HOJA INFORMATIVA SOBRE EL REFUGIO DE RAPACES DE MONTEJO
Nº 50 / Marzo de 2019

Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo



Gorrión moruno macho con ceba, en Maderuelo. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 9 de agosto de 2018.)



Lagarto ocelado. (Fotografía: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España. 2 de julio de 2018.)

HOJA INFORMATIVA SOBRE EL REFUGIO DE RAPACES DE MONTEJO

Nº 50 / Marzo de 2019

Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo

Nota.- El Refugio de Rapaces comprende dos Refugios limítrofes. El de Montejo propiamente dicho, de cerca de 2.100 hectáreas, administrado por WWF España (Adena), comprende propiedades de los municipios o vecinos de Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia) y de Santa Cruz de la Salceda (Burgos), todas ellas en el término de Montejo. El del embalse de Linares del Arroyo, de 315 hectáreas, corresponde en su mayor parte al término de Maderuelo (Segovia); y comprende propiedades de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), entidad que lo administra. Los dos Refugios están incluidos en el Parque Natural de Hoces del río Riaza (5.185 hectáreas), también Zona Especial de Conservación (ZEC, de 5.185 hectáreas) y Lugar de Importancia Comunitaria (de Interés para la Conservación) (LIC), que comprende parte de tres téminos (Maderuelo, Montejo, y Valdevacas de Montejo); y está incluido en la ZEPA [Zona de Especial Protección para las Aves], de 6.540 hectáreas; la cual está incluida a su vez en la IBA [Área Importante para la Conservación de las Aves], de 8.464 hectáreas. El área de estudio se refiere a todas las hoces del Riaza (dentro y fuera de la IBA), y a los roquedos y otras zonas próximas; en distintos términos municipales de Segovia, Burgos y Soria.

Introducción y comentarios.-

Al igual que en años anteriores, y ante la cantidad de información relativa al Refugio (que incluye más de 70.000 páginas de apuntes y datos), la presente Hoja Informativa presentará sobre todo aquellas novedades que afecten a lo señalado en la "**Lista de vertebrados del Refugio de Rapaces de Montejo (1975-1992)**" (1993; 55 págs.), y en las "**Hojas Informativas sobre el Refugio de Rapaces de Montejo**" **Nº 22** (1996; 56 págs.), **Nº 23** (1998; 60 págs.), **Nº 24** (2000; 100 págs.), **Nº 25** (2002; 112 págs.), **Nº 26** (2003; 158 págs.), **Nº 27** (2004; 220 págs.), **Nº 28** (2005; 128 págs.), **Nº 29** (2006; 230 págs.), **Nº 30** (2006; 184 págs.), **Nº 31** (2007; 314 págs.), **Nº 32** (2008; 360 págs.), **Nº 33** (2009; 460 págs.), **Nº 34** (2010; 480 págs.), **Nº 35** (2011; 494 págs.), **Nº 36** (2012; 358 págs.), **Nº 37** (2012; 358 págs.), **Nº 38** (2013; 434 págs.), **Nº 39** (2013; 432 págs.), **Nº 40** (2014; 494 págs.), **Nº 41** (2014; 494 págs.), **Nº 42** (2015; 392 págs.), **Nº 43** (2015; 458 págs.), **Nº 44** (2016; 288 págs.), **Nº 45** (2016; 352 págs.), **Nº 46** (2017; 306 págs.), **Nº 47** (2017; 370 págs.), **Nº48** (2018; 352 págs.), y **Nº 49** (2018; 430 págs.); y también reseñará, en la medida de lo posible, los principales trabajos sobre el Refugio realizados o publicados en el último año, junto con ciertas novedades interesantes o curiosas.

El significado de los signos es el mismo que en las publicaciones antes citadas. Puede verse la explicación en la Lista de vertebrados (pp. 7-11), y un resumen en el trabajo sobre mamíferos (pp. 5-6).

Las cuatro cuadrículas UTM de 10x10 km. que incluyen parte del Refugio (30TVM40, 30TVM50, 30TVL49, y 30TVL59) se designarán, respectivamente, con los números **1**, **2**, **3** y **4**. En el caso de las aves, a la derecha del nombre de cada especie nidificante se indicará (siempre que ello no suponga ningún peligro para su seguridad) la situación reproductora conocida [segura (**N**), probable (**n**), o posible (+)]; indicando entre paréntesis, a la derecha de cada uno de estos signos, los números de las cuadrículas UTM a que se refieren los datos correspondientes. Si los datos conocidos sobre la reproducción corresponden sólo a zonas próximas al área de estudio, pero incluidas en las cuadrículas UTM mencionadas, entonces el signo correspondiente irá entre corchetes ([ ]).

En el Refugio e inmediaciones se han citado un total de 333 especies de vertebrados (323 seguras y 10 dudosas): 247 especies de aves (243 + 4), 47 especies de mamíferos (45 + 2), 16 especies de reptiles (14 + 2), 12 especies de anfibios (11 + 1), y 11 especies de peces (10 + 1) (incluyendo dos aves y cuatro peces introducidos; y excluyendo citas muy dudosas reseñadas en el Apéndice 1, y "Anexos", de la Lista de vertebrados). De ellas, el autor ha comprobado la presencia de unas 251 (241+10): 193 aves (188+5), 29 mamíferos (27+2), 12 reptiles (11+1), 10 anfibios (7+3), y 7 peces.

Hasta ahora, y después de la creación del Refugio, se ha comprobado algún año la reproducción en la zona de al menos 128 especies de aves (y 8 más en zonas próximas) [123 seguras (y otras 5 en zonas próximas), 4 probables (y 2 más en zonas próximas), y 1 posible (y 1 más en zonas próximas)], 20 especies de mamíferos (19 seguras y 1 probable), 9 especies de reptiles (7 seguras y 2 probables), y 8 de anfibios (7 seguras y 1 probable). Suman 165 especies reproductoras (y 8 más en zonas próximas) [156 (+5) seguras, 8 (+2) probables, y 1 (+1) posibles], sin contar los peces (ni los datos dudosos).

Depósito legal: M-18218-2000. Impresión: EL ESTUDIO.
I. S. S. N.: 1576-3609. Dirección del autor.- c/ Pensamiento, 15 – 3º AB / 28020-Madrid.

Las informaciones contenidas en la presente Hoja Informativa pueden ser reproducidas indicando su procedencia (y si se trata de una observación o un dato concreto, o de uno o varios censos, también el autor correspondiente). Para citarla, se recomienda la siguiente forma:

--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2019). *Hoja Informativa sobre el Refugio de Rapaces de Montejo*, Nº 50. Editada por el autor. Madrid. 496 págs.

AVES (Paseriformes).-

Las principales novedades relativas a las aves no paseriformes, entre marzo de 2018 y marzo de 2019, aparecen en la **Hoja Informativa Nº 51**. Aquí figuran las aves paseriformes.

Un nuevo e importante libro que recoge bastantes datos recientes sobre las aves de la zona, y de otras localidades, es el siguiente, que recomendamos:
--- Román Sancho, F.; Lobo Cueva, J. L.; y Fernández González, R. (2018). **Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos. Volumen V.** Caja de Burgos. Aula de Medio Ambiente. Burgos. 300 págs.

El orden aquí seguido es el de la **Lista de las Aves de España** (Gutiérrez, R.; De Juana, A.; y Lorenzo, J. A.; SEO, 2012), con las mínimas modificaciones del citado **Anuario Ornitológico de Burgos (Volumen V**, 2018**)**, aunque haya habido cambios taxonómicos posteriores. Manuel de Andrés Moreno proporciona amablemente la lista que se reproduce al final (págs. 489-491), de las especies mencionadas en las Hojas Informativas, con el orden actualizado de acuerdo con la siguiente referencia:
--- Gill, F.; y Donsker, D. (eds.) (2018). **IOC (International Ornithological Congress) World Bird List** (v. 9.1).

132.- **ALONDRA DE DUPONT o ALONDRA RICOTÍ** (*Chersophilus duponti*) N(3,4) n([2])

Un extenso trabajo sobre la **alondra ricotí o alondra de Dupont**, que recoge prácticamente toda la información sobre la especie que he obtenido o conocido durante cuarenta años, así como reseñas de las publicaciones que ha habido sobre el tema, aparece en la **Hoja Informativa Nº 40** sobre el Refugio (páginas 2 a 33; "***La alondra ricotí en la zona del Refugio de Montejo***"), y puede verse también en www.naturalicante.com. Aparecen datos posteriores en las **Hojas Informativas Nº 42** (págs. 2-3), **Nº 44** (págs. 2-4), **Nº 46** (págs. 2-3), y **Nº 48** (págs. 2-3); y para el paramo de Corcos (al parecer, el último paraje de Burgos donde aún sobrevive la especie), en los nuevos informes publicados en www.avesdeburgos.com. Otras novedades recientes se indican más adelante.

La alondra ricotí es una especie vulnerable según la legislación vigente, y está considerada "*en peligro*" tanto en el "***Libro Rojo de las Aves de España***" como en el "***Atlas de las Aves Reproductoras de España***". Como es bien sabido, la disminución del pastoreo extensivo, y en ciertas regiones también la transformación del medio, han sido nefastas para este pájaro que vuela poco, de voz inconfundible pero muy difícil de ver ("*¿Has visto al ricotíííí…? No, yo no lo viiii…*"), tan misterioso que su presencia en España (y en Europa), como reproductor, no fue descubierta para la ciencia hasta hace unas pocas décadas (aunque tiene diferentes nombres locales). Este "*amigo del desierto*" (traducción literal del nombre científico del género, como bien indica el profesor Francisco Bernis Madrazo en su "***Diccionario de nombres vernáculos de aves***") rechaza los campos cultivados y sólo se reproduce, que sepamos, en páramos sin roturar, y sin árboles o casi, de vegetación rastrera. En cambio, otras aves esteparias de la zona, como por ejemplo la **calandria**, parecen preferir claramente las llanuras cultivadas a los páramos naturales, al menos durante la época de cría. Un estudio sobre las preferencias de hábitat y sobre otras cuestiones, de todas las especies de aves esteparias de la zona, fue publicado en 2003, por Fidel José

Fernández y Fernández-Arroyo, en la revista científica "*Oxyura*" (Volumen XI, Nº 1, págs. 167 a 179; "***Las aves esteparias del Refugio de Rapaces de Montejo***").

Los datos del autor en 2017 aparecen resumidos en:
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2018). **Alondra ricotí *Chersophilus duponti***. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, Vol. 65(1), I-2018, págs. 173-174

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-

--- El 1 de abril de 2018, a las 8 h. 35 m. y a las 8 h. 50 m., uno o dos ejemplares oídos en el páramo de Valdebejón (cuadrícula 3), en el lado izquierdo (aunque "parece que el canto venía de la ladera del barranco (o quizás de Valdepardebuyes), pero se oía bastante bien". (Xavier Parra Cuenca).

--- El 7 de mayo de 2018, tres ejemplares oídos en los páramos de Moral de Hornuez (cuadrícula 4). Se indican las coordenadas de cada sitio. (Carlos Palma Barcenilla).

--- También en 2018, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo anota nuevos cantos de la especie; en los páramos del sureste (el 15 de abril, entre las 11 h. 27 m. y las 11 h. 38 m., varias veces, cerca de Valtejo; el 30 de mayo, entre las 12 h. 39 m. y las 13 h. 45 m., varias veces, en el páramo alto cerca de Los Poyales 1ª; el 10 de junio, entre las 7 h. 38 m. y las 9 h. 32 m., oídos bastantes veces al menos dos machos cantores, en el páramo alto entre la margen derecha de Valtejo y la margen izquierda de La Carceleja; con lo que se obtiene un total de al menos 3 ejemplares), posiblemente en los páramos del suroeste (el 6 de junio, a las 19 h. 8 m., no con seguridad, en el páramo alto justo después del Reguero de los Pozos), y en los páramos de la Retuerta (en la parta alta de la margen derecha; el 28 de mayo, a partir de las 10 h. 36 m., más de una vez; el 3 de junio, entre las 17 h. 17 m. y las 22 h. 26 m., varias veces, en la misma zona; el 4 de junio, a las 3 h. 47 m., a las 7 h. 21 m. [varias veces], y a las 14 h. 6 m., en la misma zona; y el 21 de julio, a las 13 h. 11 m., no con seguridad, en la misma zona). Se obtiene un total de **al menos 4-5 machos cantores** (al menos 3 en los páramos del sureste [cuadrícula 4], posiblemente uno en los páramos del suroeste [cuadrícula 3], y al menos uno en los páramos de la Retuerta [cuadrícula 4]), y muy posiblemente más.

Teniendo en cuenta los datos de los tres naturalistas citados, se obtiene un total de **al menos 7-9 machos cantores**, y seguramente más.

En el censo de otoño de 2018, se obtiene una cita más, en los páramos del sureste:
--- El 11 de noviembre, a las 7 h. 15 m., una alondra de Dupont cantando (oída), en los páramos del barranco del Boquerón (Javier Cano Sánchez y Carlos Cano Barbacil).

Y en el comienzo de 2019, aparecen una o dos citas:
--- El 16 de febrero, a las 18 h. – 18 h. 20 m. ap., una alondra de Dupont oída, en los páramos del nordeste, frente a S.I. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio).
--- El 20 de febrero, una posible alondra de Dupont oída, en los páramos del suroeste. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio).

En la "**Memoria anual del Parque Natural Hoces del río Riaza. Año 2018**" (Junta de Castilla y León, pág. 84), puede leerse:
"*Informe de capturas de alondra ricotí Chersophilus duponti en la provincia de Segovia realizado en 2018 en el entorno del PNHR* [*Parque Natural de las Hoces del Riaza*] *por el equipo de investigación del Grupo de Ecología Terrestre de la Universidad Autónoma de Madrid (TEG-UAM).*
El equipo dirigido por Juan Traba Díaz, Profesor Titular del Departamento de Ecología, TEG-UAM, Universidad Autónoma de Madrid, ha realizado durante los días 20 a 25 de marzo de 2018, las actividades de censo y capturas de alondra ricotí Chersophilus duponti en la provincia de Segovia como parte del proyecto LIFE 15NAT/ES/000802 para la Conservación de la alondra ricotí y su hábitat. Las zonas donde se realizaron dichas actividades se encontraban dentro de los Parques Naturales de Hoces del río Duratón y Hoces del río Riaza.
Haciendo uso de cepos malla y reclamos se consiguieron capturar un total de 24 ejemplares:
12 individuos (11 machos y 1 hembra) en las Hoces del río Duratón, y otros 12 individuos (9 machos y 3 hembras) en las Hoces del río Riaza.

En el Parque Natural Hoces del río Riaza las capturas se han realizado al sur del arroyo Valtejo y Llano del Raso en el término municipal de Maderuelo y en los páramos del entorno del barranco de Bañuelos en el término municipal de Villaverde de Montejo."

[Observación.- Todo el término de Villaverde de Montejo está fuera del Parque Natural.]

(Sobre otras estimaciones publicadas, de la población de alondra de Dupont en la zona, véanse las **Hojas Informativas Nº 30**, págs. 2-4; **Nº 26**, pág. 2; **Nº 28**, pág. 3, Notas 3 a 6; **Nº 34**, págs. 2-20; **Nº 36**, págs. 2-3; **Nº 38**, págs. 2-3; **Nº 40**, pág. 2; **Nº 42**, págs. 2-3; **Nº 44**, págs. 2-4, **Nº 46** (págs. 2-3), y **Nº 48**, págs. 2-3. / Otras referencias, sobre la especie allí, pueden verse en la **Hoja Informativa Nº 32**, págs. 2-4; y en Hojas Informativas anteriores).

Por otro lado, sobre actuaciones recientes y proyectos relativos a la alondra ricotí en el páramo de Corcos (Burgos), pueden verse novedades en los siguientes artículos:

--- Antón, B. (2018). **La Fundación Alondra Ricotí trabaja por conservar la colonia de la zona de Haza, única en Burgos. / Actualmente residen en este rincón de la Ribera 12 parejas, que son muy difíciles de ver y cuyo canto es espectacular.** *Diario de Burgos*, 2 de diciembre de 2018, pág. 36. (Con fotografías de Alfonso Antón y de Jesús Lázaro).

--- Palma Barcenilla, C. (2018). **La colaboración a nivel local favorece al último reducto burgalés de alondra ricotí. / La colaboración a tres bandas entre conservacionistas, viticultores y un ayuntamiento ha hecho posible la mejor del hábitat de la alondra ricotí en el páramo de Corcos, último reducto que queda de esta especie amenazada en toda la provincia de Burgos.** *Quercus*, Nº 384, febrero de 2018, pág. 44.

--- Palma Barcenilla, C.; y Lüders, U. (2018). **Recuperando el hábitat de la alondra ricotí (*Chersophilus duponti*) en el páramo de Corcos (Burgos).** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 20, marzo de 2018, pág. 33. (Con fotografías de Carlos Palma).

--- Pascual, I. (2018). **Los amantes del fantasma de la estepa. / La Oficina Verde de la UBU dedica este curso su programa ambiental a ayudar a la Fundación Alondra Ricotí en la recuperación de esta especie en peligro de extinción, con apenas 12 parejas.** *Diario de Burgos*, 21 de septiembre de 2018, pág. 26.

--- Román Sancho, F. (2018). **Alondra ricotí, *Chersophilus duponti***. Págs. 145-146 en : Román Sancho, F.; Lobo Cueva, J. L.; y Fernández González, R. **Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos. Volumen V.** Fundación Caja de Burgos y Diputación Provincial de Burgos. Burgos. 300 pp.

--- Santamaría, D. (2018). **La UBU espera recaudar 10.000 euros para salvar a la alondra ricotí. / El Páramo de Corcos es el último reducto provincial de las 12 parejas de esta ave esteparia en peligro de extinción. / Su supervivencia depende de la compra de parcelas que se adapten a su hábitat.** *El Correo de Burgos*, viernes 21 de septiembre de 2018, pág. 9.

En el Volumen V del **Anuario Ornitológico de Burgos** (pág. 145), Fernando Román indica que "*los registros aportados para la presente edición señalan la presencia de un único núcleo reproductor estable en nuestro territorio, el del Páramo de Corcos, de acuerdo a lo ya señalado anteriormente (…).*"

Nota.- La población de alondra de Dupont en la zona (y las de ortega, collalba negra, martín pescador, halcón peregrino, águila real, alimoche, y buitre leonado) están mencionadas también en el documento "**Plan básico de gestión y conservación del Espacio Protegido Red Natura 2000 ZEPA-ES4160008-Hoces del Río Riaza-ZEPA**" (Junta de Castilla y León, 2016, 28 páginas).

133.- **CALANDRIA** (*Melanocorypha calandra*) N(1,4) n(2)

Nuevos datos sobre agrupaciones.- Año 2018.-
--- El 9 de agosto, unas 30 calandrias en un campo cerca de Valdevarnés (Segovia, cuadrícula 4). (Xavier Parra Cuenca).
--- El 11 de octubre, unas 10 calandrias en el llano de Milagros (Burgos, cuadrícula 1). (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).
--- El 11 de noviembre, unas **600** calandrias en la zona del alto del Bercial (Segovia, cuadrícula VL58). (Xavier Martín Vilar).

Entre las mayores agrupaciones de esta especie anotadas en la zona, figuran las citadas en la **Hoja Informativa Nº 40**, págs. 33-34.

Notas.- 1) En los censos de otoño, se ha registrado esta especie en **1988**, **1990** (sólo oída), **1991**, **1994** (sólo oída), **1995**, **1996**, **1997**, **1998**, **2001**, **2002**, **2004**, **2006**, **2007**, **2008**, **2009**, **2010**, **2011** (sólo oída), **2012**, **2013**, **2014**, **2015**, **2016**, **2017**, y **2018**.

2) En el Volumen V del **Anuario Ornitológico de Burgos** (pág. 146), Fernando Román Sancho indica de la calandria que "*se sigue constatando un acusado declive en sus poblaciones*".

134.- **TERRERA COMÚN** (*Calandrella brachydactyla*) N(1,3) n([2],4)

Nuevas citas.- Año 2018.-
--- El 4 de junio, a las 17 h. 4 m., una terrera común, muy confiada, en los llanos cultivados cerca de Vallunquera (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 13 de junio, a las 12 h. 46 m., una terrera común con ceba en el pico, en la carretera de la coronación de la presa (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 12 de agosto, a las 11 h. 30 m., seis terreras comunes, en campos de Moral de Hornuez (camino de Las Rozas; cuadrícula 3 ap.). Se obtienen fotos de un ejemplar. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 21 de agosto, a las 15 h. 30 m., terrera común oída, en los páramos cerca de Castroserracín (cuadrícula VL38). (Carlos Palma Barcenilla y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Nota.- En el Volumen V del **Anuario Ornitológico de Burgos** (pág. 146), se recoge la cita, debida a Carlos Palma Barcenilla, de tres terreras comunes en los eriales de Casanova (cuadrícula VM61) el 1 de abril de 2015, como la primera observación del año para la provincia.
En la misma publicación, Fernando Román Sancho indica que "*las aves asociadas a medios agrícolas como la terrera común continúan con un marcado descenso en sus efectivos a nivel provincial (…)*".

135.- ***TERRERA MARISMEÑA** (*Calandrella [Alaudala] rufescens*) A

Véase lo indicado sobre esta especie en las **Hojas Informativas Nº 26** (pág. 6), **Nº 28** (pág. 5), **Nº 30** (pág. 6), y **Nº 32** (pág. 6). No hemos conocido novedades posteriores.

136.- **COGUJADA COMÚN** (*Galerida cristata*) N(1,3) n(2) +(4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-

--- El 21 de julio de 2018, a las 12 h. 10 m., una cogujada común con ceba, en el barranco lateral al de San Andrés (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

137.- **COGUJADA MONTESINA** (*Galerida theklae*) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, excepto aquellas en que se indica otro autor).

-- El 13 de mayo, a las 19 h. 57 m., **un nido** ocupado de cogujada montesina, con un adulto y **cuatro huevos**, en los páramos cerca del barranco de la Retuerta (cuadrícula 4). El nido está en el suelo, entre la hierba; tiene unos 10 cm. de diámetro externo. Los huevos son moteados, con el polo grueso más oscuro. (Fot.)
-- El 14 de mayo, a las 19 h. 20 m., una cogujada montesina con ceba, en lo alto del Murujón de la Hoz (cuadrícula 1).
-- El 16 de mayo, a las 20 h. 13 m., **un nido** ocupado de cogujada montesina, con un adulto y **cinco huevos**, en lo alto de la margen derecha del barranco de Covanegra (cuadrícula 3). El nido está en el suelo, bajo una matita de espliego o salvia; tiene unos 11 cm. de diámetro externo. Los huevos son como los del nido del 13 de mayo. (Fot.)
-- El 21 de mayo, a las 13 h. 10 m., una cogujada montesina con ceba, en el llano al este de la parte final del Reguero de los Pozos (cuadrícula 3).
-- El 28 de mayo, a las 10 h. 45 m., una cogujada montesina con ceba, en el páramo de la margen derecha del barranco de la Retuerta (cuadrícula 4).
-- El 30 de mayo, a las 10 h. 47 m., una cogujada montesina con ceba, en el páramo alto entre El Gordo y Los Poyales (cuadrícula 4).
-- El 15 de junio, a las 13 h. 41 m., una cogujada montesina con ceba, que reclama, en el valle del Pozarón (en lo alto de la margen izquierda, frente a la buitrera; Burgos, cuadrícula VM20).
--- El 12 de agosto, una cogujada montesina con ceba, fotografiada, en Moral de Hornuez. (Xavier Parra Cuenca).

138.- **TOTOVÍA (o ALONDRA TOTOVÍA)** (*Lullula arborea*) N(¿1?,2,3,4) n(1)

Nuevos datos sobre la reproducción.-

Año 2018.-
--- El 5 de mayo, a las 10 h. 19 m., en el sabinar del norte del Refugio (cuadrículas 3-4), frente a la parte final de Peña Cuervo, dos totovías cantan en vuelo y parecen seguirse. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Comienzo de 2019.-
--- El 14 de marzo, entre las 9 h. 49 m. y las 9 h. 51 m., dos totovías, una de las cuales coge material, en campos de Valdevacas de Montejo, en la subida del valle paralelo al Tercer Valle. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

139.- **ALONDRA (COMÚN)** (*Alauda arvensis*) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-
--- El 22 de abril, a las 13 h. 2 m., una pareja de alondras que parece estar en cortejo, junto al camino al comedero de buitres de Ayllón (Segovia, cuadrícula VL68). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 9 de agosto, una alondra común joven en el alto del Bercial (Segovia, cuadrícula VL58). (Xavier Parra Cuenca).

Nota.- Sobre los grupos de alondras registrados en el **censo de otoño de 2018**, véase el Informe final correspondiente, pág. 64.

140.- * **AVIÓN ZAPADOR** (*Riparia riparia*) B [N([2])]

Pueden verse novedades anteriores en las **Hojas Informativas Nº 34** (pág. 24), **Nº 40** (pág. 39), y **Nº 44** (pág. 6). Véanse también las **Hojas Informativas Nº 26** (pág. 9), **Nº 28** (pág. 7), **Nº 30** (págs. 8-9), y **Nº 32** (pág. 9).

141.- **AVIÓN ROQUERO** (*Ptyonoprogne rupestris*) N(1,3,4) +(2)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, excepto aquellas en que se indica otro autor).

--- El 6 de abril, se constata que el avión roquero nidifica en Covanegra (cuadrícula 3). (Jesús Cobo Anula, biólogo conservador del Refugio, de WWF).
--- El 15 de abril, veo el nido del avión roquero en la cueva grande alta del barranco de Valtejo (margen derecha, cuadrícula 4).

El 31 de mayo, un avión roquero acude a ese nido, que sin duda está ocupado. Se ve plumón, hay deyecciones debajo, y después veo idas y venidas de la pareja de aviones roqueros.

El 1 de junio, veo por allí la pareja de aviones roqueros, y veo que alguno de ellos acude al nido.

El 17 de julio, en la misma cueva, veo muchas deyecciones bajo el nido, que sin duda ha estado ocupado este año; a las 17 h. 13 m., un avión roquero vuela cerca.

Sobre observaciones del autor en años anteriores, relativas a la reproducción del avión roquero en esa cueva, puede verse un resumen en la **Hoja Informativa Nº 36** (pág. 34), con datos posteriores en las **Hojas Informativas Nº 42** (pág. 5), **Nº 44** (pág. 6), **Nº 46** (pág. 4), y **Nº 48** (pág. 6). Véase también la **Hoja Informativa Nº 34** (pág. 25).
--- El 17 de abril, a las 15 h. 31 m., tres aviones roqueros junto a la salida norte del túnel al sur del viaducto; a las 19 h. 55 m., dos aviones roqueros junto a la salida sur del túnel pequeño; y a las 20 h. 53 m., avión roquero junto a la salida sur del túnel del sur. (Cuadrícula 4).
--- El 16 de mayo, en torno a las 21 h. 56 m., vuelan dos aviones roqueros por la cueva grande de P.C.T.R. (cuadrícula 3).

Sobre observaciones del autor en años anteriores, relativas a la reproducción del avión roquero en esa cueva, puede verse un resumen en la **Hoja Informativa Nº 36** (pág. 34), con datos posteriores en las **Hojas Informativas Nº 42** (pág. 5), **Nº 44** (pág. 6), **Nº 46** (pág. 4), y **Nº 48** (pág. 6). Véase también la **Hoja Informativa Nº 34** (pág. 25).
--- El 23 de mayo, un nido de avión roquero en Peñalba, en el techo de la "Cueva de la Calabaza" (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 24 de mayo, a las 11 h. 35 m., un avión roquero acude al techo del extraplomo sobre el nido de buitre leonado (con pollito) Nº 60 de V.A.D. (cuadrícula 4).
--- El 10 de junio, a las 16 h. 31 m., veo un nido ocupado de avión roquero (entra y sale el adulto) en Peña de la Zorra (cuadrícula 1), encima del nido fracasado Nº III del cuervo.
--- El 17 de julio, en la cueva baja de la margen derecha del barranco de Valtejo (cuadrícula 4), veo tres nidos de avión roquero; uno parcial, otro con un antiguo nido de chochín, y otro del que sobresale un palito. A las 15 h. 56 m., un avión roquero vuela cerca.

Sobre observaciones del autor en años anteriores, relativas a la reproducción del avión roquero en esa cueva, véase lo anotado en las **Hojas Informativas Nº 32** (pág. 110, en el apartado sobre 2008), **Nº 34** (pág. 25, en los apartados sobre 2009 y 2010), **Nº 36** (pág. 34), **Nº 38** (pág. 36), **Nº 46** (pág. 5), y **Nº 48** (pág. 6).
--- El 5 de agosto, a las 8 h. 36 m., veo un nido de avión roquero en la hoz del río Dulce (Pelegrina, Guadalajara, cuadrícula WL25).

Comienzo de 2019.-
--- El 27 de febrero, a las 15 h. 30 m. ap., una pareja de aviones roqueros, que por su comportamiento debe de tener nido, por el mirador de la presa (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 26 de marzo, a las 9 h. 50 m., "*un avión roquero volando sobre la carretera a la altura de La Catedral, con una pluma grande cobertora blanca que parece pegada al cuerpo. Se cae la pluma e inmediatamente la captura en vuelo (construcción de nido).*" (Jesús Cobo Anula, asesor técnico de WWF para el Refugio).

Nuevos datos sobre citas en otoño o invierno.-
Anexo para el otoño de 2003.- A los datos señalados en la **Hoja Informativa Nº 28** (págs. 7-8) puede añadirse:
--- El 2 de noviembre de 2003, avión roquero en las hoces del Riaza (Christophe Pontegnie, en eBird).

Anexo para el otoño de 2017.- A los registros señalados en la **Hoja Informativa Nº 48** (págs. 6-7), puede añadirse:
--- El 6 de octubre de 2017, avión roquero, en las hoces del Riaza. (Ramón Ballester, en eBird).

Otoño de 2018.-
--- El 11 de octubre de 2018, unos 20 aviones roqueros en vuelo, en Peña de la Zorra. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).

--- El 10 de noviembre de 2018:
16 h. ap.- Tres o cuatro aviones roqueros debajo de la presa. (Juan Prieto Martín y Alejandro Quecedo del Val).
17 h. 3 m.- Avión roquero por el Boquerón, visto desde lo alto de P.D.D. (José Luis López-Pozuelo García).
17 h. 5 m.- Otro avión roquero sobre el poblado de la presa. (José Luis López-Pozuelo García).
17 h. 24 m.- Doce aviones roqueros. P.D.D. (Eduardo Álvarez Cebrián y Javier Díez de Artazcoz Abellán).
Por la tarde.- Doce aviones roqueros. La Catedral. (Jorge Andrés Remacha Lorenzo, José Miguel Ibáñez de la Fuente, y Petra de Pablo González).
Por la tarde.- Avión roquero. Peña Fueros derecha (José Luis Armendáriz Sanz y Francisco Jesús Fernández Herrera).

--- El 11 de noviembre de 2018:
8 h. 6 m.- Dos aviones roqueros. V.A.D. (Juan Prieto Martín y Alejandro Quecedo del Val).
8 h. 18 m.- Dos aviones roqueros. V.A.D. (Juan Prieto Martín y Alejandro Quecedo del Val).
9 h. 24 m.- Una docena de aviones roqueros sobre el Cerrejón. (José Luis López-Pozuelo García).
12 h. 51 m.- Avión roquero. Peña Portillo. (Javier Cano Sánchez y Carlos Cano Barbacil).
Por la mañana.- Avión roquero. P.D.D. (Eduardo Álvarez Cebrián y Javier Díez de Artazcoz Abellán).
Por la mañana.- Avión roquero. Peña Fueros derecha (José Luis Armendáriz Sanz y Francisco Jesús Fernández Herrera).
Por la mañana.- Tres aviones roqueros. V.D.I. (Bruno Chacón Espinosa, Daniel Carrera Estévez y Diego Carrera Sánchez).
Por la mañana.- Diez aviones roqueros. La Catedral. (Jorge Andrés Remacha Lorenzo, José Miguel Ibáñez de la Fuente, y Petra de Pablo González).

--- El 17 de noviembre de 2018, bastantes aviones roqueros sobre la ermita de El Casuar. (Participantes en una excursión al Refugio del grupo de Madrid de WWF, guiada por José Luis López-Pozuelo García y Paloma Fraguío Piñas. Estuvieron también Gerardo Barsi Moreau [coordinador del grupo], Jesús E. Márquez Burillo [portavoz del grupo], Almudena Fadrique Reyes, Juan Carlos Velázquez Melero, Patricia Monteverde Vitoria, Rosa Alonso Alarcón, y Francisco Guerra Ortiz.)

Nota.- En el **Informe 70** del **Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos** se publican varios registros de concentraciones de aviones roqueros en octubre, en distintas localidades, así como una cita en noviembre y otra en diciembre.

--- Comienzo (invierno) de 2019.-
--- El 27 de febrero, a las 12 h. 57 m, bastantes aviones roqueros por La Catedral (S.D.); y a las 15 h. 12 m. y después, aviones roqueros por la presa. (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 13 de marzo, a las 16 h. 9 m., un avión roquero vuela sobre la ladera baja, bajo El Castillo. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 20 de marzo, a las 10 h. 35 m., algún avión roquero frente a Valdeparaíso; y a las 12 h. ap., aviones roqueros en La Catedral (S.D.). (José Luis López-Pozuelo García).

Nuevos datos sobre agrupaciones.- Año 2018 (a partir de marzo, inclusive).-

--- El 30 de marzo, entre las 10 h. 0 m. y las 13 h. 30 m., más de 50 aviones roqueros, en la parte final de La Catedral. Se indica el sitio en una fotografía. (Martín Francisco Arévalo Sánchez).

Nota.- De acuerdo con lo que se indicó en la **Hoja Informativa Nº 34** (pág. 26), y con los datos posteriores, en los censos de otoño el avión roquero ha sido señalado en **1989**, **1990**, **1996**, **1997**, **2000**, **2001**, **2002**, **2003**, **2004**, **2006**, **2007**, **2008**, **2009**, **2010**, **2012**, **2013**, **2014**, **2015**, **2016**, **2017**, y **2018** (y en **1987** en el Duratón).

Si fueran distintos los aviones roqueros observados en sitios diferentes, se habrían visto al menos unos 155-165 aviones roqueros (y posiblemente más) en el censo de otoño de 2014, unos 45 en el censo de otoño de 2015, unos 42 en el de 2016, unos 28 en el de 2017, y unos 31 en el de 2018.

Ataques aéreos.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 17 de julio, a las 11 h. 13 m., un avión roquero da pasadas a un cernícalo vulgar hembra posado, en el 2º Valle (margen izquierda, fin total, ya en el cañón del río). Después, el avión roquero acosa en vuelo a un cernícalo vulgar que vuela y que parece distinto y macho.

--- El 31 de julio, a las 18 h. 53 m., un avión roquero acosa a un cernícalo vulgar macho adulto que vuela gritando, en el barranco de los Callejones (en la zona del nido de buitres Nº 2; provincia de Soria).

Véase lo indicado al respecto en las **Hojas Informativas Nº 30**, págs. 9-10; **Nº 32**, pág. 11; **Nº 34**, págs. 26-27; **Nº 36**, pág. 35; **Nº 38**, pág. 37; **Nº 40**, pág. 41; **Nº 42**, pág. 6; **Nº 46**, pág. 6; y **Nº 48**, pág. 7.

142.- **GOLONDRINA COMÚN** (*Hirundo rustica*) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-

--- En Barbolla (Segovia, cuadrícula VL47), entre el 15 y el 17 de junio, Antonio Fernández Ortiz señala la reproducción de la especie en el pueblo.

Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2018.-
--- El 27 de marzo, a las 18 h. 50 m., una golondrina común en Campo de San Pedro; y después, a las 19 h. 45 m., dos golondrinas comunes en Riguas (cuadrícula VL58, para ambas citas). (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).
--- El mismo día 27 de marzo, al atardecer, una golondrina común en Barbolla (Segovia, cuadrícula VL47), "*buscando refugio del frío que hacía*". (Antonio Fernández Ortiz).
--- El 28 de marzo, a las 13 h. 49 m., una golondrina común en el barranco de San Andrés (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El mismo día 28 de marzo, ap., de nuevo una golondrina común en la zona de Barbolla (Segovia, cuadrícula VL47). (Antonio Fernández Ortiz).
--- El 30 de marzo, unas diez golondrinas comunes, siguiendo un rebaño de ovejas, en la estación de Maderuelo. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 31 de marzo, dos golondrinas comunes posadas (se obtiene foto), y varias volando sobre el río, en Montejo de la Vega. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 1 de abril, golondrina común en Montejo de la Vega, y en Languilla. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 2 de abril, golondrinas comunes en Valdevacas de Montejo. (Juan José Molina Pérez y Juan Francisco Martín Calleja).
--- El mismo día 2 de abril, entre las 15 h. 3 m. y las 15 h. 26 m., varias observaciones de golondrina común, cerca de Montejo de la Vega. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
A partir de esa fecha, hay más registros de la especie.
Puede añadirse que, este año, se señala entre el 1 y el 20 de abril, para una amplia zona en torno al área de estudio, en el mapa de la llegada de la golondrina común en España, que figura en el "**Calendario Meteorológico 2019**" de la Agencia Estatal de Meteorología (Madrid, 2018, 356 pp., págs. 179-181; "***Llegada de la golondrina en la primavera de 2018***"). (Amablemente enviado por Javier Cano Sánchez).

Comienzo de 2019.-
--- El 26 de marzo, a las 16 h. 12 m., al menos dos golondrinas comunes en Montejo de la Vega, volando sobre el Molino. (Jesús Cobo Anula, asesor ténico de WWF España para el Refugio de Montejo).
--- El 28 de marzo, a las 11 h. 10 m., al menos tres golondrinas comunes en Montejo de la Vega. (Jesús Cobo Anula, , asesor ténico de de WWF España para el Refugio de Rapaces de Montejo).

Nuevos datos sobre partidas.- Año 2018.-
--- El 11 de septiembre, golondrina común en las afueras de Fuentelcésped (Burgos). (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España).
--- El 16 de septiembre, a las 19 h. 8 m., golondrinas comunes en el pueblo de Montejo. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

143.- **GOLONDRINA DÁURICA** (*Cecropis daurica*) [N(1,3)] +(4)

Nuevas citas (año 2018):

S/n) El 16 de junio, dos golondrinas dáuricas junto al puente de Navapalos sobre el río Duero (Sorica, cuadrícula VL89). (Fermín Redondo Ramírez).

S/n) El 19 de junio, una golondrina dáurica en Fresnillo de las Dueñas (Burgos, cuadrícula VM41). (Candelas Iglesias Aparicio y Xavier Martín Vilar).

S/n) El 5 de agosto, a las 14 h. 31 m., una golondrina dáurica en el barranco de Valdearcos (Guadalajara, cuadrícula WL26). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

34) El 9 de septiembre, al menos dos golondrinas dáuricas, volando alrededor del puente de Alconadilla (Segovia, cuadrícula 4), junto a muchas más golondrinas comunes y aviones comunes. Un ejemplar es fotografiado. (Xavier Parra Cuenca).

(Recuérdese la observación realizada en la misma zona el 17 de septiembre del año anterior, por el autor, citada en la **Hoja Informativa Nº 48**, pág. 9.)

Notas.- 1) Sobre los nidos conocidos en el nordeste de Segovia, véanse las **Hojas Informativas Nº 23** [pág. 33], **Nº 24** [pág. 57], **Nº 26** [pág. 14], **Nº 28** [págs. 9-10], **Nº 30** [págs. 11-12], **Nº 32** [pág. 13], y **Nº 46** [pág. 6]. Sobre nidos en el sur de Burgos o en el suroeste de Soria, véanse las **Hojas Informativas Nº 23** [pág. 33], **Nº 34** [págs. 29-30], **Nº 36** [pág. 37], **Nº 38** [pág. 38], **Nº 42** [pág. 8], **Nº 44** [pág. 8], **Nº 46** [pág. 7], y **Nº 48** [pág. 8], así como las citas anteriores. Véase también la **Hoja Informativa Nº 40**, pág. 43.

2) La observación realizada por Javier Vitores Casado, de una posible golondrina dáurica el 13 de marzo de 2016 en las graveras de Villalba de Duero, aparecida en la **Hoja Informativa Nº 44** (pág. 8), aparece citada por Fernando Román Sancho, indicando la fuente, en el Volumen V del **Anuario Ornitológico de Burgos** (pág. 152); señalando que "*sería la primera cita para ese año*" en la provincia.

144.- **AVIÓN COMÚN** (*Delichon urbica* [*urbicum*]) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, excepto aquellas en que se indica otro autor).

--- Ayllón (Segovia, cuadrícula VL68).- El 19 de mayo, a las 21 h. 7 m., veo dos aviones comunes que acuden a sendos nidos en construcción, en el edificio del Banco de Santander.

--- Barbolla (Segovia, cuadrícula VL47).- Entre el 15 y el 17 de junio, Antonio Fernández Ortiz señala la reproducción de la especie en el pueblo. Entre el 6 y el 8 de julio, Antonio Fernández indica que "*se ven nidos de avión común en la cornisa del Ayuntamiento*".

--- Boceguillas (Segovia, cuadrícula VL47).- El 20 de junio, en el silo, cuento al menos **111** nidos de avión común: al menos 68 nidos (enteros o no, algunos ocupados) en la cara sur, 5 nidos en la cara este, y 38 nidos en la cara norte.

Se recuerda que el 15 de junio de 2012 conté al menos **47** nidos (47-50) de avión común en la cara sur del silo de Boceguillas (véase la **Hoja Informativa Nº 38**, pág. 39); el 21 de junio de 2014 conté al menos **57** nidos de avión común, algunos ocupados, en el mismo silo (al menos 33 en la cara sur, y al menos 24 en el otro lado; véase la **Hoja Informativa Nº 42**, pág. 8); el 21 de junio de 2015, conté **48** nidos de avión común, en parte ocupados, en el lado sur de este silo (véase la **Hoja Informativa Nº 44**, pág. 9); el 14 de junio de 2016, conté, en este silo, al menos 41 nidos de avión común en la cara norte, y al menos 61 nidos de avión común en la cara sur; lo que da un total mínimo de **102** nidos (enteros o parciales; y en parte ocupados, en ambas caras; véase la **Hoja Informativa Nº 46**, pág. 7); el 21 de junio de 2017, conté **83** nidos, en parte ocupados, en la pared sur (véase la **Hoja Informativa Nº 48**, pág. 9); y el 21 de junio de 2017, conté **111** nidos de avión común [al menos 68 nidos (enteros o no, algunos ocupados) en la cara sur, 5 nidos en la cara este, y 38 nidos en la cara norte], como antes se indicó.

--- Campo de San Pedro (Segovia, cuadrícula VL58).- El 19 de junio, cuento, en el silo de la derecha (según se mira desde la carretera de Riaguas, a la izquierda si venimos de Fuentemizarra), 44 nidos de avión común (enteros o no, y en parte ocupados); y en el otro silo, 82 nidos de avión común (enteros o no,

en parte ocupados); lo que da un total de **126** nidos de avión común, en parte ocupados en cada uno de los dos silos.

Se recuerda que el 12 de junio de 2012 conté al menos **70** nidos de avión común (30+40) en los silos de Campo de San Pedro, pero sólo en un lado de cada silo (véase la **Hoja Informativa Nº 38**, pág. 39); el 21 de junio de 2015, en los silos de Campo de San Pedro, conté **171 nidos** de avión común, ocupados en parte: en el silo de la izquierda (según se ven desde la carretera a Fuentemizarra), 88 nidos (28 en un lado y 60 en el otro); y en el silo restante, 83 nidos (51 y 32, en los lados respectivos; véase la **Hoja Informativa Nº 44**, pág. 9); el 20 de junio de 2016, conté **34 nidos** (enteros o parciales) de avión común en la pared "derecha" del silo "derecho" ("derecha" según se viene desde Riaguas) de Campo de San Pedro (cuadrícula VL58; véase la **Hoja Informativa Nº 46**, pág. 7); y el 17 de junio de 2017 conté **247** nidos de avión común: en el silo de la derecha (según se mira desde la carretera de Riaguas), 161 nidos (70 en una pared, y 91 en el otro lado), en parte ocupados (en ambas caras); y en el otro silo, 86 nidos (43, en parte ocupados, en cada lado) (véase la **Hoja Informativa Nº 48**, pág. 9); y el 19 de junio de 2018 conté **126** nidos de avión común: en el silo de la derecha (según se mira desde la carretera de Riaguas), 44 nidos, en parte ocupados; y en el otro silo, 82 nidos, en parte ocupados (como antes se indicó).

--- Fuentenebro (Burgos, cuadrícula VL39).- El 16 de junio, veo nidos de avión común.

--- Puente de Maderuelo (Segovia, cuadrícula 4, VL49).- El 1 de julio, cuento al menos **254 nidos** (enteros o parciales) de avión común: en el lado este (el lado de aguas arriba), al menos **85** nidos (parte de ellos, ocupados); y en el lado oeste (el lado de aguas abajo), al menos **169** nidos.

Recuérdese que en este puente conté, en 2011, los días 6 y 7 de julio, al menos **287** nidos (**85+202**) (véase la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 38); en 2012, el 8 de septiembre, al menos **196** nidos (**75+121**) (véase la **Hoja Informativa Nº 38**, pág. 39); en 2013, el 6 de julio, al menos **286** nidos (**83+203**) (véase la **Hoja Informativa Nº 40**, pág. 44); en 2014, el 1 de agosto, al menos **314** nidos (**88+226**) (véase la **Hoja Informativa Nº 42**, pág. 9); en 2015, el 20 de julio, al menos **249** nidos (**62+187**) (véase la **Hoja Informativa Nº 44**, pág. 9); en 2016, el 17 de julio, al menos **264** nidos (**71+193**) (véase la **Hoja Informativa Nº 46**, pág. 7); en 2017, el 17 de julio, al menos **267** nidos (**78+189**) (véase la **Hoja Informativa Nº 48**, pág. 10); y en 2018, el 1 de julio, al menos **254** nidos (**85+169**) (como antes se indicó).

--- Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia, cuadrículas 1-3).- El 12 de agosto, veo aviones comunes, y nidos.

--- Santa Cruz de la Salceda (Burgos, cuadrícula 2).- El 27 de mayo, a las 18 h. 53 m., cuento **28** nidos (16+12) de avión común, enteros o no, y al menos uno ocupado, en la plaza del pueblo, donde veo aviones comunes.

--- Vadocondes (Burgos, cuadrícula VM51).- El 20 de junio, veo al menos **10** nidos, algunos ocupados, en la iglesia.

--- Valdevacas de Montejo (Segovia, cuadrícula 3).- Año 2018.- El 5 de julio, nidos de avión común, en parte ocupados, en el pueblo de Valdevacas. Se obtienen fotografías. (Juan Francisco Martín Calleja).

Nota.- El curioso caso (por lo temprano de la fecha), reseñado en la **Hoja Informativa Nº 42** (pág. 9), de un pollo volandero de avión común encontrado muerto en Fuentenebro (Burgos) el 21 de abril de 2015, por el pastor Antonio Casado Iglesias (quien me enseñó el cadáver, visto también por Francisco Javier Ortega Pinilla), aparece comentado, citando la referencia, por Fernando Román Sancho, en el Volumen 5 del **Anuario Ornitológico de Burgos** (pág. 153).

Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2018.-

--- El 31 de marzo, por la mañana, dos aviones comunes cerca de Montejo de la Vega (en las paredes, volando sobre el río). (Xavier Parra Cuenca).

--- El 1 de abril, algún avión común en Montejo de la Vega, frente a la peña del Castillo. (Xavier Parra Cuenca).

--- El 2 de abril, a las 19 h. 30 m. ap., un avión común, en Valdevacas de Montejo. (Juan José Molina Pérez y Juan Francisco Martín Calleja).

--- El mismo día 2 de abril, un grupo de unos 15 aviones comunes en el prado de Barbolla (Segovia, cuadrícula VL47). (Antonio Fernández Ortiz).

--- El 14 de abril, a las 20 h. 7 m., aviones comunes, en Ayllón. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 20 de abril, a las 18 h. 51 m., avión común, en la parte final de Peña Fueros. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 21 de abril, a las 11 h. 57 m., avión común, en Maderuelo. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

A partir de esa fecha, hay más observaciones de la especie.

Nuevos datos sobre agrupaciones (y sobre partidas).- Año 2018.-
--- Entre el 12 y el 14 de mayo, 24 aviones reunidos en torno al prado de El Olmillo (Segovia, cuadrícula VL47). (Antonio Fernández Ortiz).
--- El 23 de julio, a las 20 h. 9 m. ap., bastantes docenas de aviones comunes, en Hontangas (Burgos). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 10 de agosto, a las 19 h. 0 m., un grupo de varias decenas de aviones comunes, cazando sobre el pinar quemado en El Guancho, con algunas golondrinas comunes. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 15 de septiembre, a las 13 h. 43 m., muchos aviones comunes, posados y volando, en la zona del Molino de Torraño (Soria, cuadrícula VL89). (Participantes en una excursión del Fondo para el Refugio, guiada por Fermín Redondo Ramírez).
--- El 16 de septiembre, a las 18 h. 58 m., aviones comunes en el pueblo de Montejo. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 17 de septiembre, en la senda de los Caracoles (cerca de Grado del Pico), muchos aviones comunes a las 10 h. 53 m., y más de 35-40 aviones comunes a las 11 h. 24 m. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Nota.- Sobre grandes agrupaciones de aviones comunes, en años anteriores, véanse las **Hojas Informativas Nº 26** (págs. 15-16), **Nº 28** (pág. 10), **Nº 30** (pág. 13), **Nº 32** (págs. 14-15), **Nº 36** (pág. 39), **Nº 38** (págs. 39-40), **Nº 40** (págs. 44-45), **Nº 46** (pág. 8), y **Nº 48** (pág. 10).

145.- **BISBITA CAMPESTRE** (*Anthus campestris*) N(1,3,4) n(2)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-
--- El 14 de junio, a las 18 h. 6 m., un bisbita campestre con ceba, en la carretera entre Cuevas de Provanco y la desviación a Las Madres del Botijas (Segovia, cuadrícula VL29). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 3 de agosto, a las 19 h. 31 m., un bisbita campestre joven, cerca del comedero de buitres de Ayllón (Segovia, cuadrícula VL68). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 15 de agosto, a las 14 h. 0 m., un bisbita campestre joven, en Moral de Hornuez (Segovia, cuadrícula 3). (Xavier Parra Cuenca).

Pueden verse datos sobre los nidos de este pájaro, descubiertos en la zona en años anteriores, en las **Hojas Informativas Nº 21** [págs. 13-14], **Nº 22** [pág. 37], **Nº 23** [pág. 33], **Nº 26** [pág. 16], **Nº 30** [pág. 13], **Nº 32** [pág. 15], **Nº 36** [pág. 40], y **Nº38** [pág. 41].

Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2018.-
--- El 18 de abril, un bisbita campestre en Arauzo de Salce (Burgos, cuadrícula VM62). (Rufino Fernández González; publicado en www.avesdeburgos.com).
--- El 21 de abril, un bisbita campestre oído, frente a Peñalba j. d. (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 27 de abril, un bisbita campestre bien visto y oído, en el páramo alto del valle del Pozarón (Burgos, cuadrícula VM20). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

146.- **BISBITA ARBÓREO** (*Anthus trivialis*) ¿[n(¿3?)]? [n([2])]

Pierde la "**C**".

Nuevas citas: Año 2018.-

S/n) --- El 30 de marzo, un posible ejemplar, no confirmado, en Moral de Hornuez. (Xavier Parra Cuenca).

25) --- El 1 de abril, a las 12 h. 48 m., un bisbita arbóreo en Montejo de la Vega, junto al puente. Se obtiene foto. (Xavier Parra Cuenca).

26) --- El 10 de septiembre, a las 11 h. 30 m., un bisbita arbóreo en Montejo de la Vega, en la fuente de La Pisadera. Se obtiene foto. (Xavier Parra Cuenca).

En el Refugio e inmediaciones, sin incluir los parajes cercanos, el total de registros fechados que conocemos asciende a 26.

Véase lo indicado sobre este pájaro en las **Hojas Informativas Nº 23** (pág. 33), **Nº 26** (pág. 17), **Nº 28** (pág. 11), **Nº 30** (pág. 14), **Nº 32** (págs. 16-17), **Nº 34** (pág. 32), **Nº 36** (págs. 40-41), **Nº 38** (págs. 41-42), **Nº 40** (págs. 45-46), **Nº 42** (pág. 10), **Nº 44** (págs. 10-11), y **Nº 48** (pág. 11).

147.- **BISBITA COMÚN (o PRATENSE)** (*Anthus pratensis*)

Nuevas citas en primavera.- Año 2018.-
--- Entre los días 25 de marzo y 9 de abril, muchos bisbitas pratenses en la zona de Barbolla (Segovia, cuadrícula VL47). (Antonio Fernández Ortiz).
--- El 27 de marzo, por la mañana, un bisbita común, en los huertos de Moral de Hornuez. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 30 de marzo, a las 19 h. 0 m., un grupo de 12 bisbitas comunes, junto con fringílidos, en campos cerca de la estación de Maderuelo. Se obtiene foto. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 18 de abril, dos bisbitas pratenses en Arauzo de Salce (Burgos, cuadrícula VM62). (Rufino Fernández González; publicado en www.avesdeburgos.com, como la última observación prenupcial del año en la provincia).

Pueden verse citas anteriores en primavera, en la comarca, en las **Hojas Informativas Nº 22** [pág. 38], **Nº 23** [págs. 33-34], **Nº 24** [pág. 59], **Nº 28** [pág. 11], **Nº 30** [pág. 14], y **Nº 32** [pág. 17], **Nº 38** [pág. 42], **Nº 44** [pág. 11], y **Nº 48** [pág. 11].

Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2018.-

--- El 11 de octubre, dos bisbitas comunes en el llano de Milagros. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).
--- Entre el 8 y el 13 de octubre, cerca de Barbolla (Segovia, cuadrícula VL47), agrupaciones grandes de bisbitas pratenses en las zonas agrícolas. (Antonio Fernández Ortiz).

Pueden verse datos sobre el bisbita común en los **informes finales** de los últimos censos de otoño. Véase también la **Hoja Informativa Nº 34**, pág. 32.

148.- **BISBITA ALPINO** (*Anthus spinoletta*) C

Nueva observación.-

16) El 20 de marzo de 2019, junto al embalse de Linares, uno o dos bisbitas alpinos, junto a bisbitas comunes y lavanderas blancas. (José Luis López-Pozuelo García).

Véase lo indicado sobre esta especie en las **Hojas Informativas Nº 40** (págs. 47-48, y las Hojas Informativas anteriores citadas allí, **Nº 46** (pág. 9) y **Nº 48** (pág. 12).

149.- **LAVANDERA BOYERA** (*Motacilla flava*) N(1,2,4) +(3)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, excepto aquellas en que se señala otro observador).

--- El 19 de junio, a las 8 h. 36 m., una lavandera boyera joven, en la subida al alto del Bercial (cerca de Riaguas, cuadrícula VL58).
--- Entre el 6 y el 8 de julio, en la zona de Barbolla (Segovia, cuadrícula VL47), "*muy frecuentemente se ven pollos de lavandera boyera por los parajes aptos, como el prado y El Cubillo*". (Antonio Fernández Ortiz).
--- El 2 de agosto, a las 11 h. 38 m., una lavandera boyera joven, en el puente de Alconadilla (cuadrícula 4).
--- Entre el 11 y el 19 de agosto, en la zona de Barbolla (Segovia, cuadrícula VL47), se ven lavanderas boyeras jóvenes. (Antonio Fernández Ortiz).
--- El 13 de agosto, a las 17 h. 28 m., lavanderas boyeras, entre las cuales hay al menos unos dos jóvenes, junto al arroyo del Corral (cerca de Riaguas, cuadrícula VL68).
--- El 14 de agosto, más de 10 lavanderas boyeras (algunos ejemplares son adultos, pero la mayoría son jóvenes) en el arroyo del Corral (cerca de Riaguas, cuadrícula VL68). (Xavier Parra Cuenca).

Nótese que en años anteriores se registraron, por distintos ornitólogos, jóvenes o grupos familiares de lavanderas boyeras junto al embalse. Véase, por ejemplo, lo indicado al respecto en las **Hojas Informativas Nº 21** (pág. 14), **Nº 22** (pág. 38), **Nº 23** (pág. 34), **Nº 24** (pág. 59), **Nº 26** (pág. 18), **Nº 28** (pág. 12), **Nº 32** (pág. 18), **Nº 34** (págs. 34-35), **Nº 36** (pág. 42), **Nº 38** (pág. 43), **Nº 40** (pág. 48), **Nº 42** (págs. 10-11), **Nº 44** (pág. 12), **Nº 46** (pág. 10), y **Nº 48** (pág. 13).

Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2018.-
--- El 27 de marzo, una lavandera boyera en El Cubillo (cerca de Barbolla, cuadrícula VL47). En los días siguientes, fue muy frecuente verla en este paraje, "*siempre sola o junto a bisbitas pratenses*". (Antonio Fernández Ortiz).
--- El 2 de abril, una lavandera boyera "*migrando sobre la balsa de riego de Arauzo de Salce (Burgos, cuadrícula VM62)*". (Rufino Fernández González; publicado en la "***Hoja Informativa sobre la avifauna en el sureste de Burgos***" Nº 1, de agosto de 2018, y del mismo autor; pág. 37; esta observación aparece allí como la primera del año en esa zona.)
--- El 3 de abril, una nueva lavandera boyera en otro paraje del término de Barbolla. (Antonio Fernández Ortiz).

Nota.- --- El 10 de mayo de 2018, una lavandera boyera macho, de la raza ibérica (*M. f. iberiae*), en el Refugio de Montejo. (Luis Sitges Aparicio).

Sobre los registros de lavandera boyera de las razas *iberiae* y *flava* en el Refugio, véase lo anotado en la **Lista de vertebrados del Refugio** [pág. 31, Nota 65]; y en las **Hojas Informativas Nº 16** [pág. 1], **Nº 22** [pág. 38], **Nº 23** [pág. 34], **Nº 24** [pág. 59], **Nº 26** [págs. 18-19], **Nº 30** [pág. 15], **Nº 40** [págs. 48-49], **Nº 46** [pág. 10], y **Nº 48** [pág. 13].

150.- **LAVANDERA CASCADEÑA** (*Motacilla cinerea*) N(1, [2], 4)

Nuevos datos de interés.- Año 2018.-
--- El 1 de abril, a las 10 h. 0 m., una lavandera cascadeña en la fuente de La Pisadera. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 16 de mayo, a las 9 h. 25 m., una lavandera cascadeña en el río Riaza, frente a Valdebejón (cuadrícula 3). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 9 de agosto, a las 9 h. 55 m., una lavandera cascadeña en la zona de la isla, del embalse de Linares. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 19 de agosto, una lavandera cascadeña en la fuente de La Pisadera. Se obtiene foto. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 10 de septiembre, a las 11 h. 30 m., una lavandera cascadeña en la fuente de La Pisadera, en Montejo de la Vega. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 4 de noviembre, una lavandera cascadeña en el río Riaza, a la altura de Milagros. (Juan José Molina Pérez).
--- Sobre las observaciones de lavandera cascadeña en el censo de otoño de 2018 (días 10 y 11 de noviembre), véase el **Informe final** correspondiente.
--- El 15 de noviembre, una lavandera cascadeña en la cola del embalse, y otra en el soto de Milagros. (José Liarte de Blas y Ricardo Ramos Sánchez).
--- El 28 de diciembre, una lavandera cascadeña en el soto de Valdeherreros (Milagros, Burgos), y una lavandera cascadeña junto al embalse. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).

151.- **LAVANDERA BLANCA** (*Motacilla alba*) N(1,2,3,4)

Nuevas observaciones en el comedero de buitres del Refugio de Montejo.- Año 2018.-

--- El 11 de marzo, lavandera blanca. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Joel Reyes Núñez, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 3 de abril, tres lavanderas blancas. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, y Juan José Molina Pérez).
--- El 14 de mayo, lavandera blanca. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, y Juan José Molina Pérez, que obtiene foto).
--- El 5 de junio, dos lavanderas blancas. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España).
--- El 14 de agosto, al menos dos lavanderas blancas. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 11 de noviembre, dos lavanderas blancas. (Antonio Ruiz Heredia y José Antonio Rodríguez Crespo).
--- El 12 de noviembre, una lavandera blanca. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Fernando Jiménez Raigón, Mar Gasco González, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Pueden verse datos anteriores, sobre observaciones de lavandera blanca en el comedero de buitres del Refugio de Montejo, en las **Hojas Informativas Nº 24** [pág. 59], **Nº 26** [pág. 20], **Nº 28** [pág. 14], **Nº 34** [pág. 39], **Nº 36** [pág. 47], **Nº 40** [págs. 51-52], **Nº 42** [pág. 12], **Nº 44** [pág. 13], **Nº 46** [pág. 10], y **Nº 48** [pág. 14].

Nuevos datos sobre agrupaciones.- Año 2018, y comienzo de 2019.-

--- El 11 de octubre, unas 15 lavanderas blancas en Milagros, y unas 6 en Montejo. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).
--- El 28 de enero, al atardecer (18 h. 15 m.), un dormidero de lavanderas blancas en un tejado de Boceguillas. (José Luis López-Pozuelo García).

El récord del Refugio, debido a Elías Gomis Martín y Alfonso Lario Doylataguerra, se refiere a más de 100 lavanderas blancas en un terreno recién arado, el 22 de octubre de 2001; pueden verse más detalles en la **Hoja Informativa Nº 26** –pág. 20-. El récord de la comarca, según los datos que conocemos, corresponde a unas 134 aves, observadas en el basurero de Aranda el 13 de marzo de 2004, por Javier Vitores y Consuelo Bellella, tal como se indicó en la **Hoja Informativa Nº 28** –pág. 15-.

(Sobre grandes agrupaciones de lavanderas blancas en la comarca, véase lo señalado en las **Hojas Informativas Nº 24** [pág. 60], **Nº 26** [págs. 20-21], **Nº 28** [pág. 15], **Nº 30** [págs. 16-17], **Nº 32** [pág. 21], **Nº 34** [págs. 37, 39], **Nº 36** [pág. 45], **Nº 38** [pág. 45], **Nº 40** [pág. 52], **Nº 42** [pág. 12], **Nº 46** [pág. 11], y **Nº 48** [pág. 15]).

Observaciones de la lavandera blanca enlutada..-

Las observaciones de lavandera blanca enlutada en la zona (cinco citas, y cinco más en zonas cercanas) están reseñadas en las **Hojas Informativas Nº 21** (pág. 14), **Nº 22** (pág. 38), **Nº 23** (pág. 34), **Nº 24** (pág. 60), **Nº 26** (pág. 21), **Nº 30** (pág. 17), **Nº 32** (pág. 23), **Nº 34** (págs. 38-39), **Nº 36** (págs. 46-47), **Nº 38** (pág. 46), **Nº 40** (pág. 54), y **Nº 42** (pág. 12). En parte de ellas también se recogen observaciones o referencias publicadas en otras provincias.

152.- ***MIRLO ACUÁTICO (EUROPEO)** (*Cinclus cinclus*) +(1,4)

Puede verse una relación de las 31 citas que conocemos, del mirlo acuático en el Refugio, en las **Hojas Informativas Nº 40** (págs. 55-57), **Nº 42** (pág. 13), y **Nº 44** (pág. 14). Véase también la **Hoja Informativa Nº 48** (pág. 15).

153.- **CHOCHÍN** (*Troglodytes troglodytes*) N(1,[2],3,4)

Observación curiosa.- El 13 de julio de 2018, a las 21 h. 12 m., un chochín, en la parte alta de la margen izquierda del barranco de Valdebejón (cuadrícula 3). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Nota.- Sobre los registros del chochín en el último censo de otoño, véase el **Informe final** correspondiente, pág. 66.

154.- ***ACENTOR COMÚN** (*Prunella modularis*) n(3)

Nuevas citas: Año 2018.-

--- El 27 de marzo, a las 18 h. 0 m., un acentor común, fotografiado, en los huertos de Moral de Hornuez. (Xavier Parra Cuenca).

155.- ***ACENTOR ALPINO** (*Prunella collaris*)

Véase lo indicado sobre este pájaro en la **Lista de vertebrados del Refugio** (pág. 31, Nota 69), y en las **Hojas Informativas Nº 24** (pág. 60), **Nº 28** (pág. 17), **Nº 32** (pág. 25), **Nº 36** (pág. 48), y **Nº 44** (pág. 14).

Las citas que conocemos en la zona corresponden a los meses de noviembre (sobre todo), diciembre, enero, y febrero; y a 1983, todos los años comprendidos entre 1985 y 1991 (ambos inclusive), 1997, 2007, 2010, y 2015.

La mayor agrupación se refiere a nueve aves observadas en lo alto de la margen izquierda (parte final) del barranco de Valdecasuar, el 11-11-1990, a las 10 h. 21 m., por Daniel Díaz Diethelm (reseñado en el **Informe final del censo de otoño** correspondiente, pág. 7).

156.- ***ALZACOLA (ROJIZO)** (*Cercotrichas* [*Erythropygia*] *galactotes*) A

Véase lo anotado sobre este pájaro en la **Lista de vertebrados del Refugio** (pág. 31, Nota 70); y en las **Hojas Informativas Nº 18** (pág. 12), **Nº 19** (pág. 13), **Nº 21** (pág. 14), **Nº 24** (pág. 60), **Nº 28** (pág. 17), y **Nº 30** (pág. 20).

157.- **PETIRROJO (EUROPEO)** (*Erithacus rubecula*) N(1,3,4) [n([2])]

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-

--- El 11 de agosto, a las 20 h. 30 m., un petirrojo joven en el camino de Cilleruelo de San Mamés. (Xavier Parra Cuenca).

--- El 14 de agosto, un petirrojo joven del año en el pinar de Valdevacas de Montejo, cerca de la torre (cuadrícula 3). (Xavier Parra Cuenca).
--- El 20 de agosto, a las 9 h. 23 m., dos petirrojos jóvenes, que reclaman, en el bosque alto al sur de Peña Cuervo (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Nota.- Sobre los registros del petirrojo en el último censo de otoño, véase el **Informe final** correspondiente, pág. 66.

158.- **RUISEÑOR COMÚN** (*Luscinia megarhynchos*) N(1,[2],3,4) n(2)

Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2018.- El 14 de abril, a las 11 h. 41 m., ruiseñor común oído, en la chopera del sur de La Pililla. / El 16 de abril, a las 13 h. 20 m., ruiseñor común oído en la chopera del valle paralelo al Tercer Valle; y a las 18 h. 27 m., ruiseñor común oído, en la recula del Boquerón. / El 17 de abril, a las 20 h. 6 m., ruiseñor común oído, en la recula del Boquerón. / El 21 de abril, a las 9 h. 19 m., un ruiseñor común, bien visto, que canta, frente a Peñalba. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
El 25 de abril, a las 10 h. 30 m., oído bastante el ruiseñor común, en la recula de Carralanga. (José Luis López-Pozuelo García).
A partir de esa fecha, hay más observaciones de la especie.

Nuevos datos sobre partidas.- Año 2018.- -- El 9 de septiembre, un ruiseñor común, fotografiado, junto al puente de Alconadilla. (Xavier Parra Cuenca).

Nota.- En las primaveras de 2017 y 2018, detecté menos ruiseñores que en recorridos análogos de años precedentes.

159.- ***PECHIAZUL** o **RUISEÑOR PECHIAZUL** (*Luscinia svecica*) A

Tercera y cuarta citas (y primera con foto, y primeras para el embalse):

--- En 2018, un pechiazul, de medalla blanca, junto al puente de Alconadilla, al menos desde el 8 de septiembre por la mañana (a las 10 h. 0 m., vuela hacia las laderasde la carretera de Alconadilla, hacia un rosal y luego más allá) hasta el 9 de septiembre pot ls mañana (a las 8 h 15 m., se le ve fugazmente junto a un cardo, agitando la cola) y por la tarde (a las 19 h. 30 m., en uno de los charcos del río). El día 9 por la tarde se obtienen algunas fotos. (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).

La cita aparece también en:
--- Parra Cuenca, X.; y Gutiérrez Fernández, M. (2019). **Ruiseñor pechiazul *Luscinia svecica.*** Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, Vol. 66(1), 1-2019, pág. 247.

Nueva cita en una zona cercana:

--- El 12 de octubre de 2018, en el término de Castillejo de Mesleón (Segovia, cuadrícula VL47), un ruiseñor pechiazul, "*con pechera azul poco marcada*", posado en un rosal silvestre, "*en una zona de dehesa del monte conocido como El Chaparral, donde hay una pradera cercana a un arroyo, con rebollos, encinas y rosales silvestres*". (Antonio Fernández Ortiz).

Véase lo indicado sobre este pájaro en las **Hojas Informativas Nº 30** (pág. 21), **Nº 32** (págs. 27-28), y **Nº 34** (págs. 42-43).

160.- ***COLIAZUL CEJIBLANCO (o RUISEÑOR COLIAZUL)** (*Tarsiger cyanurus*) A

Es una especie nueva para la zona; y, según los datos que conocemos, para Castilla y León.

Fue descubierto y fotografiado un ejemplar en el censo de otoño de 2018.

1) El sábado 10 de noviembre de 2018, a las 11 h. 58 m. / 12 h. 0 m., un coliazul cejiblanco, hembra o joven, posiblemente del primer invierno, en el pinar de Valdevacas de Montejo, junto a la torreta de vigilancia (cuadrícula 3). Se obtienen fotos. Montserrat Gutiérrez lo ve primero. (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).

2) El domingo 11 de noviembre de 2018, a las 11 h. 0 m., un coliazul en el pinar de Valdevacas de Montejo. (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).
b) El mismo día, domingo 11 de noviembre de 2018, de 11 h. 0 m. a 13 h., un coliazulo cejiblanco (o ruiseñor azul siberiano) del primer invierno (joven nacido en la primavera de 2018), en la misma zona; sedimentado en un bosque de pino resinero (*Pinus pinaster*) con manchas de jara leñosa, parecido en luz y estructura a la taiga. Confiado, se posa en espacio abierto, montones de ramajes de poda o en las propias jaras. Activo con un comportamiento curioso propio de jóvenes que no conocen el lugar. *(*Andrés Requejo de las Heras).

La difusión de la noticia por Internet atrajo a naturalistas de distintas procedencias. Ya fuera del censo de otoño, aunque en estas fechas y en el mismo sitio, tenemos:

2) c) El mismo día 11 de noviembre de 2018, en la misma zona, el coliazul cejiblanco fue visto también por José Portillo (publicado en *Rare Birds in Spain*).

3) El lunes 12 de noviembre de 2018, en el mismo paraje, el coliazul cejiblanco fue fotografiado por Manuel Segura (puede verse una foto en *Reservoir Birds*, y una foto similar en *Rare Birds in Spain*), y fue visto asimismo por Chemi Ibáñez (*eBird*).

Sólo tenemos noticias de diez citas homologadas anteriores de esta especie en España. Agradecemos, en particular, el meticuloso trabajo de búsqueda bibliográfica realizado por Francisco Javier Ortega Pinilla, que ha proporcionado amablemente información detallada de los registros publicados.

161.- **COLIRROJO TIZÓN** (*Phoenicurus ochruros*) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, excepto aquellas en que se indique otro autor).

--- El 20 de mayo, en la cueva del barranco lateral de la margen derecha del Reguerillo (cuadrícula 4), el viejo nido del colirrojo tizón está vacío. (Véanse las **Hojas Informativas Nº 34**; pág. 43, **Nº 36**, pág. 47; **Nº 40**, págs. 61, 63; **Nº 46**, pág. 14; y **Nº 48**, pág. 17.)
--- El 4 de junio, en el pueblo de Maderuelo (cuadrícula 4), Martín Martín Martín me enseña **un nido** de colirrojo tizón, dentro de un garaje, en lo alto de un poste.
--- El 20 de julio, Carlos García Pérez informa sobre un nido ocupado de colirrojo tizón en Fuentenebro (Burgos, cuadrícula VL39).

162.- **COLIRROJO REAL** (*Phoenicurus phoenicurus*)

Nuevas observaciones.- Año 2018.-

--- El 20 de marzo, a las 20 h. 18 m., un posible colirrojo real en la Vega de El Casuar, frente a Peña de la Zorra. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio).

--- El 9 de agosto, a las 11 h. 20 m., un colirrojo real de tipo hembra, fotografiado, en el aparcamiento del embalse cerca de la isla. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 12 de agosto, a las 10 h. 0 m., un colirrjo real hembra y quizás también un macho, en el barranco de San Andréx. (Xavier Parra Cuenca).

--- El 8 de septiembre, a las 19 h. 0 m., un colirrojo real de tipo hembra, entre Moral de Hornuez y Fuentemizarra. (Xavieer Parra Cuenca).

--- El 10 de septiembre, a las 12 h. 30 m., un colirrojo real macho, fotografiado, junto a la carretera de la coronación de la presa, en el aparcamiento. (Xavier Parra Cuenca).

(Véanse el comentario de la **Hoja Informativa Nº 26**, pág. 28; la Nota 2 de la **Hoja Informativa Nº 28**, págs. 19-20; las Notas 1 y 2 de la **Hoja Informativa Nº 30**, pág. 23; y las Notas 1 y 2 de la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 51.)

163.- **TARABILLA NORTEÑA** (*Saxicola rubetra*)

Nuevas citas.- Año 2018.-

S/n) --- Entre el 11 y el 19 de agosto, en la zona de Barbolla (Segovia, cuadrícula VL47), se ven tarabillas norteñas de paso. (Antonio Fernández Ortiz).

49) --- El 8 de septiembre, por la mañana y por la tarde, una tarabilla norteña, fotografiada, junto al puente de Alconadilla. El mismo día, a las 19 h. 0 m., una tarabilla norteña en el camino a Fuentemizarra paralelo a la carretera. (Xavier Parra Cuenca).

50) --- El 9 de septiembre, por la tarde y al anochecer, una tarabilla norteña, junto al puente de Alconadilla. (Xavier Parra Cuenca).

51) --- El 10 de septiembre, a las 8 h. 0 m., dos tarabillas norteñas en Moral de Hornuez, junto al camino de Valdevacas. (Xavier Parra Cuenca).

El total de citas anotadas (sin contar las de zonas próximas) es de 51, repartidas entre los meses de marzo (1), abril (3), mayo (2), julio (1), agosto (8), septiembre (28), octubre (3), noviembre (4) y diciembre (1).

[Véanse las **Hojas Informativas Nº 22** (pág. 39), **Nº 23** (pág. 35), **Nº 24** (pág. 61), **Nº 26** (págs. 28-29), **Nº 28** (pág. 20), **Nº 30** (pág. 23), **Nº 32** (págs. 30-31), **Nº 34** (págs. 45-46), **Nº 36** (págs. 51-52), **Nº 38** (págs. 53-54), **Nº 40** (págs. 64-65), **Nº 42** (pág. 15), **Nº 46** (pág. 16), y **Nº 48** (págs. 17-18); así como la **Lista de vertebrados del Refugio** (págs. 31-32, Nota 72).]

Obsérvese que la mayor parte de las citas corresponde al paso postnupcial. En localidades del sur de Segovia (términos de Valseca y cercanos), Alfredo López Hernangómez señala algo parecido, en sus trabajos citados en la Hoja Informativa Nº 36 (pág. 52).

164.-**TARABILLA COMÚN (EUROPEA)** (*Saxicola torquata* [*torquatus*] [*rubicola*]) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-

--- El 13 de junio, a las 9 h. 40 m. ap., una pareja de tarabillas comunes con algún pollo (joven de año), junto al puente de Alconadilla (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García).

Comentario.- Pueden verse datos sobre los nueve nidos de tarabilla común descubiertos en la zona, de los que tenemos noticias, en las **Hojas Informativas Nº 30** (pág. 24), **Nº 32** (págs. 31-32), y **Nº 40** (pág. 66).

Los nueve nidos fueron descubiertos por Daniel Magnenat (tres, uno en 1996 y dos en 2005; cada uno de ellos, con cuatro pollos), Jesús Hernando (dos, uno en 1996 y uno en 2008; uno con cuatro pollos, y otro con al menos dos pollos), Bernard y Danielle Scherler (uno, en 2008, con al menos tres pollos), y Fidel José Fernández (tres, uno en 1995, uno en 2008, y uno en 2013; con cuatro huevos, cinco huevos, y cinco huevos, respectivamente).

165.- **COLLALBA GRIS** (*Oenanthe oenanthe*) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-

--- Entre el 6 y el 8 de julio, en las afueras de Barbolla (Segovia, cuadrícula VL47), en la valla de una casa, "*se ve muy frecuentemente una pareja de collalbas grises; puede que estén criando, pues a veces*

portan cebas en el pico; el nido se intuye al otro lado de la valla, pero no se encuentra (…).” (Antonio Fernández Ortiz).
--- El 21 de julio, a las 11 h. 53 m., un pollo volandero de collalba gris, en el barranco lateral al de San Andrés (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 23 de julio, a las 9 h. 13 m., dos collalbas grises, una adulta y un joven, en la estepa cerealista del norte del Refugio de Montejo, cerca de las tres sabinas (cuadrícula 1). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 9 de agosto, un grupo de adultos y juveniles bajando a la estación de Maderuelo, cerca de Myta, y en el alto del Bercial. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 18 de agosto, un joven cerca del Otero de Valdevacas de Montejo. (Xavier Parra Cuenca).

Comentario.- Hasta ahora, y según la información que hemos recibido, Daniel Magnenat es el único ornitólogo que ha conseguido encontrar nidos ocupados de collalba gris en el Refugio (véanse datos [correspondientes a 1993, 1994, 1995, 2000 y 2004] en las **Hojas Informativas Nº 22**, pág. 39; **Nº 26**, pág. 30; y **Nº 28**, pág. 21), junto con el guarda Jesús Hernando Iglesias (quien vio, en 2000, un nido cerca de Montejo); si bien Vicente Garza Villegas halló un nido ocupado en una zona cercana, en 1988 (reseñado en la **Lista de vertebrados del Refugio**, págs. 9-10).

Nuevos datos sobre partidas.- En 2018.-
--- En septiembre, observaciones de collalba gris los días 8 (Xavier Parra Cuenca), 12 (José Luis López-Pozuelo García), 14 (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo), 15 (participantes en la excursión del Fondo para el Refugio, guiada por Jorge Andrés Remacha Lorenzo), y 17 (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- Entre el 8 y el 13 de octubre, en la zona de Barbolla (Segovia, cuadrícula VL47), se ven muchas collalbas grises todavía de paso. (Antonio Fernández Ortiz).
--- El 11 de octubre, unas ocho collalbas grises en el llano de Milagros, y tres en el camino a Maluque. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).

Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2018.-
--- El 25 de marzo, dos collalbas grises en El Campazo (al norte de Barbolla, cuadrícula VL47). (Antonio Fernández Ortiz).
--- El 25 de abril, a las 10 h. 3 m., una collalba gris macho se posa en un chopo, cerca del puente de Alconadilla (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García).
A partir de esta fecha, hay más observaciones de la especie.

Comentario.- En el Volumen V del **Anuario Ornitológico de Burgos** (pág. 164), José Luis Lobo Cueva incluye una interesante gráfica que recoge las fechas anuales de primeras y últimas observaciones de la especie, en la provincia.

166.- **COLLALBA RUBIA** (*Oenanthe hispanica*) N(1,2,3,4)

Sobre las fases de coloración.- En siete años, Daniel Magnenat registró unos 47 machos de collalba rubia (sumando los de años diferentes, aunque puedan no ser todos distintos), de los que ap. 27 (el 57´4 %) correspondían a la forma gorginegra, y 20 a la forma gorgiblanca.

Puede añadirse que, de 186 observaciones de machos registradas por Fidel José Fernández durante los veinte últimos años (1999-2018), en el Refugio e inmediaciones, 99 (el 53´23 %) correspondían a la forma gorginegra y 87 ap. a la forma gorgiblanca; y al menos 127-128 (62-63+65) eran también de fase pálida. Curiosamente, en cinco años (2006, 2012, 2013, 2014 y 2017) predominaron o se igualaron las observaciones de la fase gorgiblanca (11 de 18, 5 de 10, 7 de 11, 7 de 11, y 15 de 26, respectivamente); pero no así en otros ocho años: 2007 (5 de 13), 2008 (2 de 9), 2009 (4 de 9), 2010 (2 de 4), 2011 (5 de 12), 2015 (5 de 11), 2016 (2 de 6), y 2018 (4 de 7).

[En 2012, Fidel José identificó la fase de coloración en 10 machos (6 de ellos pálidos), de los que 5 eran gorgiblancos (cuatro, pálidos) y cinco eran gorginegros (dos, pálidos)].
[En 2013, Fidel José identificó la fase de coloración en 11 machos (3 de ellos pálidos), de los que 7 eran gorgiblancos (dos, pálidos) y 4 eran gorginegros (uno pálido, y al menos uno no pálido)].

[En 2014, Fidel José identificó la fase de coloración en 11 machos (3 de ellos pálidos), de los que 7 eran gorgiblancos (dos, pálidos) y 4 eran gorginegros (uno de ellos pálido). Nótese la similitud con el año anterior.].

[En 2015, Fidel Josí identificó la fase de coloración en 11 machos (8 pálidos, uno no pálido, y 2 no determinados), de los que 5 eran gorgiblancos (los cinco, pálidos) y 6 eran gorginegros (tres palidos, uno no pálido, y dos no determinados).].

[En 2016, Fidel José identificó la fase de coloración en 6 machos (4-5 pálidos, y 1 no determinado), de los que 2 eran gorgiblancos (uno, pálido) y 4 eran gorginegros (tres o los cuatro, palidos).].

[En 2017, Fidel José identificó la fase de coloración en 26 machos (19 pálidos, y 7 no determinados), de los que 15 eran gorgiblancos (13 de ellos pálidos) y 11 eran gorginegros (6 de ellos palidos).].

[En 2018, Fidel José identificó la fase de coloración en 7 machos (5 pálidos, y 2 no determinados), de los que 3 eran gorgiblancos (2 de ellos pálidos) y 4 eran gorginegros (3 de ellos palidos).].

Carlos Palma Barcenilla, en el "**Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de Burgos**" (Jacinto Román Sancho, Fernando Román Sancho, Luis Miguel Ansola Aristondo, Carlos Palma Barcenilla, y Rafael Ventosa Sánchez; ed. Caja de Ahorros del Círculo Católico, Burgos, 1996, 322 pp.; pág. 207), indica que "*sobre 70 machos bien vistos de la provincia, 44* [el 62´9 % ap.] *eran del primer tipo* [de garganta negra] *y 26 del segundo* [de garganta clara]".

Joaquín Sanz-Zuasti y Tomás Velasco Tejada, en su magnífica "**Guía de las Aves de Castilla y León. Nueva edición revisada y ampliada**" (fotografía de Carlos Sánchez; Náyade Editorial; Medina del Campo, Valladolid, 2005; 408 pp.; pág. 270), citan la publicación anterior entre varias referencias bibliográficas más, y escriben de la especie: "*Los mayores efectivos parecen encontrarse en Zamora, Salamanca, Segovia y sur de Soria (…). La forma gorginegra es más numerosa en Ávila, Burgos y Soria (57-63% de los machos) que la forma gorgiblanca, que resulta algo más frecuente con mayor complejidad estructural del hábitat (…). Reciente disminución en varias regiones españolas (…)*".

Un interesante artículo anterior sobre estas cuestiones es el de Francisco Suárez, "**El dimorfismo de la Collalba Rubia (*Oenanthe hispanica* L.): variaciones geográficas y entre hábitats**" (*Ardeola*, 37 [2], 1990, págs. 291-298).

Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2018.-

--- El 22 de abril, a las 9 h. 50 m., una collalba rubia macho de la forma gorginegra pálida, en el Molino de Torraño (Soria, cuadrícula VL78). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

(En fechas posteriores, hay más observaciones de la especie).

Nuevos datos sobre partidas.- Año 2018.-

--- El 10 de septiembre, una collalba rubia macho, de la forma gorgiblanca, fotografiada, en Villaverde de Montejo, en el paraje del Guancho. (Xavier Parra Cuenca).

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-

--- El 10 de junio, a las 7 h. 46 m., en los páramos del sureste (cuadrícula 4), una collalba rubia macho de la forma gorgiblanca pálida, con ceba en el pico, porsada en una sabina arbustiva. A las 7 h. 52 m. y a las 9 h. 12 m., una collalba rubia hembra reclama, ap. en la misma zona. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 13 de junio, una collalba rubia hembra con ceba, fotografiada, en Arauzo de Salce (Burgos, cuadrícula VM62). (Rufino Fernández González; publicado en www.avesdeburgos.com).

--- El 14 de junio, a las 21 h. 3 m., en la margen derecha del barranco lateral del cañón del Botijas (cuadrícula VL29), una collalba rubia macho de la forma gorginegra pálida; y a las 21 h. 4 m., en la misma zona, un joven volandero de collalba rubia. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Comentario.- La reproducción de la collalba rubia en esta cuadrícula, VL29, está considerada como "*posible*", en el "**Atlas de las Aves Reproductoras de España**" (Martí, R., y Del Moral, J. C. [eds.]; Dirección General de Conservación de la Naturaleza – Sociedad Española de Ornitología, Madrid, 2003, 733 pp.; pág. 434).

--- El 12 de agosto, a las 11 h. 30 m., un joven cerca del barranco de San Andrés, en Moral de Hornuez. (Xavier Parra Cuenca).

--- El 18 de agosto, a las 10 h. 12 m., un joven en la margen izquierda del barranco de Valdepardebueyes. (Xavier Parra Cuenca).

(Sobre los nidos de esta especie localizados en la zona, en años anteriores, y también sobre las fases de coloración, véase lo indicado en **las Hojas Informativas Nº 26**, págs. 32-34; **Nº 28**, pág. 22; **Nº 30**, págs. 25-26; **Nº 32**, págs. 34-35; **Nº 36**, págs. 55-56; **Nº 38**, págs. 57-58; **Nº 40**, págs. 70-72; y **Nº 42**, pág 17).

167.- **COLLALBA NEGRA** (*Oenanthe leucura*) N(1) n(3,4)

Año 2018.-

--- En Peña Rubia (cuadrícula 1).-
--- El 23 de febrero, a las 16 h. 41 m. y a las 16 h. 51 m., una collalba negra macho. (Jesús Cobo Anula).

Puede verse un amplio resumen de toda la información anterior conocida, sobre la collalba negra en el Refugio, en las **Hojas Informativas Nº 26** (págs. 34-37), **Nº 28** (págs. 23-24), **Nº 30** (págs. 27-29), **Nº 32** (págs. 36-40), **Nº 34** (págs. 50-54), **Nº 36** (págs. 58-59), **Nº 38** (págs. 57-59), **Nº 40** (págs. 72-74), **Nº 42** (págs. 17-18), **Nº 44** (págs. 19-20), **Nº 46** (pág. 18), y **Nº 48** (pág. 21).

Véanse también las **Hojas Informativas Nº 32** (págs. 39-40, Notas), y **Nº 34** (págs. 53-54, Notas).

En los dos últimos años, sobre todo en 2018, llama la atención la escasez de observaciones de collalba negra, ave para la cual esta zona está en el límite de su área de distribución, del mismo modo que sucede (o sucedía) con el chotacabras pardo.

168.- **ROQUERO ROJO** (*Monticola saxatilis*) N(1,3,4)

Nuevas citas.- Año 2018.-
--- El 18 de agosto de 2018, a las 10 h. 0 m., tres roqueros rojos, en el barranco de Pardebueyes (en Villaverde de Montejo). Se obtiene foto de uno de ellos. (Xavier Parra Cuenca).

Véase lo señalado, sobre los años anteriores, en las **Hojas Informativas Nº 5** [pág. 1], **Nº 11** [pág. 6], **Nº 12** [pág. 5], **Nº 19** [pág. 14], **Nº 21** [pág. 15], **Nº 22** [pág. 40], **Nº 23** [pág. 36], **Nº 26** [pág. 37], **Nº 28** [págs. 24-25], **Nº 30** [pág. 29], **Nº 32** [págs. 40-41], **Nº 34** [págs. 54-55]**, Nº 36** [pág. 59], **Nº 38** [pág. 61], **Nº 40** [págs. 74-75], **Nº 42** [págs. 18-19], **Nº 46** [pág. 19], y **Nº 48** [pág. 21].

169.- **ROQUERO SOLITARIO** (*Monticola solitarius*) N(1,3,4) +(2)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- En primavera (sobre todo) o verano, en 2018, he anotado la presencia del roquero solitario en los siguientes sitios (observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, excepto aquellas en que se indique otro autor):

I y II (2) --- El reguerillo del Boquerón (cuadrícula 4): uno o dos machos vistos (y uno posiblemente también oído), en distintas zonas (como la parte final de la margen derecha, y la 2ª Bifurcación), el 20 de mayo; y un macho, muy bien visto, en la margen derecha, el 10 de junio.

(Recuérdese que, en 2017, vi un macho el 14 de mayo,en la margen izquierda, muy cerca del viejo nido Nº X de buitre leonado; y fotografié un macho, "en la ladera alta de la margen izquierda [parte final], el 28 de mayo.)

III y IV (2) --- El barranco del Boquerón (cuadrícula 4): un ejemplar visto en la margen derecha (cerca del nido Nº 4 de buitre leonado), el 22 de julio; y dos ejemplares (macho y hembra), vistos en la margen izquierda, también el 22 de julio.

(Recuérdese que, en 2017, vi un macho en la margen izquierda, en la salida sur del túnel pequeño, el 29 de abril; y vi un macho en la margen derecha, cerca del nido Nº 4 de buitre leonado, el 14 de mayo.)

V (1) --- El barranco de la Fuente (La Carceleja, cuadrícula 4): una hembra, muy bien vista, el 17 de abril.

(Recuérdese que, el 11 de abril de 2017, vi un macho y una hembra en este barranco; y oí un macho el 14 de mayo y el 25 de mayo del mismo año.)

VI (1) --- El Caramelón (Presa Después Derecha, P.D.D.; cuadrícula 4): una hembra vista, cerca del monumento a la Virgen, el 10 de junio.

(Recuérdese que, en 2017, oí un posible macho cantor el 19 de mayo; vi un ejemplar, en el comienzo de la peña, el 21 de mayo; y vi un ejemplar, que se posó en una pequeña sabina cerca del monumento a la Virgen, el 30 de mayo).

VII (1) --- La Catedral (S.D.; cuadrícula 4): un macho cantor oído, el 23 de mayo.

(Recuérdese que, en 2017, vi un ejemplar posiblemente hembra, en lo alto de la peña, el 22 de mayo; vi un macho en lo alto, en la primera parte de la peña, ap. sobre el nido Nº 21 de buitre leonado, el 29 de mayo; y vi un macho en la segunda parte (parte final) de la peña, debajo (bien) del nido Nº 36 de buitre leonado, el 30 de mayo).

VIII (1) --- El barranco de El Gordo (cuadrícula 4): un macho cantor oído, y posiblemente también visto, el 29 de mayo.

IX y X (2) --- Los Poyales (S.I.; cuadrícula 4): un macho cantor oído, en el comienzo total de la peña (S.I.1ª, c.t.t.), el 29 de mayo; y un macho cantor muy bien visto, casi en lo alto de la parte final de la peña (S.I.2ª), el 30 de mayo.

(Recuérdese que, en 2017, vi un macho, "*muy bonito*", y otro posible ejemplar cerca, también en S.I.1ª (c.t.t.), el 21 de mayo; oí un macho cantor, también en S.I.1ª, el 30 de mayo; y oí un posible macho cantor, en S.I.2ª (f.t.t.), el 31 de mayo.)

XI (1) --- El barranco D.E.L.C, (cuadícula 4): un macho cantor oído, en la margen izquierda, el 24 de mayo.

XII (1) --- V.A.D, (Viaducto Antes Derecha, o Beticuerpo; cuadrícula 4): un ejemplar visto, en la zona del nido Nº 77 de buitres leonados, el 17 de julio.

(Recuérdese que, en 2017, vi un ejemplar, posiblemente macho, en la primera parte de la peña [no lejos del nido fracasado Nº "77" de buitres leonados], el 23 de mayo; y vi una hembra y un macho, en la segunda parte de la peña [desde la curva hasta el final], el 24 de mayo.)

XIII (1) --- El barranco de Valtejo (cuadrícula 4): un macho cantor oído y visto, repetidas veces y a distintas horas, el 15 de abril; un macho, visto, el 17 de abril.

(Recuérdese que, el 1 de junio de 2016, realicé interesantes observaciones de un macho en este barranco).

XIV (1) --- V.D.I. (Cuesta Agria, cuadrícula 4): un macho cantor oído, en el fin total de la peña, el 1 de junio.

XV (1) --- El Corralón (cuadrícula 4): un macho cantor oído varias veces, en el comienzo de la peña, el 27 de mayo.

(Recuérdese que, el 26 de mayo de 2017, oí posiblemente un macho cantor en esta peña).

XVI (1) -- Peña Fueros (cuadrícula 4): en la 2ª parte, un macho cantor oído, el 5 de mayo.

(Recuérdese que, el 23 de abril de 2017, vi muy bien un macho, en lo alto de la parte final de Peña Fueros).

XVII, XVIII y XIX--- El barranco de Valdecasuar (cuadrícula 3), en tres sitios:

(1) --- En la margen derecha, un macho cantor, muy bien visto y oído, en la zona del nido vacío Nº 30 de buitres leonados, el 2 de mayo; una hembra, en el nido vacío Nº 30 y cerca, el 7 de mayo; un macho visto, "*muy bonito*", en lo alto del Circo, el 15 de julio.

(Recuérdese que justo un año antes, el 2 de mayo de 2017, registré un macho cantor, visto y oído, en el Circo).

(2) ---- En la margen izquierda, un macho visto el 1 de mayo, en el G.III (cerca del nido vacío Nº 2 de buitres leonados); y un ejemplar visto el 19 de agosto, en el G.I.

(Recuérdese que, en 2017, vi dos roqueros solitarios en la zona del Grupo Sur, el 9 de abril; oí un posible macho cantor en el G.II, el 3 de mayo; y vi un macho en el G.I, también el 3 de mayo.)

XX (1) --- Peña X (cuadrícula 2-4): un macho, bien visto, el 20 de abril.

XXI (1) ---- P.D.Z. (Peña a la derecha de Peña de la Zorra, cuadrícula 1): un ejemplar visto, el 4 de julio.

XXII (1) --- La Hocecilla (cuadrícula 3): un macho cantor visto, en la gran cornisa, el 6 de mayo.
(Recuérdese que justo un año antes, el 6 de mayo de 2017, vi y oí un macho cantor, en la zona del nido Nº 9 de buitres leonados; y oí posiblemene un macho cantor el 16 de mayo del mismo año.)

XXIII (1) --- El Reguero de los Pozos (cuadrícula 3): un macho con ceba, visto el 21 de mayo, en la margen izquierda; y visto también (¿el mismo?), dos veces, "*muy bonito*", el 6 de junio.
(Recuérdese que, el 9 de abril de 2007, vi una hembra en la parte alta del Reguero).

XXIV (+1) (1-2) --- Peña Rubia (cuadrícula 1): un macho, y posiblemente también otro ejemplar, el 12 de junio, en el entrante 3º, en la zona de los viejos nidos Nº 62 y Nº 17 de buitre leonado y cerca; un ejemplar visto, el 13 de julio, cerca del viejo nido Nº F del alimoche.

XXV (+1) (1) --- Laderas frente a Peña Rubia (en la margen izquierda del río; cuadrículas 1-3): un ejemplar visto, el 13 de julio.
(Recuérdese que, el 15 de abril de 2017, vi bien un macho cantor en el próximo reguero de la Guijarra.)

XXVI (+1) (1) --- El Reguero Bañuelos (cuadrícula 3): un macho cantor, visto y oído, en la parte final del reguero, el 2 de abril.
(Recuérdese que, el 14 de abril de 2017, fotografié un macho en este barranco).

XXVII (+1) (1) --- El Barranco de Covanegra (o Reguero de la Higuera) (cuadrícula 3): un macho visto más de una vez, en la parte final de la margen izquierda, el 16 de mayo.

XXVIII (+1) (1) --- El barranco de Pardebueyes (cuadrícula 3): un macho cantor oído, el 16 de mayo.
(Recuérdese que, en 2017, y en la margen izquierda del barranco, vi un macho el 15 de mayo y un ejemplar el 23 de julio.)

XXIX (+2) (1-2) --- El barranco de Valdebejón (cuadrícula 3): un macho visto, en la margen derecha (en la zona del Nº X), el 28 de abril; un macho visto, en la margen izquierda (en la zona del nido vacío Nº 23 del buitre leonado, algo más bajo), el 16 de mayo.
(Recuérdese que el 13 de abril de 2017 vi un macho cantor cerca de allí; y vi un ejemplar, posiblemente hembra, en la margen izquierda, el 9 de junio del mismo año.)

XXX, XXXI y XXXII (+2) (3) --- El barranco de la Retuerta, en tres parajes distintos (cuadrícula 3 para el primer sitio, y 4 para los restantes), el 1 de abril: justo después de la cantera (un macho visto), las segundas rocas grandes (zona del Nº Z) (un macho visto), y las rocas antes de la buitrera (un macho visto).
(Recuérdese que, el 10 de abril de 2017, registré la especie, incluyendo al menos un macho visto, en cada uno de esos tres sitios).

XXXIII (+2) (1) --- El barranco de San Andrés (cuadrícula 4).- El 28 de marzo, un macho, oído y visto, que canta posado (en lo alto) y en vuelo, en la parte final del barranco lateral de la margen izquierda.
(Recuérdese que, el 1 de abril de 2017, registré un macho cantor visto y oído en el mismo paraje, y también vi y oí un macho cantor en otras dos zonas del barranco).

Además, el mismo año 2018:

--- Jesús Cobo Anula (biólogo conservador del Refugio, de WWF) vio:
--- El 23 de febrero, en Peña de la Zorra (Refugio de Montejo, cuadrícula 1), dos roqueros solitarios (una pareja) a las 9 h. 7 m., y un roquero solitario macho a las 9 h. 13 m.
--- El 6 de abril, una pareja de roqueros solitarios en Covanegra.
--- El 9 de abril, un **nido** en construcción de roqueros solitarios, en Peña de la Zorra.
--- El 30 de julio, a las 17 h. 5 m., un roquero solitario en la boca de una cueva, en Peña Rubia vuelta.

--- Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, registró:
--- El 18 de mayo, un roquero solitario macho, fotografiado, en un protector arbóreo, en el Refugio de Montejo.

--- José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano anotaron:
--- El 11 de octubre, un roquero solitario macho en roquedo junto a la ermita de Valdeherreros ("*un cuervo le da una pasada y hace que baje a una zona menos expuesta*"), y un roquero solitario en Peña de la Zorra.

--- José Luis López-Pozuelo García anotó, el 25 de abril, a las 13 h. 33 m., un roquero solitario macho en vuelo de canto, en P.D.D. (El Caramelón).

--- Juan José Molina Pérez vio dos roqueros solitarios, uno de ellos macho, el 8 de abril, en D.E.L.C.

--- Xavier Parra Cuenca registró:
--- El 31 de marzo, a las 12 h. 0 m., un roquero solitario macho en las paredes cerca de Montejo; y a las 19 h. 30 m., dos roqueros solitarios machos, fotografiados, cantando juntos en el barranco de la Retuerta.
(Esta última observación recuerda la realizada por Fidel José Fernández en el barranquillo de El Reloj, el 16 de abril de 2017; véase la **Hoja Informativa Nº 48**, pág. 22.)
--- El 1 de abril, tres roqueros solitarios en la roca del Castillo, en Montejo de la Vega. Obtuvo foto de un macho.
--- El 10 de agosto, a las 20 h. 30 m., dos roqueros solitarios en la parte alta de la margen izquierda del barranco de Valdepardebueyes.
--- El 11 de agosto, a las 12 h. 30 m., un roquero solitario en la carretera de la coronación.
--- El 10 de septiembre, a las 20 h. 30 m., un roquero solitario en la parte alta de Peña Rubia.

--- Luis Sitges Aparicio observó, el 6 de junio, un roquero solitario hembra que se introdujo en un agujero, en Las Torres (término de Montejo, cuadrícula 1).

Y en zonas cercanas de otras cuadrículas (observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo):

1 --- La Peña Flor (Fuentenebro, Burgos, cuadrícula VL39).- El 31 de marzo, un roquero solitario macho, que vuela de la margen izquierda a la margen derecha.

2 --- Adrada de Haza (Peña Derecha; Burgos, cuadrícula VM30).- Un macho, visto, el 27 de abril.

3 --- Buitrera de Haza (Burgos, cuadrícula VM30).- El 10 de marzo, un roquero solitario macho, debajo y a la derecha (bien) del nido de buitres leonados Nº 4.

4 y 5 --- El Molino de Torraño (Soria, cuadrícula VL78).- El 22 de abril, un macho cantor, oído y visto, y fotografiado; el 29 de julio, un ejemplar visto, pero en otra parte del cañón del río Pedro, aguas abajo, cerca del nido grande y vacío de buitre leonado.

6 --- La Pedriza de Ligos (Soria, cuadrícula VL78): un ejemplar visto, en la zona de los nidos Nº 11 y Nº 14 de buitre leonado, el 27 de julio.
(Recuérdese que, en 2017, vi un ejemplar, posiblemente hembra, también el 27 de julio.)

7 --- Mirador de Pelegrina (hoz del río Dulce, Guadalajara, cuadrícula WL25): un ejemplar visto, el 6 de agosto.

Entre las cuatro cuadrículas que incluyen el Refugio, y considerando sólo las observaciones y audiciones realizadas por el autor en la primavera y el verano de 2018, se obtiene un total de 33-35 posibles territorios de roquero solitario (o al menos, zonas donde ha sido detectado por el autor en este año), todos ellos en Segovia, de los que 29-31 corresponden a la ZEPA (y 26-27 al Parque Natural, y 18-19 al Refugio).

En cuadrículas cercanas de las tres provincias, y en primavera o verano (salvo un registro el 10 de marzo), se obtienen 7 lugares más; lo que da un total de 40-42 sitios donde he registrado la especie este año.

Hay más sitios donde sin duda habita este pájaro en el Refugio (y en su entorno inmediato). Por ejemplo, en 2017 (primavera y verano), y tal como se detalla en la **Hoja Informativa Nº 48**, detecté también al mirlo acuático en otros 23-25 sitios: el barranquillo de El Reloj (1-2 territorios), el barranco de la Fuente (La Carceleja), el Cerro Pelado, Peña Inclinada (P.D.I.), La Catedral (un 2º territorio), Vallejo El Chico (2º Valle) (¿?), la cantera, V.A.D. (un 2º territorio), La Raya, el barranco de Valugar (margen derecha), el 2º Cañón (margen izquierda), el barranco de Valdecasuar (margen derecha) (un 2º territorio), Vallejo del Charco (parte final), La Murcielaguera, Peña Portillo, el reguero de Valhondo grande, el Reguero de la Guijarra, El Castillo, Las Torres, Covanegra, el barranco de la Retuerta (unos dos territorios más), y el barranco de San Andrés (dos territorios más). De estos 23-25 sitios, 19-21 corresponden a la ZEPA (y 17-19 al Parque Natural, y 13-14 al Refugio).

Se obtiene así, considerando sólo las observaciones realizadas por el autor en los dos últimos años, en primavera o verano, y únicamente en las cuatro cuadrículas consideradas, un total de 58-62 territorios con la especie detectada, de los que 48-52 corresponden a la ZEPA (y 43-46 al Parque Natural, y 31-33 al Refugio).

En cuadrículas cercanas de las tres provincias, en primavera o verano de 2017, y considerando sólo las observaciones del autor, aparecen 6-7 sitios más: El Risco, el cañón del Botijas, La Calzorra, Los Callejones (uno o dos territorios), la Hoz de Vildé, y La Yecla. Se obtienen así, sólo para las observaciones del autor en los dos últimos años, 13-14 territorios en zonas cercanas de las tres provincias. Y en total, **71-76** sitios donde he registrado la especie los dos últimos años en la comarca.

Sobre las observaciones del roquero solitario en el censo de otoño de 2018, véase el Informe final correspondiente.

En el comienzo de 2019, destacaremos la observación de un macho en Peña Portillo 2ª, y otro en lo alto de P. P. izqda., el 19 de marzo (Jesús Cobo Anula, asesor técnico de WWF para el Refugio de Montejo).

Notas.- 1) En el Refugio y su entorno, existen bastantes citas del roquero solitario a mediados de noviembre, durante los censos de otoño. En el último (10 y 11 de noviembre de 2018), se vieron cinco ejemplares seguramente distintos.

Véanse los **Informes finales** correspondientes a **1988** (pág. 3), **1989** (pág. 4), **1990** (pág. 7), **1991** (pág. 8), **1992** (pág. 5), **1993** (pág. 9), **1994** (pág. 16), **1996** (pág. 10), **1997** (pág. 16), **1998** (pág. 19), **2000** (pág. 19), **2001** (pág. 19), **2002** (pág. 23), **2003** (pág. 38), **2004** (pág. 44), 2006 (págs. 57-58), **2007** (pág. 73), **2008** (págs. 80-81), **2009** (pág. 79), **2010** (pág. 89), **2011** (pág. 67), **2012** (pág. 84), **2013** (pág. 74), **2014** (pág. 66), **2015** (pág. 70), **2016** (pág. 74), **2017** (pág. 75), y **2018** (págs. 67-68).

2) Tres nuevos informes sobre la especie, referidos al sur de Segovia, son los siguientes:
--- López Hernangómez, A. (2017). **Nota sobre el roquero solitario (*Monticola solitarius*) en el término segoviano de Valseca, 2017.** Informe inédito. 5 págs.
--- López Hernangómez, A. (2018). **Apunte sobre el roquero solitario (*Monticola solitarius*) en el término segoviano de Valseca, 2018.** Informe inédito. 2 págs.
--- López Hernangómez, A. (2018). **Apunte sobre la invernada reiterada del roquero solitario (*Monticola solitarius*) en el término segoviano de Valseca, 2018.** Informe inédito. 3 págs.

3) La observación realizada por el autor, de un roquero solitario en el valle del Pozarón (Burgos, cuadrícula VM20), cerca de la buitrera, el 27 de julio de 2014, recogida en la **Hoja Informativa Nº 42** (pág. 19), aparece reseñada, citando la fuente, por José Luis Lobo Cueva, en el Volumen 5 del **Anuario Ornitológico de Burgos** (pág. 167).

170.- ***MIRLO CAPIBLANCO** (*Turdus torquatus*) B

Nuevas observaciones: Año 2018.-
--- El 31 de marzo, a las 13 h. 0 m., dos ejemplares (un macho y una hembra), en La Hoz (barranco de San Andrés). (Montserrat Gutiérrez Fernández).

--- El 1 de abril, a las 18 h. 0 m., en el mismo lugar, al menos dos machos y una hembra, y algún ejemplar más. Se obtienen fotos. (Xavier Parra Cuenca).

Véase lo indicado sobre esta especie en las **Hojas Informativas Nº 26** (pág. 39), **Nº 30** (pág. 31), **Nº 32** (pág. 43), **Nº 34** (pág. 57), **Nº 36** (pág. 62), y **Nº 48** (pág. 26). Nótese que, de las diez citas de la zona del Refugio, una corresponde al 31 de marzo, ocho a abril, y una a noviembre.

171.- **MIRLO COMÚN** (*Turdus merula*) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 30 de julio, a las 9 h. 44 m., uno o dos mirlos jóvenes del año, en la ladera frente a los cortados de Caracena (Soria, cuadrícula VL98).
--- El 1 de agosto, a las 15 h. 1 m., dos mirlos jóvenes del año, en la margen derecha del barranco de Bocalavoz (Soria, cuadrícula VL88).
--- El 4 de agosto, a las 10 h. 53 m., un mirlo joven (o hembra, pero posiblemente joven) en El Peñascal (Burgos, cuadrícula VL39).

Notas.- 1) Sobre algunas observaciones de mirlos en el censo de otoño de 2018, véase el **Informe final** correspondiente, pág 69.

2) Sobre mirlos albinos o con plumas blancas, pueden verse casos y referencias anteriores en las **Hojas Informativas Nº 23** (pág. 36), **Nº 24** (pág. 63), **Nº 26** (pág. 40), **Nº 28** (pág. 26), **Nº 30** (pags. 31-32), **Nº 32** (pág. 43), y **Nº 34** (pág. 57), **Nº 40** (pág. 78), y **Nº 48** (págs. 26-27).

172.- **ZORZAL REAL** (*Turdus pilaris*)

Nuevas citas:

Anexo para 2003.- A los datos señalados en la **Hoja Informativa Nº 28** (págs. 26-27) puede añadirse:
73) --- El 2 de noviembre de 2003, zorzal real en las hoces del Riaza (Christophe Pontegnie, en eBird).

En el área de estudio, sin incluir las zonas próximas, hemos recibido ya 73 registros de este pájaro. Las fechas continúan siendo las señaladas en la **Lista de vertebrados del Refugio** (pág. 32, Nota 74), con las novedades de tres citas en octubre (las reseñadas en las **Hojas Informativas Nº 32** [pág. 44], **Nº 40** [pág. 78], y **Nº 44** [pág. 21]) y de dos citas en marzo (anotadas en la **Hoja Informativa Nº 30** [pág. 32] y **Nº 34** [pág. 57], respectivamente). Las 73 citas se reparten así: Tres en octubre, 37 en noviembre, once en diciembre, nueve en enero, diez en febrero, dos en marzo, y una en abril. Las observaciones más tempranas son del 9 de octubre de 2013, del 28 de octubre de 2015, del 31 de octubre de 2007, del 7 de noviembre de 2015, y del 8 de noviembre de 2003. La más tardía corresponde al 18 de abril de 1987.

Comentarios.- 1) Hasta ahora, el zorzal real ha sido citado en los censos de otoño de **1987** (una cita probable), **1988**, **1991**, **1993**, **1996**, **1998**, **2000**, **2001**, **2003**, **2004**, **2006**,**2009**, **2010**, **2011**, **2012**, **2015**, **2016**, y **2017**.

2) Sobre las fechas y las citas, véanse también la **Hoja Informativa Nº 28**, págs. 26-27; y las referencias citadas en las **Hojas Informativas Nº 30**, pág. 33, **Nº 32**, pág. 44, **Nº 36**, pág. 63, y **Nº 40**, pág. 79.

173.- **ZORZAL COMÚN** (*Turdus philomelos*) N(1) ¿N(¿4?)? n(3,4)

Nuevas observaciones en primavera o verano.- Año 2018.-
--- El 27 de marzo, a las 9 h. 30 m., un zorzal común, en los huertos de Moral de Hornuez. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 1 de abril, a las 12 h. 55 m., un zorzal común en Montejo de la Vega, cantando y buscando comida junto al río. Se obtienen fotos. (Xavier Parra Cuenca).

--- El 19 de agosto, zorzal común en la fuente de La Pisadera, en Montejo de la Vega. (Xavier Parra Cuenca).

Nota.- El 28 de diciembre de 2018, cuatro zorzales comunes en el soto de Valdeherreros (Milagros, Burgos), y unos 40 ap. por el sabinar del camino de Maluque. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).

Véase lo indicado sobre esta especie, las fechas de observación y la reproducción, en la **Lista de vertebrados del Refugio** –pág. 32, Nota 75-; y en las **Hojas Informativas Nº 23** –pág. 36-, **Nº 24** –pág. 63-, **Nº 26** –págs. 41-43-, **Nº 28** –pág. 28-, **Nº 30** –págs. 33-34-, **Nº 32** –págs. 44-46-, **Nº 34** –pág. 59-, **Nº 36** –págs. 63-64-, **Nº 40** –págs. 79-81-, **Nº 42** –pág. 20-, y **Nº 48** –págs. 27-28-.

Sobre los registros en los censos de otoño, véanse los **Informes finales** correspondientes.

Como se indicó en la **Hoja Informativa Nº 26** (pág. 42), la mayor agrupación registrada en el Refugio, según los datos que conocemos, corresponde a un mínimo de 100-150 zorzales comunes en el sabinar del sur (en lo alto de la margen derecha del barranco de Valugar), anotados por Juan Prieto Martín el 13 de noviembre de 1994 (a las 13 h. 30 m.). El día anterior, el mismo ornitólogo había señalado 50 zorzales comunes en la misma zona.

174.- **ZORZAL ALIRROJO** (*Turdus iliacus*)

Véase lo indicado sobre esta especie en la **Lista de vertebrados del Refugio** (pág. 32, Nota 76), y en las **Hojas Informativas Nº 24** (pág. 63), **Nº 30** (pág. 34), **Nº 32** (pág. 46), **Nº 34** (págs. 59-60), **Nº 36** (pág. 64), **Nº 38** (pág. 65), **Nº 40** (pág. 81), **Nº 42** (pág. 21), y **Nº 44** (pág. 22); así como en los **Informes finales** de los censos de otoño.

Nota.- Sobre la observación (no segura) de zorzal alirrojo en el censo de otoño de 2018, véase el **Informe final** correspondiente, pág. 68.

175.- **ZORZAL CHARLO** (*Turdus viscivorus*) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre agrupaciones.- Año 2018.-

--- El 15 de noviembre, unos 15 zorzales charlos en el pinar de Valdevacas, cerca de la torre de vigilancia de incendios (cuadrícula 3). (José Liarte de Blas y Ricardo Ramos Sánchez).

Nota.- Sobre nuevos datos en el censo de otoño de 2018, véase el **Informe final** correspondiente, págs. 68-69.

176.- **RUISEÑOR BASTARDO (o CETIA RUISEÑOR)** (*Cettia cetti*) N(1,[2],4) n(2,3)

Nota.- Xavier Parra Cuenca obtuvo una bonita foto de este esquivo pájaro el 1 de abril de 2018, junto al río Riaza, en Montejo de la Vega. Puede verse en el Anexo fotográfico.

(Sobre nuevos datos en el censo de otoño de 2018, véanse el **Informe final** correspondiente).

177.- **BUITRÓN o CISTÍCOLA BUITRÓN** (*Cisticola juncidis*) B [+(1)]

Nuevas citas: Año 2018.-

--- El 14 de junio, a las 19 h. 37 m., un buitrón oído, en campos de Adrada de Haza (Burgos, cuadrícula VM30). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

[En la misma zona, vi y oí al buitrón el 17 de junio de 2014 (véase la **Hoja Informativa Nº 42**, pág. 21), y lo oí el 17 de junio de 2016 (véase la **Hoja Informativa Nº 46**, pág. 22). Cerca de allí, en los campos de Haza –misma cuadrícula-, oí al buitrón el 14 de junio de 2017 (véase la **Hoja Informativa Nº 48**, pág. 28).]

El buitrón sólo ha sido citado en cuatro censos de otoño; los de **1997**, **2003**, **2015**, y **2017**.

Véase lo anotado sobre este pájaro, incluyendo un resumen de todas las citas anteriores conocidas en la zona, en las **Hojas Informativas Nº 23** [pág. 37], **Nº 24** [pág. 63], **Nº 26** [pág. 44], **Nº 28** [págs. 29-30], **Nº 30** [pág. 35], **Nº 32** [págs. 47-48], **Nº 34** [pág. 61], **Nº 36** [pág. 64], **Nº 42** [pág. 21], **Nº 44** [págs. 22-23], **Nº 46** [pág. 22], y **Nº 48** [págs. 28-29].

Nota.- Los registros del buitrón en dos cuadrículas del sur de Burgos, debidos al Dr. Pedro Rodríguez Panizo y al autor respectivamente, y recogidos en la **Hoja Informativa Nº 42** (pág. 21), aparecen mencionados por Rufino Fernández González, citando la referida publicación, en el Volumen V del **Anuario Ornitológico de Burgos** (pág. 171).

178.- ***BUSCARLA PINTOJA** (*Locustella naevia*) B

Nota.- En el Refugio, pueden verse las seis citas que conocemos en la **Lista de vertebrados del Refugio** (pág. 32, Nota 77), y en las **Hojas Informativas Nº 24** (pág. 64), **Nº 26** (pág. 44), **Nº 28** (págs. 30-31), y **Nº 46** (pág. 22). Las seis citas se refieren a los meses de agosto (una), septiembre (cuatro), y octubre (una). Tres citas más, en zonas cercanas, corresponde a septiembre (una, en el nordeste de Segovia) y octubre (dos en el sur de Burgos); véanse las **Hojas Informativas Nº 26** (pág. 44), y **Nº 34** (pág. 61). Cada una de las siete citas de Segovia alude a una sola ave (en tres casos, un joven); cuatro de ellas fueron anilladas, y una fue encontrada muerta. Una de las dos citas de Burgos también incluye un ave que fue anillada.

Una cita en las hoces del Duratón (debida a C. Jarque, y publicada en el "**Noticiario Ornitológico**" de *Ardeola* -Vol. 43[2], 1996, pág. 256-) se refiere a octubre.

Véanse también las notas incluidas en la **Hoja Informativa Nº 32** (págs. 48-49).

S/n.- Nota sobre la ***BUSCARLA UNICOLOR** (*Locustella luscinioides*)

Véase la Nota sobre esta especie en la **Hoja Informativa Nº 26** (pág. 44, al final).

179.- ***CARRICERÍN REAL** (*Acrocephalus melanopogon*) A

La única cita que conocemos sigue siendo la publicada en la **Lista de vertebrados del Refugio** (pág. 32, Nota 78). Se ha aludido a ella en los libros reseñados en la **Hoja Informativa Nº 30** (pág. 36).

180.- ***CARRICERÍN COMÚN** (*Acrocephalus schoenobaenus*) B

Nota.- En el Refugio o su entorno inmediato, las cinco únicas citas que conocemos de este pájaro corresponden a 1978, 1981, 2006, 2011, y 2013, respectivamente. Las dos primeras se publicaron en la **Lista de vertebrados del Refugio** (pág. 32, Nota 79), la tercera en la **Hoja Informativa Nº 32** (págs. 49-50), la cuarta en la **Hoja Informativa Nº 36** (pág. 65), y la quinta en la **Hoja Informativa Nº 42** (pág. 22). En una zona cercana del nordeste de Segovia, hubo en 2004 una sexta noticia para la comarca, reseñada en la **Hoja Informativa Nº 28** (pág. 31). En el sur de Burgos, en las charcas de Villalba de Duero, ha habido tres citas más (una en 2005, una en 2010, y otra en 2015), recogidas en las **Hojas Informativas Nº 32** (págs. 49-50), **Nº 34** (pág. 62), y **Nº 42** (pág. 22), respectivamente.

Las ocho citas corresponden a abril (una), mayo (una), julio (dos), agosto (dos), y octubre (dos). (Véase la **Hoja Informativa Nº 38**, pág. 66).

181.- **CARRICERO COMÚN** (*Acrocephalus scirpaceus*) N(1,[2],¿4?) n(4)

Nuevas citas.- Año 2018.-
69) --- El 10 de agosto, al menos dos carriceros comunes, junto al puente de Alconadilla (cuadrícula 4). (Xavier Parra Cuenca).
70) --- El 8 de septiembre, un carricero común, fotografiado, junto al puente de Alconadilla (cuadrícula 4). Tiene una anilla de metal en la pata izquierda. (Xavier Parra Cuenca).

En zonas relativamente cercanas del sur de Burgos.- Un carricero común en la ribera del río Arandilla (Huerta de Rey, Burgos, cuadrícula VM73), el 18 de abril. (Rufino Fernández González; publicado en www.avesdeburgos.com, como la primera observación del año en la provincia).

En el Refugio e inmediaciones, sin incluir zonas próximas, ha habido ya, que sepamos, al menos 70 citas de la especie. [Véase lo señalado sobre este pájaro en las **Hojas Informativas Nº 22** (pág. 40), **Nº 23** (pág. 37), **Nº 24** (pág. 64), **Nº 26** (pág. 45), **Nº 28** (págs. 31-32), **Nº 30** (págs. 36-37), **Nº 32** (págs. 50-52), **Nº 34** (pág. 62), **Nº 36** (pág. 66), **Nº 38** (págs. 66-67), **Nº 40** (pág. 82), **Nº 42** (pág. 22), **Nº 44** (pág. 23), y **Nº 48** (pág. 30).]

182.- ***CARRICERO TORDAL** (*Acrocephalus arundinaceus*) A E [n([2])] +(4)

Nuevas citas en zonas cercanas.-

--- El 24 de abril de 2018, un carricero tordal macho cantando, en la ribera del río Aranzuelo (Arauzo de Miel, Burgos, cuadrícula VM63) (Rufino Fernández González). (Publicado en www.avesdeburgos.com, como la primera observación del año en el sur de la provincia).

Véase lo indicado sobre este pájaro en las **Hojas Informativas Nº 26** (págs. 45-46), **Nº 28** (pág. 32), **Nº 30** (pág. 37), **Nº 32** (págs. 52-53), **Nº 34** (págs. 62-63), **Nº 36** (pág. 66), **Nº 40** (pág. 83), **Nº 42** (pág. 63), **Nº 44** (págs. 23-24), **Nº 46** (pág. 23), y **Nº 48** (pág. 30).

183.- **ZARCERO COMÚN o POLÍGLOTA** (*Hippolais polyglotta*) N(1,[2],3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-
--- El 10 de agosto, a las 19 h. 30 m., un joven cebado por un adulto, y otros ejemplares vistos, en El Guancho (Villaverde de Montejo, cuadrícula 3). (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).

Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2017.- El 23 de abril, un zarcero políglota en Torregalindo (Burgos) (Víctor Salvador Vilariño). (Publicado en www.avesdeburgos.com).

Año 2018.- El 17 de abril, a las 12 h. 41 m., un zarcero común oído, junto a la boca norte del túnel al sur del viaducto. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

184.- ***ZARCERO PÁLIDO [BEREBER]** (*Hippolais pallida*) [(*Iduna opaca*)] A

Véase lo indicado sobre este pájaro en la **Hoja Informativa Nº 26** (pág. 46); para otras zonas de Segovia (el Duratón), en el "*Noticiario Ornitológico*" de "**Ardeola**" (Vol. 35 [2], 1988, pág. 313); y para

el sur de Burgos, en la **Hoja Informativa Nº 34** (pág. 63). Véanse también las referencias anotadas en la **Hoja Informativa Nº 30** (pág. 37).

185.- **CURRUCA RABILARGA** (*Sylvia undata*) N(1,2,3,4)

Sobre la disminución de registros de este pájaro, véase lo indicado en las **Hojas Informativas Nº 30** (pág. 39), **Nº 34** (pág. 64), y **Nº 38** (pág. 67). Parece que la especie se está recuperando algo los últimos años, en la zona.

Véanse también los **Informes finales** de los censos de otoño.

S/n.- ***CURRUCA SARDA / BALEAR** (*Sylvia sarda* [*balearica*]) B ?

Véase lo indicado sobre esta controvertida especie en las **Hojas Informativas Nº 24** (págs. 64-65) y **Nº 28** (pág. 33), y **Nº 30** (pág. 39).

186.- **CURRUCA TOMILLERA** (*Sylvia conspicillata*) N(3,4) n(1,[2])

Nuevos registros.- Año 2018.-

--- El 6 de abril, una curruca tomillera en Haza (Burgos, cuadrícula VM30). (Cristian Osorio Huerga; publicado en www.avesdeburgos.com, como la primera observación del año en la provincia).

--- El 10 de mayo, una curruca tomillera macho, en el Refugio de Montejo. Se obtienen fotos. (Luis Sitges Aparicio).

--- El 19 de mayo, a las 12 h. 14 m., una curruca tomillera, en los páramos del suroeste (en la zona que Daniel Magnenat llamaba "*la estepa sur*"). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 6 de junio, una curruca tomillera, fotografiada, en el Refugio de Montejo. (Luis Sitges Aparicio).

--- El 12 de agosto, a las 10 h. 0 m., al menos dos currucas tomilleras (una parece joven), en los campos adyacentes al barranco de San Andrés, en el término de Moral de Hornuez. Un ejemplar es fotografiada. (Xavier Parra Cuenca).

(Sobre los nidos ocupados de este pájaro, véase la **Hoja Informativa Nº 40**, págs. 84-85).

Anexo para años anteriores.- En 2015, aunque la primera observación que conocemos en el nordeste de Segovia fue de un ave el 3 de abril (un ave observada en Moral de Hornuez, en el paraje de Las Rozas, por Xavier Parra Cuenca, tal como se indicó en la **Hoja Informativa Nº 44,** pág. 24), en el sur de Burgos hubo ese año una observación anterior, del 1 de abril (dos aves en eriales de La Vid, cuadrícula VM60, registradas por Carlos Palma Barcenilla; publicado en www.avesdeburgos.com).

187.- **CURRUCA CARRASQUEÑA** (*Sylvia cantillans*) N([1],2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-

--- El 1 de junio, a partir de las 11 h. 37 m., una curruca carrasqueña con ceba (un insecto), que reclama mucho, en una pequeña encina de lo alto de la margen izquierda (parte final) del barranco de Valtejo (cuadrícula 4). Está todo el rato allí, o cerca. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 9 de agosto, dos currucas carrasqueñas hembras o jóvenes en el bosquete de encinas del alto del Bercial (cuadrícula VL58). (Xavier Parra Cuenca).

--- El 10 de agosto, una curruca carrasqueña joven, fotografiada, en El Guancho (Villaverde de Montejo). (Xavier Parra Cuenca).

Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2018.-

--- El 15 de abril, vista en el barranco de Valtejo (16 h. 45 m.). / El 17 de abril, vista y oída en la parte final del barranco de la Fuente (16 h. 34 m. – 16 h. 54 m.). / (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 25 de abril, vistas cerca del embalse (10 h. 30 m., 10 h. 40 m.). (José Luis López-Pozuelo García).

A partir de esa fecha, hay más observaciones de la especie.

Comienzo de 2019.-

--- El 14 de marzo, a las 8 h. 25 m., curruca carrasqueña oída, en el sabinar del sur, hacia el final de la parte alta de la margen derecha de Valdecasuar. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Anexo para años anteriores.- En 2015, la primera observación registrada en Burgos fue de un macho en el encinar de Arauzo de Salce (cuadrícula VM62) el 10 de abril, por Rufino Fernández González. (Publicado en www.avesdeburgos.com).

188.- ***CURRUCA CABECINEGRA** (*Sylvia melanocephala*) N(2) +(1,4)

Nuevas citas.- Año 2018.-

--- El 25 de abril, a las 11 h., una curruca cabecinegra macho, en la margen derecha del embalse, por el Valle Ancho. (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 23 de mayo, a las 9 h. 41 m., una pareja de currucas cabecinegras, en un escaramujo, en la margen derecha del embalse, entre la recula de Carralanga y el Valle Ancho. (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 9 de noviembre, a las 11 h. 9 m., una curruca cabecinegra junto al río Riaza, aguas abajo de la presa. (Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra, José Luis Romero Carayol, y Pedro Rodríguez Panizo).

Véase lo indicado sobre esta curruca en la **Lista de vertebrados del Refugio** (pág. 33, Nota 83), y en las **Hojas Informativas Nº 22** (pág. 41), **Nº 23** (pág. 37), **Nº 24** (págs. 65-66), **Nº 26** (págs. 50-51), **Nº 28** (págs. 35-36), **Nº 30** (pág. 40), **Nº 32** (págs. 56-57), **Nº 34** (pág. 66), y **Nº 36** (pág. 68), **Nº 38** (pág. 70), **Nº 42** (pág. 24), **Nº 44** (pág. 25), **Nº 46** (pág. 24), y **Nº 48** (pág. 32).

El único nido registrado en el Refugio, según la información que conocemos, sigue siendo el nido con cuatro huevos descubierto por Daniel Magnenat el 21 de mayo de 1992, en el sabinar del nordeste (citado en la **Lista de vertebrados del Refugio**, pág. 33, Nota 83; y en la **Hoja Informativa Nº 20**, pág. 12).

189.- **CURRUCA MIRLONA** (*Sylvia hortensis*) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-
--- El 12 de agosto, a las 10 h. 0 m., tres o más currucas mirlonas en el barranco de San Andrés. Los ejemplares vistos claramente son jóvenes. (Xavier Parra Cuenca).

Nuevos datos sobre partidas.- Año 2017.-
--- El 6 de octubre, curruca mirlona, en las hoces del Riaza. (Ramón Ballester, en eBird).

Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2018.-
--- El 5 de mayo, a las 10 h. 4 m., oída la primera curruca mirlona, en el sabinar del norte del Refugio. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

190.- **CURRUCA ZARCERA** (*Sylvia communis*) N(1,4) [n([3])] +(3)

Nuevas observaciones.- Año 2018.-
--- El 10 de mayo, una curruca zarcera macho, fotografiada, en el Refugio de Montejo. (Luis Sitges Aparicio).
--- El 12 de agosto, a las 20 h. 0 m., varias currucas zarceras en el pinar quemado, en la cara sur del cerro Lucas (cerca de la cima). Un ejemplar es fotografiado. (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).
--- El 14 de agosto, a las 9 h. 15 m., dos currucas zarceras en campos entre Moral de Hornuez y Valdevacas de Montejo, no lejos de Hornuez. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 15 de agosto, a las 20 h. 30 m., una curruca zarcera, fotografiada, cerca de Fuentemizarra. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 8 de septiembre, a las 10 h. 0 m., dos currucas zarceras cerca del puente de Alconadilla. (Xavier Parra Cuenca).

Nota.- La observación realizada por el Dr. Pedro Rodríguez Panizo, de una curruca zarcera en La Vid (Burgos, cuadrícula 2) el 9 de agosto de 2014, reseñada en la **Hoja Informativa Nº 42** (pág. 25), aparece recogida por Rufino Fernández González, citando la referida publicación, en el Volumen 5 del **Anuario Ornitológico de Burgos** (pág. 180).

191.- **CURRUCA MOSQUITERA** (*Sylvia borin*) N(1,[2],3,4) n(2)

Nuevas observaciones.- Año 2018.-

--- El 12 de agosto, a las 10 h. 0 m., una o dos currucas mosquiteras, en el barranco de San Andrés. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 14 de agosto, una curruca mosquitera , en los huertos de Hornuez (cuadrícula 3). (Xavier Parra Cuenca).
--- El 15 de agosto, a las 7 h. 58 m., una curruca mosquitera, en la chopera cerca de Aldealengua de Santa María (junto al río Riaza, cuadrícula VL68). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

192.- **CURRUCA CAPIROTADA** (*Sylvia atricapilla*) N(1,4) n(2,3)

Nuevos datos sobre la reproducción, y sobre algunas observaciones.-

Anexo para 2017.- A los registros señalados en la **Hoja Informativa Nº 48** (págs. 33-34), puede añadirse:
--- El 6 de octubre, curruca capirotada, en las hoces del Riaza. (Ramón Ballester, en eBird).

Año 2018.-
--- El 30 de marzo, un macho de curruca capirotada por la mañana, y una pareja por la tarde, en los huertos de Moral de Hornuez. Se obtiene foto. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 1 de abril, entre las 10 h. 0 m. y las 11 h. 0 m., varias currucas capìrotadas, principalmente machos, que cantan, en la Fuente de La Pisadera, en Montejo de la Vega. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 12 de agosto, a las 10 h. 0 m., dos currucas capirotadas (primero una hembra, y después un macho), junto al arroyo de San Andrés. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 14 de agosto, una curruca capirotada macho en los huertos de Moral de Hornuez (cuadrícula 3). (Xavier Parra Cuenca).
--- El 17 de septiembre, a las 8 h. 48 m., una curruca capirotada hembra, junto a Villacorta (Segovia, cuadrícula VL67). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 11 de noviembre, por la mañana, curruca capirotada, frente a Peña Portillo. (Félix Martínez Olivas).
--- El mismo día 11 de noviembre, entre las 9 h. 6 m. y las 9 h. 22 m., al menos cuatro currucas capirotadas, frente a Peña Rubia, en un rosal silvestre del río o cerca. (Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra, José Luis Romero Carayol, Elías Gomis Martín, Silvia Gomis Tellés, y Epifanio Ramos Gutiérrez).
--- El mismo día 11 de noviembre, por la mañana, curruca capirotada oída, frente a La Catedral. (Jorge Andrés Remacha Lorenzo, José Miguel Ibáñez de la Fuente, y Petra de Pablo González).
--- El 16 de noviembre, una curruca capirotada macho choca contra un cristal (o similar), en Aranda de Duero (Burgos). Es llevada a la Casa del Parque, en Montejo de la Vega, donde se reanima y le devuelven la libertad. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio).

193.- **MOSQUITERO PAPIALBO** (*Phylloscopus bonelli*) N(1,[2],¿3?,[3],4) +(2,3)

Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2018.-
--- El 18 de abril, un mosquitero papialbo en la ribera del río Aranzuelo (Arauzo de Miel, Burgos, cuadrícula VM63), un macho cantando en un encinar de Arauzo de Salce (Burgos, cuadrícula VM62), y un ejemplar en Huerta de Rey (Burgos, cuadrícula VM73). (Rufino Fernández González; publicado en www.avesdeburgos.com).
--- El 20 de abril, a las 16 h. 25 m., un mosquitero papialbo, en la Peña X. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

194.- **MOSQUITERO SILBADOR** (*Phylloscopus sibilatrix*) B

Véase lo indicado sobre este pájaro en la **Lista de vertebrados del Refugio** (pág. 33, Nota 87), y en las **Hojas Informativas Nº 22** (pág. 42), **Nº 24** (págs. 66-67), **Nº 28** (pág. 37), **Nº 32** (págs. 60-61), y **Nº 48** (pág. 34).

En la **Hoja Informativa Nº 34** (págs. 68-69) se incluye un resumen de las nueve primeras citas conocidas en la comarca . La décima (novena para el Refugio y su entorno inmediato) aparece en la **Hoja Informativa Nº 48** (pág. 34).

195.- **MOSQUITERO COMÚN / IBÉRICO** (*Phylloscopus collybita* / *ibericus*) N([2],3,4) +(1,2) y 195bis [*brehmii*]

Notas.- Año 2018.-

1.- Xavier Parra Cuenca registra, el 27 de marzo, al menos cuatro mosquiteros comunes junto al puente de Alconadilla, y varios ejemplares en los huertos de Moral de Hornuez (obtiene foto); el 30 de marzo, a las 14 h. 30 m., dos mosquiteros comunes junto al puente de Alconadilla; y el 31 de marzo, un mosquitero común en el río Riaza, aguas abajo de Montejo de la Vega.

2.- Xavier Parra Cuenca señala, el 1 de abril, a las 18 h. 0 m., un canto claro de mosquitero ibérico oído en Moral de Hornuez.

3.- Xavier Parra Cuenca fotografía un mosquitero ibérico, y observa dos ejemplares, junto al puente de Alconadilla, el 8 de septiembre, a las 10 h. 15 m.

4.- Sobre las anotaciones de mosquiteros en el **censo de otoño de 2018**, véase el **Informe final** correspondiente (pág. 70). El mosquitero fue citado por sitete equipos (por uno de ellos, sólo oído); de los que siete señalaron mosquitero común (uno de ellos, sólo oído), y uno señaló también mosquitero ibérico.

Destacaremos:

El 10 de noviembre, entre las 8 h. 39 m. y las 11 h.58 m., y por la tarde.- Mosquitero común, y mosquitero común ibérico (verdoso), en las charcas de Villalba de Duero (Burgos). (Javier Vitores Casado, Cecilio San Miguel Gayubo y Carlos López Tello).

5.- José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano observan un mosquitero común en el camino a Maluque, el 28 de diciembre.

Sobre las diferencias (y semejanzas) entre los mosquiteros común e ibérico, y la distribución y fenología de ambos, pueden verse las referencias citadas en las **Hojas Informativas Nº 24** (pág. 67), **Nº 26** (págs. 53-54), **Nº 28** (págs. 38-39), **Nº 30** (pág. 45), **Nº 32** (págs. 61-62), **Nº 34** (págs. 69-70), y **Nº 40** (págs. 89-90).

Sobre las observaciones (y audiciones) de mosquitero común o ibérico registradas en los censos de otoño de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, y 2018, véase lo anotado en los Informes finales correspondientes (págs. 94-95, 70, 87-88, 76-77, 69, 73-74, 78, 79-80, y en preparación, ,respectivamente).

196.- **MOSQUITERO MUSICAL** (*Phylloscopus trochilus*)

Nuevas citas.- Año 2018.-

65) El 30 de marzo, a las 14 h. 45 m., un mosquitero musical junto al puente de Alconadilla. Se obtiene foto. (Xavier Parra Cuenca).

66) El 1 de abril, a las 12 h. 33 m., dos mosquiteros musicales junto al río Riaza, en Montejo de la Vega; y a las 20 h. 0 m., varios posibles mosquiteros musicales al lado del río, en Aldealengua de Santa María. (Xavier Parra Cuenca).

67) El 9 de agosto, a las 10 h. 45 m., al menos cuatro mosquiteros musicales juntos, en la zona del aparcamiento del embalse cercano a la isla. Un ejemplar es fotografiado, en la orilla del embalse de Linares. (Xavier Parra Cuenca).
68) El 10 de agosto, a las 9 h. 0 m., un mosquitero musical junto al puente de Alconadilla. (Xavier Parra Cuenca).
69) El 12 de agosto, a las 10 h. 0 m., un mosquitero musical en el barranco de San Andrés. (Xavier Parra Cuenca).
70) El 14 de agosto, a las 10 h. 15 m., uno o más mosquiteros musicales en el pinar de Valdevacas, cerca de la torre de vigilancia. (Xavier Parra Cuenca).
71) El 10 de septiembre, un mosquitero musical, fotografiado, en Montejo de la Vega. (Xavier Parra Cuenca).

El total de citas recibidas asciende a 71, sin contar los registros en zonas cercanas. Por meses, los 68 registros se reparten así: Dos en marzo, nueve en abril, uno en mayo, uno en junio, dos en julio, veinticinco en agosto, veintiuno en septiembre, nueve en octubre, y uno en noviembre.

197.- **REYEZUELO SENCILLO** (*Regulus regulus*) [+(3)]

Nuevas citas:
--- El 11 de noviembre de 2018, a las 9 h. 25 m., un bando mixto de páridos y reyezuelos en el soto bajo Peña Portillo; con al menos 4-6 herrerillos comunes, 2 herrerillos capuchinos, 2 reyezuelos sencillos y 8-10 reyezuelos listados.. (Félix Martínez Olivas).

El total de registros fechados que conocemos asciende a 100: Cinco en febrero, dos en marzo, uno en abril, cuatro en junio, uno en julio, cinco en agosto, uno en septiembre, dos en octubre, 73 en noviembre (de ellos, 24 en 1989), y seis en diciembre. (Véase la **Lista de vertebrados del Refugio**, pág. 33, Nota 89).

198.- **REYEZUELO LISTADO** (*Regulus ignicapillus* [*ignicapilla*]) N(¿1?,2,¿3?,4) n(1,3)

Nuevas citas: Año 2018.-

--- El 31 de enero, a las 14 h. 17 m., un reyezuelo listado bajo S.I., antes del aforador. (José Luis López-Pozuelo García). (Citado en la **Hoja Informativa Nº 48**, pág. 35).
--- El 27 de marzo, a las 10 h. ap., un reyezuelo listado, en los huertos de Moral de Hornuez. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 1 de abril, a las 18 h. 0 m., dos reyezuelos listados en la hoz de Moral de Hornuez, entre arbustos espinosos. Se obtiene foto. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 28 de mayo, a las 18 h. 12 m., un reyezuelo listado, en el poblado del embalse (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 14 de agosto, a las 10 h. 45 m., un reyezuelo listado, en el pinar de Valdevacas, cerca de la torre. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 10 de septiembre, a las 11 h. 55 m., uno o dos reyezuelos listados, en el pinar de Valdevacas, cerca de la torre. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 12 de octubre, un reyezuelo listado, en el monte de "El Chaparral", en el término de Castillejo de Mesleón (Segovia, cuadrícula VL47). (Antonio Fernández Ortiz).
--- El 10 de noviembre, por la tarde, reyezuelo listado visto, frente a Peña Fueros izquierda. (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).
--- El mismo día 10 de noviembre, a las 17 h. 36 m., reyezuelo listado oído, frente a Peña de la Zorra. (Manuel de Andrés Moreno y Antonio Fernández Ortiz).
--- El 11 de noviembre, a las 9 h. 25 m., un bando mixto de páridos y reyezuelos en el soto bajo Peña Portillo; con al menos 4-6 herrerillos comunes, 2 herrerillos capuchinos, 2 reyezuelos sencillos y 8-10 reyezuelos listados.. (Félix Martínez Olivas).
--- El mismo día 11 de noviembre, a las 10 h. 2 m., reyezuelo en encinar del monte de Linares. (Juan Francisco Martín Calleja).

--- El mismo día 11 de noviembre, por la mañana, reyezuelo listado visto, frente a Peña Fueros izquierda. (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).
--- El mismo día 11 de noviembre, por la mañana, reyezuelo listado visto, frente a El Campanario / La Raya. (Antonio Sanz Carro y Andrés Requejo de las Heras).

Comienzo de 2019.-
--- El 27 de febrero, a las 12 h. 7 m, un reyezuelo, sin determinar especie, en un guillomo, en la ladera de Los Poyales (S.I.). (José Luis López-Pozuelo García).

199.- **PAPAMOSCAS GRIS** (*Muscicapa striata*) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre partidas.- Año 2018.-

---- El 9 de septiembre, un papamoscas gris, fotografiado, junto al puente de Alconadilla. (Xavier Parra Cuenca).

---- El 16 de septiembre, a las 16 h. 25 m., un papamoscas gris, en una chopera de la parte alta del barranco de Valdecasuar. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Javier Alcalde Cuña, Diana Teresa Argüello Barrio, Fermín Redondo Ramírez, y Gabriel Redondo Jáuregui).

Notas.- 1) El 18 de julio de 2018, a las 13 h. 47 m., un papamoscas gris, junto al río y el puente principal del poblado del embalse (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

2) La observación realizada por el autor, de un papamoscas gris en el término de Fuentenebro (Burgos) el 6 de octubre de 2015, reseñada en la **Hoja Informativa Nº 44** (pág. 28), está citada por José Luis Lobo Cueva, indicando la fuente, en el Volumen 5 del **Anuario Ornitológico de Burgos** (pág. 187).

200.- **PAPAMOSCAS CERROJILLO** (*Ficedula hypoleuca*) n(1,4)

Citas tardías.- Otoño de 2017.-
--- El 6 de octubre de 2017, papamoscas cerrojillo, en las hoces del Riaza. (Ramón Ballester, en eBird).

Nuevas observaciones en primavera.- Año 2018.-
--- El 21 de abril, a las 18 h. 43 m., un papamoscas cerrojillo, en la parte alta del camino del Chorrillo (cerca de Maderuelo, cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Primeras observaciones en agosto (primera quincena).- Año 2018.-
--- El 9 de agosto, a las 20 h. 15 m., papamoscas cerrojillo, en el bosquete de encinas del alto del Bercial. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 11 de agosto, a las 20 h. 30 m., un papamoscas cerrojillo, en el camino de Cilleruelo de San Mamés. (Xavier Parra Cuenca).
--- El mismo día 11 de agosto, a las 8 h. 18 m., un papamoscas cerrojillo frente a Los Poyales, en lo alto, justo antes de D.s.m. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 12 de agosto, a las 20 h. 30 m., varios papamoscas cerrojillos, en el pinar cerca de Hornuez. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 14 de agosto, a las 9 h. 45 m., varios papamoscas cerrojillos en el pinar de Valdevacas, cerca de la torre; y a las 12 h. 43 m., un ejemplar, fotografiado, en el término de Moral de Hornuez, en el pinar quemado cerca de Cerro Lucas. (Xavier Parra Cuenca).

Nuevos datos sobre partidas.- Año 2018.-
---- El 8 de septiembre, un papamoscas cerrojillo, en Peñalba (cuadrícula 4). (Xavier Parra Cuenca).
---- El 15 de septiembre, a las 8 h. 42 m., un papamoscas cerrojillo, junto a la fuente de los Anillos (cuadrícula VL68). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
---- El 16 de septiembre, a las 16 h. 51 m., un papamoscas cerrojillo, entre Montejo y Valdevacas ap. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Javier Alcalde Cuña, Diana Teresa Argüello Barrio, Fermín Redondo Ramírez, Gabriel Redondo Jáuregui, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Notas.- 1) Sobre las fechas de paso y de observación de la especie en la zona, puede verse también lo indicado en la **Lista de vertebrados del Refugio** (pág. 34, Nota 91); y en las **Hojas Informativas Nº 22** (pág. 43), **Nº 26** (pág. 57), **Nº 28** (pág. 41), **Nº 30** (pág. 47), **Nº 32** (págs. 64-65), **Nº 34** (págs. 72-74), **Nº 36** (pág. 75), **Nº 38** (págs. 74-75), **Nº 40** (págs. 96-99), **Nº 44** (pág. 28), y **Nº 48** (pág. 36).

2) Las observaciones realizadas por el autor, de dos papamoscas cerrojillos en el término de Fuentenebro (Burgos) el 6 de octubre de 2015, reseñadas en la **Hoja Informativa Nº 44** (pág. 28), están citadas por José Luis Lobo Cueva, indicando la fuente, en el Volumen 5 del **Anuario Ornitológico de Burgos** (pág. 188).

3) Un prolongado estudio en Madrid sobre la especie aparece publicado en los dos siguientes e importantes trabajos, donde también se menciona el Refugio de Rapaces de Montejo:

--- Cano Barbacil, J.; y Cano Sánchez, J. (2018). **Fenología de los pasos migratorios del papamoscas cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*). Seguimiento a largo plazo en el centro y sur de la Comunidad de Madrid.** *Calendario Meteorológico 2019. Información meteorológica y climatológica de España.* Agencia Estatal de Meteorología. Madrid. Págs. 304-314.

--- Cano Barbacil, J.; y Cano Sánchez, J. (2018). **La duración de los pasos migratorios del papamoscas cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*) se reduce en los últimos cuarenta años en el centro y sur de la Comunidad de Madrid.** Págs. 24-39 en: Juan, M.; De la Torre, V.; y Pérez-Granados, C. *Anuario Ornitológico de Madrid 2015-2017.* SEO-Monticola. Madrid.

201.- **MITO** (*Aegithalos caudatus*) N(1,[2],3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-
--- El 27 de marzo, mitos haciendo un nido en la orilla del embalse, en la zona de la isla; en una horquilla de dos ramas, a 2 m. del suelo o poco más, en un chopo de momento sumergido. Se obtiene foto. (Xavier Parra Cuenca).

Nuevos datos sobre agrupaciones (de al menos seis aves).- Año 2018.-
--- El 10 de noviembre, a las 16 h. 48 m., un grupo de 6-7 mitos, frente a Peña Portillo 2ª (Alejandro Manuel Gil Gutiérrez).
--- El 15 de noviembre, un bando de 14 mitos, en chopos y majuelos cerca de la cola del embalse (cuadrícula 4). (José Liarte de Blas y Ricardo Ramos Sánchez).

Véase lo anotado sobre el mito en el **Informe final** del último censo de otoño, pág. 71.

202.- ***CARBONERO PALUSTRE** (*Parus [Poecile] palustris*) A ?

203.- **HERRERILLO CAPUCHINO** (*Parus [Lophophanes] cristatus*) N(2,3,4) [n([1])]

Nuevas citas.- Año 2018.-
--- El 12 de agosto, a las 20 h. 45 m., tres herrerillos capuchinos en el pinar próximo a Hornuez (cerca del camino a la N-I). (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).
--- El 14 de agosto, a las 10 h. 0 m., dos herrerillos capuchinos en el pinar de Valdevacas. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 15 de agosto, a las 12 h. 50 m., un herrerillo capuchino en Valdevacas de Montejo. Se obtiene foto. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 10 de noviembre, a las 11 h. 55 m. / 12 h. 0 m., dos herrerillos capuchinos en el pinar de Valdevacas, junto a la torreta de vigilancia. (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).
--- El 11 de noviembre, a las 9 h. 25 m., un bando mixto de páridos y reyezuelos en el soto bajo Peña Portillo; con al menos 4-6 herrerillos comunes, 2 herrerillos capuchinos, 2 reyezuelos sencillos y 8-10 reyezuelos listados.. (Félix Martínez Olivas).
--- El mismo día 11 de noviembre, por la mañana, herrerillo capuchino oído, frente a Peña Fueros izquierda. (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).

204.- **CARBONERO GARRAPINOS** (*Parus [Periparus] ater*) N(3) +(1,4)

Nuevas citas.- Año 2018.-

--- El 4 de agosto, un carbonero garrapinos, bien visto, al norte del Peñascal (Fuentenebro, Burgos, cuadrícula VL39). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 14 de agosto, al menos cuatro carboneros garrapinos, en el pinar de Valdevacas de Montejo. Se obtiene foto de un ejemplar. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 10 de noviembre, a las 11 h. 55 m. / 12 h. 0 m., dos carboneros garrapinos en el pinar de Valdevacas, junto a la torreta de vigilancia. (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).
--- El 11 de noviembre, a las 9 h. 4 m., carbonero garrapinos, frente a Las Torres. (Yolanda Arrabal Agüera, Coral Jiménez Herbón y Miguel Ángel Granado Iglesias).
--- El mismo día 11 de noviembre, por la mañana, carbonero garrapinos, frente a El Campanario / La Raya. (Antonio Sanz Carro y Andrés Requejo de las Heras).
--- El mismo día 11 de noviembre, por la mañana, probable carbonero garrapinos oído, frente a Valdecasuar margen derecha 3. (Javier Balset Izquierdo y Elvira Balset Martín).
--- El 12 de noviembre, a las 11 h. 0 m., un carbonero garrapinos, en el pueblo de Montejo de la Vega. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Nota.- En el Volumen 5 del **Anuario Ornitológico de Burgos** (pág. 190), José Luis Lobo Cueva aporta citas de la primavera de 2014, debidas a Luis Miguel Ansola Aristondo, según las cuales la reproducción de la especie sería probable en las cuadrículas VM31 y VM22 (varios ejemplares cantando en La Ventosilla el 19 de abril, y en Olmedillo de Roa el 13 de mayo).

205.- **HERRERILLO COMÚN** (*Parus [Cyanistes] caeruleus*) N(1,2,3,4)

Sobre los registros del herrerillo común en el último censo de otoño, véase el Informe final correspondiente, pág. 72.

206.- **CARBONERO COMÚN** (*Parus major*) N(1,[2],3,4) +(2)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-
--- El 14 de agosto, al menos un ejemplar joven y un adulto, en el pinar de Valdevacas de Montejo, cerca de la torre de vigilancia (cuadrícula 3); y el 18 de agosto, varios ejemplares en la misma zona. (Xavier Parra Cuenca).

207.- **TREPADOR AZUL** (*Sitta europaea*)

Nuevas citas, en el Refugio o en zonas cercanas.- Año 2018.-

--- El 1 de julio, a las 16 h. 0 m., un trepador azul, en la chopera vieja de Aldealengua (cuadrícula VL68). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 9 de septiembre, a las 19 h. 30 m., al menos cinco trepadores azules, de los que al menos uno es joven del año, en la chopera del río Bercimuel, en Alconada de Maderuelo, cerca del límite de Riaguas (cuadrícula VL58). Se obtienen fotos. (Xavier Parra Cuenca).

Sólo conocemos 29 citas (20+9) de la especie en la zona del Refugio, sin incluir parajes cercanos.

Véase lo indicado sobre este pájaro en la **Hoja Informativa Nº 26**, págs. 61-62. (Véanse también las **Hojas Informativas Nº 28**, pág. 43; **Nº 30**, pág. 49; **Nº 32**, pág. 68; **Nº 36**, pág. 78; **Nº 38**, págs. 81-82), **Nº 40** (pág. 102), **Nº 42** (pág. 29), **Nº 44** (págs. 29-30), **Nº 46** (págs. 27-28), y **Nº 48** (págs. 37-38).

208.- **TREPARRISCOS** (*Tichodroma muraria*) C

Nuevas observaciones en el desfiladero de La Yecla (Burgos, cuadrícula VM64), y en otras zonas de la misma provincia, pueden verse en **www.avesdeburgos.com**.

Véase el resumen relativo a esta especie en la **Hoja Informativa Nº 38** (pág. 82), y en las referencias citadas allí. Véanse también las **Hojas Informativas Nº 42** (pág. 29) y **Nº 40** (pág. 30).

209.- **AGATEADOR COMÚN o EUROPEO** (*Certhia brachydactyla*) N(1,¿2?,3,4) [N([2])]

Observaciones curiosas.- Año 2018.- El 14 de agosto, alrededor de las 10 h. 0 m., varios agateadores en el pinar de Valdevacas; dos juntos en un tronco. (Xavier Parra Cuenca).

(Véase lo indicado sobre la especie en la **Hoja Informativa Nº 48**, pág. 38).

210.- **PÁJARO MOSCÓN (EUROPEO)** (*Remiz pendulinus*) B N(4) +(1)

Nota.- El 10 de noviembre de 2018, un nido de pájaro moscón en las charcas de Fuentespina (Burgos). (Javier Vitores Casado, Carlos López Tello y Cecilio San Miguel Gayubo).

Véase lo indicado sobre esta especie en la **Lista de vertebrados del Refugio** (págs. 16, 34); y en las **Hojas Informativas Nº 9** (pág. 1), **Nº 22** (pág. 43), **Nº 24** (pág. 69), **Nº 26** (pág. 63), **Nº 28** (pág. 45), **Nº 30** (pág. 50), **Nº 32** (pág. 70), **Nº 34** (págs. 79-80), **Nº 36** (pág. 79), **Nº 40** (pág. 103), y **Nº 42** (pág. 30); así como en el **Informe final** de los censos de otoño de **1992** (pág. 5), de **2006** (pág. 61), de **2007** (pág. 77), de **2014** (pág. 71), y de **2018** (pág. 72).

211.- **OROPÉNDOLA** (*Oriolus oriolus*) N(1,3,4) [N([2])] n(2)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- --- El 3 de julio, a partir de las 10 h. 7 m., dos oropéndolas, de las que una al menos es macho, en la margen izquierda del embalse de Linares, en la zona del nido Nº 19 del águila calzada (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Recuérdese la observación realizada por el autor, en la misma zona, justo un año antes, el 3 de julio de 2017 (véase la **Hoja Informativa Nº 48**, pág. 38).

--- El 9 de agosto, a las 11 h. 0 m., dos oropéndolas machos y una hembra en los chopos del aparcamiento frente a la isla. (Xavier Parra Cuenca).

Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2018.- --- El 13 de abril, a las 18 h. 0 m., una oropéndola ("mari guapa") vista, en La Peña Flor (Fuentenebro, Burgos, cuadrícula VL39). (Yolanda Calleja Corento y Juan Carlos Cano Calleja).

--- El 26 de abril, una oropéndola en Tubilla del Lago (Burgos, cuadrícula VM52). (Rubén Arrabal Espeja; publicado en www.avesdeburgos.com).

--- El 28 de abril, oropéndola oída en el río Riaza, al oeste de los barrancos del oeste (8 h. 32 m.), y en La Hocecilla (19 h. 54 m.). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

(A partir de esa fecha, hay más registros de la especie).

212.- **ALCAUDÓN DORSIRROJO** (*Lanius collurio*) N(1,[2],3, 4) n(2)

Nuevas observaciones.- Año 2018.-

--- El 6 de junio, un alcaudón dorsirrojo macho, cerca del aparcamiento de la parte oeste del Refugio. Se obtienen fotografías. (Luis Sitges Aparicio).

--- El 17 de junio, a las 20 h. 49 m., un alcaudón dorsirrojo macho, junto a la pista de tierra entre Peñacea y Olmillos (Soria, cuadrícula VL89). (Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García, Cristian Calvo Vergara, Antonio Romera Camarero, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 15 de agosto, a las 12 h. 0 m., un alcaudón dorsirrojo hembra, fotografiado, y puede que algún otro ejemplar, en la zona del pinar quemado cerca de Hornuez (cuadrícula 3). (Xavier Parra Cuenca).

Nota.- La información de años anteriores, sobre el alcaudón dorsirrojo en el Refugio (e inmediaciones), incluyendo los datos sobre nidos y pollos localizados y sobre aves anilladas, está resumida en la **Lista de vertebrados del Refugio** (pág. 34, Nota 94), en las **Hojas Informativas Nº 21** (pág. 14), **Nº 22** (pág. 44), **Nº 23** (págs. 39-40), **Nº 24** (págs. 69-70), **Nº 26** (pág. 64), **Nº 28** (págs. 46-47), **Nº 30** (págs. 51-52), **Nº 32** (págs. 71-72), **Nº 34** (págs. 81-84), **Nº 36** (págs. 80-81), **Nº 38** (pág. 85), **Nº 40** (págs. 104-107), **Nº 42** (págs. 30-31), **Nº 44** (pág. 31), **Nº 46** (págs. 28-29), y **Nº 48** (págs. 38-39); y en las publicaciones y referencias allí citadas.

213.- **ALCAUDÓN NORTEÑO / REAL** (*Lanius excubitor / meridionalis*) N(1,2,3,4)

Nota.- Sobre la presencia de los dos tipos de alcaudón real en el Refugio, véase lo indicado en el **Informe final del censo de otoño de 2002** (págs. 25-26); y en las **Hojas Informativas Nº 26** (págs. 65-66), **Nº 28** (págs. 47-49), **Nº 30** (págs. 52-54), **Nº 32** (págs. 72-75), **Nº 34** (págs. 84-90), **Nº 36** (págs. 81-83), **Nº 38** (pág. 86), **Nº 40** (págs. 107-109), **Nº 42** (pág. 31), **Nº 44** (pág. 31), y **Nº 48** (págs. 39-40). (Y también, lo señalado en la **Lista de vertebrados del Refugio** [pág. 34, Nota 95]; y en las **Hojas Informativas Nº 21** –pág. 14-, **Nº 22** –págs. 44/45-, **Nº 23** –pág. 40-, **Nº 24** –pág. 70-, y **Nº 46** –pág. 29-). Véase también lo indicado en el libro "**Guía de las Aves de Castilla y León. Nueva edición revisada y ampliada**" (2005), de Joaquín Sanz-Zuasti y Tomás Velasco (fotografía: Carlos Sánchez; Náyade Editorial; Medina del Campo, Valladolid; 408 pp.; págs. 319, 388-389).

En relación con estos temas, señalaremos nuevas citas recientes, en el Refugio e inmediaciones, de un alcaudón de tipo real.

Anexo para 2003.- a los datos señalados en la **Hoja Informativa Nº 28** (pág. 47) puede añadirse la observación del alcaudón real meridional en las hoces del Riaza el 2 de noviembre de 2003 (Christophe Pontegnie, en eBird).

Anexo para 2017.- A los registros señalados en la **Hoja Informativa Nº 48** (págs. 39-40), puede añadirse:
--- El 6 de octubre, un alcaudón real meridional, en las hoces del Riaza. (Ramón Ballester, en eBird).
Año 2018.-
--- El 10 de septiembre, a las 18 h. 30 m., un alcaudón real meridional, fotografiado, en Moral de Hornuez, cerca del Esplegón (entre campos y páramos). (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).
--- El 11 de noviembre, después de las 9 h. 31 m., un alcaudón real, en el páramo entre Milagros y Fuentelcésped (Burgos). (Javier Vitores Casado, Carlos López Tello y Cecilio San Miguel Gayubo).
--- El mismo día 11 de noviembre, a las 16 h. 20 m., un alcaudón real meridional, en Villaverde de Montejo. (Javier Cano Sánchez y Carlos Cano Barbacil).
--- El 15 de diciembre, un alcaudón real en Caleruega (Burgos). (Juan José Molina Pérez).

Año 2018.-
--- El 3 de enero, dos alcaudones reales, en cables del tendido entre Pedraja de San Esteban y La Rasa (Soria). (Fermín Redondo Ramírez). (Publicado en la **Hoja Informativa Nº 48**, pág. 40).
--- El 15 de noviembre, tres alcaudones reales meridionales, en tres sitios distintos. (José Liarte de Blas y Ricardo Ramos Sánchez).

[Véase las Notas de las **Hojas Informativas Nº 46** (pág. 29) y **Nº 48** (pág. 40).]

214.- **ALCAUDÓN COMÚN** (*Lanius senator*) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.-

Anexo para 2016.- A los datos señalados en las **Hojas Informativas Nº 46** (pág. 30) y **Nº 48** (pág. 40), puede añadirse:
--- El 6 de agoato de 2016, alcaudones comunes jóvenes y adultos en los páramos de Maderuelo (Xavier Martín Vilar, en eBird).

Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, excepto aquellas en que se indica otro autor).

--- El 13 de julio, a las 19 h. 31 m., un alcaudón común joven, junto a un alcaudón común adulto, en un cable, sobre la carretera, cerca y al suroeste de Villavilla de Montejo. (Véase la observación del 10 de agosto, en la misma zona).
--- El 22 de julio, a las 9 h. 37 m., un alcaudón común adulto con ceba, en lo alto de Peña Portillo, cerca y al sur de la bifurcación de caminos.
--- El 25 de julio, a las 10 h. 4 m., un alcaudón común joven, en La Higuera (Segovia, cuadrícula VL03).
--- El 2 de agosto, a las 8 h. 26 m., un alcaudón común joven, en la Peña del Gato (cuadrícula VL68).
El mismo día 2 de agosto, a las 17 h. 58 m., un alcaudón común joven, en el comienzo de la pista a La Calzorra (Soria, cuadrícula VL78-VL88).
--- El 9 de agosto, un alcaudón común joven, entre Myta y la estación de Maderuelo, cerca de Myta. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 10 de agosto, a las 15 h. 47 m., un alcaudón común joven, en un cable, entre Las Tollas y Villalvilla de Montejo (cuadrícula 3). (Véase la observación del 13 de julio, en la misma zona).
--- El 11 de agosto, un alcaudón común joven, fotografiado, en Villaverde de Montejo. (Xavier Parra Cuenca).
--- El mismo día 11 de agosto, a las 10 h. 57 m., un alcaudón común joven, en un cable, junto a la cantera (cuadrícula 4).
--- El 12 de agosto, varios alcaudones comunes jóvenes, y una hembra, en campos de Moral de Hornuez. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 13 de agosto, a las 18 h. 40 m., un alcaudón común joven, junto al arroyo cruzado por el camino que va al dormidero de alimoches, cerca de Riaguas de San Bartolomé (cuadrícula VL58).
El mismo día 13 de agosto, a las 20 h. 49 m., un alcaudón común joven, junto al camino de la subida oeste al comedero de buitres del Refugio de Montejo. (Con Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio.)
--- El 19 de agosto, a las 9 h. 28 m., tres alcaudones comunes, un adulto y dos jóvenes del año, en la ladera muy alta de la zona del Reguerillo del Boquerón (cuadrícula 4), donde acaba el páramo y comienzan las encinas.
--- El 21 de agosto, a las 16 h. 8 m., un alcaudón común joven, en los páramos de Castroserracín (Segovia, cuadrícula VL38). (Con Carlos Palma Barcenilla).
El mismo día 21 de agosto, a las 19 h. 51 m., un alcaudón común joven, en el comedero de buitres del Refugio de Montejo. (Con Jesús Hernando Iglesias [guarda de WWF España en el Refugio], Juan José Molina Pérez, Carlos Cuéllar Basterrechea, y Carlos Palma Barcenilla).
--- El 22 de agosto, a distintas horas (8 h. 58 m., 9 h. 6 m., y 12 h. 33 m.), tres alcaudones comunes jóvenes, en los páramos entre Navares de las Cuevas y Castroserracín (Segovia, cuadrícula VL38).
--- El 23 de agosto, a las 9 h. 3 m., un gorrión común y un alcaudón común joven, en sabina cerca del Majano Nº 1, en la estepa cerealista del norte del Refugio de Montejo (cuadrícula 1).
--- El 10 de septiembre, un alcaudón común joven del año, fotografiado, en Montejo de la Vega. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 16 de septiembre, un alcaudón común joven, en Vallejo del Charco. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio).

Nuevos datos sobre llegadas.- Año 2018.-

--- El 5 de mayo, a las 18 h. 45 m., un alcaudón común (el primero que veo este año), en el sabinar del norte del Refugio, al oeste del comedero de buitres (cuadrículas 3-4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Nuevos datos sobre partidas.- Año 2018.-

--- El 10 de septiembre, un alcaudón común joven, fotografiado, en Montejo de la Vega. (Xavier Parra Cuenca).

215.- **ARRENDAJO** (*Garrulus glandarius*) [N(3)] [n([2])] +(4)

Sobre la reproducción.- Véase lo indicado en las **Hojas Informativas Nº 26**, pág. 68; **Nº 34**, pág. 91; y **Nº 36**, pág. 84.

Observaciones curiosas.- Año 2018.- El 14 de agosto, a las 13 h. 45 m., dos arrendajos en medio de la carretera asfaltada, entre Moral de Hornuez y la N-I. (Xavier Parra Cuenca).

Por otra parte, se han registrado ya, que conozcamos, 218 citas de este córvido en la zona (hasta 2018 inclusive), sin contar otros registros en parajes cercanos. Corresponden a todos los meses del año. Las mayores agrupaciones de las que tenemos noticias son las señaladas en las **Hojas Informativas Nº 26** (pág. 68), **Nº 28** (pág. 50), y **Nº 30** (pág. 55).

Notas.- 1) En el Volumen 5 del **Anuario Ornitológico de Burgos** (pág. 197), José Luis Lobo Cueva recoge la observación de una pareja de arrendajos en celo en La Ventosilla (cuadrícula VM31) el 19 de abril de 2014, por Luis Miguel Ansola Aristondo, lo que señala la reproducción probable en esa cuadrícula.

2) En el censo de otoño de 2018, los 125 participantes registraron unos cinco arrendajos (vistos).

216.- **RABILARGO (IBÉRICO)** (*Cyanopica cyanus [cooki]*) N(2,3,4) [n([1])] +(1)

Nuevos datos sobre la reproducción.-

Año 2018.-
--- El 12 de agosto, un rabilargo joven, fotografiado, en Moral de Hornuez (cuadrícula 3). (Xavier Parra Cuenca).
--- El 14 de agosto, a las 8 h. 13 m., rabilargos, de los que dos son jóvenes, en La Peña Flor (en la ladera de la margen izquierda) (Burgos, cuadrícula VL39). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Esta observación recuerda la de un rabilargo joven en esa ladera, realizada por el mismo autor el 24 de julio del año anterior (citada en la **Hoja Informativa Nº 48**, pág. 41).

Recuérdese que, en otras zonas de la misma cuadrícula, vi un pollo volandero de rabilargo el 17 de julio de 2014, y algún posible pollo el 28 de julio de 2014, como se detalla en la **Hoja Informativa Nº 42** (pág. 32). Esta última observación está citada por José Luis Lobo Cueva, mencionando la referida publicación, en el Volumen 5 del **Anuario Ornitológico de Burgos** (pág. 197).

En la cuadrícula VL39, la reproducción del rabilargo está señalada como "*posible*" en el "**Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de Burgos**" (Jacinto Román Sancho, Fernando Román Sancho, Luis Miguel Ansola Aristondo, Carlos Palma Barcenilla, y Rafael Ventosa Sánchez; ed. Caja de Ahorros del Círculo Católico, Burgos, 1996, 322 pp.; pág. 268), ,y en el "**Atlas de las Aves Reproductoras de España**" (Martí, R., y Del Moral, J. C. [eds.]; Dirección General de Conservación de la Naturaleza – Sociedad Española de Ornitología, Madrid, 2003, 733 pp.; pág. 540).

--- Entre el 8 y el 13 de octubre, "*se observa varios días a un grupo familiar de rabilargos ibéricos al inicio de la subida al alto de la Serrezuela, en Navares de las Cuevas*" (Segovia, cuadrícula VL38). (Antonio Fernández Ortiz).

Notas.- 1) En el censo de otoño de 2018, con 125 participantes, se detectaron como mínimo unos 48-49 rabilargos al parecer distintos (46-47 vistos y otros oídos), y probablemente más. El mayor grupo observado tenía **15** aves (el 9 de noviembre, a las 14 h. 15 m., junto a Montejo; Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra, José Luis Romero Carayol y Pedro Rodríguez Panizo). (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 73-74).

[En el censo de otoño de 2010, con 65 participantes, se detectaron como mínimo 113-118 rabilargos (111-116 vistos y algunos más oídos), con una agrupación máxima de 25 aves. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs 98-99).

En el censo de otoño de 2011, con 58 participantes, se vieron como mínimo unos 58 rabilargos, y posiblemente más, con una agrupación máxima de 16 aves. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 73-74.)

En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes, se vieron como mínimo unos 109 rabilargos, y posiblemente más, con una agrupación máxima de 30 aves. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 91-92.)]

En el censo de otoño de 2013, con 66 participantes, se detectaron como mínimo unos 39 rabilargos, y probablemente más. Los mayores grupos registrados tenían ocho aves. (Véase el **Informe final** correspondiente, pág. 79).

En el censo de otoño de 2014, con 74 participantes, se detectaron como mínimo unos 65 rabilargos que debían de ser distintos, y probablemente más. El mayor grupo observado tenía 19 aves. (Véase el **Informe final** correspondiente, pág. 72.)

En el censo de otoño de 2015, con 94 participantes, se detectaron como mínimo unos 41-55 rabilargos que debían de ser distintos, y probablemente más. El mayor grupo observado tenía unas 15 aves. (Véase el **Informe final** correspondiente, pág. 76).]

En el censo de otoño de 2016, con 76 participantes, se detectaron como mínimo unos 73 rabilargos que debían de ser distintos, y probablemente más. El mayor grupo observado tenía unas 25 aves. (Véase el **Informe final** correspondiente, pág. 80).

En el censo de otoño de 2017, con 108 participantes, se detectaron como mínimo unos 118-122 rabilargos al parecer distintos, y probablemente más. El mayor grupo observado tenía 52 aves. Otro grupo tenía 23-27 aves. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 82-83).]

Otros datos sobre agrupaciones.- Año 2018, y comienzo de 2019.-

--- El 4 de agosto, a las 11 h. 5 m., al menos 11 rabilargos en El Peñascal (Fuentenebro, Burgos, cuadrícula VL39). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 15 de noviembre, un bando de 12 rabilargos en el pinar de Valdevacas, cerca de la torre de vigilancia de incendios (cuadrícula 3). (José Liarte de Blas y Ricardo Ramos Sánchez).
--- El 26 de diciembre (de 2018), a las 11 h. 34 m., un bando de unos 30 rabilargos en el barranco de la Alduela, en la margen derecha del embalse (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 28 de diciembre (de 2018), un grupo de 16 rabilargos en el soto de Valdeherreros (Milagros, Burgos). (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).
--- El 28 de enero (de 2019), a las 10 h. 37 m., un bando de 30-40 rabilargos en el Valle Ancho, en la margen derecha del embalse (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García).

Puede verse una reseña de grandes bandos registrados en años anteriores en las **Hojas Informativas Nº 23** -pág. 40, Nota 1-, **Nº 24** –pág. 71-, **Nº 26** –pág. 69-, **Nº 28** –págs. 50-51-, **Nº 30** –pág. 56-, **Nº 32** –págs. 76-77-, **Nº 34** –págs. 92-93-, **Nº 36** –págs. 85-87-, **Nº 38** –pág. 90-, y **Nº 40** –págs. 112-115-. En esta última se incluye una reseña de los mayores bandos anotados en la zona, según los datos que conocemos.

2) Nuevos registros de rabilargo en el comedero de buitres del Refugio.- Año 2018.- Véase el Anexo I.

[Sobre observaciones de rabilargos en el comedero de buitres del Refugio de Montejo, o junto a la carroña, véase lo indicado en las **Hojas Informativas Nº 23** (pág. 40), **Nº 28** (pág. 51), **Nº 30** (pág. 56, Nota 1), **Nº 32** (págs. 77-78, Nota 1), **Nº 36** (pág. 86, Notas 1 y 2), **Nº 38** (pág. 91, Nota 1), **Nº 40** (pág. 114, Nota 1); **Nº 42** (pág. 33, Nota 2), **Nº 44** (pág. 33, Nota 2), **Nº 46** (pág. 31, Nota 2), y **Nº 48** (pág. 42, Nota 2); así como "***El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo***" (pág. 141).]

3) El 23 de julio de 2018, casi debajo del nido de azor Nº T (cuadrícula VL39, provincia de Burgos), donde había visto un pollo de azor veinte días antes (véase la **Hoja Informativa Nº 51**, apartado del azor), vi una pluma caudal de rabilargo, aunque podía no ser presa del azor. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

4) El 23 de mayo de 2018, a las 10 h. 27 m., dos rabilargos hostigan a un cuervo, en un chopo de la margen derecha del embalse, en la recula de la Alduela. (José Luis López-Pozuelo García).

5) El 17 de junio de 2018, a las 11 h. 15 m., un rabilargo acosa a un águila real adulta, que vuela y se posa en dos sitios (en roca), cerca de Piquera de San Esteban (Soria). (Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García, Cristian Calvo Vergara, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

5) El 12 de noviembre de 2018, a las 10 h. 37 m., tres rabilargos, muy bien vistos, en la ladera bajo El Castillo, junto al camino. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
(Primera observación de la especie en esta zona, para el autor).

217.- **URRACA (COMÚN)** (*Pica pica*) N(1,2,3,¿4?) +(4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernandez-Arroyo, excepto aquellas en que se indica otro autor.)

--- El 30 de julio, a las 18 h. 29 m., una urraca colicorta, en Quintanas Rubias de Arriba (Soria, cuadrícula VL88).
--- El 6 de agosto, a las 8 h. 54 m., una urraca colicorta, en Abánades (Guadalajara).
--- El 12 de agosto, a las 10 h 0 m., una urraca joven, fotografiada, que es cebada por un adulto, cerca de Moral de Hornuez (cuadrícula 3). (Xavier Parra Cuenca).
--- El 15 de agosto, a las 16 h. 31 m., una urraca colicorta, junto al km. 107 de la N-I (Segovia, cuadrícula VL56).

Notas.- 1) Nuevos datos sobre agrupaciones.- Otoño de 2018.- Sobre las concentraciones de urracas registradas en el censo de otoño, véase el **Informe final** correspondiente.

Sobre nuevas observaciones de urracas en el comederos de buitres de la comarca, véase el **Anexo I**.

Sobre las mayores concentraciones registradas de urracas, en años anteriores, véanse las **Hojas Informativas Nº 40** (págs. 116-117, Nota 1) y **Nº 46** (págs. 31-32, Nota 1).

2) El 27 de abril DE 2018, en el nido de búho real Nº X-B.T., fracasado, vi un pico de córvido (posiblemente urraca).

3) En el censo de otoño de 2018, con 125 participantes, se vieron seguramente no menos de 73 urracas.



(Fotografía: Raúl González Rodríguez. Noviembre de 2018.)

218.- ***CHOVA PIQUIGUALDA*** *(Pyrrhocorax graculus)* *B*

Véanse el resumen y las referencias sobre esta especie en la ***Hoja Informativa Nº 34*** *(pág. 98).*

219.- **CHOVA PIQUIRROJA** (*Pyrrhocorax pyrrhocorax*) N(1,3,4) +(2)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, excepto si se indica otro autor).

Barranco de San Andrés (cuadrículas 3-4).-
--- El 31 de marzo, dos chovas, y posible nido, en el barranco de San Andrés. El posible nido está en un agujero profundo, pero en una roca baja fácilmente accesible. (Xavier Para Cuenca).

Peñalba (cuadrícula 4).-
--- El 10 de marzo, a las 16 h. 58 m., un chova se mete en la cueva del nido Nº 34 de buitres leonados.
--- El 21 de abril, a las 10 h. 21 m., dos chovas, volando y posadas, parecen cortejarse.

El Caramelón (Presa Después Derecha) (cuadrícula 4).-
--- El 29 de mayo, a las 15 h. 23 m. ap., una grajilla o chova se introduce en un agujero encima de un nido de grajilla. Después, a las 16 h. 36 m., una chova en una oquedad de la peña, sobre el sitio peculiar a la izquierda del viejo nido Nº 2 del buitre leonado. Otra chova se mete en otro agujero, ap. entre la oquedad anterior y ese sitio peculiar.

Peña Negra (Adrada de Haza, Burgos) (cuadrícula VM30).-
--- El 13 de junio, a las 11 h. 49 m., dos chovas acuden a un agujero, arriba y a la derecha del nido Nº 1 del buitre leonado (con pollo). Una chova se va y la otra se mete dentro del agujero (posible nido de chova).

Comienzo de 2019.-
--- El 10 de marzo, entre las 11 h. 0 m. y las 12 h. 30 m. ap., se obtienen fotos de chova transportando material, en el Refugio de la C.H.D. (Juan José Molina Pérez).

Nuevos datos sobre agrupaciones.- Año 2018.-
--- El 17 de junio, a las 17 h. 31 m., al menos 45 chovas en Osma (Soria, cuadrícula VM90). (Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García, Cristian Calvo Vergara, Antonio Romera Camarero, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 14 de julio, a las 12 h. 59 m., un bando de varias docenas de chovas, en El Reloj y justo antes (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 9 de agosto, a las 12 h. 0 m., 12 chovas piquirrojas vuelan el cembalse al cañón, por encima de la estación de Maderuelo. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 11 de agosto, unas 20 chovas piquirrojas en la coronación de la presa. (Xavier Parra Cuenca).
--- Sobre agrupaciones de chovas en el censo de otoño de 2018, véase el **Informe final** correspondiente, págs. 75-77).
--- El 15 de noviembre de 2018, un bando laxo de 9 chovas, en el camino de Maluque a Montejo. (José Liarte de Blas y Ricardo Ramos Sánchez).

A propósito de otras agrupaciones de chovas, en los años precedentes, véanse, en particular, los **Informes finales de los censos de otoño de 2002** (págs. 26-27; Juan Prieto Martín) **y de 2006** (págs. 63-65). Sobre datos de chovas en otros censos de otoño, véanse también los **Informes finales de 2003**, págs. 44-45; **de 2004**, págs. 48-49; **de 2005**, pág. 41; **de 2007**, págs. 80-81; **de 2008**, págs. 90-91; **de 2009**, págs.89-91; **de 2010**, págs. 100-102; **de 2011**, págs. 75-77; **de 2012**, págs. 92-94; **de 2013**, pags. 80-82; **de 2014**, págs. 72-74; **de 2015**, págs. 77-78; **de 2016**, págs. 81-82; **de 2017**, págs. 84-87; y **de 2018**, págs.
. Sobre otras grandes agrupaciones de chovas en el Refugio, véanse asimismo los datos reseñados en las **Hojas Informativas Nº 23** (pág. 41), **Nº 28** (pág. 54, Nota 2), **Nº 30** (pág. 59, Nota 1), **Nº 32** (págs. 84-85, Nota 2), **Nº 34** (págs. 101-103), **Nº 36** (págs. 93-95), **Nº 38** (págs. 97-99), **Nº 40** (págs. 121-122), **Nº 42** (págs. 35-37), **Nº 44** (pág. 35), **Nº 46** (pág. 33), y **Nº 48** (pág. 44).

El censo de otoño en que se comprobó la presencia de más chovas fue posiblemente el de **2006**. En este recuento de 2006, con 88 participantes, destaca un bando de **más de 100** chovas, el jueves 9 de noviembre (anotado poco antes de las 7 h. 56 m., en Peña Portillo, por Sergio Aris Arderiu), y un bando de **100** chovas, el 11 de noviembre (observado a las 16 h. 16 m., en Peña Portillo, por Juan Prieto Martín). Resalta asimismo un bando de unas **58** chovas piquirrojas, anotadas a las 17 h. 27 m. del mismo día 11 de noviembre, junto a la granja de Campillo de Aranda, por Pablo Sanz Trillo y Omar Santos Lago. En el mismo día, y tal como se refleja en el **Informe final** de este censo de otoño, se vieron tres bandos distintos que sumaban **164** chovas (80 en Peña Portillo, a las 16 h. 40 m. [Juan Prieto Martín]; 26 frente al Circo del Águila, a las 16 h. 41 m. [José Antonio Dávila García]; y 58 junto a la granja de Campillo de Aranda, a las 17 h. 27 m. [Pablo Sanz Trillo y Omar Santos Lago]). Ese día se vieron probablemente no menos de **181** chovas. Y en la noche del sábado al domingo, se comprobó dónde durmieron no menos de unas **90-92** chovas, distribuidas por peñas, distribuidas por peñas de la forma que se indica en el **Informe final** (págs. 63-65).

En el censo de otoño de 2007, con 67 participantes, se vieron probablemente unas **70-80** chovas como mínimo, y muy posiblemente bastantes más. El mayor bando observado fue de 33 chovas. Se comprobó dónde durmieron más de 52 chovas.

En el censo de otoño de 2008, con 53 participantes, se vieron probablemente unas **145** chovas como mínimo, y muy posiblemente bastantes más. El mayor bando observado fue de unas 100 chovas. Se comprobó dónde durmieron unas 37-39 chovas.

En el censo de otoño de 2009, con 53 participantes, se vieron probablemente unas **154-176** chovas como mínimo, y muy posiblemente bastantes más. El mayor bando observado fue de unas 100 chovas. Se comprobó dónde durmieron unas 34-36 chovas.

En el censo de otoño de 2010, con 65 participantes, se vieron probablemente **unas 117-122** chovas como mínimo, y muy posiblemente bastantes más. El mayor bando observado fue de unas 40 chovas. Se comprobó dónde durmieron unas 50 chovas.

En el censo de otoño de 2011, con 58 participantes, se vieron probablemente **unas 126-131** chovas como mínimo, y muy posiblemente bastantes más. Los mayores bandos observados fueron de unas 50 chovas, y de unas 80 aves entre chovas y grajillas. Se comprobó dónde durmieron unas 27-29 chovas.

En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes, se vieron probablemente **unas 132-146** chovas como mínimo, y muy posiblemente bastantes más. Los mayores bandos observados tenían hasta 48-50 chovas el sábado, y hasta 53 chovas el domingo. Se comprobó dónde durmieron unas 36-50 chovas.

En el censo de otoño de 2013, con 66 participantes, se vieron probablemente **unas 119-127** chovas como mínimo, y muy posiblemente bastantes más. Los mayores bandos observados tenían hasta unas 40 chovas el sábado, y hasta 37 chovas el domingo. Se comprobó dónde durmieron unas 30-32 chovas.

En el censo de otoño de 2014, con 74 participantes, se vieron probablemente **unas 92-96** chovas como mínimo, y muy posiblemente bastantes más. Los mayores bandos observados tenían hasta unas 12 chovas el sábado, y hasta 21-23 chovas el domingo. Se comprobó dónde durmieron unas 57 chovas.

En el censo de otoño de 2015, con 94 participantes, se vieron probablemente **unas 122-147** chovas como mínimo, y muy posiblemente bastantes más. Los mayores bandos observados tenían hasta 27 chovas el sábado, y hasta 40 chovas el domingo. Se comprobó dónde durmieron unas 59-64 chovas.

En el censo de otoño de 2016, con 76 participantes, se vieron probablemente **unas 215-227** chovas como mínimo, y muy posiblemente bastantes más. Los mayores bandos observados tenían hasta unas 30 chovas el sábado, y hasta 65-70 chovas el domingo. Se comprobó dónde durmieron unas 66 chovas.

En el censo de otoño de 2017, con 108 participantes, se vieron probablemente unas 134-144 chovas como mínimo, y muy posiblemente bastantes más. Los mayores bandos observados tenían hasta 40 chovas el sábado, y hasta 54 chovas el domingo. Se comprobó dónde durmieron unas 60-62 chovas.

En el censo de otoño de 2018, con 125 participantes, se vieron probablemente unas 164 chovas como mínimo, y muy posiblemente bastantes más. Los mayores bandos observados tenían hasta unas 15 chovas el sábado, y hasta 33 chovas el domingo. Se comprobó dónde durmieron unas 78-81 chovas

Notas.- 1) Nuevas observaciones de interés en zonas cercanas.- (Datos de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, excepto aquellos en que se indica otro observador). Año 2018.-

--- Barranco de San Andrés (Segovia).- Al menos dos chovas el 28 de marzo.

Dos chovas, y posible nido, el 31 de marzo. (Xavier Parra Cuenca).

Siete chovas el 17 de agosto, a las 12 h. 30 m. (Xavier Parra Cuenca).

--- Ayllón (Segovia, cuadrícula VL68).- Cuatro chovas junto a la torre de La Martina, el 16 de junio, al anochecer; siete chovas, el 17 de junio, al amanecer.

--- Haza (Burgos, cuadrícula VM30).- Una chova el 11 de marzo, varias chovas el 29 de marzo, chova oída el 13 de junio.

--- Torregalindo (Burgos, cuadrícula VM30).- Dos chovas el 15 de junio.

--- Valle del Pozarón (Burgos, cuadrícula VM20).- Una chova vista y alguna chova oída el 15 de junio; cuatro chovas, el 3 de julio; chovas vistas, en el valle y el páramo cercano, el 23 de julio; una chova vista, en la torre de Corcos, el 7 de agosto.

--- La Yecla (Burgos, cuadrícula VM64).- Oída chova el 3 de agosto.

--- Molino de Torraño y páramos cercanos (Soria, cuadrícula VL78).- Una chova el 22 de abril.

--- Zona de Barbolla (Segovia, cuadrícula VL47).- Una chova cerca de Covachuelas, el 30 de marzo ap.; ocho chovas en el paraje del pico de la Chorra, el 14 de mayo. (Antonio Fernández Ortiz).

--- Hoz del río Dulce (Guadalajara, cuadrícula WL25).- Chovas oídas el 5 de agosto, y vistas (dos) el 6 de agosto.

2) Sobre una chova anillada.-

En relación con las observaciones de una chova anillada, con un compañero de pareja no anillado, recogidas en las **Hojas Informativas Nº 46** (pág. 35) y **Nº 48** (pág. 46), puede indicarse que, en este paraje de El Campanario vuelta, el 10 de junio de 2018, a las 18 h. 21 m., vi dos chovas piquirrojas, ambas sin anillar. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Sobre registros anteriores, de chovas anilladas en el Refugio, véase la **Hoja Informativa Nº 46**, pág. 35. Véase también la **Hoja Informativa Nº 48**, pág. 46.

3) Ataques aéreos.- En 2018, se han registrado nuevas agresiones de la chova a otras especies, como el águila calzada, y el cuervo. (Véanse los apartados correspondientes).

4) El 25 de mayo de 2018, a las 20 h. 50 m., cerca del viaducto, una pareja de chovas, una de las cuales posiblemente tenga el pico más largo y curvado que la otra. ¿Posible diferencia de sexos? (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

*5) Registros de chova realizados por el autor en distintas cuadrículas del sur de Burgos, reseñados en la **Hoja Informativa Nº 46** (pág. 34), aparecen recogidos por José Luis Lobo Cueva, citando la referida publicación, en el Volumen 5 del **Anuario Ornitológico de Burgos** (pág. 34).*

6) Sobre la velocidad de un bando de chovas, en los censos de otoño se han obtenido algunos datos, correspondientes a **1999** (tres; unos 40 km./h., unos 42 m./h., y unos 22´5 km./h., respectivamente), **2000** (dos; unos 35 km./h. y unos 50 km./h., respectivamente), **2011** (unos 18 km./h.), **2012** (dos; cada uno de unos 30 km./h.), y **2018** (unos 30 km./h.). La media de los nueve datos sería pues de unos 33´05 km./h. (297´5/9), con un rango de 18 a 50 km./h., una moda de 30 km./h., y márgenes de error difíciles de precisar.

*7) Para los próximos días 3 al 5 de octubre de 2019, está previsto en Segovia el **V Congreso Internacional sobre el Estudio y Conservación de las Chovas**; organizado por el Museo Nacional de Ciencias Naturales-CSIC, y Tagonius, con la colaboración de otras entidades.*

220.- **GRAJILLA (OCCIDENTAL)** (*Corvus [Coloeus] monedula*) N(1,[2],3,4) +(2)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Peñalba (cuadrícula 4).-
--- El 21 de abril, a las 12 h. 42 m., una grajlla con una ramita se mete en la cueva del nido de buitre leonado Nº 29 (con pollo); a las 14 h. 57 m., hay dos grajillas juntas en el viejo nido Nº F del alimoche; a las 15 h. 18 m., acuden grajillas a una especie de grieta en el techo dela cueva del viejo nido Nº 10 de buitres leonados; y a las 15 h. 25 m., una grajilla acude a un agujero arriba y a la izquierda del nido Nº 32 de buitres leonados.
--- El 19 de mayo, a las 17 h. 58 m., una grajilla con ceba se introduce en un agujero, arriba y a la derecha del nido Nº 4 de buitres leonados, y sale.
--- El 5 de junio, a las 9 h. 53 m., bullicido de grajillas en la peña. Una sale del viejo nido Nº V´ del búho.

Peña Inclinada (P.D.I., cuadrícula 4).-
--- El 22 de mayo, a las 10 h. 29 m., una grajilla con ceba se introduce en un agujero, bajo la repisa del nido Nº 24 de buitres leonados.
--- El 29 de mayo, a las 15 h. 23 m., hay una grajilla en un agujero, del que sale, y vuelve, y sale de nuevo (aparte, una grajilla o chova se mete en un agujero encima); a las 15 h. 29 m., de nuevo hay una grajilla en el mismo agujero; a las 16 h. 7 m., sale una grajilla del mismo agujero, donde parece claro que hay nido; y a las 16 h. 33 m., una grajilla va al mismo agujero. Está arriba y a la izquierda del contenedor verde.

La Raya (cuadrícula 4).-
--- El 6 de mayo, a las 15 h. 30 m., dos grajillas acuden a un agujero con palos, sobre la raya de La Raya.

Nuevos datos sobre agrupaciones (de al menos 35 ejemplares).- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, excepto aquellas en que se indique otro autor).

--- El 21 de mayo, a las 19 h. 49 m., un bando de **más de 50** grajillas, en El Caramelón (Presa Después Derecha, P.D.D.; cuadrícula 4).
--- El 16 de julio, a las 11 h. 2 m. y antes, **más de 92** grajillas (en dos bandos, de más de 70 y 22 aves respectivamente), en Peñalba (cuadrícula 4).
--- El 3 de agosto, a las 20 h. 55 m., **al menos 87** grajillas, posadas en Peñalba.
--- El 19 de agosto, a las 12 h. 30 m., **al menos 50** grajillas, en Peñalba. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 11 de octubre, un grupo de **unas 100** grajillas, en Peñalba. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).
--- El 11 de noviembre, **84** grajillas en Peñalba. (Juan Luis Galindo Estévez, Fernando Ávila Vico, Mario Benedited Guerrero, y Candelas Iglesias Aparicio)
Sobre otras agrupaciones de grajillas en el censo de otoño de 2018, véase el **Informe final** correspondiente, págs. 77-78.
--- El 14 de noviembre, **82** grajillas en Fuentelcésped (Burgos, cuadrícula 1). (Cristian Osorio Huerga y Daniel Sanz Platero; publicado en www.avesdeburgos.com).
--- El 17 de diciembre, **55** grajillas en cultivos de secano de Fuentespina (Burgos, cuadrícula 1). (Cristian Osorio Huerga y Daniel Sanz Platero; publicado en www.avesdeburgos.com).
--- El 28 de diciembre, un grupo de 24 grajillas, en vuelo, en el camino a Maluque. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).

Otros datos sobre grandes bandos, y sus desplazamientos, pueden verse en los **Informes finales de los censos de otoño**. Véanse también las agrupaciones reseñadas en las **Hojas Informativas** **Nº 26** (pág. 72), **Nº 28** (pág. 55), **Nº 30** (pág. 60), **Nº 32** (pág. 86), **Nº 34** (págs. 101-108), **Nº 36** (págs. 97-102), **Nº 38** (págs. 102-105), **Nº 40** (págs. 124-126), **Nº 42** (págs. 37-38), **Nº 44** (pág. 37), **Nº 46** (pág. 36), y **Nº 48** (pág. 47), por ejemplo.

Grajillas en el comedero de buitres del Refugio.- Año 2018.- Véase lo indicado en el Anexo I.

Notas.- 1) En diecisiete censos de otoño aparece, en los informes finales correspondientes, algún dato para la velocidad de desplazamiento de un bando de grajillas. Son los de 1994 (posiblemente unos 40-60 km./h., al menos), 1997 (45 km./h.), 1998 (dos datos, de unos 67´5 km./h. y unos 75 km./h.,

respectivamente), 2002 (56´7 km./h.), 2003 (unos 75 km./h.), 2004 (dos datos, de unos 21 km./h. y de unos 38´6 km./h.), 2005 (ap. 36´7 km./h.), 2006 (dos datos, de ap. unos 41 km./h. y de unos 30 km./h.), 2007 (unos 36 km./h.), 2008 (tres datos; de al menos unos 42 km./h., unos 40 km./h., y unos 55 km./h.), 2009 (tres datos; de unos 36´7 km./h., unos 40 km./h., y unos 26´2 km./h.), 2011 (dos datos, ambos de unos 60 km./h.), 2012 (tres datos; de unos 25 km./h., unos 60 km./h. y unos 45 km./h.), 2014 (tres datos; de unos 25´3 km./h., unos 75 km./h., y unos 42 km./h., respectivamente), 2015 (unos 40 km./h.), 2016 (dos datos; de unos 20 km./h. y unos 43 km./h., respectivamente), y 2018 (unos 48 km./h.). La media de los 30 datos sería de unos 45´16 km./h. [1.354´7/30], con un rango de 20 a 75, y una moda de unos 60 km./h.

2) En el censo de otoño de 2018, con 125 participantes, se vieron probablemente más de 356-442 grajillas, y muy posiblemente bastantes más. ; el mayor bando observado tenía 120 aves. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 77-78).

En el censo de otoño de 2017, con 108 participantes, se vieron probablemente más de 219 grajillas, y muy posiblemente bastantes más.; el mayor bando observado tenía 175 aves. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 86-87).

En el censo de otoño de 2016, con 76 participantes, se vieron probablemente más de 216 grajillas, y muy posiblemente bastantes más.; el mayor bando observado tenía unas 100 aves. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 83-84).

En el censo de otoño de 2015, con 94 participantes, se vieron probablemente más de 487-557 grajillas, y muy posiblemente bastantes más.; el mayor bando observado tenían unas 250 aves. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 78-80).

En el censo de otoño de 2014, con 74 participantes, se vieron probablemente más de 324 grajillas, y muy posiblemente bastantes más; los mayores bandos observados tenían unas 120-140 aves, y unas 115-120 aves. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 74-75).

En el censo de otoño de 2013, con 66 participantes, se vieron probablemente más de 336-420 grajillas, y muy posiblemente bastantes más.; el mayor bando observado tenía unas 200 aves. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 82-83).

En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes, se vieron probablemente más de 300-309 grajillas, y muy posiblemente bastantes más. ; el mayor bando observado tenía unas 150 aves. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 94-97).

El de 2011 es uno de los censos de otoño en que se registraron más grajillas (probablemente más de 600-714, y muy posiblemente bastantes más), junto con los de 2008 (probablemente más de 528, y muy posiblemente bastantes más), y 2015 (probablemente más de 487-557, y muy probablemente bastantes más).

221.- ***GRAJA** (*Corvus frugilegus*) A ?

Véase lo indicado sobre la graja en la **Hoja Informativa Nº 34**, págs. 108-109.

222.- **CORNEJA (NEGRA)** (*Corvus corone*) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-
(Las observaciones en que no se indica autor son de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 28 de mayo, un nido probablemente de corneja en un chopo frente a Peña de la Zorra (cuadrícula 1), después del sauce que crece aguas abajo del nido vacío del águila calzada.
--- El 11 de julio, dos jóvenes volanderos de corneja, fotografiados, en Valdeherreros (Milagros, Burgos; cuadrícula 1). (Juan José Molina Pérez).
--- El 20 de agosto, en las tres sabinas (en la estepa cerealista del norte del Refugio de Montejo, cuadrícula 1), restos de un viejo nido de corneja en la sabina más oriental, y restos de un nido mayor en la sabina más occidental.

Nuevas grandes concentraciones.- Año 2018.-

Sobre las agrupaciones de cornejas observadas en el censo de otoño de 2018, véase el **Informe final** correspondiente, págs. 78-79.

Pueden verse datos y referencias sobre otras grandes agrupaciones de cornejas en las **Hojas Informativas Nº 24** (págs. 72-73), **Nº 26** (págs. 73-74), **Nº 28** (págs. 57-58), **Nº 30** (págs. 51-52), **Nº 32** (págs. 89-90), **Nº 34** (pág. 111), **Nº 36** (págs. 105-106), **Nº 38** (pág. 107), **Nº 42** (págs. 39-40), **Nº 44** (pág. 38), **Nº 46** (pág. 38), y **Nº 48** (pág. 49).

Notas.- 1) En el censo de otoño de 2018, con 125 participantes, se vieron seguramente más de 63 cornejas, y probablemente bastantes más.

En el censo de otoño de 2017, con 108 participantes, se vieron seguramente más de 40 cornejas, y probablemente bastantes más.

En el censo de otoño de 2016, con 76 participantes, se vieron seguramente más de 65 cornejas, y probablemente bastantes más. El mayor grupo anotado tenía unas 12 cornejas. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 84-85.)

En el censo de otoño de 2015, con 94 participantes, se vieron seguramente más de 59 cornejas, y probablemente bastantes más. Los mayores grupos anotados tenían 11 cornejas. (Véase el **Informe final** correspondiente, pág. 87.)

En el censo de otoño de 2014, con 74 participantes, se vieron seguramente más de 73 cornejas, y probablemente bastantes más. El mayor grupo anotado tenía más de 20 cornejas. (Véase el **Informe final** correspondiente, pág. 76.)

En el censo de otoño de 2013, con 66 participantes, se vieron más de 20 cornejas, y probablemente bastantes más. Los mayores grupos observados tenían 8 y 7 aves, respectivamente. (Véase el **Informe final** correspondiente, pág. 83.)

En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes, se vieron seguramente más de 89 cornejas, y muy probablemente bastantes más. El mayor grupo observado tenía 52 aves. (Véase el **Informe final** correspondiente, pág. 97.)

2) El 8 de junio de 2018, en lo alto del monte frente a Peña de la Zorra, un desplumadero de corneja, al parecer obra de un ave. Las plumas no están mordidas. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

3) El 10 de junio de 2018, alguna pluma de corneja en el nido de **búho real** Nº Y-B.F., con un pollo. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

223.- **CUERVO (GRANDE)** (*Corvus corax*) N(1,[2],3,4)

En 2018, en las hoces del Riaza y su entorno, registré al menos 10-12 parejas, y ocho nidos del gran cuervo; de los que dos fracasaron (ambos en el Parque Natural, y uno también en el Refugio), y seis tuvieron éxito (cuatro en Segovia [uno en el Refugio], y dos en Soria), con un total de 20 pollos volados (dos nidos con 5 pollos, un nido con 4 pollos, un nido con 3 pollos, un nido con dos pollos, y un nido con un pollo). Cuatro nidos estaban en roca (dos con cinco pollos cada uno, y dos fracasados), dos en postes del tendido eléctrico (con cuatro y tres pollos respectivamente), uno en un chopo (con dos pollos), y uno en el interior de una nave (con un pollo). El único nido con éxito del Refugio (y del Parque, que sepamos) tuvo cinco pollos.

I.- Los nidos con éxito, observados por el autor, son los siguientes:

I.1.- Nido Nº VIII de Peña Rubia (cuadrícula 1; en el Refugio de Montejo). Es un nido nuevo. Está en roca, en el entrante 1º, debajo y a la izquierda del viejo nido Nº 2 del buitre leonado, a la derecha del nido Nº α del cernícalo.

Encontré el nido el 12 de mayo. Fue descubierto también, de forma independiente, por Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio. El 5 de junio, vi **cinco pollos** en el nido. El 6 de junio, vi un cuervo adulto, y pollos.

I.2.--- Nido Nº I de la chopera cerca de Myta (cuadrícula 4; fuera de la IBA). Está en un chopo negro. El 16 de abril, vi que había un cuervo adulto echado en el nido. El 11 de junio, vi **dos pollos** en el nido, donde al parecer no había más.

Es el viejo nido Nº α del **cernícalo**. Sobre lo sucedido aquí en años anteriores, véase lo indicado más adelante, en el caso 21 de la alternancia de nidos.

I.3.--- Nido Nº III del barranco de la Retuerta (cuadrícula 4; fuera de la IBA). El 4 de junio, vi **cinco pollos** en el nido.

Es el viejo nido Nº D del **alimoche**, y Nº φ del **cernícalo**. Sobre lo sucedido aquí en años anteriores, véase lo indicado más adelante, en el caso 23 de la alternancia de nidos.

I.4.--- Nido Nº I-G (cuadrícula VL56). Está en el interior de una amplia nave. Raúl Navas Sanz me informó de este nido, que era desconocido para nosotros. Siguiendo sus indicaciones, vi el nido el 13 de abril; había un cuervo adulto cerca. El 17 de mayo, vi de nuevo el nido, que tenía deyecciones debajo. El 20 de junio, vi **un pollo** en el nido; sólo había uno, ya crecido; vi también dos cuervos adultos cerca.

En esta cuadrícula, VL56, la reproducción del cuervo está considerada como "posible" en el "**Atlas de las Aves Reproductoras de España**" (Martí, R., y Del Moral, J. C. [eds.]; Dirección General de Conservación de la Naturaleza – Sociedad Española de Ornitología, Madrid, 2003, 733 pp.; pág. 554).

I.5.---- Nido Nº I de San Esteban de Gormaz (Soria, cuadrícula VM80). Está en un poste del tendido eléctrico. Fue descubierto y amablemente mostrado por Fermín Redondo Ramírez y Ángel Bocos García. En mayo, Fermín Redondo vio dos o tres pollos en el nido. El 17 de junio (con Fermín Redondo, Ángel Bocos, Cristian Calvo, y Antonio Romera) vimos dos pollos de cuervo en el nido. El día siguiente 18 de junio, vi **tres pollos** en el nido; y un cuervo adulto cerca.

En este nido salieron adelante dos pollos de cuervo en 2015 (véase la **Hoja Informativa Nº 46**, pág. 40).

I.6.---- Nido Nº I de la zona de Pedraja de San Esteban (Soria, cuadrícula VM80). Está en un poste del tendido eléctrico. Fue descubierto por Fermín Redondo Ramírez y Ángel Bocos García; quienes me lo mostraron amablemente, junto con Cristian Calvo Vergara y Antonio Romera Camarero, el 17 de junio; vimos al menos tres pollos. El día siguiente 18 de junio, vi **cuatro pollos** en el nido; al parecer, no había más.

Es un viejo nido de cuervo, que en 2017 fue utilizado con éxito primero por el cuervo (según comprobó Fermín Redondo Ramírez) y luego por el **alcotán** (que sacó adelante dos pollos; nido Nº S-P-2). (Véase la **Hoja Informativa Nº 49**, pág. 188).

II. Los nidos fracasados son los siguientes:

II.1.- Nido Nº II de El Reloj (cuadrícula 4; fuera del Refugio, pero dentro del Parque y por tanto de la ZEPA). En 2018, vi que el nido estaba ocupado por el cuervo los días 16 de abril, 17 de abril, 30 de abril (los dos cuervos atacaron gritando a un milano negro), 21 de mayo, y 24 de mayo. El 10 de junio, comprobé que el nido había fracasado, y vi un buitre leonado adulto junto a él.

Es el viejo nido Nº 3 del **buitre leonado**. Sobre lo sucedido aquí en años anteriores, véase lo indicado más adelante, en el caso 3 de la alternancia de nidos.

II.2.- Nido Nº III de Peña de la Zorra (cuadrícula 1; en el Refugio de Montejo). Es un nido nuevo. Está en roca, sobre la cornisa del viejo nido Nº 17 de buitres leonados.

El 9 de abril, Jesús Cobo Anula (biólogo conservador del Refugio, de WWF) descubrió el nido, que no había señalado una semana antes. Jesús Hernando Iglesias (guarda del Refugio, de WWF) también localizó el nido. El 18 de abril, vi el nido, que encontré de forma independiente, y que parecía vacío. El 6 de mayo, vi un cuervo que acudía al nido, y después permanecía echado en él. El 9 de junio, vi que el nido parecía vacío (posible fracaso). El 10 de junio, confirmé que el nido había fracasado.

III.- Otros territorios donde detecté bastante el cuervo en 2018, pero sin encontrar nido este año (al parecer, no lo ha habido, al menos no con éxito), son los siguientes:

III.1. Zona del viaducto. Vi la pareja de cuervos, y la oí bastante, el 17 de abril.

III. 2. Zona de El Corralón y Las Torcas´. Vi y oí la pareja de cuervos el 28 de mayo.

III.3. Zona de Peña Fueros y del 2º Cañón. Vi la pareja de cuervos el 20 de abril. Vi y oí bastante al cuervo el 5 de mayo.

III.4. Barranco de Valdecasuar. Vi y escuché un cuervo el 2 de mayo.

Y en zonas cercanas:

--- Adrada de Haza (El Torrejón; Burgos, cuadrícula VM30).
--- Yacimiento de Montejo de Tiermes (Soria, cuadrícula VL87).
--- Barranco de Los Callejones (Soria, cuadrícula VL87).
--- Nacimiento del río Aguisejo (Segovia, cuadrícula VL77-VL87).

Un resumen de los censos de 2018 aparece en:

--- Redondo Ramírez, F.; Navas Sanz, R.; y Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2019). **Cuervo grande *Corvus corax***. Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, Vol. 66(1), I-2019, pág. 253.

Sobre los cuervos registrados en los últimos censos de otoño, pueden verse los **informes finales** correspondientes.

Alternancia de nidos de cuervos y aves rapaces.- En el Refugio y su entorno, he comprobado los siguientes casos:

1) El nido Nº A-R, donde crió el **cuervo** en 1980 (vi un huevo y dos pollos el 18 de mayo); y donde el **alimoche** crió con éxito en los ocho años siguientes (1981-1988) (sacando dos pollos cada año, excepto en 1985 y 1987), y lo intentó también en 1990 (aunque sin éxito), 1991 y 1992 (en cada uno de esos dos años, llegó a volar un solo pollo, aunque nacieron dos), y de nuevo en 1993 (sin éxito, aunque nacieron dos pollos).
(Véase "*El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo*", págs. 167-168, apartado 3.13.4).

2) El nido Nº B-E.R., donde el **halcón** sacó tres pollos en 1978 (y quizás comenzó la cría en 1983, según las noticias recibidas); fue visitado por el **cernícalo** (¿intento fracasado de cría?; Nºα) en la primavera de 2000; y al parecer el **cuervo** construyó allí un nido (aunque no sacó pollos; posible intento fracasado de cría; Nº II) en 2009.

3) El nido Nº III-E.R., que vi el 20 de mayo de 2006 (nido ya vacío, posiblemente de cuervo, aunque no estoy seguro); donde el **cuervo** posiblemente intentó criar, en todo caso sin éxito, en 2007 y en 2010, y donde el cuervo crió con éxito (llegaron a volar tres pollos) en 2015. El nido fue utilizado con éxito por el **buitre leonado** (Nº 3-E.R.) en 2016; y de nuevo por el **cuervo**, sin éxito, en 2018.

4) El nido Nº A-P.D.D., donde crió el **halcón** peregrino en 1980 (casi seguro), 1981 (dos pollos), 1982 (¿dos pollos?), 1984 (tres pollos, que desaparecieron; véase la **Hoja Informativa Nº 13**, pág. 2), y 1992 (tres pollos, de los que uno era menor que los otros dos; los vi muy bien el 29 y el 30 de mayo). Es posible que en 2010 hubiera un intento fracasado de cría del **cuervo**, pues el 31 de mayo vi aquí un nido con palos, vacío, quizás de esta especie. En 2015, debió haber un intento fracasado de cría del cuervo (Nº I), pues a partir del 1 de junio vi aquí un nido hecho y vacío de la especie. En 2017, el nido fue ocupado

por el **buitre leonado** (Nº "7"-P.D.D.), y nació el pollo, que tenía unos 44-48 días el 30 de mayo, pero murió antes de poder volar (el 16 de julio, estaba muerto en el nido).

5) El nido Nº E-S.I., ocupado por el **alimoche** en 2003 (llegó a volar un solo pollo) y en 2004 (la reproducción fracasó); y donde el **cuervo** (Nº I-S.I.) crió en 2007 (vi al menos 2-3 pollos, al parecer tres, pero no es seguro que llegaran a volar).

6) El nido Nº I-E.C., donde el **alimoche** (Nº C-E.C.) crió con éxito en 1996 (un solo pollo), 1997 (dos pollos), 1998 (dos pollos), 1999 (un solo pollo), 2000 (dos pollos), y 2001 (un solo pollo, bastante tardío); y donde el **cuervo** (Nº I-E.C.) crió con éxito en 2006 (cuatro pollos) y en 2016 (tres pollos).

7) El nido Nº I-L.R., donde llegaron a volar tres pollos de **cuervo** en 1988; y donde el **buitre leonado** (Nº 3-L.R.) crió con éxito en 1978, 1979, 1980, 1981, 1989, 1990, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 y 2007 (en 22 años, cuatro anteriores [consecutivos] y dieciocho posteriores a la utilización del nido por el cuervo, con un máximo de quince años consecutivos; si bien es preciso hacer notar que en los dos últimos años -2006 y 2007- el pollo apareció muerto en su nido antes de poder volar –en 2006, entre el 3 de junio y el 18 de julio; y en 2007, entre el 6 de junio y el 24 de julio-). La alternancia ha sido pues del tipo *Buitre – Cuervo – Buitre.*

8) El caso más sorprendente se refiere a 1989: el cuervo crió con éxito tres pollos en un nido (Nº II-L.R.) situado en la misma oquedad que un nido de **buitre leonado** (Nº 5-L.R.), en el que también salió adelante el pollo. Pueden verse más detalles en mi nota "**Common Ravens nesting beside Griffon Vultures**", publicada en "*British Birds*" (Vol. 87, Nº 1, enero de 1994, pág. 42). En 2012, los cuervos sacaron adelante tres pollos en este nido, a menos de un metro de un intento fracasado de cría del buitre leonado, como se indicó en la **Hoja Informativa Nº 38** (pág. 110). En este nido Nº 5-L.R., el **buitre leonado** crió con éxito en 1974/75 (filmado el pollo por el equipo de "*El Hombre y la Tierra*"), 1981, 1989, 1993, 2000, 2001, 2004, 2005, 2009, y 2014. En 2016, los **cuervos** sacaron adelante seis pollos en un nido (Nº II´-L.R.) situado en el mismo viejo nido Nº 5-L.R. del buitre leonado.

9) El nido Nº III-L.R., donde el **cuervo** intentó criar sin éxito en 1998 (comprobado por Félix Martínez y por el autor); y donde el **alimoche** (Nº C-L.R.) intentó criar sin éxito en 2003, y sacó adelante un único pollo en 2004.

10) El nido Nº B-P.F., donde el **alimoche** sacó adelante un solo pollo en 1984 y en 1993; el **cuervo** había criado allí (Nº I-P.F.) al menos en 1978, aunque ignoro el número de pollos que volaron; casi con seguridad también crió en 1990 (creí ver al menos 2-3 pollos de cuervo en el nido, el 9 de junio), y crió con éxito en 2016 (al menos tres pollos).

(Puede anotarse aquí la sorprendente observación realizada por Rosa Rodríguez Manzano en 1993: El 15 de mayo, un cuervo se introdujo en la cueva de este nido -9´45-).

11) El nido Nº II-P.Z., donde el **cuervo** crió con éxito en 2015 (salieron adelante tres pollos). En este nido, el **halcón peregrino** crió (Nº A-P.Z.) al menos en 1981 (salieron adelante tres pollos, según Felipe Javier Samino Arellano y otros), en 1982 (salieron dos pollos, según Felipe Javier Samino), en 1983 (llegó a volar como mínimo un pollo, según Mario Morales Villarroel y otros), y en 1990 (llegaron a volar dos pollos, macho y hembra). El mismo nido fue ocupado por el **alimoche** (Nº I-P.Z.) en 1997 (la reproducción fracasó; se trataba de una reposición, según Jesús Hernando Iglesias), 2000 (salió adelante un único pollo), 2001 (la reproducción fracasó), 2002 (la reproducción fracasó, aunque nació un pollo), y 2003 (la reproducción fracasó). Por tanto, la alternancia ha sido del tipo *Halcón –Alimoche –Cuervo.*

12) El nido Nº C-P.Z., donde el **alimoche** sacó dos pollos en 1983; y donde posiblemente había criado el **cuervo** (Nº I-P.Z.) en 1978.

13) El nido Nº I-P.P., donde el **cuervo** crió en 1985 y en 1986, y de nuevo en 2001 (en este año salieron adelante tres pollos), y en 2016 (cuatro pollos); y donde el **alimoche** (Nº M-P.P.) crió con éxito en 1995 (un único pollo), y de nuevo en 2004 (un solo pollo), en 2005 (un solo pollo), y en 2008 (también un solo pollo); e intentó criar, sin éxito, en 2011 (aunque debió nacer algún pollo, según Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio). La alternancia ha sido pues del tipo *Cuervo – Alimoche – Cuervo – Alimoche.*

14) El nido Nº D-P.R., donde el **alimoche** (Nº D-P.R.) crió con éxito en 1982 (salió adelante un solo pollo), en 1984 (un solo pollo), y en 1997 (dos pollos); y crió sin éxito en 2000 (año en que fracasó la reproducción). En el mismo nido, el **cuervo** (Nº II-P.R.) crió en 1983 (salieron adelante al parecer tres pollos, según comunicaron José Velasco, Mario Morales y Hoticiano Hernando), en 1987 (desconozco cuántos pollos salieron ese año), en 1988 (vi al menos tres pollos en el nido el 29 de mayo, pero Hoticiano Hernando comunica que volaron cuatro pollos el 2 de junio; Jesús Hernando también vio cuatro pollos), y en 1990 (vi al menos unos dos o tres pollos, pero Jesús Hernando y José Luis López-Pozuelo vieron cuatro pollos). En el mismo nido, el **halcón** (Nº C-P.R.) crió en 1993 (llegaron a volar dos pollos). (Véase "***El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo***", pág. 167, apartado 3.13.3, caso A-2). Por tanto, la alternancia ha sido del tipo *Alimoche – Cuervo – Alimoche – Cuervo – Halcón – Alimoche*.

15) El nido Nº VII-P.R., donde el **cuervo** intentó criar sin éxito en 2017. En el mismo sitio, el **buitre leonado** (Nº 46-P.R.) crió con éxito en 2005.

16) El nido Nº A-C., donde el **halcón** crió con éxito en 1978, 1979, ¿1980?, ¿1981?, ¿1982?, 1983 (tres pollos), 1984 (al menos un pollo), 1986 (dos pollos), 1987 (tres pollos), y 2000 (tres pollos) (las cifras se refieren a los pollos que llegaron a volar). En el mismo nido, el **alimoche** (Nº H-C.) al parecer intentó criar (sin éxito) en 1988, según constataron Jesús Hernando (quien vio la ceba de un solo pollo el 2 de julio), Hoticiano Hernando y otros; el nido estaba vacío, aunque con palos y lana, el 18 de julio. En el mismo nido, el **cuervo** (Nº I-C.) crió con éxito en 1996 (salió adelante al menos un pollo, o quizá dos). (Véanse "***El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo***", pág. 167, apartado 3.13.3, caso B-1; y la **Hoja Informativa Nº 25**, pág. 87). Por tanto, la alternancia ha sido del tipo *Halcón – Alimoche (frac.) – Cuervo – Halcón*; si bien resulta curioso el largo intervalo de tiempo transcurrido (trece años) entre las dos últimas reproducciones del halcón.

17) El nido Nº B-C., donde el **halcón** crió con éxito en 1985 (llegaron a volar dos pollos). En la oquedad había palos que indicaban que había sido un antiguo nido de **cuervo**, aunque no sabemos cuándo.

18) El nido Nº B-P., donde el **halcón** crió en 1991 (llegaron a volar tres pollos), 1992 (llegaron a volar al menos dos pollos), 1993 (llegaron a volar cuatro pollos), 1994 (la reproducción fracasó; aunque nacieron al menos dos pollos, según comprobó José Luis López-Pozuelo García), ¿1995? (no hubo reproducción con éxito, y no sabemos si la pareja llegó a realizar la puesta; aunque el nido estuvo ocupado algún tiempo, según las detalladas observaciones magistralmente descritas por José Antonio Vernia Peris en sus informes), 1996 (la reproducción fracasó; aunque había comenzado, según las muchas observaciones realizadas por José Antonio Vernia, José Luis López-Pozuelo, Juan Luis Galindo, Marcos Gálvez, Javier Vitores, Consuelo Bellella, y Daniel Magenat), 2000 (llegaron a volar dos pollos), 2001 (llegaron a volar tres pollos), 2002 (no hubo reproducción con éxito; aunque el nido estuvo ocupado, según Javier Vitores y Consuelo Bellella), 2008 (sin éxito, aunque el nido estuvo ocupado, según comprobaron José Luis López-Pozuelo García y Fidel José Fernández), 2009 (sin éxito, aunque el nido estuvo ocupado, según comprobaron José Luis López-Pozuelo García y Fidel José Fernández), 2010 (llegaron a volar dos pollos), 2011 (llegaron a volar dos pollos), y 2012 (llegaron a nacer tres pollos, según comprobó Jesús Hernando Iglesias, pero desaparecieron). El mismo nido, en 2002, y después del intento fracasado del halcón, fue ocupado por el **cuervo** (Nº II-P.), aunque la reproducción del cuervo al parecer también fracasó. El nido, en 2012, y después del intento fracasado del halcón, fue ocupado por la **grajilla**, aunque es posible que la reproducción de la grajilla fracasara también. En 2018, el nido fue ocupado por el **alimoche** (Nº G-P.) pero la reproducción fracasó.

Nótese el intento fracasado de cría del cuervo en 2001, y de la grajilla en 2012, en el mismo año en que había fracasado antes un intento de cría del halcón.

Llaman la atención los cuatro pollos de halcón que llegaron a volar en 1993. Sólo conocemos otro caso de un nido de halcón con cuatro pollos (que también llegaron a volar) en el Refugio (el nido Nº B-P.Z., en 1994; véanse las **Hojas Informativas Nº 21**, pág. 2, y **Nº 22**, pág. 26).

19) El nido Nº C-P., que fue ocupado por el **halcón** en 1997 (la reproducción fracasó; aunque nacieron uno o dos pollos al menos, según constató José Antonio Vernia Peris). En el mismo nido, el **cuervo** (Nº I-P.) crió con éxito en 1991 (llegaron a volar al menos cuatro o cinco pollos, quizás incluso seis), 1992 (salió adelante al menos un pollo), 1993 (salieron adelante dos pollos, y al parecer sólo dos), 1994 (salieron adelante tres pollos), 1995 (salieron adelante al menos cuatro o cinco pollos, seguramente cinco al menos), 1996 (llegaron a volar cinco pollos), 1999 (salieron adelante cinco pollos), y 2009 (salieron adelante tres pollos); y sin éxito, tal vez en 2000 (según Juan Luis Galindo Estévez), en 2001 (aunque nacieron al menos dos pollos, y probablemente más, según José Luis López-Pozuelo). En el mismo nido,

el **buitre leonado** intentó criar sin éxito en 2010, y lo consiguió (Nº 39-P.) en 2018. Por tanto, la alternancia ha sido del tipo *Cuervo – Halcón (frac.) – Cuervo – Buitre*.

[En el libro sobre "**El halcón peregrino**" (ed. Diputación Foral de Vizcaya; Bilbao, 2002, 291 pp.), de Iñigo Zuberogoitia y otros, se indica (pág. 125): "*En cinco casos comprobamos que los halcones estaban anidando en viejos nidos de cuervo, en lugares en que la disponibilidad de huecos es escasa. En una ocasión observamos una triple alternancia, cuervo – halcón – cuervo.* "].

20) El nido Nº A-L.P., donde el **alimoche** al parecer intentó criar sin éxito en 1986, consiguió sacar dos pollos en 1988, e intentó criar sin éxito en 1997. Aunque parece que fue quemado en 1990/91 (se encuentra en una zona próxima), fue usado por el **cuervo** (Nº I-L.P.) en 1993 (salieron adelante al menos dos pollos, y creo que no más) y en 1999 (cuatro pollos). La alternancia ha sido pues del tipo *Alimoche – Cuervo – Alimoche (frac.) – Cuervo.*

21) El nido Nº I-Ch.M., en un chopo negro, donde el **cernícalo** sacó adelante tres pollos en 2012; y donde el **cuervo** crió con éxito dos pollos en 2016, cuatro pollos en 2017, y dos pollos en 2018.

22) El nido Nº A-B.R., donde el **halcón** crió con éxito en 1988 (dos pollos); y el **cuervo** (Nº II-B.R.) crió con éxito en 1992 (cuatro pollos). En el mismo nido, el **alimoche** (Nº A-B.R.) crió en los quince años comprendidos entre 1994 y 2008 (ambos inclusive); sacó adelante un solo pollo en siete de estos años (1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2002, y 2008), ninguno en 1997 (la reproducción fracasó), y dos pollos en cada uno de los siete años restantes (2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, y 2007). Por tanto, la alternancia ha sido del tipo *Halcón – Cuervo – Alimoche*.

23) El nido Nº III-B.R., donde el **cuervo** crió con éxito en 1994 (al menos tres o cuatro pollos), 1995 (cuatro pollos), 1996 (al menos tres pollos), 1998 (al menos tres pollos), 1999 (dos pollos, aunque uno de ellos murió; véase la **Hoja Informativa Nº 24**, pág. 73), 2002 (al menos tres pollos), 2016 (tres pollos, aunque uno de ellos murió; véase la **Hoja Informativa Nº 46**, pág. 40), 2017 (dos pollos, véase la **Hoja Informativa Nº 48**, págs. 50-51), y 2018 (cinco pollos, como antes se indicó). Fue utilizado por el **cernícalo vulgar** (Nº φ) en 2010 (cuatro pollos), y por el **alimoche** (Nº D) en 2013 (un solo pollo).

24) El nido Nº VI-B.R, que quizás fue utilizado por el **cuervo**, en todo caso sin éxito, en 2008; y donde el cuervo sacó adelante tres pollos en 2015. En este nido el **buitre leonado** (Nº 2-B.R.) crió con éxito sólo en 2009, 2011, 2016, 2017, y 2018; y lo intentó sin éxito en 1989 (según Miguel Ángel Carro Martínez), y posiblemente también (sin éxito) en 1991, 1999, y 2010. Por tanto, la alternancia ha sido del tipo *Buitre (frac.) –¿Cuervo? (frac.) – Buitre – Cuervo – Buitre.*

25) El nido Nº VII-B.R., construido por el **cuervo** en 2011 (citado en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 109), aunque la reproducción del cuervo no tuvo éxito. Fue usado por el **alimoche** (Nº F-B.R.) en 2018, aunque también sin éxito.

26) El nido Nº I-P.Á., donde el **cuervo** crió con éxito en 1986 (vi que había dos huevos el 11 de mayo, y un solo pollo el 9 de junio). Apareció tapado con piedras en 1987 (el 7 de mayo). Sin embargo, el **águila real** aportó material al nido (Nº 11-Á.R.), al parecer, en 2003, aunque la reproducción no tuvo éxito. Vi un águila real adulta, posiblemente hembra, posada junto al nido vacío, el 3 de mayo de 2003. Además, el 5 de mayo de 2004, con lluvia, vi un águila real adulta en el nido; el nido parecía vacío el 19 de mayo, y comprobé que estaba vacío el 21 de mayo del mismo año 2004 (aunque había plumones y deyecciones, plumas de perdiz, y cerca pelo de conejo).

27) El nido Nº II-C.R., en un chopo, donde el **cuervo** crió con éxito en 2002 (dos pollos), y de nuevo en 2006 (cinco pollos) y en 2016 (cuatro pollos); y donde el **cernícalo** crió con éxito en 2005 (dos pollos), y de nuevo en 2008 (tres pollos). El **águila calzada** (Nº 37) anidó allí en 2012, aunque la reproducción fracasó; y en 2014, año en que sacó adelante dos pollos (ambos, de fase clara). La alternancia es pues del tipo *Cuervo – Cernícalo – Cuervo – Cernícalo – Águila calzada – Cuervo.*

28) El nido Nº I-Pa., en árbol (en una gran encina), donde los **cuervos** sacaron adelante cuatro pollos en 2005 (véase la **Hoja Informativa Nº 30**, pág. 63), y tres pollos en 2007 (véase la **Hoja Informativa Nº 32**, pág. 64). Fue ocupado por el **cernícalo** en 2008, aunque la reproducción fracasó (el 14 de junio, vi un cernícalo vulgar echado en el nido, y otro cernícalo que volaba gritando; el 6 de julio, el nido estaba vacío, y la pareja de cernícalos volaba gritando).

29) El nido Nº I-V´, en roca, en la provincia de Soria (cuadrícula 4), donde los **cuervos** sacaron adelante dos pollos en 2013, como se indicó en la **Hoja Informativa Nº 40** (pág. 132). Lo descubrí el 15 de agosto de 2011, vacío aunque con algunas deyecciones, y comprobé que estaba vacío los días 10 y 11 de junio de 2012. Según el pastor Antonio Casado Iglesias, se trata de un antiguo nido de **alimoches**; tal vez sea el mismo nido en el que Félix Martínez Olivas y colaboradores anillaron un pollo de alimoche el 17 de julio de 1984.

S/n) Puede añadirse que el 9 de junio de 2008 vi, en el viejo nido Nº Y-B.R. de buitre leonado (donde nunca se ha logrado la reproducción con éxito del buitre), un nido hecho y con palos, vacío, que parecía de cuervo.

S/n) Puede añadirse que, en el nido Nº X-B.R., usado posiblemente por el **búho real** en 2010 (véase la **Hoja Informativa Nº 35**, pág. 390), vi en 2012 (el 4 de junio) palos nuevos traídos posiblemente por el cuervo (o por el alimoche), aunque ese año 2012 la reproducción no tuvo éxito. El nido fue utilizado con éxito por el **alimoche** (Nº E-B.R.) ¿en 2015 (un pollo)?, en 2016 (llegaron a volar dos pollos), y en 2018 (un pollo).

S/n) Puede añadirse, en Peñalba, un viejo nido de **cuervo**, que fue ocupado con éxito por el **alimoche** (Nº C-P.) en 1997 (dos pollos), 1999 (dos pollos), 2000 (un solo pollo), y 2001 (dos pollos). En el mismo nido, el **buitre leonado** (Nº 10-P.) crió con éxito en 2002, 2006, 2008, y 2009; y sin éxito, aunque con pollo nacido, en 2010 (el pollo fue visto por Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF, aunque la reproducción fracasó), en 2013 (vi el pollo vivo hasta el 1 de julio, día en que aún no volaba, y el 23 de julio vi el pollo muerto en el nido); y sin éxito, en 2014 (véase la **Hoja Informativa Nº 43**, pág. 123, caso 10), y en 2016 (véase la **Hoja Informativa Nº 47**, pág. 112, caso 23).

S/n) En una zona próxima, la buitrera I de Langa de Duero (Soria), el **buitre leonado** crió con éxito (nido Nº 13), en 2018, en un viejo nido de **cuervo**.

Nótese que, de los 29 casos anteriores de alternancia de nidos usados alguna vez por el **cuervo**, en las hoces del Riaza e inmediaciones, las otras especies que intervienen son el **alimoche** (en 16 nidos, a los que se podrían añadir los dos últimos casos S/n), el **halcón** (en nueve nidos, cuatro de los cuales fueron ocupados también algún año por el alimoche), el **buitre leonado** (en siete nidos), el **cernícalo vulgar** (en cinco nidos, tres de ellos en árbol), el **águila real** (en un nido), el **águila calzada** (en un nido, en árbol), y posiblemente el **búho real** (en un nido).

Pueden añadirse, en zonas cercanas, los intentos de cría del cuervo, registrados por José Manuel Boy Carmona, en el viejo nido Nº 33 de **águila calzada** (véase la **Hoja Informativa Nº 40**, pág. 133, así como lo anotado [en la **Hoja Informativa Nº 46**] en el capítulo sobre el **ratonero**, que crió en 2015 allí [dos pollos]), o en el nido Nº XXI de **ratonero** (que anidó allí en 2014, y sacó dos pollos allí en 2017 [véase lo anotado en la **Hoja Informativa Nº 43**, pág. 161]; mientras el **milano negro** crió en 2015 un pollo allí [véase lo anotado en la **Hoja Informativa Nº 45**, pág. 44]), o en el nido Nº XI del **milano negro** (que sacó adelante al menos un pollo en 2012 –véase la **Hoja Informativa Nº 39**, pág. 82, y posiblemente dos o tres en 2016 –véase el capítulo sobre esta especie-).

Además, ya en la provincia de Soria, Fermín Redondo Ramírez comprobó que el nido Nº S-Pe de **águila calzada** (donde nacieron dos pollos pero sólo voló uno en 2016; véase el capítulo correspondiente a esta especie) había sido antes un nido de cuervo, donde salieron adelante tres o cuatro pollos de esta especie en un año anterior. En este mismo nido, el **ratonero** sacó adelante tres pollos en 2017 (véase la **Hoja Informativa Nº 49**, pág. 162), y un solo pollo en 2018 (véase la **Hoja Informativa Nº 51**).

Además, ha habido casos de nidos muy próximos de cuervo y de aves rapaces, utilizados simultáneamente con éxito en la cría. Por ejemplo, el del los nidos Nº B-P. de **alimoche** y Nº I-P. de cuervo (a unos ¿2-3 m.?), en 1991 (el alimoche sacó un pollo; y el cuervo, al menos cuatro y posiblemente cinco), en 1992 (el alimoche sacó un pollo, y el cuervo al menos uno), y "casi" en 1993 (la reproducción del alimoche fracasó, pero el cuervo sacó adelante dos pollos y creo que no más), 1994 (la reproducción del alimoche fracasó, pero el cuervo sacó adelante tres pollos), 1995 (la reproducción del alimoche fracasó, pero el cuervo sacó adelante al menos cuatro o cinco pollos –seguramente al menos

cinco-), y 1996 (la reproducción del alimoche fracasó, pero el cuervo sacó adelante cinco pollos). (Véase "*El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo*", apartados 3.6.2.1, 3.8.4, y 3.13.4.B). En 1999, el **buitre leonado** fracasó en la cría en el próximo nido Nº 12 (comprobado por José Luis López-Pozuelo, Javier Vitores, Consuelo Bellella, José Antonio Vernia, y el autor), pero el cuervo sacó cinco pollos en el citado nido Nº I-P. Pueden añadirse los casos de los nidos Nº C-P.F. de **alimoche** y Nº III-P.F. de cuervo (¿a menos de 10 m. uno de otro?) en 1998 (el alimoche sacó adelante un pollo, y el cuervo cuatro); Nº A-L.R. de **alimoche** y Nº I-L.R. de cuervo (a unos ¿7-8 m.?) en 1988 (el alimoche sacó dos pollos, y el cuervo tres, cerca también de dos nidos –Nº 2 y Nº 7- de **buitre leonado**); Nº 43-P.R. de **buitre leonado** y Nº III-P.R. de cuervo en 1989 (el cuervo sacó tres pollos y el buitre fracasó, aunque debió nacer el pollo); Nº A-P.R. de **alimoche** y Nº V-P.R. de cuervo (como a un metro de distancia) en 1994 (el alimoche fracasó, debido al cuervo según constató el guarda Jesús Hernando, pero el cuervo sacó cinco pollos; véase "***El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo***", apartado 3.8.4, págs. 159-160); y Nº C-B.R. de **alimoche** y Nº I-B.R. de cuervo en 2014 (el alimoche fracasó, aunque llegó a nacer un pollo, pero el cuervo sacó dos pollos), etc.

Otro caso curioso es el de los nidos Nº B-B.R. de **cernícalo** y Nº VI-B.R. de cuervo (a muy pocos metros unos de otro), en 2006 (tanto el cuervo como el cernícalo sacaron adelante cuatro pollos, aunque uno de los pollos de cuervo murió antes de poder volar). Estos casos a menudo van acompañados de frecuentes agresiones entre las especies implicadas. Es interesante hacer notar que el cernícalo se reprodujo más tarde; este tipo de **separación temporal** (en la misma temporada de cría) ya había ocurrido otras veces (con cierto solapamiento o sin él), en peñas aisladas (pimero cuervo y después cernícalo, o primero halcón y luego cuervo, o primero halcón y más tarde cernícalo). Se podrían poner más ejemplos: los nidos Nº B-B.R. de **cernícalo** y Nº III-B.R. de cuervo en 1994 (el cuervo sacó al menos tres pollos y quizás cuatro o más, y el cernícalo tuvo al menos dos pollos), 1996 (el cuervo sacó adelante al menos tres pollos, y el cernícalo al menos tres pollos) y 1998 (el cuervo sacó adelante al menos tres pollos, y el cernícalo al menos uno), los nidos Nº B-B.R. de cernícalo y Nº V-B.R. de cuervo en 2007 (el cuervo sacó adelante tres pollos, y el cernícalo cuatro, aunque este año pude ver los siete pollos en la misma visita [el 11 de junio; los tres pollos de cuervo aún no volaban y los cuatro de cernícalo empezaban a emplumar]), etc.

Sobre nidos en árboles, tenemos el caso de los nidos Nº I-C.R. de cuervo y Nº II-C.R. (Nº β) de **cernícalo**, situados en dos chopos muy próximos y utilizados simultáneamente en 2008. Como antes se indicó, el cuervo sacó adelante un solo pollo y el cernícalo tres (y no más), aunque estos últimos debieron nacer y llegaron a volar mucho más tarde que el pollo del cuervo, ofreciendo así un nuevo ejemplo de **segregación temporal** (aunque con un cierto solapamiento) entre ambas especies y en la misma temporada de cría.

El caso más sorprendente se refiere a 1989, como antes se indicó (caso 8 de la alternancia de nidos).

Nota.- Una foto de dos nidos muy próximos, uno de cuervo y otro de **halcón**, en el Jura, en 2007, obtenida por S. Beuchat, fue publicada en el Nº 55 (2) de la veterana revista científica suiza "*Nos Oiseaux*" (2008, pág. 109). Un artículo anterior sobre el tema, de Claude Beuchat, apareció en el Nº 51 de "*Nos Oiseaux*" (2004, pág. 122; "**Nidification de proximité entre le Faucon pèlerin *Falco peregrinus* et le Grand Corbeau *Corvus corax***").

En el "Noticiario Ornitológico" de "**Ardeola**" (Vol. 57 [2], diciembre de 2010, pág. 522), se publica un caso de "*nidificación en un mismo alcornoque de **cigüeña negra** y cuervo, separados a escasa distancia y con tres pollos en cada nido, en las cercanías de la sierra de Halconera, Badajoz, el 15 de junio de 2010 (H. Gómez-Tejedor)*".

Nuevas grandes concentraciones.- En años anteriores: Véanse los datos reseñados en las **Hojas Informativas Nº 24** (pág. 73), **Nº 30** (págs. 66-67), **Nº 32** (págs. 98-99), **Nº 34** (págs 120-122), **Nº 36** (págs. 114-115), **Nº 38** (págs. 116-119), **Nº 40** (pág. 139), **Nº 42** (pág. 47), **Nº 46** (pág. 46), y **Nº 48** (pág. 57). Véase también lo indicado al respecto en el artículo del autor "***Sobre las aves carroñeras del Refugio de Rapaces de Montejo***", publicado en las "*Actas del II Congreso Internacional sobre Aves Carroñeras*" (Aedenat-Coda-Grefa; Cañizares – Solán de Cabras, Cuenca, 1997; publicado en 2000, 195 pp.; pág. 74, en págs. 69-78).

Sobre agrupaciones de cuervos en el comienzo de 2018, véase la **Hoja Informativa Nº 48**, pág. 57. Y sobre las concentraciones registradas en el **censo de otoño** del mismo año, véase el **Informe final** correspondiciente, págs. 79-82.

En el Refugio o junto al mismo, fuera de la zona del comedero de buitres, y en el comienzo de 2019, destacan:
--- El 13 de marzo de 2019, a las 18 h. 0 m., 9 cuervos, cerca de la zona de El Carrascal. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Datos nuevos en el comedero de buitres de Campo de San Pedro, y en otros comederos de la comarca: Entre 2008, y los primeros meses de 2019, puede verse un resumen de los datos en las **Hojas Informativas Nº 33** (Anexo I, págs. 366-368), **Nº 34** (Anexo I, págs. 287-295), **Nº 35** (Anexo I, págs. 448-454), **Nº 36** (Anexo I, págs. 243-251), **Nº 38** (Anexo I, págs. 278-284), **Nº 40** (Anexo I, págs. 354-357), **Nº 42** (Anexo I, págs. 149-151), **Nº 44** (Anexo I, págs. 135-136), **Nº 46** (Anexo I, págs. 140-146), y **Nº 48** (Anexo I, págs. 145-151). Pueden verse datos posteriores en el Anexo I de la presente Hoja Informativa.

Las mayores agrupaciones de las que tenemos noticias en la zona son de **290** cuervos, en una chopera cercana al comedero de Campo, el sábado 21 de enero de 2012 (Juan Luis Galindo Estévez, para el censo de dormideros de milano real en la provincia de Segovia, coordinado por Esteban Casaux Rivas), y de **aproximadamente 200** cuervos, cerca del comedero de Campo de San Pedro, el 10 de diciembre de 2005 (Jorge Andrés Remacha Lorenzo).

El siguiente número más alto registrado en la zona, que sepamos, corresponde a **162** cuervos como mínimo, con 96 milanos reales y unas 300 grajillas, el 30 de diciembre de 2013, en el dormidero de milanos de Campo de San Pedro. (Juan Luis Galindo Estévez).

Los totales de **103** cuervos en el comedero de Campo el 22 de enero de 2011 (Juan Luis Galindo Estévez), y de **unos 100** cuervos cerca del mismo comedero el 12 de noviembre de 2005 (Fernando Alarcón García, Manuel López Lázaro y Luis Miguel Romero González), representan los siguientes records que conocemos para la comarca; junto con un total de **84** cuervos en el comedero de buitres de Campo de San Pedro, señalado por Guillermo Doval y Javier Marchamalo el 27 de marzo de 2003 (citado en la **Hoja Informativa Nº 28**). Pueden verse datos sobre las mayores agrupaciones de años anteriores en las **Hojas Informativas Nº 24** (pág. 73), **Nº 26** (pág. 76), **Nº 28** (pág. 60), **Nº 34** (págs. 120-122), **Nº 36** (pág. 115), **Nº 38** (pág. 118), **Nº 40** (pág. 139), **Nº 42** (pág. 47), y **Nº 44** (pág. 46).

El récord que conocemos, para el cuervo en el comedero del Refugio de Montejo, es de **más de 70** cuervos el 23 de febrero de 2018 (a las 13 h. 47 m.; Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias, de WWF); seguido por unos **40-50** cuervos el 8 de febrero de 2018 (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF); por al menos **34** cuervos el 15 de noviembre de 2016 (Raúl González Rodríguez, Paqui Molina Navarro, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo), y **unos 30-40** cuervos o más el 22 de febrero de 2019 (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el Refugio).

Destacaremos también, en el Refugio y en 2018, un agrupación de **70** cuervos (el 11 de noviembre, a las 8 h. 58 m., en V.A.D.; Juan Prieto Martín y Alejandro Quecedo del Val).

El récord que conocemos, para el cuervo en el comedero de Maderuelo, es de **más de 30** cuervos el 26 de noviembrede 2017 (Juan Luis Galindo Estévez); seguido por **25** cuervos (en vuelo) el 13 de diciembre de 2015 (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo); y **22** cuervos el 10 de noviembre de 2018. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

El récord que conocemos, para el cuervo en el comedero de Ayllón, es de **10** cuervos el 15 de noviembre de 2017 (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

En 2018, destacan:

--- En el comedero de Maderuelo, **22** cuervos el 10 de noviembre. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- En el comedero de Campo de San Pedro, **16** cuervos el 15 de noviembre. (José Liarte de Blas y Ricardo Ramos Sánchez).

---- ---- ---- ---- ----

Ataques aéreos.- Después de la aparición de la **Hoja Informativa Nº 46**, y en el área de estudio, se han registrado ataques del cuervo a distintas aves (rapaces o córvidos o roqueros); como el buitre leonado, el alimoche, el águila calzada, el milano negro, el búho real, y el roquero solitario. También ha habido agresiones del alimoche, del halcón peregrino, del cernícalo, de la chova piquirroja, y del rabilargo, al cuervo. (Véanse los apartados correspondientes a las especies citadas).

Destacaremos la siguiente observación:

--- El 26 de mayo de 2018, a las 14 h. 2 m., un cuervo ataca repetidas veces a un buitre leonado posado en el nido Nº 28 de El Campanario (nido sin pollo de buitre). El cuervo llega a tocar al buitre, posándose o casi en su dorso. A la tercera vez, le hace salir volando y lo acosa mucho en vuelo, llegado a posarse (o casi) sobre su dorso, también en vuelo (creo que lo toca). ¿Para qué? (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Notas.- 1) Nuevas observaciones, realizadas por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, de cuervos comiendo un pollo de buitre muerto en su nido.-

--- El 22 de mayo de 2018, a las 11 h. 35 m., vi un cuervo que acudía al nido de buitre leonado Nº "44" de La Catedral (S.D.), y comía del pollo muerto del buitre. A las 11 h. 40 m., el cuervo seguía comiendo del pollo muerto del buitre. A las 11 h. 42 m., se fue el cuervo, después de haber estado comiendo durante siete minutos. A las 11 h. 47 m., vi que el cuervo estaba otra vez junto al nido, y comió nuevamente del pollo muerto del buitre. El mismo día, vi también un buitre adulto cerca.
En este nido había visto el pollo vivo del buitre el día anterior, 21 de mayo, al anochecer, junto a un buitre adulto; el pollo no era grande, estaba emplumado sólo en parte, tenía aún partes blancas.
Los días 22 y 30 de mayo, vi de nuevo el nido vacío.
En este nido, José Luis López-Pozuelo García había visto, el 31 de enero, un buitre junto al nido reconstruido; el 28 de febrero, un buitre adulto echado; el 21 de marzo, un buitre adulto echado; y el 25 de abril, un buitre adulto erguido.

--- El 28 de mayo de 2018, a partir de las 13 h. 54 m., en el nido de buitre leonado Nº 34 de Peña Rubia, un cuervo come lo que parece ser el pollo muerto del buitre. A las 13 h. 56 m., veo marcharse al cuervo. A las 14 h. 1 m., el cuervo está de nuevo comiendo allí, donde se ve algo rojo. A las 14 h. 19 m., el cuervo está otra vez comiendo allí. Y sigue.
En este nido, había visto el pollo vivo del buitre los días 12 y 13 de mayo (con las alas ya emplumadas pero no grande, junto a un buitre adulto), y 21 de mayo (cerca de un buitre adulto).

--- El 6 de mayo de 2018, a las 15 h. 53 m., en el nido de buitre leonado Nº "34" de Peña de la Zorra, veo dos alimoches adultos que comen del pollo muerto del buitre. A las 16 h. 5 m., hay un cuervo allí, donde está al menos 15 minutos y le veo salir volando a las 16 h. 20 m. A las 16 h. 25 m., de nuevo hay un cuervo comiendo allí. A las 16 h. 42 m., en lugar del cuervo, están otra vez los dos alimoches adultos.
En este nido había visto, el 20 de abril, un buitre adulto con un pollo blanco de unos 42 días; el 28 de abril, un buitre adulto con el pollo; el 2 de mayo, un buitre adulto con el pollo (con el dorso blanco). El 5 de mayo, no vi ningún buitre adulto, y me pareció que el pollo de buitre estaba muerto, lo que confirmé el día siguiente.

--- El 6 de junio de 2018, a las 19 h. 3 m, en el nido de buitre leonado Nº 14 de Peña Rubia, vi un alimoche adulto, no anillado, comiendo de los restos del pollo muerto del buitre. A las 19 h. 17 m., el alimoche voló. A las 20 h. 14 m., vi un cuervo posado junto a esos restos.
En este nido había visto el pollo vivo del buitre los días 12 y 13 de mayo (ya emplumado, con jirones blancos, junto a un buitre adulto en ambos días), y 21 de mayo (cerca de un buitre adulto). El 29 de mayo, vi un buitre adulto cerca. El 5 de junio, vi que el nido estaba vacío. (Pocos días antes, hacia el 1 de junio, Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, había visto un cuervo comiendo restos del pollo muerto del buitre, en el nido).

Un caso distinto es el siguiente:

--- El 23 de mayo de 2018, a las 18 h. 33 m., en La Catedral (S.D.), dos chovas acosan volando a un cuervo volando y posado. El cuervo ronda el nido Nº 39 de buitre leonado, en el que hay un buitre adulto y un pollo blanco de quizás unos 20 días; el cuervo llega a posarse cerca. A las 19 h. 10 m., aprovechando al parecer una posible ausencia del adulto, el cuervo se lanza en picado. El 29 de mayo, vi que el nido estaba vacío.

Pueden destacarse también las siguientes observaciones:

--- El 12 de junio de 2018, en la buitrera I de Langa de Duero (Soria), en el nido Nº 4 de buitre leonado hay un pollo blanco de unos 40-41 días; y un buitre adulto, que luego se va. A las 12 h. 0 m., veo al cuervo que va directo hacia ese nido; el buitre adulto le adelanta (en este caso, el buitre vuela más rápido que el cuervo), y llega al nido antes que el cuervo, el cual se posa en lo alto del cortado y luego junto al nido del buitre. Pude comprobar que el pollo del buitre salió adelante.

--- El 19 de mayo de 2018, a las 8 h. 0 m., en Las Torres, un cuervo está cerca del nido de buitres Nº 4, donde un buitre adulto protege al pollito blanco (que salió adelante, pese a su retraso con respecto a las fechas habituales).

Sobre las observaciones de cuervos comiendo buitres leonados muertos en sus nidos (adultos o pollos), realizadas por el autor, véanse las **Hojas Informativas Nº 26** (pág. 109), **Nº 27** (pág. 121), **Nº 28** (pág. 61), **Nº 29** (pág. 124), **Nº 30** (pág. 68), **Nº 32** (pág. 99), **Nº 36** (págs. 117-118), **Nº 38** (pág. 120), **Nº 40** (págs. 140-141), **Nº 42** (pág. 47), **Nº 46** (pág. 47, Nota 1), y **Nº 48** (pág. 58, Nota 1).

2) En el Volumen 5 del **Anuario Ornitológico de Burgos** (pág. 200) se recoge la observación, realizada por Fernando Román Sancho, de un grupo familiar de cuatro cuervos en el pinar de Quemada (cuadrícula VM51), el 11 de julio de 2015.

3) Nuevos datos sobre la mortalidad.- Año 2018.-

--- El 23 de diciembre de 2018, en el CRAS "Los Lavaderos" de Segovia, ingresó como cadáver, muerto por electrocución, un cuervo, hallado por los Agentes Medioambientales en una captación de agua en Alconada de Maderuelo (Segovia). (Datos que figuran en la "**Memoria anual del Parque Natural Hoces del río Riaza. Año 2018**", de la Junta de Castilla y León, página 87).

4) En el censo de otoño de 2018, realizado por 125 ornitólogos, se registraron al menos **unos 114-136** cuervos posiblemente distintos, y probablemente más. El mayor grupo registrado fue de **70** cuervos (el domingo, a las 8 h. 58 m., en V.A.D.; Juan Prieto Martín y Alejandro Quecedo del Val). (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 79-81).

Comentario.- Los censos de otoño en que se han registrado más cuervos son los de 2015 (al menos unos 157-178), 2012 (al menos unos 145-150), 2005 (al menos unos 117), 2018 (al menos unos 114-136), 2014 (al menos unos 97-106), 2013 (al menos unos 92-94), 2017 (al menos unos 86-88), 2016 (al menos unos 85), 2007 (al menos unos 68-70), 2002 (al menos unos 65-70), 2004 (al menos unos 64), 2008 (al menos unos 48-49), 2010 (al menos unos 46), 2009 (al menos unos 45-46), 1990 (al menos 38), 2001 (al menos unos 34-36), 2006 (al menos unos 33-46), 2003 (al menos unos 30-39), y 2011 (al menos unos 29-34).

5) En el censo de otoño de 1999, se calculó una velocidad media de unos 30 km./h. ap. para una pareja de cuervos. (Véase el **Informe final** correspondiente, pág. 18).

En el censo de otoño de 2000, se calculó una velocidad media de unos 30 km./h. ap. para una pareja de cuervos. (Véase el **Informe final** correspondiente, pág. 23).

En el censo de otoño de 2001, se calculó una velocidad media de unos 34 km./h. para un grupo de cuervos, y de unos 22 km./h. ap. para otro grupo. (Véase el **Informe final** correspondiente, pág. 22).

En el censo de otoño de 2003, se calculó una velocidad media de unos 48 km./h. para un grupo de cuervos. (Véase el **Informe final** correspondiente, pág. 47).

En el censo de otoño de 2013, se calculó una velocidad media de unos 30 km./h. para un grupo de cuervos. (Véase el Informe final correspondiente, pág. 86).

En el censo de otoño de 2014, se calculó una velocidad media de unos 37´5 km./h. para un grupo de cuervos. (Véase el Informe final correspondiente, págs. 77-79).
En el censo de otoño de 2018, se calculó una velocidad media de unos 17´3 km./h. para un bando de cuervos. (Véase el Informe final correspondiente, págs. 79-82).

La media de los ocho datos es de unos 31´1 km./h. (248´8/8), con un rango de 17´3 a 48, y con una moda de unos 30 km./h., aunque el margen de error es difícil de determinar.

224.- **ESTORNINO PINTO** (*Sturnus vulgaris*)

Nuevas citas.- Año 2018.-

En el nordeste de Segovia.-
--- El 10 de noviembre, a las 17 h. 10 m., en una torre del tendido eléctrico, por P.D.D., 20 estorninos, de los que dos o tres son pintos. (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 11 de noviembre, a las 8 h. 10 m., en cables sobre la presa, unos 60 estorninos, de los que unos 15-18 son pintos. (José Luis López-Pozuelo García).
--- El mismo día 11 de noviembre, a las 8 h. 29 m.- Un estornino pinto vuela río arriba, frente a El Campanario y La Raya. (Antonio Sanz Carro y Andrés Requejo de las Heras).
--- El mismo día 11 de noviembre, por la mañana.- Estornino pinto. Las Torres. (Yolanda Arrabal Agüera, Coral Jiménez Herbón y Miguel Ángel Granado Iglesias).
--- El 15 de noviembre de 2018, unos 70 estorninos pintos dispersos. No se observan grandes bandos. (José Liarte de Blas y Ricardo Ramos Sánchez).

En el sur de Burgos.-
--- El 1 de enero, gran bando mixto de **11.000** estorninos, pintos y negros, en el Parque General Gutiérrez, en el casco urbano de Aranda de Duero (Cristian Osorgo Huerga y Daniel Sanz Platero; publicado en www.avesdeburgos.com).
--- El 9 de noviembre, entre las 16 h. 4 m. y las 17 h. 20 m., estornino pinto, en Aranda, junto al río Duero, en Cantaburros. (Javier Vitores Casado).

Ha habido ya, que sepamos, 62 citas de esta especie en la zona, y ha habido más citas en parajes cercanos.

Datos sobre agrupaciones, en zonas cercanas, aparecen en las **Hojas Informativas Nº 28** (págs. 62-63), **Nº 30** (págs. 68-69), **Nº 32** (págs. 101-102), **Nº 34** (págs. 124-126), **Nº 36** (págs. 120-121), **Nº 38** (págs. 121-122), **Nº 40** (págs. 146-147), **Nº 42** (pág. 50), **Nº 44** (pág. 48), y **Nº 46** (pág. 48).

En el Refugio, la mayor agrupación citada, de la que tenemos noticias, corresponde a un bando de al menos **150** estorninos pintos, registrado por Juan Prieto Martín el 13 de noviembre de 1993, junto a los corrales de Peña Rubia. (Citado en el **Informe final** del censo de otoño de 1993, pág. 9).

225.- **ESTORNINO NEGRO** (*Sturnus unicolor*) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018 (observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).-

--- El 2 de mayo, a las 10 h. 19 m., un estornino negro con plumón o pelusa, en Peña La Graja (Refugio de Montejo, Segovia, cuadrícula 1).
--- El 27 de mayo, a las 19 h. 52 m., un estornino negro con ceba, en Santa Cruz de la Salceda (Burgos, cuadrícula 2).
--- El 16 de junio, a las 6 h. 58 m., un estornino negro con ceba, en Sacramenia (Segovia, cuadrícula VL19-29).
--- El 20 de junio, a las 6 h. 59 m., un estornino negro se introduce en una oquedad del nido grande de cigüeñas (ocupado, con pollo) de Fuentespina (Burgos, cuadrícula 1), donde el estornino debe de anidar.

--- El 16 de julio, a las 12 h. 35 m., estorninos, entre los cuales parece haber jóvenes, en El Chorrillo (cerca del embalse y de Maderuelo, cuadrícula 4).
--- El 20 de julio, a las 18 h. 50 m., un estornino con ceba, en Valdevacas de Montejo (Segovia, cuadrícula 3).

Nuevas grandes agrupaciones (de al menos 50 ejemplares).- Año 2018.-

--- El 1 de enero, gran bando mixto de **11.000** estorninos, pintos y negros, en el Parque General Gutiérrez, en el casco urbano de Aranda de Duero (Cristian Osorgo Huerga y Daniel Sanz Platero; publicado en www.avesdeburgos.com).
--- El 11 de agosto, unos 50 estorninos negros en Valdepardebueyes. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 12 de agosto, a las 9 h. 0 m., grandes grupos de estorninos negros frente al Esplegón, en Moral de Hornuez. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 19 de agosto, a las 10 h. 48 m., una gran bandada de muchos estorninos, en los páramos del sureste, cerca del Reguerillo. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 11 de octubre, unos 30 estorninos negros en Milagros, y unos 50 en Montejo. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).
--- El 28 de diciembre, unos **100** estorninos negros en el soto de Valdeherreros (Milagros, Burgos), y 20 estorninos negros como mínimo en Montejo. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).

--- Sobre las agrupaciones registradas en el censo de otoño de 2018, véase el **Informe final** correspondiente, págs. 82-83. La mayor agrupación contada fue de **unos 1.000** estorninos (el sábado, entre las 7 h. 20 m. y las 8 h. 39 m., en charcas junto a Aranda de Duero; Javier Vitores Casado, Cecilio San Miguel Gayubo y Carlos López Tello).

Comienzo de 2019.-

--- El 13 de marzo, a las 17 h. 38 m, un gran bando de estorninos, cerca del Pontón. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

(Sobre las grandes agrupaciones de estorninos en la comarca, puede verse lo indicado en las **Hojas Informativas Nº 28** [págs. 62-63], **Nº 30** [págs. 70-71]), **Nº 32** [pág. 103], **Nº 34** [págs. 125-126], **Nº 36** [págs. 121-122], **Nº 38** [págs. 122-124], **Nº 40** [pág. 148], **Nº 42** [pág. 51], **Nº 44** [pág. 48], y **Nº 46** [pág. 48], y **Nº 48** [pág. 60]).

226.- **GORRIÓN COMÚN** (*Passer domesticus*) N(1,[2],3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 28 de mayo, a las 11 h. 34 m., **16 cópulas seguidas** de una pareja de gorriones comunes, en el pueblo de Moral de Hornuez (Segovia, cuadrícula 3). En todos los casos, es el macho el que monta sobre la hembra.
--- El 17 de junio, a las 8 h. 50 m., una pareja de gorriones comunes en lo que parece una parada nupcial, en el pueblo de Piquera de San Esteban (Soria, cuadrícula VL79).
--- El 21 de agosto, por la tarde, gorrión común "haciendo la rueda", en el pueblo de Montejo de la Vega (Segovia, cuadrícula 1-3).

--- En nidos (ocupados o no) de cigüeña blanca, en 2018, observé gorrión común en las siguientes localidades:

--- Alconadilla (Segovia) (los días 22 de abril y 19 de mayo).
--- Alconada de Maderuelo (Segovia) (el 16 de junio).
--- Barbolla (Segovia) (el 20 de junio, en el nido con tres pollos).
--- Bercimuel (Segovia) (el 19 de junio).
--- Campo de San Pedro (Segovia) (los días 19 de junio y 3 de julio; en el nido de la chimenea alta).
--- Corral de Ayllón (Segovia) (el 18 de junio).

--- Fresnillo de las Dueñas (Burgos) (el 20 de junio; en el nido vacío, en el nido ocupado de arriba, y en el nido con dos pollos).
--- Languilla (Segovia) (los días 16 de junio y 1 de julio).
--- La Sequera de Haza (Burgos) (el 15 de junio).
--- Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia) (los días 2 de abril y 4 de julio).
--- Pajarejos (Segovia) (el 19 de junio).
--- Sacramenia (Segovia) (el 16 de junio).
--- San Esteban de Gormaz (Soria) (el 12 de junio).
--- Santa Cruz de la Salceda (Burgos) (el 2 de julio).
--- Santa María de Riaza (Segovia) (el 18 de junio, en el nido del silo).
--- Soto de San Esteban (Soria) (el 12 de junio).

Notas.- 1) Sobre las observaciones de gorriones comunes en el censo de otoño de 2018, véase el **Informe final** correspondiente, pág. 91.

2) El 9 de agosto de 2018, gorrión común en el embalse, junto a la isla. (Xavier Parra Cuenca).

3) El 23 de agosto de 2018, a las 9 h. 3 m., un gorrión común cerca del Majano Nº 1, en la estepa cerealista del norte del Refgio, donde pocas veces he observado la especie (y ninguna anterior en ese sitio concreto). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

4) El 28 de diciembre de 2018, un mínimo de 10 gorriones comunes en el pueblo de Montejo de la Vega. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).

227.- **GORRIÓN MORUNO** (*Passer hispaniolensis*) N(1, 4)

Véase lo indicado sobre este pájaro en la **Lista de vertebrados del Refugio** (pág. 35, Nota 101); y en las **Hojas Informativas Nº 22** (pág. 46), **Nº 23** (págs. 42-43), **Nº 24** (págs. 74-75), **Nº 26** (págs. 80-81), **Nº 28** (pág. 65), **Nº 30** (pág. 73), **Nº 32** (pág. 106), **Nº 34** (págs. 129-131), **Nº 36** (págs. 124-125), **Nº 38** (pág. 127), **Nº 40** (págs. 151-156), **Nº 42** (págs. 52-53), **Nº 44** (págs. 49-50), **Nº 46** (pág. 50), y **Nº 48** (pág. 61).

Nuevas observaciones.- Año 2018.-
--- El 30 de marzo, un gorrión moruno macho, fotografiado, cerca de la estación de Maderuelo (cuadrícula 4). (Xavier Parra Cuenca).
--- El 22 de abril, a las 13 h. 26 m., al menos siete gorriones morunos (cuatro machos y tres hembras) en la chopera cerca del comedero de buitres de Ayllón (cuadrícula VL68), en el viejo nido vacío Nº VI del milano negro.
--- El 11 de junio, a las 9 h. 44 m., un gorrión moruno macho va y viene al nido de milano negro Nº XXVI (en la isla, con dos pollos; cuadrícula 4); a las 16 h. 11 m., de nuevo un gorrión moruno macho está en el nido (o junto al nido) Nº XXVI del milano negro (antiguo nido Nº XIX de la garza real).
--- El 1 de julio, a las 11 h. 15 m., un gorrión moruno macho, y un gorrión común macho, en el nido de cigüeña blanca de Languilla (cuadrícula VL68); y a las 17 h. 48 m., gorriones morunos (hay machos), y nidos de la especie, bajo el nido (o en el nido) de cigüeña blanca de Alconadilla (cuadrícula 4).
--- El 3 de julio, a las 9 h. 19 m., nidos de gorrión moruno en la margen izquierda del embalse (cuadrícula 4), cerca del nido Nº 19 de águila calzada.
--- El 23 de julio, a las 11 h. 52 m., en la isla del embalse (cuadrícula 4), un gorrión hembra, moruno o común, en el nido vacío Nº 15 de la garza real.
--- El 27 de julio, a las 17 h. 7 m., en una chopera cerca de Pedraja de San Esteban (Soria, cuadrícula VM80), vemos tres nidos de gorrión moruno, uno de ellos sobre un nido de milano negro. (Con Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García, Jesús Javier Andrés Rodríguez, y Antonio Romera Camarero).
--- El 2 de agosto, a las 9 h. 24 m., nidos de gorrión moruno cerca del viejo nido de águila calzada del Hoyo de Valhondo, no lejos de Alconadilla (cuadrícula 4).
--- El 9 de agosto, algunos gorriones morunos en la misma estación de Maderuelo (cuadrícula 4). Un macho con ceba es fotografiado. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 13 de agosto, a las 17 h. 2 m., nidos de gorrión moruno en el viejo nido de águila calzada de la chopera de Corral de Ayllón (cuadrícula VL68).

--- El 14 de agosto, algunos gorriones morunos en un edificio entre Riaguas y Riahuelas (cuadrícula VL58). (Xavier Parra Cuenca).
--- El 15 de noviembre, un gorrión moruno macho en el soto del arroyo de Carralanga, junto al embalse de Linares (cuadrícula 4). (José Liarte de Blas y Ricardo Ramos Sánchez).

(Las observaciones son de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, salvo aquellas en que se indica otro autor).

La reproducción del gorrión moruno en las cuadrículas 4, VL68, y VM80, no está señalada en el "**Atlas de las Aves Reproductoras de España**" (Martí, R., y Del Moral, J. C. [eds.]; Dirección General de Conservación de la Naturaleza – Sociedad Española de Ornitología, Madrid, 2003, 733 pp.; pág. 560).

228.- **GORRIÓN MOLINERO** (*Passer montanus*) N(1,[2],¿3?,4) [n([3])] +(3)

Por las razones indicadas en la **Hoja Informativa Nº 24** (pág. 75) (véanse también las notas 1 y 2 de la **Hoja Informativa Nº 32**, pág. 108), reseñaremos a continuación todas las citas fechadas, de la especie en la zona, que hemos recibido después de las recogidas en las **Hojas Informativas Nº 26** (págs. 81-82), **Nº 28** (págs. 65-66), **Nº 30** (págs. 73-74), **Nº 32** (págs. 107-108), **Nº 34** (págs. 131-132), **Nº 36** (págs. 125-126), **Nº 38** (págs. 128-129), **Nº 40** (págs. 155-156), **Nº 42** (pág. 53), **Nº 44** (págs. 50-51), **Nº 46** (págs. 50-51), y **Nº 48** (pág. 62).

Año 2018.-
--- El 1 de abril, a las 10 h. 0 m., más de cinco gorriones molineros, en Montejo de la Vega, junto al puente (cuadrícula 1). Se obtiene foto. (Xavier Parra Cuenca).
--- A finales de julio, un gorrión molinero cebando a un joven en Cantaburros (Aranda de Duero, Burgos, cuadrícula VM41). (Juan Carlos Ballano de la Viuda).
--- El 9 de agosto, a las 19 h. 30 m., un grupo de gorriones molineros en Campo de San Pedro (entrada este) (Segovia, cuadrícula VL58). (Xavier Parra Cuenca).
--- El 8 de noviembre, a las 17 h. 14 m., un gorrión molinero (y 17 gorriones comunes, y un gorrión chillón), cerca del cementerio de Montejo. (Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra, José Luis Romero Carayol, y Pedro Rodríguez Panizo).
--- El 9 de noviembre, entre las 16 h. 4 m. y las 17 h. 20 m., gorrión molinero, en Aranda, junto al río Duero, en Cantaburros (Burgos, cuadrícula VM41). (Javier Vitores Casado).
--- El 11 de noviembre, un gorrión molinero, con un grupo de gorriones comunes, junto a la casa rural de Montejo de la Vega (cuadrícula 1). (Elías Gomis Martín y Silvia Gomis Sellés).
--- El 15 de noviembre, dos gorriones molineros posados en una valla, cerca del comedero de buitres de Campo de San Pedro (cuadrícula VL58). (José Liarte de Blas y Ricardo Ramos Sánchez).

229.- **GORRIÓN CHILLÓN** (*Petronia petronia*) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018 (observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, excepto aquellas en que se indica otro observador).-
--- El 16 de mayo, a las 9 h. 15 m., un gorrión chillón en el nido fracasado (hecho y vacío, de buitre leonado) Nº 11 del barranco de Pardebueyes (cuadrícula 3), donde el 28 de abril había visto el pollo blanco del buitre. A las 10 h. 15 m., de nuevo hay allí un gorrión chillón, y coge material del nido del buitre.
--- El 19 de mayo, a las 15 h. 16 m., un gorrión chillón se introduce en un agujero, en la margen derecha de Vallunquera (cuadrícula 4), cerca del viejo nido (vacío) Nº "3" tris del buitre leonado.
--- Entre el 6 y el 8 de julio, en las afueras de Barbolla (Segovia, cuadrícula VL47), en una nave para maquinaria y paja, "*se ven dos parejas de gorrión chillón que se andan metiendo en dos huecos que hay sobre una viga tubular.*" (Antonio Fernández Ortiz).
--- El 15 de julio, a las 15 h. 50 m., un gorrión chillón con ceba, en la parte alta del barranco de Valdecasuar (cuadrícula 3), al norte de la barrera (donde la bifuración de caminos).
--- El 10 de agosto, a las 18 h. 26 m., un gorrión chillón con ceba, en la estepa cerealista del norte del Refugio de Montejo (cuadrícula 1), junto al camino, cerca del Montón de piedras (Majano) Nº 3.

Nuevos datos sobre agrupaciones.- Año 2018.-

--- El 11 de octubre, unos 30 gorriones chillones en Milagros, y unos 10 en Montejo. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).

Sobre las agrupaciones señaladas en el censo de otoño de 2018, véase el **Informe final** correspondiente, pág. 84. El mayor grupo señalado tenía más de 50 gorriones chillones (el 11 de noviembre, a las 8 h. 17 m., en los cables sobre la presa; José Luis López-Pozuelo Garcia).

Véase lo indicado sobre grandes agrupaciones, y sobre las fechas de las mismas, en la **Hoja Informativa Nº 40**, pág. 157. Véanse también las **Hojas Informativas Nº 42** (pág. 54), **Nº 44** (pág. 51), **Nº 46** (pág. 51), y **Nº 48** (pág. 62). De acuerdo con todos estos datos, parece que los grandes bandos suelen verse entre los meses de agosto y marzo, ambos inclusive.

Nuevas observaciones del gorrión chillón en nidos de buitre leonado.- Año 2018.-
--- El 16 de mayo, a las 9 h. 15 m., un gorrión chillón en el nido fracasado (hecho y vacío, de buitre leonado) Nº 11 del barranco de Pardebueyes (cuadrícula 3), donde el 28 de abril había visto el pollo blanco del buitre. A las 10 h. 15 m., de nuevo hay allí un gorrión chillón, y coge material del nido del buitre.
--- El 17 de mayo, a las 7 h. 41 m., un gorrión chillón en el nido fracasado Nº 1 de buitre leonado, en Covanegra (cuadricula 3).
(Observaciones de Fidel José Fernández y Fernandez-Arroyo).

Sobre observaciones del gorrión chillón junto a nidos de aves rapaces o de cuervos, véase lo indicado en las **Hojas Informativas Nº 23** [pág. 43], **Nº 24** [pág. 75, pinzón], **Nº 26** [pág. 83], **Nº 28** [págs. 66-67], **Nº 30** [pág. 75], **Nº 32** [págs. 108-109], **Nº 34** [pág. 134], **Nº 36** [pág. 126], **Nº 38** [pág. 130], **Nº 40** [pág. 156], **Nº 44** [pág. 51], **Nº 46** [pág. 51], y **Nº 48** [pág. 62].

230.- ***GORRIÓN ALPINO** (*Montifringilla nivalis*) A ¿?

Véase lo indicado sobre esta especie en la **Hoja Informativa Nº 34** (pág. 135).

S/n.- ***DIAMANTE CEBRA DE TIMOR** (*Taeniopygia guttata*)

Nota.- En el Volumen 5 del **Anuario Ornitológico de Burgos** (pág. 216) se publican dos citas para la provincia de estos pájaros exóticos, "*sin duda escapados de cautividad*", ambas en 2015. Una de ellas se refiere a doce ejemplares (al menos 10 machos y dos hembras) observados por Rufino Fernández González, el 10 de abril de 2015, en ribera, en Caleruega (cuadrícula VM53).

231.- **PINZÓN VULGAR** (*Fringilla coelebs*) N(1,4) n(2,3)

Nuevos datos sobre agrupaciones.- Año 2018.-

--- El 28 de diciembre, un mínimo de 25 pinzones vulgares en la subida al Llano de Milagros, y 20 pinzones vulgares como mínimo en el sabinar del camino a Maluque. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).
--- Con respecto a las mayores agrupaciones anotadas en el censo de otoño de 2018, véase el Informe final correspondiente, pág. 84.

Comienzo de 2019.-

--- El 22 de enero, aproximadamente unos 40 pinzones vulgares cruzan la autovía A-1, en Pardilla (Burgos). (Miguel Ángel Pinto Cebrián, en eBird).

Nota.- Un cuaderno bien bonito e interesante, en español e inglés, sobre todos los fringílidos del mundo, es el siguiente:

--- Andrés-Moreno, M.; y Febrero, Á. (2016). Fringílidos. True finches. MADbird 2016. 8 pp.

232.- ***PINZÓN REAL** (*Fringilla montifringilla*)

En el Refugio o su entorno inmediato ha habido ya, que sepamos, 25 citas de esta especie. También ha habido registros en zonas cercanas.

El pinzón real ha sido citado en ocho censos de otoño: los de 1989, 1990, 1991, 2000, 2004, 2012, 2014, y 2017.

Sobre las fechas de las observaciones, véase lo señalado en la **Lista de vertebrados del Refugio** (página 35, Nota 102); y en las **Hojas Informativas Nº 32** (pág. 111, Comentario), **Nº 34** (pág. 136, Nota), **Nº 42** (pág. 54), y **Nº 44** (pág. 51).

Nota.- La gran concentración de unos 300 pinzones reales (mezclados con verderón y pinzón vulgar), en viñedos junto al río Duero, cerca de Aranda (cuadrícula VM41), observada el 7 de enero de 2016 por Javier Vitores Casado, y recogida en la **Hoja Informativa Nº 44** (pág. 51), aparece reseñada por José Luis Lobo Cueva, citando la referida publicación, en el Volumen 5 del **Anuario Ornitológico de Burgos** (pág. 206).

233.- **VERDECILLO (o SERÍN VERDECILLO)** (*Serinus serinus*) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-
--- El 13 de junio, a las 9 h. 40 m., se oyen reclamos de un pollo (joven del año) de verdecillo, junto al puente de Alconadilla (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 14 de agosto, un verdecillo adulto cebando un joven en el pinar de Valdevacas de Montejo, cerca de la torre (cuadrícula 3). (Xavier Parra Cuenca).

Nota.- Sobre las observaciones de verdecillo en el censo de otoño de 2018, véase el **Informe final** correspondiente, pág. 84.

234.- ***VERDERÓN SERRANO** (*Carduelis citrinella*) A

Véase lo indicado sobre esta especie en la **Hoja Informativa Nº 48** (págs. 63-64).

235.- **VERDERÓN (COMÚN)** (*Carduelis [Chloris] chloris*) N(1,[2],3,4) +(2)

Nuevos datos sobre agrupaciones.- Año 2018.-
--- El 28 de diciembre, un mínimo de 10 verderones comunes en la subida al llano de Milagros, y 6 verderones como mínimo en campos del camino a Maluque. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).

Nota.- Sobre los registros de verderón en el último censo de otoño, véase lo indicado en el **Informe fnal** correspondiente.

236.- **JILGUERO (EUROPEO)** (*Carduelis carduelis*) N(1,[2],3,4) +(2)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-
--- El 13 de agosto, a las 19 h. 3 m., un jilguero joven, junto al puente de Alconadilla (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Nuevos datos sobre agrupaciones.- Año 2018.-
--- El 11 de octubre, unos 10 jilgueros en Milagros, y unos 10 en Montejo. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).
--- El 28 de diciembre, un mínimo de 40 jilgueros en la subida al llano de Milagros, y 20 pardillos como mínimo en campos del camino a Maluque. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).

Sobre los grupos registrados en el último censo de otoño, véase el **Informe fnal** correspondiente.

237.- **LÚGANO (o JILGUERO LÚGANO)** (*Carduelis [Spinus] spinus*)

Nuevas citas.- Año 2018.-

--- El 16 de abril, una concentración de **70** lúganos en Milagros (Burgos, cuadrícula VM40). (Diego Santamaría Merino; publicado en www.avesdeburgos.com).
--- El 18 de abril, un lúgano en Arauzo de Salce (Burgos, cuadrícula VM62). (Rufino Fernández González; publicado en www.avesdeburgos.com, como una de las últimas observaciones prenupciales del año en la provincia).

--- El 11 de noviembre, a las 9 h. 55 m., un lúgano macho en el soto bajo Peña Portillo. (Félix Martínez Olivas).

238.- **PARDILLO (COMÚN)** (*Carduelis [Linaria] cannabina*) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-
--- El 28 de mayo, a las 9 h. 4 m., un pardillo con ceba, en los páramos de la margen derecha del barranco de la Retuerta, justo después del nido Nº Z (con tres pollos) del búho real (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Nuevos datos sobre agrupaciones.- Año 2018.-
--- El 27 de marzo, un grupo de más de 50 pardillos en los campos de Riaguas de San Bartolomé. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 11 de octubre, unos 20 pardillos en Milagros. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).
--- Sobre las agrupaciones de pardillos registradas en el censo de otoño de 2018, véase el **Informe final** correspondiente, pág. 85.
--- El 15 de noviembre, unos 30 pardillos cerca del comedero de buitres de Campo de San Pedro. (José Liarte de Blas y Ricardo Ramos Sánchez).
--- El 28 de diciembre, un mínimo de 10 pardillos comunes en la subida al llano de Milagros, y 20 pardillos como mínimo en campos del camino a Maluque. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).

Nota.- El 10 de junio de 2018, a las 12 h. 23 m., en lo alto de la margen izquierda del Reguerillo del Boquerón, tres pardillos, dos hembras y un posible macho de coloración atípica. Una hembra se baña en un charquito de lluvia de la roca. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

239.- **PIQUITUERTO (COMÚN)** (*Loxia curvirostra*) [N(3)] +(3)

Puede verse un resumen de todos los datos anteriores que conocemos, del piquituerto allí, en la **Lista de vertebrados del Refugio** (pág. 35, Nota 104); y en las **Hojas Informativas Nº 21** (pág. 16), **Nº 22** (pág. 47), **Nº 23** (pág. 44), **Nº 24** (pág. 76), **Nº 26** (pág. 87), **Nº 28** (págs. 70-71), **Nº 30** (pág. 79)], **Nº 32** (págs. 114-115), **Nº 34** (pág. 139), **Nº 38** (pág. 136), **Nº 40** (pág. 164), **Nº 44** (pág. 53), **Nº 46** (pág. 53), y **Nº 48** (pág. 65). Véanse también los **Informes finales** de los censos de otoño de 1990 (pág. 7), 2003 (pág. 50), 2007 (pág. 91), 2008 (pág. 101), 2012 (págs. 106-107), y 2017 (pág. 95).

240.- ***CAMACHUELO (COMÚN)** (*Pyrrhula pyrrhula*) B

Hemos conocido ya catorce registros de este pájaro en la zona, sin incluir las zonas próximas.

Las catorce citas corresponden a 1981, 1983, 1985 ([?]), 1990 (¿?), 1991 (3), 1995, 2000, 2003, 2006, 2007, 2016, y 2017; y a los meses de octubre (1), noviembre (8), enero (1), febrero (1), marzo (1), abril (1) y julio (1[?]).

Sobre otras citas en zonas cercanas de Segovia (diciembre de 1996, Xavier Parra Cuenca; mayo de 2016, R. Bernal) o Burgos (ap. marzo o abril de 2007, Fernando Núñez Pérez), véanse las **Hojas Informativas Nº 38** (pág. 137) y **Nº 46** (pág. 53).

241.- **PICOGORDO (COMÚN)** (*Coccothraustes coccothraustes*) [¿N(3)?]

Nuevas citas (a partir de marzo de 2018 inclusive).-

56) El 30 de marzo, a las 9 h. 30 m., dos picogordos al menos, en los huertos de Moral de Hornuez. Se obtiene foto. (Xavier Parra Cuenca).

El total de citas en el Refugio e inmediaciones (sin contar las de zonas próximas) es de 56. Puede verse un resumen de las anteriores en la **Lista de vertebrados del Refugio** (págs. 35-36, Nota 106), y en las **Hojas Informativas Nº 24** (pág. 76), **Nº 26** (pág. 87), **Nº 28** (pág. 71), **Nº 30** (págs. 80-81), **Nº 32** (págs. 116-117), **Nº 34** (págs. 140-141), **Nº 38** (pág. 137), **Nº 40** (pág. 165), **Nº 42** (pág. 56), y **Nº 48** (págs. 55-56).

De las 56 citas, hay dos que no están fechadas. Las 54 restantes corresponden a los meses de enero (2), febrero (3), marzo (4), abril (1), mayo (2), julio (2), agosto (8), septiembre (1), noviembre (26), y diciembre (5); y a los años de 1980 (1), 1981 (2), 1982 (1), 1985 (2), 1988 (6), 1990 (1), 1991 (2), 1998 (2), 2002 (1), 2004 (1), 2005 (6), 2006 (3), 2007 (3), 2008 (5), 2009 (5), 2010 (1), 2012 (2), 2014 (1), 2016 (1), 2017 (5) y 2018 (3). Los únicos anillamientos que conocemos siguen siendo los señalados en la **Lista de vertebrados del Refugio**, que se refieren al 24 de septiembre de 1981 (un ave, en Valugar, a las 11 h., por el Grupo Chrysaetos) y al 12 de abril de 1982 (una hembra adulta, en la curva de la Vega, por el Grupo Naumanni; fue fotografiada, por José Luis Fuentes Serrano).
Véanse también las referencias indicadas en la **Hoja Informativa Nº 40**, pág. 165.

El picogordo ha sido citado en 11 censos de otoño: los de 1985, 1988, 1990, 1991, 1998, 2002, 2005, 2008, 2012, 2014, y 2017.

Sobre las citas anteriores en zonas cercanas del sur de Burgos, pueden verse datos y referencias en las **Hojas Informativas Nº 24** (pág. 76), **Nº 30** (págs. 80-81), **Nº 32** (pág. 117), **Nº 34** (pág. 141), y **Nº 44** (pág. 53).

242.- **ESCRIBANO CERILLO** (*Emberiza citrinella*) ¿+(¿1?,¿4?)?

Véase lo indicado sobre este pájaro en la "**Lista de vertebrados del Refugio de Rapaces de Montejo (1975-1992)**" (pág. 36, Nota 107); y en las **Hojas Informativas Nº 26** (pág. 87), **Nº 28** (pág. 71), **Nº 32** (pág. 117), **Nº 36** (pág. 132), **Nº 38** (págs. 137-138), **Nº 40** (pág. 166), y **Nº 48** (pág. 67); así como las referencias citadas en la **Hoja Informativa Nº 30** (pág. 82, Nota 1).

243.- **ESCRIBANO SOTEÑO** (*Emberiza cirlus*) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-
--- El 12 de agosto, a las 10 h. 0 m., un macho cantando, y un joven, en el barranco de San Andrés. (Xavier Parra Cuenca).

Sobre citas de la especie en el último **censo de otoño**, véase el **Informe final** correspondiente, pág. 85.

244.- **ESCRIBANO MONTESINO** (*Emberiza cia*) N(1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-
--- El 18 de agosto, un joven, en la margen izquierda del barranco de Valdepardebueyes (cuadrícula 3). (Xavier Parra Cuenca).

245.- **ESCRIBANO HORTELANO** (*Emberiza hortulana*) N(3) n(1,4) +(2)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-

--- El 10 de mayo, un macho de escribano hortelano, fotografiado, en un manzano, en el Refugio de Montejo. (Luis Sitges Aparicio).
--- El 16 de mayo, a las 12 h. 52 m., un macho de escribano hortelano, bien visto, en la margen izquierda del barranco de Pardebueyes (cuadrícula 3), en la zona del comienzo de las rocas. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 10 de agosto, a las 19 h. 30 m., dos o tres escribanos hortelanos, fotografiados, en El Guancho, al pie de cerro Lucas, en Villaverde de Montejo (cuadrícula 3). Un joven del año reclama y es respondido por un macho adulto (visto). (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).
--- Además, en la primavera de 2018, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo oyó el canto del escribano hortelano en el barranco de Valtejo (casi en la parte final, cuadrícula 4), en el barranco de Valdecasuar o cerca (en la ladera del Circo, y posiblemente también en lo alto de la margen derecha; cuadrícula 3), entre el Reguero Bañuelos y el Reguero de la Fuente de la Vega (cuadrícula 3), en la parte alta del barranco de Pardebueyes (cuadrícula 3), en el barranco de Valdebejón (cuadrícula 3), en el barranco de la Retuerta (cuadrícula 4), en el barranco de Valdimplún (cerca de Languilla, Segovia, cuadrícula VL69), y en El Molino de Torraño (Soria, cuadrícula VL78).

(Véase lo anotado sobre este pájaro en las **Hojas Informativas Nº 22** –pág. 47-, **Nº 23** –pág. 44-, **Nº 24** –pág. 77-, **Nº 26** –pág. 89-, **Nº 28** –pág. 72-, **Nº 30** –pág. 83-, **Nº 32** –pág. 118-, **Nº 34** –págs. 141-142-, y **Nº 36** –pág. 133-, **Nº 38** –pág. 140-, **Nº 40** –pág. 169-, **Nº 42** –pág. 57-, **Nº 44** –pág. 54-, **Nº 46** –pág. 54-, y **Nº 48** –pág. 67-).

246.- ***ESCRIBANO PALUSTRE** (*Emberiza schoeniclus*) A

Pierde la interrogación (**?**).

Nuevas citas en la ZEPA:

--- El 11 de noviembre de 2018, por la mañana, un escribano palustre macho del primer invierno, en la cola del embalse, frente a Peñalba (cuadrícula 4, VL49). (Juan Luis Galindo Estévez, Fernando Ávila Vico, Mario Benedited Guerrero, y Candelas Iglesias Aparicio).

(Es el primer registro que conocemos de este pájaro en la zona del embalse).

Nuevas citas en zonas cercanas.-

--- El 11 de noviembre de 2018, a las 7 h. 24 m., 4-7 escribanos palustres (4+3) en las charcas de Villalba de Duero (Burgos, cuadrícula VM31). (Javier Vitores Casado, Cecilio San Miguel Gayubo, y Carlos López Tello).

--- El 11 de noviembre de 2018, 6 escribanos palustres, en el arroyo de Riaguas (Segovia, cuadrícula VL58). (Xavier Martín Vilar).

En el mismo día, se vieron en total **11-14** ejemplares: 4-7 en las charcas de Villalba de Duero (Burgos), uno junto a la cola del embalse, y 6 en el arroyo de Riaguas (Segovia).

Nota.- Observaciones realizadas por Javier Vitores Casado en las charcas de Villalba de Duero, de 60 escribanos palustres el 8 de noviembre de 2014 (y 24 el día siguiente), y 20 escribanos palustres el 8 de noviembre de 2015 (con Carlos López Tello y Cecilio San Miguel Gayubo), recogidas en las **Hojas Informativas Nº 42** (pág. 56) y **.,** (pág. 55) respectivamente, están citadas por Fernando Román Sancho, nombrando las referidas publicaciones, en el Volumen 5 del **Anuario Ornitológico de Burgos** (pág. 212).

(Véase lo indicado sobre esta especie en las **Hojas Informativas Nº 22** [pág. 47], **Nº 24** [pág. 77], **Nº 26** [pág. 89], **Nº 28** [págs. 72-73], **Nº 30** [págs. 83-84], **Nº 32** [pág. 118], **Nº 34** [pág. 142], **Nº 36** [pág. 134], **Nº 38** [págs. 140-141], **Nº 40** [pág. 169], **Nº 42** [pág. 57], **Nº 44** [pág. 55], **Nº 46** [págs. 54-55], y **Nº 48** [pág. 67]).

247.- **TRIGUERO o ESCRIBANO TRIGUERO** (*Emberiza* [*Miliaria*] *calandra*) N(1,2,4) n(3)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-
--- El 23 de mayo, a las 9 h. 13 m., una cópula de trigueros, cerca del puente de Alconadilla. (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 19 de julio, a las 18 h. 37 m., un triguero con ceba en el pico, posado en un cable, junto a la carretera de la N-I a Villalvilla de Montejo, poco antes del arroyo de Las Tollas (cuadrícula 3). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 17 de agosto, trigueros, incluyendo bastantes jóvenes del año, cerca de Moral de Honruez (cuadrícula 3) (Xavier Parra Cuenca).

Nuevos datos sobre agrupaciones.- Año 2018.-
--- El 11 de octubre, unos 15 trigueros en Milagros. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).
--- El 11 de noviembre, unos 111 trigueros, en los páramos entre Maderuelo y Campo de San Pedro (Xavier Martín Vilar).
--- El 28 de diciembre, un mínimo de 20 trigueros en la subida al llano de Milagros, y **60** trigueros como mínimo en campos del camino a Maluque. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).

Sobre otras agrupaciones de trigueros reseñadas en el censo de otoño de 2018, véase el **Informe final** correspondiente, pág. 86.

Observación curiosa.- El 28 de mayo de 2018, a las 14 h. 57 m., un triguero, dos pardillos, y un probable gorrión común hembra, acude a beber a un charco, cerca de Fuentelcésped (Burgos, cuadrícula 1). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

NOTA.- Las cuatro cuadrículas del área de estudio, con más de cien especies de aves reproductoras registradas en cada una de ellas, figuran entre las de mayor número de especies nidificantes (de las cinco categorías consideradas), en el mapa publicado en el "**Atlas de las Aves Reproductoras de España**" (Martí, R., y Del Moral, J. C. [eds.]; Dirección General de Conservación de la Naturaleza – Sociedad Española de Ornitología, Madrid, 2003, 733 pp.; pág. 69). En el mismo Atlas se señala, con diversas consideraciones, "*una media de 75 especies por cuadrícula*".

Si suprimimos los datos dudosos, e incluimos los datos correspondientes al "**Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de Burgos**" (J. Román, F. Román, L. M. Ansola, C. Palma, y R. Ventosa; ed. Caja de Ahorros del Círculo Católico, Burgos, 1996, 322 páginas), se obtiene, para el periodo de estudio (desde que comenzó el Refugio), y para cada una de las cuatro cuadrículas (1, 2, 3 y 4), unos totales respectivos de 115 (96+9+10), 101 (70+26+5), 116 (94+19+3) y 127 (107+9+11) especies de aves reproductoras, respectivamente (los números indicados entre paréntesis corresponden a las tres categorías de segura, probable y posible; nótese la alta proporción de reproducciones seguras). Debe tenerse en cuenta que no se ha prospectado por igual toda la superficie de las cuadrículas, sino sobre todo las zonas incluidas en el Refugio y su entorno inmediato.

Como se indicó en la pág. 1, el total es de 136 especies de aves reproductoras (128 seguras, 6 probables y 2 posibles), de las que 128 (123+4+1) corresponden al área de estudio (el Refugio y sus inmediaciones), y 8 (5+2+1) a zonas próximas (pero incluidas también en alguna de las cuatro cuadrículas citadas). Nótese, de nuevo, la alta proporción de reproducciones seguras (128 de 136).

Nótese que existen tres aves –el cárabo, el piquituerto y el arrendajo– cuya reproducción es probable –en el primer caso- o posible –en los otros dos-, en el área de estudio, y es segura en zonas próximas; y existe una cuarta ave –el abejero- cuya reproducción es posible en el área de estudio, pero es probable en

zonas próximas). Al incluir los datos correspondientes al "**Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de Burgos**" (J. Román, F. Román, L. M. Ansola, C. Palma, y R. Ventosa; ed. Caja de Ahorros del Círculo Católico, Burgos, 1996, 322 páginas), aparece una especie (el carricero tordal) como reproductora probable en la cuadrícula 2, que recientemente ya sido citada como reproductora posible en la cola del embalse (cuadrícula 4); una segunda especie (el avión zapador) figura como reproductora segura en la cuadrícula 2, y sin ningún dato de cría en el área de estudio , donde sólo conocemos doce citas del ave (sin contar las zonas cercanas); y una tercera especie (el bisbita arbóreo), está como reproductora probable en la cuadrícula 2 (y dudosa en la 3), y sin datos claros de cría en el espacio natural de las hoces del Riaza o en su entorno inmediato (hay indicios dudosos de cría probable en la cuadrícula 3), donde sólo conocemos 26 citas del pájaro.

En el citado "**Atlas de las Aves Nidificantes de la provincia de Burgos**" (pág. 17), se indican, para las 181 cuadrículas correspondientes (100 de ellas totalmente) a la citada provincia, siete cuadrículas que "*han alcanzado o superado las 110 especies*" de aves reproductoras; y que tienen, respectivamente, 122, 118, 113, 113, 112, 110 y 110 especies. (Las 122 especies se refieren a la cuadrícula VN83, la del embalse de Sobrón).

Novedades posteriores, sobre las aves de Burgos, pueden verse en los **Anuarios Ornitológicos de la provincia de Burgos** (volúmenes 1, 2, 3, y 4; publicados en 2006, 2009, 2012, y 2015, respectivamente; D. González, F. Román, R. Fernández y J. L. Lobo; Caja de Burgos, Aula de Medio Ambiente; 432, 372, 301y 340 págs., resp.), así como en: www.avesdeburgos.com/anuario.htm.

Por otra parte, en el "**Atlas de las Aves Nidificantes de la Provincia de Palencia**" (F. Jubete Tazo; ed. Asociación de Naturalistas Palentinos; Palencia, 1997, 382 páginas; pág. 22), se señalan, para las 104 cuadrículas consideradas, una media de 71´64 especies de aves reproductoras ("*cifra considerada como bastante alta, y que asciende a 76´60 si se eliminan las cuadrículas con menos de un 50% de superficie perteneciente a la provincia de Palencia*"); y un total de cuatro cuadrículas con 100 o más especies (106, 106, 106 y 100, respectivamente). (Al igual que para los atlas de otras provincias, estos números han aumentado en el 2º Atlas nacional, que es posterior).

En Suiza, las cuadrículas más ricas llegan a tener "*más de 120 especies de aves nidificantes sobre 100 kilómetros cuadrados*", según datos de la Estación Ornitológica Suiza ("**Biodiversité. Un avifaune variée**"; 2005; 32 págs.).

Puede añadirse que, según los datos que conocemos, en el Refugio y su entorno inmediato, sin incluir las zonas próximas, se han anillado 4.664 aves, de 96 especies distintas. (Hay tres especies más anilladas en zonas próximas del nordeste de Segovia).

MAMÍFEROS.-

Véase lo indicado, sobre los mamíferos de la zona y las publicaciones habidas al respecto, en la **Hoja Informativa Nº 40** (pág. 175). Véanse también las **Hojas Informativas** pares posteriores. Véase, en particular, la **Hoja Informativa Nº 46** (pág. 56).

1.- **ERIZO (EUROPEO o COMÚN)** (*Erinaceus europaeus*) (1,2,3,4) n

*Sobre las observaciones directas del erizo en la comarca, véanse "**Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo**", pág. 6; y las **Hojas Informativas Nº 34** (pág. 147, Nota 1), **Nº 40** (págs. 175-176), y **Nº 42** (pág. 59).*

Sobre los erizos atropellados, puede verse un resumen en la **Hoja Informativa Nº 44** (pág. 57).

Sobre un erizo de Alicante que recibió el nombre de "Montejo", véase la **Hoja Informativa Nº 46**, pág. 56.

2.- **TOPO ¿IBÉRICO?** (*Talpa ¿occidentalis?*) B (1,3,4)

Véase lo indicado sobre el topo en la **Lista de vertebrados del Refugio** [pág. 36, Nota 111], en el 2º trabajo sobre **los mamíferos del Refugio** [pág. 5], y en las **Hojas Informativas Nº 24** [pág. 79], **Nº 26** [pág. 93], **Nº 30** [pág. 89], **Nº 34** [pág. 148], **Nº 38** [págs. 147-149], **Nº 42** [pág. 59], **Nº 44** [pág. 57], y **Nº 46** [pág. 57].

3.- ***DESMÁN (IBÉRICO) (o TOPO DE RÍO)** (*Galemys pyrenaicus*) C (1,4)

Como se indicó en el trabajo sobre **los mamíferos del Refugio** (pág. 9), no hemos conocido noticias del desmán posteriores a 1991 ap., exceptuando una cita posible en 1994. Pueden verse varias referencias, sobre la posible extinción de la especie en la zona (según distintos autores, en toda la provincia), o sobre el declive de la especie, en las **Hojas Informativas Nº 26** (pág. 93), **Nº 28** (pág. 77), **Nº 30** (pág. 89), **Nº 32** (págs. 123-124), **Nº 34** (pág. 148), y **Nº 38** (págs. 149-152), **Nº 40** (págs. 176-179), **Nº 42** (págs.. 59-60), **Nº 46** (pág. 57), y **Nº 48** (págs. 69-70). En las Hojas Informativas Nº 38 y Nº 40 puede verse también una relación de todas las citas que conocemos, del desmán en el Refugio.

En la revista "*Quercus*" Nº 395 (de enero de 2019) hay varios artículos relativos al desmán ibérico, y el Proyecto Life "*Desmania*".

S/n.- ***MUSARAÑA ENANA** (*Sorex minutus*) A ¿? (¿4?)

Véase la **Hoja Informativa Nº 40**, pág. 179.

4.- ***MUSARAÑA IBÉRICA (o ESPAÑOLA)** (*Sorex granarius*) A (3,¿4?)

Véase la Nota incluida en la **Hoja Informativa Nº 34**, pág. 148. Véase también la **Hoja Informativa Nº 46**, pág. 57.

5.- **MUSGAÑO DE CABRERA** (*Neomys anomalus*) B (1,2,4)

Pueden verse novedades anteriores sobre la especie en las **Hojas Informativas Nº 40** (pág. 180), **Nº 42** (pág. 60), y **Nº 46** (pág. 57). Véanse también las referencias citadas en la **Hoja Informativa Nº 30**, pág. 88.

6.- **MUSARAÑA GRIS o COMÚN** (*Crocidura russula*) (1,2,3,4)

Nuevos datos.- Años 2016 y 2017.- No hemos conocido registros posteriores a los recogidos en la **Hoja Informativa Nº 44** (pág. 58), salvo alguna noticia no fechada en zonas próximas.

S/n.- ***MUSARAÑITA o MUSGAÑO ENANO** (*Suncus etruscus*) A ? (¿1?)

7.- **MURCIÉLAGO GRANDE DE HERRADURA** (*Rhinolophus ferrumequinum*) B (¿1?,2,3,4)

Sobre la distribución de los rinolofos (y del resto de los murciélagos) en la zona, véanse las referencias indicadas para cada especie en las **Hojas Informativas Nº 26** (págs. 93-99), **Nº 30** (págs. 89-92), **Nº 32** (págs. 124-128), **Nº 34** (pág. 150), y **Nº 46** (págs. 58-60).

8.- ***MURCIÉLAGO PEQUEÑO DE HERRADURA** (*Rhinolophus hipposideros*) A ([1],2,[3])

9.- ***MURCIÉLAGO MEDITERRÁNEO DE HERRADURA** (*Rhinolophus euryale*) A ([1],4)

10.- ***MURCIÉLAGO RIBEREÑO (o DE RIBERA, o RATONERO RIBEREÑO)** (*Myotis daubentonii*) B (1,2,[3])

S/n.- ***MURCIÉLAGO RATONERO PARDO (o DE GEOFFROY, o DE OREJA PARTIDA, u OREJIRROTO)** (*Myotis emarginatus*)

S/n.- ***MURCIÉLAGO RATONERO GRIS (o DE NATTERER, o DE PATAGIO ASERRADO)** (*Myotis nattereri* [*scalerai*])

S/n.- **MURCIÉLAGO DE BECHSTEIN (o RATONERO FORESTAL)** (*Myotis bechsteinii*) A ? (¿1?,¿4?)

11.- **MURCIÉLAGO RATERO (o RATONERO GRANDE)** (*Myotis myotis*) (1,[2],3,[4]) N

Nuevos datos sobre agrupaciones.- En la cueva habitual (observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).-

Año 2018.-

--- El 28 de abril, en torno a las 20 h. 35 m., probablemente al menos unos 140-160 murciélagos rateros, o más, en un solo grupo.

--- El 22 de julio, en torno a las 12 h. 3 m., probablemente al menos unos 250-320 murciélagos rateros, probablemente no menos de 280, o más, en un solo grupo.

Además, este día, hay un macho muerto, reciente, no grande, en la cueva.
Tiene las siguientes medidas (longitudes).-
Cabeza y cuerpo.- 6´8 cm. / Cabeza.- 2´7 cm. / (Por tanto.- Cuerpo.- 4´1 cm.)
Cola.- 4´5 cm. / Oreja.- 2´2 cm. / Trago.- 0´9 cm. / Pie posterior.- 1´2 cm. / Antebrazo.- 5´5 cm. / Envergadura.- Ap. 33´5 cm.

No tenía, entre las orejas, la mancha blanca que presentan muchos *M. blythii*. Obtuve fotos. Estuve examinando bastante el ejemplar (oreja [forma y arrugas], trago, medidas…), y llegué a la conclusión de que debía tratarse, en efecto, de un *Myotis myotis*, posiblemente no adulto del todo.

Pueden verse datos y referencias sobre años anteriores, de esta cueva o de otros lugares, en los dos trabajos sobre **los mamíferos del Refugio** (págs. 11-12 y 6, respectivamente); y en las **Hojas Informativas Nº 23** (pág. 46), **Nº 24** (pág. 80), **Nº 26** (pág. 95), **Nº 28** (pág. 78), **Nº 30** (pág. 90), **Nº 32** (pág. 125), **Nº 34** (págs. 151-152), **Nº 36** (págs. 140-141), **Nº 38** (pág. 153), **Nº 40** (pág. 181), **Nº 42** (págs. 61-62), **Nº 44** (pág. 59), **Nº 46** (pág. 59), y **Nº 48** (pág. 71).

Véase también la Nota relativa a la especie siguiente, el murciélago ratonero mediano, en la **Hoja Informativa Nº 42** (pág. 62).

12.- ***MURCIÉLAGO RATONERO MEDIANO** (*Myotis blythii*) (¿1?,[3])

Véase lo indicado sobre esta especie en las **Hojas Informativas Nº 26** (pág. 96) y **Nº 42** (págs. 62-63).

13.- ***MURCIÉLAGO OREJUDO DORADO (o SEPTENTRIONAL)** (*Plecotus auritus*) A ? (¿1?,¿2?,¿4?)

Véase lo indicado sobre esta especie en la **Hoja Informativa Nº 46** (pág. 59)

14.- **MURCIÉLAGO OREJUDO GRIS (o MERIDIONAL)** (*Plecotus austriacus*) (1,2,3,4)

15.- **MURCIÉLAGO DE BOSQUE (o BARBASTELA)** (*Barbastella barbastellus*) A (1,2)

16.- **MURCIÉLAGO COMÚN o ENANO** (*Pipistrellus pipistrellus*) (1,2,3,4) N

Durante el último censo de otoño, frente a El Campanario / La Raya, el 11 de noviembre de 2018, a las 7 h. 35 m., se vieron cuatro murciélagos que posiblemente eran *Pipistrellus sp.* (Antonio Sanz Carro y Andrés Requejo de las Heras).

Sobre otras observaciones de murciélagos realizadas en el **censo de otoño de 2018**, véase el Informe final correspondiente, págs. 38-39.

S/n.- ***MURCIÉLAGO DE BORDE CLARO** (*Pipistrellus kuhlii*) ([3])

17.- ***MURCIÉLAGO MONTAÑERO o DE MONTAÑA** (*Hypsugo savii*) A N (1,4)

Véase lo indicado, sobre ésta y otras especies de murciélagos, en la **Hoja Informativa Nº 26** (págs. 93-99). Véanse asimismo la Nota de las **Hojas Informativas Nº 30** (Nota, pág. 92) y **Nº 46** (pág. 60).

18.- ***MURCIÉLAGO HORTELANO o DE HUERTA** (*Eptesicus serotinus*) A (4)

S/n.- ***NÓCTULO PEQUEÑO** (*Nyctalus leisleri*)

Véase la **Hoja Informativa Nº 42**, págs. 63-64.

19.- ***NÓCTULO COMÚN o MEDIANO** (*Nyctalus noctula*) A ¿? (¿1?)

Véanse las referencias sobre nóctulos (*Nyctalus sp.*) citadas en "**Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo**" (pág. 13).

20.- ***MURCIÉLAGO DE CUEVA (o TROGLODITA)** (*Miniopterus schreibersii*) A (1,[2])

Véase lo indicado sobre este murciélago en "**Los mamíferos del Refugio de Montejo (2ª parte)**" (págs. 7-8); y en las **Hojas Informativas Nº 24** (págs. 80-81), **Nº 26** (págs. 98-99), **Nº 30** (pág. 92), y **Nº 36** (pág. 144), **Nº 42** (págs. 62-63), y **Nº 46** (pág. 60).

21.- ***MURCIÉLAGO RABUDO** (*Tadarida teniotis*) A (3,4)

Véase lo indicado sobre este murciélago en las **Hojas Informativas Nº 32** (pág. 128) y **Nº 48** (pág. 72). Véanse también las **Hojas Informativas Nº 21** (pág. 17) y **Nº 34** (pág. 154), "**Los mamíferos del**

Refugio de Rapaces de Montejo" (pág. 14), y "**Los mamíferos del Refugio de Montejo (2ª parte)**" (pág. 8).

Nota.- El 15 de septiembre de 2018, a las 12 h. 6 m., un murciélago grande, en una cueva del Molino de Torraño (Soria, cuadrícula VL78). (Participantes en una excursión del Fondo para el Refugio, guiada por Jorge Andrés Remacha Lorenzo).

22.- **LIEBRE IBÉRICA** (*Lepus granatensis*) (1,2,3,4) N

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018 (a partir de abril).- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 17 de abril, a las 22 h. 22 m., una liebre joven, no grande, que se obstina en correr delante del coche, en la carretera de Campo de San Pedro a Bercimuel (cuadrícula VL58).
--- El 20 de abril, a las 0 h. 30 m., una liebre pequeña, entre Villaverde de Montejo y el desvío a la "estepa sur", en los paramos del suroeste (cuadrícula 3).
--- El 1 de julio, a las 22 h. 27 m., una liebre pequeña, junto a la carretera de Moral de Hornuez a Valdevacas de Montejo, cerca del pinar (cuadrícula 3).
--- El 21 de julio, a las 1 h. 36 m., una pareja de liebres grandes, junto a la carretera de Valdevacas de Montejo a Moral de Hornuez, en el términode Moral (cuadrícula 3).
(Véase también el siguiente apartado).

Nuevos datos sobre la liebre como presa.- Año 2018.-

--- El 12 de agosto, a las 20 h. 0 m., un posible azor levanta el vuelo del suelo, en medio de un pinar situado al lado del camino de Hornuez a la N-I, no lejos de Hornuez. La rapaz, grande y grisácea, se aleja hacia el interior del pinar. En el lugar donde emprendió el vuelo, hay una pequeña liebre parcialmente devorada (la cabeza y una pata trasera), y una pluma del pecho barrada. (Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).

Nuevos datos sobre atropellos.- Año 2018.-
--- El 22 de julio, a las 22 h. 26 m., veo una liebre atropellada, muy reciente, en la carretera de Valdevacas de Montejo a Moral de Hornuez (cuadrícula 3). La mido, y la aparto de la carretera. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Medidas.- Longitud cabeza y cuerpo.- 54 cm. / Longitud cola.- 6 cm. / Longitud total.- 60 cm. /
Longitud cabeza.- 12´5 cm. / (Por tanto.- Longitud cuerpo.- 41´5 cm.) /
Longitud pie posterior.- 12´5 cm. / Longitud oreja.- 12 cm.

[Sobre medidas de liebres atropelladas, véanse las **Hojas Informativas Nº 34** (pág. 157), **Nº 38** (pág. 158), **Nº 40** (pág. 187), y **Nº 46** (pág. 61).]

Comienzo de 2019.-
--- En febrero, se ven dos liebres atropelladas, recientes, entre Fuentenebro y la N-I. (Yolanda Calleja Corento).

Ya hemos sabido de al menos 31 liebres atropelladas en la comarca. (Véanse datos de las veintiocho anteriores en "**Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo**" [pág. 16], y en las **Hojas Informativas Nº 24** [pág. 82], **Nº 26** [pág. 99], **Nº 28** [pág. 81], **Nº 30** [pág. 94], **Nº 32** [págs. 129-130], **Nº 34** [págs. 156-158], **Nº 36** [pág. 147], **Nº 38** [pág. 158], **Nº 40** [pág. 187], **Nº 44** [pág. 60], **Nº 46** [pág. 61], y **Nº 48** [pág. 72]).

Notas.- 1) Sobre los registros de liebres en los transectos mensuales realizados por WWF España, véanse las referencias señaladas en las **Hojas Informativas Nº 36** (pág. 149), **Nº 40** (pág. 189), **Nº 42** (pág. 66), **Nº 44** (pág. 60), **Nº 46** (pág. 61), y **Nº 48** (pág. 73).

Nuevos datos aparecen en:

--- WWF España (2019). **Informe anual del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia). Datos del año 2018.** Informe presentado el 13-3-2019, en la reunión del Patronato del Parque Natural. 26 págs. (sin los Anexos).

Según se indica en el mencionado Informe (pág. 11), la liebre "*aumenta su valor de abundancia con respecto al año anterior*". (IKA: 0´069. IHA: 1,127).

Y más adelante (pág. 23), se señala que "*para esta especie en 2018 se han obtenido valores ligeramente superiores a los valores medios de abundancia.*" "*El conejo y la liebre muestran una gran variabilidad interanual desde que lleva haciéndose seguimiento de las mismas.*"

--- En la noche del 27 de abril de 2018, durante un censo nocturno de WWF España, un total de 34 corzos, 8 jabalíes, dos liebres, un conejo, y dos perdices. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el Refugio).

--- En la noche del 26 de febrero de 2019, durante un censo nocturno de WWF España, un total de 90 corzos, 27 jabalíes, siete liebres, y un conejo. Además, un zorro en un rastrojo en La Fuentecilla (21 h. 3m.), y un tejón en cultivos al pie de las bodegas más orientales de Milagros (23 h. 11 m.) ("*abandona el cultivo y sube hacia las bodegas caminando por la pista delante de las casas*"). (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el Refugio; Jesús Cobo Anula, asesor técnico de WWF en el Refugio; Joel Reyes Núñez, Keyla Mejía y Paola Mejía).

2) Puede verse una relación de fotos de liebre, que conocemos en la zona, en las **Hojas Informativas Nº 42** (pág. 65, Nota 1) y **Nº 46** (pág. 62, Nota 2, y págs. 239-240).

3) En el censo de otoño de 2010, con 65 participantes, se vieron tres liebres. Además, se encontraron excrementos de liebre en otra zona. (Véase el **Informe final** correspondiente, pág. 48.)

En el censo de otoño de 2011, con 58 participantes, se vio una liebre. (Véase el **Informe final** correspondiente, pág. 36.)

En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes, se vieron dos liebres. Además, se encontró una liebre muerta, atropellada. (Véase el **Informe final** correspondiente, pág. 50.)

En el censo de otoño de 2013, con 66 participantes, se vieron diez liebres posiblemente distintas. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 40-41).

En el censo de otoño de 2014, con 74 participantes, se vieron seis liebres posiblemente distintas. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 37-38).

En el censo de otoño de 2015, con 94 participantes, se vieron seis liebres. (Véase el **Informe final** correspondiente, pág. 38).

En el censo de otoño de 2016, con 76 participantes, se vieron al menos trece (o catorce) liebres. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 45-46).

En el censo de otoño de 2017, con 108 participantes, se vieron cinco liebres. (Véase el **Informe final** correspondiente, pág. 43).

En el censo de otoño de 2018, con 125 participantes, se vieron cuatro liebres. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 37-38).

Comentario.- Los censos de otoño en que se han visto más liebres son los de **2008** (14-16), **2016** (13-14), **2006** (9-11, posiblemente 10-11), **2013** (10), **2005** (al menos 9-10), y **1998** (al menos nueve); seguidos por los de **2002** (ocho), **2003** (ocho), y **2009** (siete u ocho).

4) Sobre la velocidad de una liebre, véase la Nota en la **Hoja Informativa Nº 44** (pág. 60).

5) En la noche del 8 al 9 de marzo de 2018, entre las 23 h. 57 m. y las 1 h. 31 m., un total de cinco liebres: una entre Fuentenebro y la N-I, una (grande) entre Montejo de la Vega y Valdevacas de Montejo, dos entre Valdevacas de Montejo y Moral de Hornuez, y una entre Moral de Hornuez y Fuentemizarra. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo). (Citado en la **Hoja Informativa Nº 48**, pág. 74.)

En la noche del 19 al 20 de abril de 2018, entre las 0 h. 14 m. y las 0 h. 31 m., un total de cinco liebres: dos (1+1) entre Villalvilla de Montejo y Villaverde de Montejo, y tres más (1+1[pequeña]+1) entre Villaverde de Montejo y Montejo de la Vega. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

6) El 10 de noviembre de 2018, entre las 11 h. 58 m. y las 12 h. 40 m.- Una liebre, en las charcas de Berlangas de Roa (Burgos, cuadrícula VM21). (Javier Vitores Casado, Cecilio San Miguel Gayubo y Carlos López Tello).

7) El 16 de junio de 2018, a las 6 h. 44 m., ¡una liebre en una calle de Sacramenia (Segovia, cuadrícula VL19-VL29)! La liebre se agazapa en pleno asfalto, junto al coche. Luego sale corriendo. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

En las cuadrículas VL58, VL29, y VM21, la presencia de la liebre no está señalada en el el "**Atlas de los Mamíferos Terrestres de España**" [Palomo Muñoz, L. J.; y Gisbert, J. (eds.), 2002; Dirección General de Conservación de la Naturaleza—SECEM—SECEMU, Madrid, 564 págs.; p. 453], ni en el "**Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España**" [Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J. C.; 2007; Dirección General para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU, Madrid, 588 págs.; p. 477].

23.- **CONEJO (COMÚN) (o DE MONTE)** (*Oryctolagus cuniculus*) (1,2,3,4) N

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018 (a partir de abril).-
--- El 13 de abril, a las 19 h. 23 m., un gazapo, cerca y al este del Km. 107 de la N-I (Segovia, cuadrícula VL56). Después, a las 19 h. 29 m., un conejo grande, en la misma zona. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 1 de julio, a las 7 h. 55 m., y de nuevo a las 8 h. 19 m., un gazapo, junto a un chozo, en campos cerca de Languilla (Segovia, cuadrícula VL68). A las 8 h. 12 m. y a las 8 h. 14 m., un conejo al parecer adulto, junto al mismo chozo. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 16 de julio, a las 18 h. 15 m., en el barranco de Valdecasuar, a la altura de la Fuente de la Refresca, un conejo joven cruzó la pista y se quedó amagado en el talud de la misma (fotografiado). (Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias, biólogo conservador y guarda, respectivamente, de WWF en el Refugio).

Como se indicó en **Hojas Informativas** anteriores, en la cuadrícula VL68 la presencia del conejo no está señalada en el el "**Atlas de los Mamíferos Terrestres de España**"[Palomo Muñoz, L. J.; y Gisbert, J. (eds.), 2002; Dirección General de Conservación de la Naturaleza—SECEM—SECEMU, Madrid, 564 págs.; p. 465], ni en el "**Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España**" [Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J. C.; 2007; Dirección General para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU, Madrid, 588 págs.; p. 488].
Tampoco está señalada, en los referidos Atlas, la presencia del conejo en las cuadrículas VL58, VM20 ni VL77, donde lo he visto en 2018 (en la VL58, en distintos sitios, y también en años anteriores; en la VM20, también en 2017, en distintos sitios).

Observaciones curiosas.- Año 2018.-
--- El 30 de marzo, al anochecer, bastantes conejos en el camino de Languilla a Riaguas, junto a los corrales. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 1 de abril, conejo en la salida de Moral de Hornuez hacia Fuentemizarra. (Xavier Parra Cuenca).
--- El 16 de julio, a las 18 h. 15 m., en el barranco de Valdecasuar, a la altura de la Fuente de la Refresca, un conejo joven cruzó la pista y se quedó amagado en el talud de la misma (fotografiado). (Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias, biólogo conservador y guarda, respectivamente, de WWF en el Refugio).
--- El 9 de agosto, varios conejos en una zona de cascotes del alto del Bercial (cuadrícula VL58). (Xavier Parra Cuenca).

Comienzo de 2019.-
--- El 20 de marzo, a las 9 h. 32 m., un conejo junto a la SG-945, ap. 1 km. al N.O. del desvío a Alconadilla (cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García).

Notas.- 1) Sobre agrupaciones.- Las mayores agrupaciones anteriores de conejos registradas en la zona, según los datos que conocemos, son las señaladas en "***Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo***" (pág. 16). (Véanse también las **Hojas Informativas Nº 34** [pág. 162, Nota 6], **Nº 42** [págs. 66-67, Nota 1], **Nº 44** [pág. 61, Nota 1], y **Nº 48** [pág. 74, Nota 1]).).

2) Puede verse una relación, de fotos o filmaciones de conejos obtenidas en la zona, en las **Hojas Informativas Nº 44** (pág. 62, Nota 2) y **Nº 48** (págs. 74, y 298-300). Un dato posterior es el antes señalado, del 16 de julio de 2018.

3) En el censo de otoño de 2010, con 65 participantes, fueron vistos unos 9 conejos (cuatro de ellos, entre el sábado y el domingo). Además, se vieron rastros o excrementos de conejo en otras dos zonas. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 47-48.)

En el censo de otoño de 2011, con 58 participantes, fueron vistos tres o cuatro conejos (todos ellos, entre el sábado y el domingo). (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 35-36.)

En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes, fueron vistos cinco o seis conejos (posiblemente seis); de ellos, cuatro o cinco (posiblemente cinco), entre el sábado y el domingo. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 49-50.)

En el censo de otoño de 2013, con 66 participantes, fueron vistos dos conejos vivos. Además, se vio un conejo muerto, y se encontraron rastros de otro conejo. (Véase el **Informe final** correspondiente, pág. 40.)

En el censo de otoño de 2014, con 74 participantes, fueron vistos dos conejos. Además, se encontraron escarbaduras de conejo. (Véase el **Informe final** correspondiente, pág. 37.)

En el censo de otoño de 2015, con 94 participantes, fueron vistos siete conejos. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 37-38.)

En el censo de otoño de 2016, con 76 participantes, fueron vistos seis conejos. (Véase el **Informe final** correspondiente, pág. 45.)

En el censo de otoño de 2017, con 108 participantes, fueron vistos unos cinco conejos. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 42-43.)

En el censo de otoño de 2018, con 125 participantes, fueron vistos tres conejos. (Véase el **Informe final** correspondiente, pág. 37.)

Comentario.- Los censos de otoño en que se han visto más conejos son los de **2008** (12, 8 de ellos entre el sábado y el domingo), **2009** (9, 6 de ellos entre el sábado y el domingo), **2010** (9, 4 de ellos entre el sábado y el domingo), **2003** (7-8), **2007** (7), **2015** (7), **2004** (al menos 6-7), **2005** (6-7, probablemente 7), **1998** (5-7), **1990** (6), **2016** (6), **2012** (5-6, posiblemente 6), **1995** (5), **2000** (5), **2006** (5), y **2017** (5).

4) Sobre los registros de conejos en los transectos mensuales realizados por WWF España, véanse las referencias señaladas en la **Hoja Informativa Nº 36** (pág. 149), **Nº 40** (págs. 196-197), **Nº 42** (pág. 68), **Nº 44** (pág. 63), **Nº 46** (pág. 65), y **Nº 48** (pág. 75).

Nuevos datos aparecen en:

--- WWF España (2019). **Informe anual del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia). Datos del año 2018.** Informe presentado el 13-3-2019, en la reunión del Patronato del Parque Natural. 26 págs. (sin los Anexos).

Según se indica en el mencionado Informe (pág. 11), el conejo "*tiene menos valores de los índices de abundancia que los obtenidos el año anterior*". (IKA: 0.025. IHA: 0,389.)

Y más adelante (pág. 23), se señala que "*para esta especie en 2018 se han obtenido valores inferiores a los valores medios de abundancia para el periodo considerado (2002-2017)*". "*El conejo y la liebre muestran una gran variabilidad interanual desde que lleva haciéndose seguimiento de las mismas.*"

--- En la noche del 27 de abril, durante un censo nocturno de WWF España, un total de 34 corzos, 8 jabalíes, dos liebres, un conejo, y dos perdices. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el Refugio).
--- En la noche del 29 de abril, durante un censo diurno (en torno al amanecer) de WWF España, un total de 8 corzos, un conejo, y 6 perdices. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el Refugio).
--- (Para el 26 de febrero de 2019, véase lo indicado en el capítulo sobre la liebre).

5) Nuevos datos sobre el conejo como presa.- Año 2018.-

--- El 27 de abril, en el nido de **búho real** Nº X-B.T., fracasado, vi huesos o restos de al menos tres conejos.
--- El 20 de mayo, en el nido de **búho real** Nº Y-B.F., con un búho adulto y dos pollos, vi los cuartos traseros de un conejo.
--- El 21 de mayo, en la margen izquierda del Reguero de los Pozos, vi huesos de conejo, posible presa del búho real.

6) La situación del conejo, y de sus predadores, es diferente en otras zonas de la provincia, como lo refleja el siguiente y bien interesante informe:

--- López Hernangómez, A. (2018). **La situación del conejo (*Oryctolagus cuniculus*) y el retorno de los depredadores a una localidad del sur de Segovia, 2018.** 12 págs.

7) En la zona de Pradales, se han matado conejos blancos (unos 8-10 en 6-7 años), según comunica Santos Bartolomé, quien enseña una foto de cuatro conejos (tres de color normal, y uno blanco) que fueron cazados allí en diciembre de 2017.

24.- ***ARDILLA ROJA o COMÚN** (*Sciurus vulgaris*) C ([2], 3,4)

Pasa de "**B**" a "**C**".

Nuevas citas en la zona, o en parajes cercanos.-
--- En 2017, una ardilla muerta en Pardilla (Burgos, cuadrícula 1, VM40). (Carlos Pecharromán Perosanz).
--- En marzo/abril de 2018, una ardilla en el pinar, en la zona de Fuentenebro (Burgos, cuadrícula VL39). (Carlos Pecharromán Perosanz).
--- En la noche del 13 de marzo de 2019, hacia las 20 h. 40 m., una ardilla muerta, atropellada, con la cola ,kpartida, entre Fuentelcésped y Fuentespina, cerca de Fuentespina (Burgos, cuadrícula). Mide ap. 25 cm. de cabeza y cuerpo (ap. 6 cm. de cabeza), y ap. 5´5 cm. de pie posterior. Es la primera ardilla, viva o muerta, que veo en esta comarca. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- En 2018/2019, varias observaciones de ardilla en Aranda de Duero (Burgos, cuarícula VM41). (Jesús Hernando Iglesias y Joel Reyes Núñez).

En las cuadrículas VL39 y VM40, la presencia de la ardilla no está señalada en el el "**Atlas de los Mamíferos Terrestres de España**" [Palomo Muñoz, L. J.; y Gisbert, J. (eds.), 2002; Dirección General de Conservación de la Naturaleza—SECEM—SECEMU, Madrid, 564 págs.; p. 351], ni en el "**Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España**" [Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J. C.; 2007; Dirección General para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU, Madrid, 588 págs.; p. 379].

En la ZEPA de las hoces del Riaza, las siete citas conocidas se refieren a la misma zona.
Si añadimos las inmediaciones del Refugio, el total de citas conocidas sube a 17, y hay más en zonas cercanas.

[Véase lo indicado acerca de esta especie en el trabajo sobre **los mamíferos del Refugio** (pág. 17), y en las **Hojas Informativas Nº 23** (pág. 47), **Nº 24** (pág. 82), **Nº 26** (págs. 100-101), **Nº 28** (pág. 83), **Nº 30** (pág. 97), **Nº 32** (pág. 133), **Nº 34** (págs. 162-163), **Nº 36** (pág. 152), **Nº 44** (págs. 63-64), **Nº 46** (pág. 64), y **Nº 48** (págs. 75-76).]

25.- **LIRÓN CARETO** (*Eliomys quercinus*) (1,[2],3,4) N

Hemos registrado 47 citas de la especie en la zona. Llaman la atención las pocas observaciones directas que conocemos, en el Refugio y su entorno, de un lirón vivo. (Véanse "***Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo***", pág. 18; y las **Hojas Informativas Nº 23** [pág. 47], **Nº 24** [pág. 83], **Nº 26** [págs. 101-102], **Nº 28** [págs. 83-84], **Nº 34** [pág. 163], **Nº 38** [pág. 162], **Nº 40** [pág. 197], **Nº 42** [pág. 69], y **Nº 46** [pág. 65]).

26.- **RATA DE AGUA** (*Arvicola sapidus*) (1,[2],4) N

Véase lo anotado sobre esta especie en "**Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo**" (págs. 18-19); y en las **Hojas Informativas Nº 34** (págs. 164-165), **Nº 36** (págs. 152-154), **Nº 38** (pág. 163), **Nº 40** (págs. 197-200), **Nº 42** (pág. 69), **Nº 44** (pág. 64), **Nº 46** (pág. 65), y **Nº 48** (pág. 76).

27.- ***TOPILLO LUSITANO (u OSCURO)** (*Microtus lusitanicus*) A (1,[2],[3],¿[4]?)

28.- **TOPILLO MEDITERRÁNEO (o COMÚN)** (*Microtus duodecimcostatus*) C (1,[2],3,4)

29.- ***TOPILLO AGRESTE (o RATILLA AGRESTE)** (*Microtus agrestis*) A E (4)

Véase lo indicado sobre esta especie en "**Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo**" (pág. 20), y en la **Hoja Informativa Nº 30** (pág. 99).

30.- **TOPILLO CAMPESINO (o RATILLA CAMPESINA)** (*Microtus arvalis*) (1,2,3,4) N

Notas.- 1) Nueva observación directa.- El 20 de abril de 2018, a las 13 h. 0 m., una ratilla campesina en el camino, entre la entrada al Refugio y el Pontón (cuadrícula 1). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

2) Sobre las cajas nido colocadas por GREFA (Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat), para el "*control biológico del topillo campesino*", con financiación de WWF España, véase lo indicado en la **Hoja Informativa Nº 42** (págs. 70-71, Nota 12), así como en el capítulo del cernícalo vulgar de las **Hojas Informativas Nº 43** (pág. 182, Nota 4), **Nº 45** (págs. 182-183, apartado I), **Nº 47** (págs. 181-182, apartado I), **Nº 49** (págs. 183-184, apartado I), y en el apartado sobre el cernícalo.

31.- **RATÓN DE CAMPO** (*Apodemus sylvaticus*) (1,2,3,4) N

Pasa de "**n**" a "**N**".

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-
--- El 17 de julio, a las 16 h. 41 m., veo muy cerca y bien un ratón de campo adulto, vivo, en el interior de una oquedad de la roca, en el páramo (cuadrícula 4). A las 16 h. 57 m., encuentro muy cerca una cría viva de la especie, con los ojos aún cerrados. Mide 9´3 cm. en total (5´2 cm. de cabeza y cuerpo, de los que 2´2 cm. son de cabeza y por tanto 3´0 cm. de cuerpo, y 4´1 cm. de cola). Desaparece internándose en un agujero de la roca. Luego veo de nuevo, un momento, al ratón adulto. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Se trata de la primera observación directa que conocemos, de una cría de la especie en el Refugio.

Otras observaciones directas.- Año 2018.-
--- El 10 de noviembre, a las 1 h. 48 m., un ratón de campo, en el camino entre Montejo y la fuente de la Vega. (Raúl González Rodríguez).

32.- **RATA NEGRA (o CAMPESTRE)** (*Rattus rattus*) C (1,3,4)

Nuevas citas: Año 2018.-

--- El 20 de mayo, a las 8 h. 8 m., un ejemplar atropellado, muerto, reciente, en la carretera entre Fuentemizarra y Moral de Hornuez, cerca de Moral (cuadrícula 3-4). Se obtienen fotos y medidas. Se deja el cadáver en un sitio apartado y visible desde lo alto. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 15 de agosto, a las 10 h. 11 m., un ejemplar atropellado, muerto, junto a Languilla (cuadrícula VL68). Se obtienen medidas. Se deja el cadáver en un sitio apartado y visible desde lo alto. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Como se indicó en las **Hojas Informativas Nº 40** (pág. 204) y **Nº 42** (pág. 71), en esta cuadrícula, VL68, la presencia de la rata negra no está señalada en el "**Atlas de los Mamíferos Terrestres de España**" [Palomo Muñoz, L. J.; y Gisbert, J. (eds.), 2002; Dirección General de Conservación de la Naturaleza—SECEM—SECEMU, Madrid, 564 págs.; p. 413], ni en el "**Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España**" [Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J. C.; 2007; Dirección General para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU, Madrid, 588 págs.; p. 456].

Las medidas de estas dos ratas campestres atropelladas son las siguientes:

	Cola	Cuerpo (A)	Cabeza (B)	A+B	Total	Oreja	Pie post.
20-5-2018	19´5 cm.	12 cm.	5 cm.	17 cm.	36´5 cm.	2´2 cm.	3´5 cm.
15-8-2018	19 cm.	11 cm.	3´5 cm.	14´5 cm.	33´5 cm.	2´2 cm.	3 cm.

La cola de la primera tenía ¿más de 190 anillos?

Véase lo indicado sobre esta especie en "**Los mamíferos del Refugio de Montejo (2ª parte)**" (pág. 14), así como en las **Hojas Informativas Nº 26** (pág. 104), **Nº 28** (pág. 87), **Nº 34** (págs. 168-169), **Nº 40** (págs. 204-206), **Nº 42** (pág. 71), y **Nº 46** (pág. 66).

33.- **RATA PARDA (o GRIS, o COMÚN)** (*Rattus norvegicus*) C (1,3,4)

Véase lo indicado sobre la rata gris en "**Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo**" (págs. 22-23), y en las **Hojas Informativas Nº 26** (pág. 104), **Nº 28** (pág. 87), **Nº 34** (pág. 169), **Nº 36** (pág. 156), y **Nº 44** (pág. 65).

34.- **RATÓN CASERO** (*Mus* [*musculus*] *domesticus*) (1,¿[2]?,[3],4) N

No hemos conocido nuevos registros en 2018.

35.- **RATÓN MORUNO** (*Mus spretus*) C (1,2,3,4)

No hemos conocido nuevos registros en 2018.

36.- ***LOBO** (*Canis lupus*) ([1],[2],[3],[4]) A

Puede verse lo indicado sobre el lobo en la **Lista de vertebrados del Refugio** (págs. 48-49), en los dos trabajos sobre los **mamíferos del Refugio** (págs. 54 y 8, respectivamente), y en **las Hojas Informativas Nº 23** (pág. 53), **Nº 24** (págs. 83-84), **Nº 26** (págs. 105-106), **Nº 28** (págs. 88-89), **Nº 30** (págs. 101-102), **Nº 32** (págs. 138-139), **Nº 34** (págs. 169-170), **Nº 36** (pág. 157), **Nº 38** (pág. 165), **Nº 40** (pág. 207), **Nº 42** (pág. 72), **Nº 44** (pág. 65), **Nº 46** (págs. 67-68), y **Nº 48** (pág. 78).

En los últimos años, en zonas próximas al Refugio, nuevos datos concretos y fiables sobre la presencia de algún lobo (o probable lobo), en el área de estudio o en zonas más o menos cercanas, han sido amablemente comunicados por distintas personas.

Notas.- 1) a) La presencia de algún grupo reproductor de lobo en la zona (cuadrículas VM30, VM40, VL49, y otras) está señalada en el siguiente y muy interesante trabajo:

--- Sánchez, A. M.; Estévez Estévez, R.; y Prieto, R. (2017). **Por la convivencia del hombre y el lobo. Aproximación al balance de mortalidad no natural del lobo ibérico.** Observatorio de la Sostenibilidad. Voluntariado del censo nacional del lobo ibérico; y Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del Medio Natural de la Universidad Politécnica de Madrid (entidades patrocinadoras). 80 págs. (Págs. 16, 18).

(Amablemente proporcionado por Javier Balset Izquierdo y por Francisco Javier Ortega Pinilla).

b) Tambien hay noticias, sobre el lobo en la comarca, en el siguiente artículo:

--- El Nordeste de Segovia (2018). **El lobo, una especie en eterno conflicto. / El lobo ibérico regresa a la comarca nordeste. / La loba coja.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 213, noviembre de 2018, págs. 9, 10-11. (Con cuatro fotografías, una de Juan José González Vega).

c) "*Cuando un lobo aúlla de noche, su sonido sacude la conciencia y más allá de la guerra ficticia que trata de enfrentar a ganaderos y naturalistas –que somos aliados-, el lobo es el símbolo de la conservación.*"

[Carlos de Hita Moreno, entrevistado por Teresa Sanz Tejero en "*El Adelantado de Segovia*" (domingo 1 de julio de 2018, págs. [1], 24-25; "**En los últimos 30 años el paisaje sonoro se ha vuelto más reseco**").]

2) Un nuevo libro sobre la especie, con datos y referencias de la zona estudiada, es el siguiente:

--- Sáenz de Buruaga Tomillo, M. (coord.); y otros (2018). **Lobos. Población de Castilla y León. Situación en España.** Ed. Rimpego. 208 págs. (Pp. [70], 80, 82, [85], 87, [91], 101, 105, 108, 116, 118, 122-123, 128-129, 130-131, 134-135, [143], 157, [161], [162], 171).
[En la pág. 58, en el pide de una foto tomada por Hipólito Hermández, se lee: "*Pocos momentos más intensos pueden vivirse en la naturaleza ibérica que contactar con el lobo, el gran depredador de la fauna europea.*"]

Observación.- A propósito de la presencia histórica del **OSO PARDO** (*Ursus arctos*), que desapareció de la zona mucho antes que el lobo [véanse, por ejemplo, los libros "**El oso pardo en España**" (Rafael Notario, SPCCPN, 1970), e "**Historia de la fauna de Soria**" (Tomo I; José Miguel García y Asensio, ASDEN, 1995)], recuérdese lo indicado en la **Lista de vertebrados del Refugio** (Apéndice 2, pág. 49), en el trabajo sobre los **mamíferos del Refugio** (pág. 55), y en las **Hojas Informativas Nº 26** (págs. 105-106), **Nº 30** (pág. 102), **Nº 34** (pág. 170), y **Nº 36** (pág. 158).

Un nuevo libro sobre la especie es el siguiente:
--- Martínez Rodríguez, E. (2018). **Viviendo con osos. / Somiedo, Asturias. 100 años de historias y leyendas. 1917-2017.** Ed. La Trébere. 286 págs.

37.- **ZORRO (ROJO)** (*Vulpes vulpes*) (1,2,3,4) N

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-

--- El 2 de mayo de 2018, a las 23 h. 56 m., un zorro no grande cruza la carretera, entre Villaverde de Montejo y Villavilla de Montejo, cerca de Villalvilla (cuadrícula 3). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Sobre atropellos.- Con los datos que hemos conocido en los años anteriores, obtenemos un total de 67 zorros atropellados en carreteras (38 de ellos en zonas cercanas), sin contar otros ocho zorros atropellados por el tren. De estos 67 zorros, 26 eran jóvenes. Veintiocho estaban en Burgos (incluyendo alguno en el límite provincial), tres en Soria (incluyendo uno cerca del límite con Segovia), y treinta y seis en Segovia. Diez se encontraban en la antigua C-114, entre Fuentelcésped y Peñalba (y dos más entre Peñalba y Alconadilla, y otro más cerca de Mazagatos); cuatro entre Fuentelcésped y Fuentespina, tres entre Fuentelcésped y Montejo, tres entre Maderuelo y Valdevarnés, uno entre Montejo y Valdevacas, y uno entre Fuentelcésped y Santa Cruz de la Salceda. Corresponden a los meses de enero (seis), febrero (tres), marzo (uno), abril ap. (uno), mayo (cuatro), junio (doce), julio (veinticuatro), agosto (seis), septiembre (cuatro), octubre (uno), noviembre (uno), y diciembre (tres), y uno más en verano. Vemos pues que el mes con más atropellos registrados es el de julio. Curiosamente, hasta ahora no se han encontrado zorros atropellados durante los censos colectivos de otoño, en noviembre. Por estaciones, ha habido tres zorros atropellados en otoño, trece en invierno, once en primavera, y 40 en verano.
Fuera del área de estudio, ha habido otros casos. (Véanse por ejemplo los reseñados en la **Hoja Informativa Nº 34**, pág. 172).

Sobre distintas referencias bibliográficas de zorros atropellados en España, véanse las recogidas en las **Hojas Informativas Nº 40**, págs. 209-210; y **Nº 44**, pág. 66.

Otros datos nuevos sobre mortalidad.-

I.- Como se indicó en la **Hoja Informativa Nº 32** (pág. 142), ya hemos tenido datos de ocho zorros atropellados por el tren en la zona, de los que dos fueron hallados en el viaducto y seis en el interior de los túneles. Seis fueron encontrados en verano (uno en julio y cinco en agosto), y dos en otoño (uno en octubre y uno en noviembre); aunque parte de ellos podían llevar tiempo muertos.

Sobre zorros atropellados por el tren en España, pueden verse referencias bibliográficas en la **Hoja Informativa Nº 40**, págs. 210-211.

II.- Con relación a los cadáveres de zorro comidos o no por los buitres, puede verse lo indicado en "**El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo**" (pág. 145, apartado 3.3.2; "Carroñas de animales salvajes"), en "**Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo**" (pág. 32, apartado 35.5.1; "Sobre la relación del zorro con el buitre leonado"), y en las **Hojas Informativas sobre el Refugio de Rapaces de Montejo Nº 23** (pág. 49, Nota P. 32), **Nº 26** (pág. 107, caso 3 de 2001), **Nº 32** (pág. 142), y **Nº 42** (pág. 73, atropellos en 2015). Véase también el último caso sobre atropellos, antes reseñado.

III.- --- Hacia mediados de marzo de 2018, se encuentra un cráneo de zorro en el término de Aldeanueva de la Serrezuela. (Yolanda Calleja Corento).

Con estos datos, ya son al menos 187-194 los zorros muertos de los que hemos tenido noticias en la comarca (incluyendo 97-100 en zonas más o menos próximas al área de estudio).

Nota.- Sobre los registros de zorros en los transectos mensuales realizados por WWF España, véanse las referencias señaladas en las **Hojas Informativas Nº 38** (pág. 169), **Nº 40** (pág. 211), **Nº 44** (pág. 67), **Nº 46** (págs. 69-70), y **Nº 48** (pág. 80).

Nuevos datos aparecen en:
--- WWF España (2019). **Informe anual del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia). Datos del año 2018.** Informe presentado el 13-3-2019, en la reunión del Patronato del Parque Natural. 26 págs. (sin los Anexos).

Según se indica en el mencionado Informe (pág. 11), el zorro "*tiene menos valores de los índices de abundancia que los obtenidos el año anterior*". (IKA: 0,013. IHA: 0,223.)

Y más adelante (pág. 23), se señala que el zorro "*mantiene valores de los índices de abundancia por debajo de los valores medios; tras la tendencia regresiva que mantuvo esta especie durante los años 2008-2012, parecía mostrar cierta tendencia de recuperación, pero en 2017 cambia esta tendencia positiva.*"

Sobre la predación de pollos de buitre leonado.- Los datos relativos a 2002 (con referencias también a los años anteriores, y a los casos publicados en otras zonas), 2003, 2004, 2005, y 2006, (2007), y 2008, pueden verse en las **Hojas Informativas Nº 25** (páginas 13-14 y 65-66), **Nº 26** (págs. 108-109), **Nº 27** (págs. 121-122, con referencias también sobre otras zonas), **Nº 29** (págs. 124-126), **Nº 31** (págs. 174-177), **Nº 33** (págs. [164], 166 –Notas B y C-), **Nº 34** (pág. 174), **Nº 35** (págs. 214, 220), y **Nº 45** (pág. 124), respectivamente.

Observaciones (y audiciones) curiosas.-

I. Año 2018 (a partir de abril).-

I.1.- El 22 de abril de 2018, a las 19 h. 22 m., un zorro hecho un anillo, en la margen derecha de Vallunquera (cuadrícula 4), en la cueva más grande (accesible) a la derecha del viejo nido Nº "3" de buitre leonado. A las 19 h. 24 m., el zorro se ha levantado, anda, y se vuelve a echar. Se pone a dormir, al parecer. A las 19 h. 28 m., el zorro sigue echado, y está despierto. A las 19 h. 38 m., el zorro sigue allí, al

parecer durmiendo. Después, a las 19 h. 47 m. y a las 20 h. 2 m., el zorro sigue durmiendo allí. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

(Recuerda la observación de un zorro durmiendo de día, en una cueva de un cortado, que realicé en Llano Fruto Benito el 2 de mayo de 2015 [véase la **Hoja Informativa Nº 44**, págs. 67 y 251]; y en una cueva de Peña Portillo el 13 de mayo de 2017 [véase la **Hoja Informativa Nº 48**, pág. 80]).

I.2.- En la noche del 9 de noviembre de 2018, a las 22 h. 53 m., un zorro, entre la Casa Rural y el cementerio de Montejo de la Vega. (José Luis Romero Carayol y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

En las cuadrículas VL89, VL69, VL04, VL29, VL39 (donde he constatado la reproducción), VL58, y VL59, donde se recogen citas de la especie en Hojas Informativas anteriores, la presencia del zorro no está señalada en el "**Atlas de los Mamíferos Terrestres de España**" [Palomo Muñoz, L. J.; y Gisbert, J. (eds.), 2002; Dirección General de Conservación de la Naturaleza—SECEM—SECEMU, Madrid, 564 págs.; p. 243], ni en el "**Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España**" [Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J. C.; 2007; Dirección General para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU, Madrid, 588 págs.; p. 278]. En los mencionados libros también se indica (págs. 243 y 277, respectivamente), a propósito del zorro, que "*las ausencias en el mapa de distribución se deben seguramente a falta de información*".

Ángel Javier España Báez y Ángel Iglesias Izquierdo, en su libro "**Guía de los carnívoros de Castilla y León y 10 Áreas Naturales para descubrirlos**" (Náyade Editorial, Valladolid, 2013, 464 págs.), señalan que, en el mapa de distribución del zorro, la aparente ausencia en algunas zonas (de Soria, Segovia y Zamora), "*con total seguridad se debe a falta de información de presencia del zorro en esas zonas*".

Comentario.- En las **Hojas Informativas Nº 24** (pág. 84, Nota 1), **Nº 26** (pág. 110, Nota 5), **Nº 30** (pág. 105, Nota 7), **Nº 32** (págs. 143-144, apartado 3, y pág. 146, apartado 15), **Nº 34** (págs. 174-176, apartados 1 y 2, y 178-179, apartados 18 y 21), **Nº 36** (págs. 159-160, y 164-165, apartados 1.3 y 1.4), **Nº 38** (págs. 165-174), **Nº 40** (págs. 207-217), **Nº 42** (págs. 75, 311-315), **Nº 44** (portada y págs. 68, 250-253), **Nº 46** (págs. 71, 242-247), y **Nº 48** (págs. 80, 302-305), puede verse una relación de fotografías o filmaciones anteriores del zorro en el Refugio, publicadas o aparecidas en distintos medios. Recuérdese que, ya en **T. 83**, se incluyeron (págs. 302-304) cuatro fotografías de una pareja de zorros en la ladera de Peña Portillo 2ª, obtenidas por José Velasco Cabas el 5 de febrero de 1983.

Nuevas fotografías de zorro son las que aparecen en el Anexo fotográfico.

II.- Sobre observaciones de zorro en el comedero de Campo de San Pedro (o junto al mismo), véanse las **Hojas Informativas Nº 30** (pág. 105, apartado 9), **Nº 32** (pág. 146, apartado 15), **Nº 36** (pág. 164, apartado III), y **Nº 38** (pág. 172, apartado II), y **Nº 48** (pág. 81, apartado II).

En el comedero de buitres del Refugio de Montejo (cuadrícula 4), ha habido, que sepamos, observaciones directas, del zorro, al menos en 1982 (a fines de abril, fuera de la verja), 1991 (el 8 de junio), 1994 (el 8 de enero), 2007 (hacia comienzos de junio; véase la **Hoja Informativa Nº 32**, pág. 146, apartado 14), 2015 (el 19 de julio; véase la **Hoja Informativa Nº 44**, pág. 68), 2016 (el 31 de marzo; véase la **Hoja Informativa Nº 44**, pág. 135), y 2018 (fotografiado con cámara automática, dos noches, en verano, por Carlos Cuéllar Basterrechea / GREFA, con WWF; véase el Anexo fotográfico).

III.- --- El 21 de marzo de 2018, a las 17 h. 2 m., en la ladera alta bajo La Catedral, dos corzos (hembras adultas) corren detrás de un zorro. (José Luis López-Pozuelo García).

Sobre registros anteriores de persecuciones de corzo a zorro, véanse las **Hojas Informativas Nº 32** (pág. 143, apartado 1 y comentario*), **Nº 34** (pág. 176, apartado 6), y **Nº 48** (pág. 82, apartado III).

IV.- Sobre zorros acosados por córvidos y otras aves, véanse "**Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo**" (págs. 33-34), y las **Hojas Informativas Nº 26** (pág. 110, Notas 6 y 7), **Nº 28** (pág. 91, Notas 4, 5 y 6), **Nº 32** (pág. 146, apartado 13), y **Nº 34** (pág. 177, apartado 13).

V.- En relación con los cadáveres de buitre leonado probablemente comidos por zorro, véanse el trabajo sobre **los mamíferos del Refugio** [pág. 29]; y las **Hojas Informativas Nº 23** [pág. 49], **Nº 24** [pág. 85], **Nº 26** [pág. 109], **Nº 28** [pág. 91], y **Nº 30** [pág. 104].

VI.- Como es bien sabido, se han realizado nuevos recuentos de zorros (números mínimos) en los censos de otoño. Pueden verse los resultados en los **Informes finales** correspondientes. Se incluyen gráficas sobre la evolución del número de zorros registrados cada año. Véanse, en particular, lo indicado por Juan Prieto Martín en el **informe del año 2000** (págs. 10-11); el **informe del año 2009** (págs. 36-37); y lo señalado en la **Hoja Informativa Nº 24** (pág. 85, Nota 4).

El resumen relativo al zorro, de los últimos censos de otoño, es el siguiente:

En el censo de otoño de 2010, con 65 participantes, fueron vistos al menos cuatro zorros. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 40-41).

En el censo de otoño de 2011, con 58 participantes, fueron vistos dos zorros. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 30-31).

En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes, fueron vistos cinco zorros (o seis). (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 42-43).

En el censo de otoño de 2013, con 66 participantes, fueron registrados seis zorros (cuatro vistos, uno oído, y uno fotografiado con cámara automatica). (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 33-34).

En el censo de otoño de 2014, con 74 participantes, fueron registrados cinco zorros (tres vistos, y dos filmados con cámaras automaticas). (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 31-32).

En el censo de otoño de 2015, con 94 participantes, fueron registrados de cuatro a seis zorros (vistos). (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 31-32).

En el censo de otoño de 2016, con 76 participantes, fueron registrados cinco zorros (vistos). (Véase el **Informe final** correspondiente, pág. 40).

En el censo de otoño de 2017, con 108 participantes, fueron registrados seis zorros (vistos). (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 34-35).

En el censo de otoño de 2018, con 125 participantes, fueron registrados seis zorros (cinco vistos y uno oído). (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 31-32).

Comentario.- Los censos de otoño en que se han visto más zorros son los de **1991** (al menos 12-16, seguramente no menos de 13-16, de los que 10-12 fueron vistos y 2-4 más sólo oídos), **2007** (al menos 10-13, de los que 8-11 fueron vistos y otros dos sólo oídos), **2004** (vistos 9-10), y **1990** (al menos 7-10, seguramente no menos de 8-10, de los que 6-7-8 fueron vistos y 1-2 más fueron sólo oídos).

VII.- El 11 de noviembre de 2018, a las 7 h. 0 m., un zorro con la cola pelada, en Las Torres. (Yolanda Arrabal Agüera, Coral Jiménez Herbón y Miguel Ángel Granado Iglesias).

Datos anteriores sobre zorros sin pelo o con muy poco pelo (que parecían tener sarna), o que presentaban la cola bastante pelada, pueden verse en las **Hojas Informativas Nº 40** (págs. 216-217), **Nº 44** (pág. 69), y **Nº 46** (pág. 72).

38.- **TEJÓN** (*Meles meles*) (1,2,3,4) N

Nuevas observaciones directas, o fotos, o filmaciones.- Año 2018 (a partir de marzo).-
(Las dos primeras citas de marzo aparecen también en la **Hoja Informativa Nº 48**, pág. 83).

--- En la noche del 4 de marzo, un tejón, visto, junto a la carretera de Fuentenebro a Pardilla, muy cerca de Fuentenebro (Burgos, cuadrícula VL39). El tejón va a los tubos de la cuneta. (José Antonio Hernando Iglesias y Mª Socorro García Vara).

--- En la noche del 8 al 9 de marzo, a las 1 h. 23 m., un tejón, visto, junto a la carretera de Valdevacas de Montejo a Moral de Hornuez, muy cerca de Moral (cuadrícula 3). El tejón sube por el terraplén de la cuneta. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- En la noche del 23 de marzo, un tejón visto, junto a la carretera de Fuentenebro a Pardilla, muy cerca de Fuentenebro (Burgos, cuadrícula VL39). (Yolanda Calleja Corento).
--- A mediados de julio, un tejón por Cantaburros (Aranda de Duero, Burgos, cuadrícula VM41), entre los ríos Arandilla y Duero. (Juan Carlos Ballano de la Viuda).
--- En la noche del 18 de septiembre, un tejón visto, junto a la carretera de Fuentenebro a la N-I (Burgos, cuadrícula VL39). Visto también, en la misma zona, en noches anteriores. (Yolanda Calleja Corento).

Comienzo de 2019.-
--- El 26 de febrero de 2019, a las 23 h. 11 m., un tejón en cultivos al pie de las bodegas más orientales de Milagros (23 h. 11 m.) ("*abandona el cultivo y sube hacia las bodegas caminando por la pista delante de las casas*"). (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el Refugio; Jesús Cobo Anula, asesor técnico de WWF en el Refugio; Joel Reyes Núñez, Keyla Mejía y Paola Mejía).

Comentario.- Ha habido ya, según los datos que conocemos, 104 observaciones directas de esta especie en el área de estudio (incluyendo 45 citas en zonas próximas, y sin incluir el foto-trampeo).

Casi todas las observaciones que conocemos del tejón en la zona tuvieron lugar de noche, aunque también hubo alguna al anochecer y al amanecer, una de día con cielo nublado (a primeros de abril de 2007; Alberto Fernández Honrubia), y cuatro de día en zonas cercanas (el 27 de enero de 2008 [fue vista una cópula, a las 9 h. 30 m.; Alfredo López Hernangómez, Antonio Cavadas Sanz y Manuel López Lázaro], el 25 de mayo de 2011 [el tejón, acosado por un perro, parecía enfermo; José Antonio Marina Díez], el 21 de junio de 2016 (a las 19 h. 57 m., en lo alto de la margen derecha del cañón del Botijas; Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo), y el 11/13 de agosto de 2016 [en llanos cerca de Santa Cruz; el tejón podía ser joven; Jesús Hernando Iglesias y Joel Reyes Núñez]). Véanse "**Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo**" (pág. 35), y las **Hojas Informativas Nº 24** (pág. 86), **Nº 32** (pág. 147), **Nº 34** (pág. 180), **Nº 36** (pág. 167), y **Nº 46** (pág. 73).

Por otra parte, aunque se han hallado bastantes tejoneras, conocemos muy pocos datos anteriores sobre la reproducción del tejón en la zona. Pueden verse en "**Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo**" (pág. 36), y en las **Hojas Informativas Nº 30** (pág. 36), **Nº 34** (pág. 180), **Nº 44** (págs. 70-71), y **Nº 46** (pág. 73).

Además, sólo conocemos siete observaciones de dos tejones juntos en la comarca (tres de ellas, en zonas cercanas). Las tres primeras están señaladas en la **Hoja Informativa Nº 34** (pág. 180), la cuarta en la **Hoja Informativa Nº 38** (pág. 175), la quinta y la sexta son mayo de 2014 ap. y del 20 de abril de 2015, respectivamente, y están reseñadas en la **Hoja Informativa Nº 42** (pág. 77); y la séptima, del 12 de mayo de 2015, aparece en la **Hoja Informativa Nº 44** (pág. 70).

Sobre el tejón como presa del búho, véanse los datos y referencias citados en las **Hojas Informativas Nº 42** (pág. 78), **Nº 44** (pág. 71, Comentario), y **Nº 46** (pág. 74).

Nuevas tejoneras.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 30 de marzo, una posible tejonera bajo Peña Águila (cuadrícula 3).

Con estos nuevos datos, se han descubierto ya varias decenas de tejoneras en el Refugio e inmediaciones, incluyendo las ya desocupadas. No menos de 42 han sido vistas por el autor. (Véanse las **Hojas Informativas Nº 24**, pág. 86; **Nº 26**, pág. 111; **Nº 28**, pág. 93; **Nº 30**, pág. 36; **Nº 32**, pág. 147, **Nº 34**, pág. 180; **Nº 36**, pág. 180; **Nº 38**, pág. 176; **Nº 40**, pág. 218, **Nº 42**, pág. 77; **Nº 44**, pág. 71; **Nº 46**, pág. 74; y **Nº 48**, pág. 84).

Nuevos datos sobre la mortalidad.-

Año 2018.- a) Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.

2018-1.- El sábado 16 de junio, a las 12 h. 50 m. ap., en la carretera de Fuentenebro a la N-I (Burgos, cuadrícula VL39), en la "curva de Moruga", Yolanda Calleja Corento me enseña un tejón muerto, grande, que me dicen fue atropellado el lunes 11.

2018-2.- El lunes 23 de julio, a las 22 h. 25 m., en la carretera de Fuentenebro a la N-I (Burgos, cuadrícula VL39), siguiendo las indicaciones de Juan Carlos Cano Calleja encuentro un tejón muerto, atropellado, reciente. Lo mido, y lo dejo en un lugar bien apartado de la carretera y visible desde el aire.

2018-3.- El viernes 3 de agosto, a las 10 h. 55 m., en la carretera de Espinosa de Cervera a Caleruega (Burgos, cuadrícula VM63), encuentro un tejón hembra atropellado, reciente (la noche anterior no estaba allí). Lo mido, y lo dejo en un lugar bien apartado de la carretera y visible desde el aire.

2018-4.- El sábado 11 de agosto, a las 18 h. 32 m., en la carretera de Moral de Hornuez a Fuentemizarra (Segovia, cuadrícula 4, VL59), encuentro un tejón hembra atropellado, muy reciente. Lo mido, y lo dejo en un lugar bien apartado de la carretera y visible desde el aire.

Las medidas de los tres últimos tejones atropellados (los dos últimos, hembras) son las siguientes:

16-6-18	Cabeza	Cuerpo	Ca+Cu	Cola	Total	Pie post.	Uña p.p.	C.U.P.D.
23-7-18	17 cm.	46 cm.	63 cm.	14 cm.	77 cm.	9 cm.		
3-8-18 h	17 cm.	54 cm.	71 cm.	19 cm.	90 cm.	11´5 cm.	1´1 cm.	4 cm. ap.
11-8-18h	16 cm.	65 cm.	81 cm.	14 cm.	95 cm.	12 cm.	1´6 cm.	4 cm. ap.

Uña p.p.- Uña del pie posterior.
C.U.P.D.- Cuerda de la uña de la pata delantera.

En la cuadrícula VM63, la presencia del tejón no está señalada en el "**Atlas de los Mamíferos Terrestres de España**" [Palomo Muñoz, L. J.; y Gisbert, J. (eds.), 2002; Dirección General de Conservación de la Naturaleza—SECEM—SECEMU, Madrid, 564 págs.; p. 275], ni en el "**Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España**" [Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J. C.; 2007; Dirección General para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU, Madrid, 588 págs.; p. 309]. En los mencionados libros también se indica (págs. 276 y 308-309, respectivamente), a propósito del tejón, la sospecha de que "*muchas de las cuadrículas en blanco sean muy probablemente zonas donde la especie está presente pero no ha sido aún detectada*".

En el nuevo mapa "**El tejón en España Central**" sigue sin aparecer la cuadrícula VM63.

b) El 13 de agosto de 2018, a las 8 h. 30 m., Samuel de la Iglesia Sanz encuentra un tejón atropellado, en la N-I, en el límite de las provincias de Burgos y Segovia (cuadrícula 3, VL49).

Comienzo de 2019.-

--- El 10 de marzo de 2019, a las 14 h. 55 m., un tejón muerto en la zona del Pontón (término de Montejo de la Vega, cuadrícula 1, estepa del norte). En torno al cadáver hay unos 20 buitres leonados, un alimoche adulto, y un milano real. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, y Joel Reyes Núñez).

Son 66 los tejones muertos de los que hemos tenido noticias en la zona (incluyendo 40 en zonas más o menos próximas). 38 de ellos (26 en zonas próximas) murieron atropellados. De estos 38 tejones atropellados, los 33 en que se conoce la fecha (de uno más se sabe que fue en verano) se reparten así: Uno en enero, dos en febrero, tres en abril, cuatro en mayo, cuatro en junio, nueve en julio, cinco en agosto, tres en septiembre, uno en octubre, y uno en noviembre. Si añadimos el caso del que se sabe que fue en verano (pero no el mes), tenemos un total de 34 tejones atropellados repartidos de la siguiente forma: Tres en invierno, nueve en primavera, veinte en verano, y dos en otoño.

Datos sobre tejones muertos en zonas cercanas del sur de Burgos, amablemente facilitados por el Servicio Territorial de Medio Ambiente (de la Junta de Castilla y León) en la citada provincia, pueden verse en la **Hoja Informativa Nº 28** (pág. 93). Otros datos, sobre zonas cercanas de Soria o Segovia,

figuran en las **Hojas Informativas Nº 32** (pág. 148), **Nº 34** (pág. 181), **Nº 36** (pág. 168), y **Nº 42** (págs. 78-79).

Véase también la **Hoja Informativa Nº 44**, págs. 71-72, Nota 1.

S/n.- ***ARMIÑO** (*Mustela erminea*)

Véase lo indicado sobre esta especie en la **Hoja Informativa Nº 26** (pág. 112).

39.- **COMADREJA** (*Mustela nivalis*) (1,2,3,4) N

Nuevas anotaciones.- Año 2018, y comienzo de 2019.-

--- El 18 de junio de 2018, "*excremento de comadreja en la puerta de la cabaña grande de Rinconada de la Hoz*" (Refugio de Montejo, cuadrícula 1). (Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias, de WWF España).
--- El 22 de febrero de 2019, a las 10 h. 30 m. ap. una posible comadreja en Fuentespina (Burgos). (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España).

El total de observaciones directas registradas es de 65, incluyendo 21 en zonas próximas.

S/n.- ***VISÓN AMERICANO** (*Mustela [Neovison] vison*) A I

Nota.- El 10 de octubre de 2018, excrementos y huellas de nutria y de un mustélido menor (posible turón o visón americano), junto al puente de Alconadilla. (José Luis López-Pozuelo García).

Véase lo indicado sobre esta especie en las **Hojas Informativas Nº 26** (págs. 112-113), **Nº 28** (págs. 94-95), **Nº 30** (pág. 108), **Nº 32** (pág. 149), **Nº 34** (pág. 182), **Nº 36** (págs. 169-170), **Nº 38** (págs. 178-179), **Nº 40** (págs. 178-179), **Nº 44** (pág. 72), **Nº 46** (págs. 75-76), y **Nº 48** (pág. 85).

Nota.- La presencia del visón americano en el río Riaza también está señalada en:
--- Palazón, S.; y Melero, Y. (2014). **Status, threats and management actions on the European mink Lutreola lutreola (Linnaeus, 1761) in Spain: a review of the studies performed since 1992.** *Munibe monographs, Nature series* 3: 109-118.
(Amablemente proporcionado por Francisco Javier Ortega Pinilla).

40.- ***TURÓN** (*Mustela putorius*) (1,¿2?,3,4) N

Nota.- El 10 de octubre de 2018, excrementos y huellas de nutria y de un mustélido menor (posible turón o visón americano), junto al puente de Alconadilla. (José Luis López-Pozuelo García).

Ha habido ya al menos 35 noticias del turón en la zona (incluyendo parajes próximos).

Incluyen diez u once observaciones directas de un ejemplar libre. Las cuatro primeras están reseñadas en "***Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo***" (pág. 38), la quinta en la **Hoja Informativa Nº 30** (pág. 108), las dos siguientes en la **Hoja Informativa Nº 32** (pág. 150); la octava, no segura, en la **Hoja Informativa Nº 36** (pág. 170); la novena, en la **Hoja Informativa Nº 42** (pág. 80); y la décima y la undécima, en la **Hoja Informativa Nº 44** (págs. 72-73). Además, hemos tenido noticias de tres capturas, en zonas cercanas de Burgos; las dos primeras, con liberación posterior, están recogidas en la **Hoja Informativa Nº 28** (pág. 95); la tercera aparece en la **Hoja Informativa Nº 36** (pág. 160).

Por otra parte, en la zona se han encontrado cinco turones muertos, según la información que conocemos. Pueden verse datos sobre los tres primeros en "***Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo***" (pág. 38), sobre el cuarto en la **Hoja Informativa Nº 30** (pág. 108); y sobre el quinto, en la **Hoja Informativa Nº 48** (pág. 85).

41.- **NUTRIA (PALEÁRTICA)** (*Lutra lutra*) (1,[2],3,4) N

Sobre la reproducción.- Informaciones sobre la reproducción de la especie allí, pueden verse en "***Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo***" (pág. 40), y en las **Hojas Informativas Nº 28** (págs. 95-96), **Nº 30** (págs. 109-111), **Nº 32** (págs. 150-151), **Nº 34** (pág. 183), **Nº 36** (págs. 170-171), **Nº 40** (pág. 222), **Nº 42** (pág. 81), **Nº 44** (pág. 73), y **Nº 46** (pág. 76). Véanse también el *Bolegyps* 29 ("**Observaciones de nutria**", pág. 1; María Melero de Blas, con Luis Suárez y Jesús Hernando; febrero de 2005), y el *Bolegyps* 42 ("**Récord de avistamientos en el censo de nutria**", pág. 1; María Melero de Blas, con Luis Suárez y Jesús Hernando; junio de 2007).

Censos colectivos.- Han sido realizados por voluntarios de WWF España (Adena). Los dieciocho primeros aparecen reseñados en la **Hoja Informativa Nº 40** (págs. 222-225); el nº 19, en la **Hoja Informativa Nº 42** (pág. 81); y el nº 20, con 35 participantes, en la **Hoja Informativa Nº 44** (págs. 73-74).

Un artículo más sobre estos censos de WWF, no citado en las Hojas Informativas anteriores, es el siguiente:

--- El Norte de Castilla (2013). **El recuento de nutrias en el Riaza confirma la calidad del ecosistema fluvial.** *El Norte de Castilla* (edición de Segovia), martes 25 de junio de 2013, pág. 10.

Otras observaciones directas, o fotografías.- Año 2018 (a partir de marzo).-

--- El 21 de marzo, a las 11 h. 35 m., un nutria, que parece joven (porque es pequeña), pasa bajo el puente de Alconadilla, río abajo. (José Luis López-Pozuelo García).

--- El 28 de marzo, una nutria junto al río, en Milagros (Burgos). (Juana Sanza).

--- El 24 de mayo, una nutria grande junto a la fuente del poblado del embalse. (Francisco Cebas Miguel, Francisco Camarero Rodríguez, y Francisco Javier Rojo Fernández, de la CHD).

--- El 21 de octubre, una nutria muy grande (al parecer macho, por el tamaño) junto al puente de madera más próximo a la presa, en el poblado del embalse. Se obtienen fotografías. (Candelas Iglesias Aparicio, durante las rutas guiadas de naturaleza de Abubilla Ecoturismo).

--- El 11 de noviembre, a las 13 h. 30 m., una nutria vista en el río Riaza, en Montejo de la Vega (Segovia, cuadrícula 1). (Anselmo Granado Sarabia).

--- El 15 de noviembre, una nutria vista en el río Riaza, cerca de Milagros (Burgos, cuadrícula 1). Es observada fuera del agua, y se sumerge en silencio. (José Liarte de Blas y Ricardo Ramos Sánchez).

Ya son 165 (al menos) las observaciones directas de nutria registradas en la zona (sin incluir las zonas cercanas), según la información que conocemos. La nutria ha sido vista allí en todos los meses del año.

--- Además, se han encontrado nuevos excrementos y rastros de nutria (en el Refugio y/o en zonas cercanas), etc. Por ejemplo, y entre otros datos, anotaremos los siguientes:

El 10 de octubre de 2018, excrementos y huellas de nutria, junto al puente de Alconadilla. (José Luis López-Pozuelo García).

El 10 de noviembre de 2018, entre las 11 h. 58 m. y las 12 h. 40 m.- Excrementos de nutria, en las charcas de Berlangas de Roa (Burgos, cuadrícula VM21). (Javier Vitores Casado, Cecilio San Miguel Gayubo y Carlos López Tello).

El 10 de noviembre de 2018, por la mañana, huellas claras de nutria, fotografiadas, en un pinar de Moral de Hornuez. (José Antonio Dávila García, Javier Eduardo Cabello Stom, y Marta Herrero Villar).

El 28 de enero de 2019, un excremento viejo de nutria, sobre una piedra, cerca del puente de Alconadilla. (José Luis López-Pozuelo García).

El 23 de febrero de 2019, excrementos de nutria, fotografiados, en la fuente cerca del poblado del embalse. (Francisco Jesús Fernández Herrera, y Sara Fernández Aguirre).

42.- **GARDUÑA** (*Martes foina*) (1,2,3,4) N

Nuevas observaciones directas, o filmaciones, o fotografías.-

Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 1 de mayo, en pleno día, a las 11 h. 55 m., en la margen izquierda del barranco de Valdecasuar (cuadrícula 3), en el Grupo del Sur, una garduña sale de un agujero horizontal justo a la izquierda del nido vacío Nº 112 del buitre leonado (a la derecha del viejo nido Nº γ del cernícalo).

Esta observación recuerda la realizada por el autor el 2 de mayo de 2012 (reseñada en la **Hoja Informativa Nº 38**, pág. 184).

--- El 5 de mayo, a las 22 h. 43 m., una garduña, bien vista, entre Aldealengua de Santa María y Languilla, no lejos de Aldealengua (cuadrícula VL68-VL69).

[Además, se han encontrado nuevos excrementos de garduña (en el Refugio y/o en zonas cercanas), etc. Véase, por ejemplo, lo anotado en el capítulo sobre invertebrados, a propósito de las almejas de río.]

Comentario.- Con los datos anteriores, ha habido ya, que sepamos, al menos 113 (110+3) observaciones directas (25 de ellas del autor, incluyendo tres dudosas) de la garduña en el área de estudio (incluyendo 37 en zonas próximas), además de otras sin fechar. Se incluyen tres filmaciones nocturnas con cámaras automáticas y luz infrarroja, en los censos de otoño; y catorce fotografías o filmaciones nocturnas con cámara automática (alguna en 2010 sin fechar, una en mayo de 2012, tres en 2013 -una en noviembre y dos en diciembre-, tres en 2015 –en enero-, dos en 2016 -una en octubre y una en diciembre- dos en 2017 –en enero-, y dos en 2018 –en junio-). Casi todas ellas han sido realizadas de noche (o al anochecer), pero ha habido siete citas de día. Se reparten entre todas las épocas del año, con predominio de junio y julio. Todas correspondían a un solo ejemplar; excepto la realizada por José Luis López-Pozuelo, Jesús Hernando y otros en la noche del 20 al 21 de junio de 1998, de dos ejemplares (seguramente un adulto y un cachorro crecido; véase la **Hoja Informativa Nº 24**, pág. 89); y la realizada por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo en la noche del 20 de julio de 2016, de dos ejemplares, como antes se indicó. Además, en la cita del autor del 9 de junio de 2004, reseñada en la **Hoja Informativa Nº 28** (pág. 98), aunque fue visto un solo ejemplar, debía haber más de uno, según se deduce de los gritos oídos.

La primera fotografía de una garduña en la zona, y la única (que sepamos) conseguida de día, fue obtenida por José Luis Nava Rueda, en el Reguero de los Pozos, el 22 de mayo de 1991; y figuró en la portada de "**Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo**" (véase también la página 41 de la misma publicación).

Las tres observaciones realizadas por el autor, de una garduña de día, corresponden al 9 de junio de 2004 (reseñada en la **Hoja Informativa Nº 28**, pág. 98), al 2 de mayo de 2012 (reseñada en la **Hoja Informativa Nº 38**, pág. 184), y al 1 de mayo de 2018 (antes reseñada).

Sobre la reproducción de la garduña en la zona, puede verse un resumen de los datos que conocemos en la **Hoja Informativa Nº 46**, pág. 79.

S/n.- Nota sobre el **MELONCILLO** (*Herpestes ichneumon*)

Véase lo indicado sobre esta especie en la **Hoja Informativa Nº 42** (págs. 84-85).

43.- **GINETA** (*Genetta genetta*) (1,3,4)

Pierde el asterisco (*)

Nuevos registros.- Año 2018.-
--- El 15 de junio de 2018, Santiago Sanz Rincón y Adolfo Frías Aguilera encuentran una gineta (un macho adulto) atropellada, muy reciente, aún caliente, entre Fuentenebro y Moradillo de Roa (provincia de Burgos, cuadrícula VL39), en el arroyo de la Vega de la Torre. Obtienen fotos. Me la enseñan.

Las medidas que obtuvimos fueron:

Cabeza	Cuerpo	Ca+Cu	Cola	Total	Pie pos.	Oreja	Pata tr.	Pata de.	Altura
11 cm.	39´5cm.	50´5cm.	46´5cm.	97 cm.	9 cm.	4´5 cm.	23 cm.	17 cm.	20 cm.

Pie pos.- Pie posterior. / Pata tr.- Pata trasera. / Pata de.- Pata delantera. / Altura.- Altura a la cruz.

Un artículo sobre ello es el siguiente:
--- Sanz Rincón, S. (2018). **Relato.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 21, octubre de 2018, págs. 26-27. (Con fotografías obtenidas por Santiago Sanz Rincón y Adolfo Frías Fernández).

(También pueden verse fotos en el Anexo fotográfico).

Comentario.- Se trata del primer dato que conocemos sobre la presencia de la gineta en la cuadrícula VL39, donde no está señalada en el "**Atlas de los Mamíferos Terrestres de España**" [L. Javier Palomo y Julio Gisbert (editores); Dirección General de Conservación de la Naturaleza – SECEM – SECEMU; Madrid, 2002, 564 pp.; pág. 291, ni en el "**Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España**" [Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J. C.; 2007; Dirección General para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU, Madrid, 588 págs.; pág. 331].

En los trece últimos años, hemos tenido pocas noticias nuevas de gineta. [Véanse "***Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo***" (págs. 43-44); y las **Hojas Informativas Nº 23** (pág. 51), **Nº 24** (pág. 90), **Nº 26** (pág. 116), **Nº 28** (pág. 98-99), **Nº 30** (págs. 111-115), **Nº 32** (pág. 154), **Nº 34** (pág. 190), **Nº 36** (págs. 180-181), **Nº 38** (pág. 187), **Nº 40** (pág. 234), **Nº 42** (pág. 85), **Nº 44** (pág. 76), **Nº 46 (**págs. 79-80), y **Nº 48 (**págs. 87-88).]

44.- **GATO MONTÉS** (*Felis silvestris*) (1,2,3,4) N

Nuevas observaciones directas, o fotos.- No hemos conocido datos posteriores a los señalados en la **Hoja Informativa Nº 48 (**pág. 88).-

---

Se han registrado ya 98 observaciones directas del gato montés en el área de estudio (incluyendo 33 en zonas próximas, e incluyendo ocho con fotos o vídeos obtenidos con cámara automática). (Véase lo indicado en las **Hojas Informativas Nº 36**, pág. 181; **Nº 38**, pág. 188; **Nº 40**, págs. 234-235; **Nº 42**, pág. 85; **Nº 44**, págs. 76-77; **Nº 46**, pág. 80; y **Nº 48**, pág. 88.)

Nota sobre el **LINCE** (*Lynx sp.*).-

Véase lo indicado sobre el lince en las **Hojas Informativas Nº 34** (págs. 190-191) y **Nº 36** (pág. 181); y en las referencias citadas allí, incluyendo "***Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo***" (pág. 55), y el Apéndice 2 de la "***Lista de vertebrados del Refugio de Rapaces de Montejo (1975-1992)***" (págs. 47-48)

45.- **JABALÍ** (*Sus scrofa*) (1,2,3,4) N

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018 (a partir de marzo).-

--- El 31 de marzo, a las 20 h. 0 m., un grupo familiar con uno o dos jabalíes adultos y más de ocho jóvenes, en el barranco de la Retuerta. (Xavier Parra Cuenca).

--- El 7 de abril, entre Vallunquera y la playa del embalse (cuadrícula 4), cuatro jabalíes: uno grande, y tres jóvenes crecidos. (Juan José Molina Pérez y otros).

--- El 30 de abril, a las 21 h. 33 m., tres jabalíes, vistos durante un buen rato. El primero (el que va delante) es un adulto grande, el segundo es algo menor, y el tercero es algo menor que el segundo (¿subadulto?). Van de la margen derecha a la margen izquierda de Vallejo del Charco, en la zona del Nº A (cuadrícula 2). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 23 de mayo, entre las 21 h. 19 m. y las 21 h. 23 m., dos jabalíes, uno grande y otro pequeño (como de menos de la mitad de tamaño), bien vistos y durante un rato, en lo alto del comienzo total de la ladera antes de Los Poyales (cuadrícula 4). Van bajando. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 8 de junio, en Vallejo del Charco, un total de 12 jabalíes: tres hembras adultas, dos bermejos, y siete rayones. (Lespicinio Abad Merino).

--- El 9 de junio, a las 9 h. 38 m., un jabalí grande con tres rayones (y no más), muy bien vistos y muy cerca, junto al río, en la orilla de la margen izquierda, frente a Peña de la Zorra. Los rayones maman, siguen a la hembra, etc. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 24 de julio, a las 14 h. 20 m., un jabato muerto, atropellado, en el camino cerca del farallón de Requijada (Segovia, cuadrícula VL25). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 19 de agosto, un rayón "*solo y despistado*", en el camino de Montejo a La Hocecilla (cuadrícula 1). (Xavier Parra Cuenca).

--- El 10 de noviembre, a las 16 h. 35 m.- 16 h. 39 m., seis jabalíes (dos adultos y cuatro jabatos) sobre Peña Rubia (Refugio de Montejo, cuadrícula 1). (Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra, José Luis Romero Carayol, Elías Gomis Martín, Silvia Gomis Tellés, Epifanio Ramos Gutiérrez, Nuria Álvarez-Acevedo Salan, y Beatriz Alonso Gómez).

--- El mismo día 10 de noviembre, a las 21 h. 10 m., cuatro jabalíes, un adulto y tres jabatos, cruzando la carretera de Valdevacas a Montejo. (Ángel Leiva Lozano).

Otras agrupaciones (de al menos cinco ejemplares).- Año 2018.-

--- El 21 de marzo, a las 12 h. 22 m., al menos siete jabalíes grandes, en el Valle Ancho (margen derecha del embalse, cuadrícula 4). (José Luis López-Pozuelo García).

--- En la noche del 27 de abril, durante un censo nocturno de WWF España, un total de 34 corzos, 8 jabalíes, dos liebres, un conejo, y dos perdices. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el Refugio).

--- El 18 de mayo, en la zona de Maluque, un total de unos 40-50 jabalíes, en distintos grupos (de cinco, ocho…). (Lucas Gadea Cáceres).

--- El 30 de mayo, en la zona de Vallejo del Charco, 20 jabalíes. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio).

--- El 11 de noviembre, a las 9 h. 48 m., cinco jabalíes, en Castroboda. (Javier Cano Sánchez y Carlos Cano Barbacil).

--- El 11 de noviembre, a las 9 h. 3 m., un jabalí en Peña Portillo 2ª; y a las 10 h. 0 m., cuatro jabalíes más (distintos del anterior, con lo que el total es de cinco jabalíes), en Peña Portillo 2ª. (Alejandro Manuel Gil Gutiérrez).

--- El mimo día 11 de noviembre, a las 9 h. 50 m., siete jabalíes adultos, todos de buen tamaño, pasan muy cerca del observador. Vienen junto al monte de Linares y van hacia las eras de Linares. (Juan Francisco Martín Calleja).

--- El 26 de diciembre, a las 12 h. 56 m., dos jabalíes muy grandes, hembras, vistas muy cerca, en el talud del viaducto viejo; y poco después, no lejos de allí, tres jabalíes más, una hembra adulta y dos jóvenes casi de su tamaño, más pardos que bermejos. (José Luis López-Pozuelo García).

--- El 27 de diciembre, a las 18 h. ap., doce jabalíes, en la zona de Maluque. (Juan José Molina Pérez y Leo Molina Novo).

Comienzo de 2019.-

--- En la noche del 26 de febrero de 2019, durante un censo nocturno de WWF España, un total de 90 corzos, 27 jabalíes, siete liebres, y un conejo. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el Refugio; Jesús Cobo Anula, asesor técnico de WWF en el Refugio; Joel Reyes Núñez, Keyla Mejía y Paola Mejía).

(Sobre las mayores agrupaciones de jabalíes citadas en el Refugio, en años anteriores, pueden verse datos en "**Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo**", pág. 47; y en las **Hojas Informativas Nº 23** [págs. 51-52], **Nº 24** [págs. 90-91], **Nº 26** [págs. 117-118], **Nº 28** [págs. 99-100], **Nº 30** [págs. 115-116], **Nº 32** [págs. 157-158], **Nº 34** [págs. 191-194], **Nº 36** [págs. 182-183], **Nº 38** [págs. 189-191], **Nº 40** [págs. 238-239], **Nº 42** [págs. 86-87], **Nº 44** [págs. 77-78], **Nº 46** [págs. 81-82], y **Nº 48** [págs. 89-90]; y en los **Informes finales** de los censos de otoño).

Otras observaciones interesantes o curiosas.- Año 2018.-

--- El 6 de abril, a las 8 h. 45 m., dos jabalíes grandes bajo Peña de la Zorra, que al parecer habían dormido allí. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio).

--- El 5 de mayo, a las 1 h. 0 m., en la estepa cerealista del norte del Refugio de Montejo, al noroeste del Montón de piedras Nº 3, cuatro jabalíes grandes; al menos uno parece hembra, quizás todos sean hembras; unos esperan, al parecer, a los otros. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 9 de mayo, a las 14 h. 20 m., un jabalí grande, en la ladera alta de la margen izquierda del Circo del Águila. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 25 de mayo, a las 12 h. 46 m., un jabalí grande, bien visto y oído, durante un buen rato, en la parte alta y entrada de V:A.D., justo después de la curva (cuadrícula 4); y a las 21 h. 50 m., dos jabalíes, en el valle al nordeste del Llano de la Raya (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 27 de julio, a las 17 h. 0 m. ap., un jabalí sale de unos juncos entre cultivos, entre San Esteban de Gormaz y Pedraja de San Esteba (Soria, cuadrícula VM80), en el término de San Esteban, cerca de límite. (Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García, Jesús Javier Andrés Rodríguez, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 10 de agosto, a las 22 h. 44 m., cuatro jabalíes, grandes, cruzan de norte a sur el camino de Vallejo del Charco a la cta. Sg-945. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 11 de noviembre, a las 20 h. 30 m., un jabalí cruza la carretera, entre Grajera y Boceguillas (cuadrícula VL47). (Fernando Ávila Vico).

--- El 13 de noviembre, a las 17 h. 44 m., un jabalí grande, bien visto, en el prado de una ladera, cerca de Santibáñez de Ayllón (cuadrícula VL77). / El mismo día, a las 18 h. 58 m., un jabalí cruza la carretera Sg-945, en la zona donde bordea el embalse (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

La presencia del jabalí en las cuadrículas VL47 y VM80 no está señalada en el "**Atlas de los Mamíferos Terrestres de España**" [L. Javier Palomo y Julio Gisbert (editores); Dirección General de Conservación de la Naturaleza – SECEM – SECEMU; Madrid, 2002, 564 pp.; pág. 307], ni en el "**Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España**" [Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J. C.; 2007; Dirección General para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU, Madrid, 588 págs.; pág. 349].

Comienzo de 2019.-

--- El 10 de marzo, a las 10 h. 45 m., dos jabalíes en el Coto Maluque, junto a la carretera SG-945. (Juan José Molina Pérez).

Nuevos datos sobre la mortalidad.-

a) Caza.- Año 2018.-

--- Sobre los jabalíes abatidos en las cacerías organizadas en enero o febrero, en varias localidades cercanas, véase la **Hoja Informativa Nº 48**, pág. 89.

--- En enero o febrero, dos jabalíes enfermos llegaron junto a las casas del poblado del embalse de Linares, en el Refugio de la CHD, y murieron un par de días después. (Francisco Cebas Miguel, Francisco Camarero Rodríguez, y Francisco Javier Rojo Fernández, de la CHD).

--- El 12 de noviembre, a las 11 h. 53 m., restos de un jabalí muerto, en Vallejo del Charco. (Jesús Hernando Iglesias [guarda de WWF España], Fernando Jiménez Raigón, Mar Gasco González, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 8 de diciembre, no se vieron jabalíes en una cacería en Fuentenebro (Burgos), según las noticias recibidas.

--- El 9 de diciembre, se mataron 54 jabalíes en una cacería en Castillejo de Robledo (Soria), y dos más en una cacería en Valdanzo (Soria), según las noticias recibidas.

--- El 15 de diciembre, se mataron 7 jabalíes en una cacería en Aldehorno (Segovia), según las noticias recibidas.

Comienzo de 2019.-
--- A últimos de febrero, se mataron 3 jabalíes en una cacería en Fuentenebro (Burgos), según las noticias recibidas.

b) Atropellos en carreteras.- Año 2018 (a partir de abril).-
--- El 24 de julio, a las 14 h. 20 m., un jabato muerto, atropellado, en el camino cerca del farallón de Requijada (Segovia, cuadrícula VL25). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
La presencia del jabalí en la cuadrícula VL25 no está señalada en el "**Atlas de los Mamíferos Terrestres de España**" [L. Javier Palomo y Julio Gisbert (editores); Dirección General de Conservación de la Naturaleza – SECEM – SECEMU; Madrid, 2002, 564 pp.; pág. 307], ni en el "**Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España**" [Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J. C.; 2007; Dirección General para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU, Madrid, 588 págs.; pág. 349].

Hasta la fecha, hemos sabido de 22 jabalíes atropellados en las inmediaciones del Refugio (cinco) o en zonas cercanas (once): uno en 1993 –en una zona cercana-, tres en 1996, uno hacia 1998, tres en 2000 –en zonas cercanas-, uno en 2001 –en una zona cercana-, uno en 2003, dos en 2007 –en zonas cercanas-, tres en 2008 –rayones, en una zona próxima-, uno en 2010 –en una zona cercana-, uno en 2013 –en una zona próxima-, y cinco en el comienzo de 2018 –cuatro, en una zona próxima-; sin contar uno más en una zona relativamente cercana. Siete de ellos fueron llevados al comedero de buitres de Montejo (uno en 1996, tres en 2000, uno en 2001, uno en 2003, y uno en 2013). Sin contar el de 1998 del que no tenemos la fecha del accidente, los 21 restantes corresponden a los meses de enero (uno), febrero ap. (uno), marzo (cinco), abril (cuatro), abril o mayo (tres, rayones), agosto (dos), octubre (dos), noviembre (dos) y diciembre (uno). Pueden verse más datos en las **Hojas Informativas Nº 20** (pág. 14), **Nº 23** (pág. 52), **Nº 26** (pág. 119), **Nº 28** (pág. 100), **Nº 32** (pág. 159), **Nº 34** (pág. 196), y **Nº 40** (pág. 239).

Nota.- Una importante información sobre el problema de los atropellos de jabalí aparece en el detallado trabajo "**Mortalidad de vertebrados en carreteras. Proyecto provisional de seguimiento de la mortalidad de vertebrados en carreteras (PMVC)**" (Documento Técnico de Conservación de la SCV, Sociedad para la Conservación de los Vertebrados, Nº 4; Madrid, 2003, 346 pp.; págs. 34 y 159-160; 87 casos). Según se indica allí, "*parece que ha aumentado el número de atropellos en los últimos años, quizás por aumentos locales de su población*". Por otra parte, "*los jabalíes sufren más atropellos entre octubre y enero, posiblemente por su celo invernal y la coincidencia con la época de caza, que incrementan sus movimientos*".
(Véanse también las referencias citadas en las **Hojas Informativas Nº 26** [pág. 119], **Nº 30** [pág. 117], y **Nº 32** [pág. 159]).

c) Otros.- Año 2018.-
--- Hacia mediados de marzo, se encuentra un cráneo de jabalí en el término de Aldeanueva de la Serrezuela. (Yolanda Calleja Corento).

Notas.- 1) Entre todas las camas de jabalí vistas (y registradas) en 2018, por el autor, destacan:
--- Una cama de jabalí que encontré el 2 de abril, en el Reguero Bañuelos (cuadrícula 3).
--- Una gran cama de jabalí que encontré el 15 de abril, en el fondo del barranco de Valtejo (cuadrícula 4).
--- Una posible gran cama de jabalí que encontré el 24 de mayo, en los páramos del nordeste (cuadrícula 4).
--- Una gran cama de jabalí que encontré el 24 de mayo, junto a la mayor encina alta de D.E.L.C. (cuadrícula 4).
--- Una cama de jabalí que encontré el 24 de mayo, bajo un gran enebro de la miera, en lo alto de D.E.L.C., casi en la esquina frente a V.A.I. (cuadrícula 4).
--- Una cama de jabalí que encontré el 24 de mayo, bajo una sabina, en lo alto de la margen derecha de D.E.L.C. (cuadrícula 4).

--- Una gran cama de jabalí que encontré el 26 de mayo, cerca de la boca sur del viejo túnel al sur del viaducto (cuadrícula 4).
--- Una cama de jabalí que encontré el 29 de mayo, en la margen derecha del barranco de El Gordo (cuadrícula 4).
--- Una cama de jabalí que encontré el 2 de junio, en lo alto de Las Torcas 1ª (cuadrícula 4).
--- Una gran cama de jabalí que vi el 8 de junio, en lo alto de Peña Cuervo, después del Circo del Águila (cuadrícula 4).
--- Una cama de jabalí que vi el 17 de julio, junto a una sabina, en la ladera de la margen derecha del barranco de Valtejo (cuadrícula 4).

(Véanse las **Hoja Informativas Nº 40** [pág. 241, Nota y foto], **Nº 42** [pág. 87, Nota 1, y pág. 383, foto], **Nº 44** [pág. 79, Nota 1, y pág. 261, fotos], y **Nº 46** [págs. 83-84, Nota 1, y pág. 268, foto], y **Nº 48** [pág. 92, Nota 1, y pág. 268, foto]).

2) Conocemos pocas fotos o películas de jabalí vivo y libre en la zona. Se refieren sobre todo a los días 9 de abril de 1991 ap. (un jabalí macho en la ladera del barranco de Valugar, fotografiado por el guarda Juan Francisco Martín Calleja; citado en la Hoja Informativa Nº 19, pág. 16), 13 de junio de 1996 (una hembra adulta –había dos, y doce rayones- en la ladera del 2º Cañón, fotografiada por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo; citada en la Hoja Informativa Nº 23, págs. 51-52), 27 de mayo de 1998 (un grupo de jabalíes –había treinta- en Canto Chico, cerca de La Carceleja, fotografiado por el guarda Juan Francisco Martín Calleja; citado en la Hoja Informativa Nº 24, pág. 91), 13 de mayo de 2002 (un jabalí –había dos- en la ladera del barranco del Boquerón, fotografiado por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo; citado en la Hoja Informativa Nº 26, pág. 119), 2004 ap. (una filmación de una lucha entre dos jabalíes, al anochecer, se incluye en el reportaje de Juan José Andrés y otros (TVE-Castilla y León), titulado "*Refugio de convivencia. 30 años de ADENA en Montejo*", emitido en la 2ª cadena de Televisión Española [La 2], para Castilla y León, el 13 de enero de 2005; citado en la Hoja Informativa Nº 28, pág. 101, Nota 3), 2005 (dos jabalíes filmados por Juan José Molina Pérez; citado en la Hoja Informativa Nº 30, pág. 119), 14 de mayo de 2005 (una jabalina con tres rayones, filmada en el barranquillo del Reloj por Juan José Molina Pérez; citado en la Hoja Informativa Nº 30, pág. 119), 30 de mayo de 2006 (dos hembras con al menos cinco rayones, en V.A.I. [en lo alto de la ladera, bajo la peña], fotografiadas por Juan José Molina Pérez; citado en la Hoja Informativa Nº 30, pág. 119), 26 de mayo de 2008 (a las 17 h. 57 m., 4-6 jabalíes grandes y algún rayón, en un campo de cebada del sabinar del norte; fotografiados por Jorge Sierra Antiñolo, con Jesús Hernando Iglesias; citado en la Hoja Informativa Nº 32, pág. 157), 31 de mayo de 2008 (jabalíes en el Tercer Valle –había dos grandes y cuatro rayones, y otros dos jabalíes se vieron cerca-, fotografiados por José Luis Pacheco, durante una visita a las hoces realizada por 16 miembros de Izate; la foto apareció en el blog "Miradas cantábricas"; Hoja Informativa Nº 32, pág. 157), 8 de noviembre de 2008 (siete jabalíes, dos adultos y cinco bermejos, en la ladera de Valdecasuar / 2º Cañón; Ricardo Pérez Rodríguez, durante el censo de otoño; la foto apareció en "flickr", y en la Hoja Informativa Nº 34 [págs. 191-192]), 5 de enero de 2009 (cinco jabalíes al menos [había ocho o nueve], en Peña Portillo, junto a la base del cortado; Juan José Molina Pérez, con Jesús Hernando Iglesias; dos fotos aparecieron en la Hoja Informativa Nº 34 [págs. 192-193]), 14 de noviembre de 2010 (en la noche del 13 al 14, un jabalí filmado, con cámaras automáticas y luz infrarroja, en la margen izquierda del río, bajo La Catedral; Jorge Manuel Hernández Núñez), 2010 (un jabalí fotografiado con las cámaras trampa instaladas por WWF; citado en la Hoja Informativa Nº 34, pág. 198), 12/13 de noviembre de 2011 (en la noche del 12 al 13, jabalíes filmados, con cámaras automáticas y luz infrarroja, cerca del río, bajo V.A.D.; Bruno Chacón Espinosa e Iván Chacón Espinosa; citado en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 187), 12 de diciembre de 2011 (un jabalí fotografiado de noche, durante una actividad de foto-trampeo en un máster en biología de la conservación de la Universidad Complutense de Madrid; citado en la Hoja Informativa Nº 36, pág. 187), 25 de febrero de 2012 (a las 18 h. 10 m., un jabalí hembra con una cría, en el Refugio de la CHD; Juan Francisco Martín Calleja), 21 de abril de 2012 (un jabalí, a las 19 h. 35 m., en el Refugio de la CHD; Juan Francisco Martín Calleja), 7 de enero de 2013 (a las 11 h. 52 m., nueve jabalíes, de diferentes edades, en Encinas; Héctor Miguel Antequera; señalado antes), noche del 3 de junio de 2013 (jabalíes en Maluque; Héctor Miguel Antequera), noche del 7 al 8 de junio de 2013 (un rayón, en la carretera SG-945, en la margen derecha del embalse; Héctor Miguel Antequera), julio / agosto de 2013 (al anochecer, dos jabalíes grandes que acuden a beber en el embalse, junto al embarcadero; Héctor Miguel Antequera), 5 de octubre de 2013 (a las 11 h. 26 m., jabalíes subiendo por la ladera de D.E.L.C.; Xavier Martín Vilar y Mar Cuadrado Gutiérrez), noche del 20 al 21 de octubre de 2013 (a las 0 h. 53 m., un jabalí en la orilla izquierda del embalse, frente al Montón de Trigo, fotografiado con cámara automática de visión nocturna; Héctor Miguel Antequera), 15 de diciembre de 2013 (a las 12 h. 45 m., en el páramo de Languilla, dos jabalíes corriendo, perseguidos por

perros; José Manuel Boy Carmona), tarde del 15 de noviembre de 2013 (visto un grupo de doce jabalíes bajo La Catedral; se obtienen dos filmaciones en vídeo, en las que se ven al menos seis jabalíes, en una saltando un tronco y en la otra cruzando el río; Jorge Manuel Hernández Núñez), tarde del 25 de febrero de 2014 (entre las 18 h. 0 m. y las 18 h. 30 m. ap., en el sabinar del norte del Refugio, entre Vallejo Covacha y Vallejo Pobre, un grupo de cinco jabalíes -una hembra grande, una hembra de menor tamaño, y tres ejemplares más pequeños-, filmados; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España), tarde del 27 de marzo de 2014 (hacia las 18 h. 35 m. ap., un jabalí fotografiado, en el barranco D.E.L.C.; Héctor Miguel Antequera), ap. 2014 (jabalí en el término de Maderuelo; Lespicinio Abad Merino), 22 de mayo de 2014 (al anochecer, un jabalí hozando en la ladera de La Hocecilla; Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo), 3 de junio de 2014 (un jabalí, en el barranco de Valtejo; Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo), 28 de agosto de 2014 (jabatos corriendo o saltando, cerca de Languilla; José Manuel Boy Carmona), y tarde del 8 de noviembre de 2014 (a las 17 h. 32 m., siete jabalíes, dos adultos y cinco crías, filmados, en campos y laderas cerca de Peña de la Zorra; Juan Miguel Velasco de Miguel), mañana del 9 de noviembre de 2014 (a las 8 h. 8 m., una jabalina dando de mamar a tres rayones, bajo V.A.D.; Bruno Chacón Espinosa), enero de 2015 (jabalíes filmados, con cámara de fototrampeo, junto a las charcas burgalesas de Villalba de Duero; Jesús Moneo Gayubo), 14 de marzo de 2015 (un jabalí en Maluque, cerca de la SG-945; Héctor Miguel Antequera), aparte de los dos rayones antes referidos en marzo de 2015 (Lespicinio Abad Moreno, y Héctor Miquel Antequera), 30 de mayo de 2015 (dos jabalíes, cerca de P. D.Z.; Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo), 7 de noviembre de 2015 (una hembra de jabalí con cinco bermejos, bajo una sabina, en Peña fueros derecha; José Luis Armendáriz Sanz y Francisco Jesús Fernández Herrera), 8 de noviembre de 2015 (cinco jabalíes, encamados en la ladera bajo El Corralón; Miguel Briones Díez), 13 de marzo de 2016 (una cama de jabalí con tres rayones, en lo alto de El Corralón; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España), 25 de marzo de 2016 (un jabalí "*bastante grande, con el pelaje bastante claro*", "*en la zona del aparcamiento del embalse cercano a la isla"*; Xavier Parra Cuenca), 14 de junio de 2016 (siete jabalíes grandes con dos crías, de 14 ejemplares que había, en el nordeste del Refugio; Juan José Molina Pérez), s/f (tres jabalíes grandes con al menos siete crías, en el término de Maderuelo; Juan Francisco Martín Calleja), 4 de octubre de 2016 (en la noche del 3 al 4, un jabalí que come de una corza atropellada, en el suroeste de Soria; Cristian Calvo Vergara), y 7 de diciembre de 2016 (un jabalí, con fototrampeo, de noche, en el suroeste de Soria; Fermin Redondo Ramírez / Cristian Calvo Vergara). Posteriormente, en enero y marzo de 2017, varias fotos de jabalí con fototrampeo, en el suroeste de Soria (Fermín Redondo Ramírez / Cristian Calvo Vergara). / El 29 de marzo de 2017, un jabalí fotografiado durante un censo nocturno de WWF España (puede verse la foto en el Informe anual de 2017 sobre el Refugio, pág. 14). / El ¿29 de abril? de 2017, hasta seis jabalíes (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España). / El 10 de mayo de 2017, una jabalina con cuatro rayones, en la ladera de La Catedral (Candelas Iglesias Aparicio). / El 11 de mayo de 2017, a las 21 h. 15 m. ap., dos jabalíes filmados (había ocho), entre Pradales y Aldeanueva de la Serrezuela (Mariano Castro Carravilla). / Los días 1 y 3 de agosto de 2017, dos y un jabalíes, respectivamente, junto a la charca de Villálvaro (Soria, cuadrícula VM81), fotografiados con cámara automática (Fermín Redondo Ramíres, Cristian Carlo Vergara y Gabriel Redondo Jáuregui). / El 12 de noviembre de 2017, cuatro jabalíes, dos grandes y dos jóvenes, en Peña Rubia (Juan José Molina Pérez y Raúl González Rodríguez). / El 30 de diciembre de 2017, al menos cuatro jabalíes, de los que uno es joven, fotografiados con cámara automática, en el suroeste de Soria. (Fermín Redondo Ramíres, Cristian Carlo Vergara y Gabriel Redondo Jáuregui). / El 7 de abril de 2018, cuatro jabalíes, fotografiados, junto a la Sg-945, cerca del desvío a la presa. (Juan José Molina Pérez). / El 30 de abril de 2018, dos jabalíes, fotografiados, en la zona de Vallejo del Charco. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio). / El 19 de agosto de 2018, un jabalí, fotografiado, en Montejo de la Vega. (Xavier Parra Cuenca).

(Sobre fotos publicadas de jabalíes cazados en la zona, véase la **Hoja Informativa Nº 32**, pág. 161, Nota 7).

3) Sobre los transectos realizados por WWF, véanse las las **Hojas Informativas Nº 36** (págs. 187-188, Notas 5 y 6), **Nº 38** (pág. 194, Nota 3), **Nº 40** (págs. 242-243), **Nº 42** (pág. 89), **Nº 44** (pág. 80), **Nº 46** (pág. 85), y **Nº 48** (pág. 94).

Nuevos datos aparecen en:

--- WWF España (2019). **Informe anual del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia). Datos del año 2018.** Informe presentado el 13-3-2019, en la reunión del Patronato del Parque Natural. 26 págs. (sin los Anexos).

Según se indica en el mencionado Informe (pág. 11), el zorro "*el corzo y el jabalí continúan mostrando una tendencia positiva en los valores de abundancia, y en 2018 se obtiene el 2º valor más alto para los índices de todo el periodo (el valor más alto se obtuvo el año anterior)*". (IKA: 0,182. IHA: 2,911.)

4) En el censo de otoño de 2010, con 65 participantes, se registraron al menos unos 19-20 jabalíes, de los que 18-19 fueron vistos (incluyendo uno filmado). (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 41-42).

En el censo de otoño de 2011, con 58 participantes, se registraron al menos unos 12-13 jabalíes, de los que como mínimo 12 fueron vistos, y uno oído. Además, se filmaron jabalíes, y se encontró el cráneo de un jabalí. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 31-32.)

En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes, se registraron al menos 15-22 jabalíes, de los que como mínimo 14-21 fueron vistos, y uno oído. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 44-45.)

En el censo de otoño de 2013, con 66 participantes, se registraron al menos 12 jabalíes (vistos). (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 34-35.)

En el censo de otoño de 2014, con 74 participantes, se registraron al menos unos 23-24 jabalíes (23 vistos). (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 32-33).

En el censo de otoño de 2015, con 94 participantes, se registraron al menos unos 40 jabalíes (19 grandes y 21 pequeños, todos ellos vistos). (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 32-33).

En el censo de otoño de 2016, con 76 participantes, se registraron al menos unos 13 jabalíes (12 vistos [unos cinco grandes, tres medianos, y cuatro crías], y al menos otro sólo oído). (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 40-41).

En el censo de otoño de 2017, con 108 participantes, se registraron al menos unos 45 jabalíes (vistos; incluyendo como mínimo 22 grandes, entre los que se determinaron dos machos y dos hembras, y doce jóvenes –entre ellos, ocho bermejos y dos rayones-). (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 36-38).

En el censo de otoño de 2018, con 125 participantes, se registraron al menos unos 37 jabalíes (vistos) [incluyendo como mínimo 8 grandes, entre los que se determinaron uno o dos machos grandes, y siete jabatos]. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 32-33).

Comentario.- Los censos de otoño en que se han registrado más jabalíes son los de **2017** (al menos unos 45, incluyendo al menos 22 grandes y 12 jóvenes, todos ellos vistos), **2015** (al menos unos 40, 19 grandes y 21 pequeños, todos ellos vistos), **2018** (al menos unos 37, todos ellos vistos, incluyendo al menos ocho grandes y siete jabatos), **2006** (al menos unos 19-23, probablemente 25-32, de los que uno fue sólo oído), **2014** (al menos unos 23-24, de los que 23 fueron vistos), **2007** (al menos 16-23, de los que 0-1 fueron sólo oídos), **2010** (al menos unos 19-20, de los que uno fue sólo oído), **1998** (al menos 18), **2009** (al menos unos 17-19), **2012** (al menos 15-22, de los que uno fue sólo oído), **2000** (al menos 14-21), y **1990** (al menos unos 16).

46.- ***CIERVO (ROJO)** (*Cervus elaphus*) (4) A

Nota.- En Vildé (Soria, cuadrícula VL99), un pastor al parecer vio un ciervo el 23 de julio de 2018 ap., según comunican agentes medioambientales de Soria.

Véase lo indicado sobre el ciervo en las **Hojas Informativas Nº 28** (pág. 101), **Nº 34** (pág. 199), **Nº 36** (pág. 188), **Nº 38** (pág. 195), **Nº 40** (pág. 244), y **Nº 46** (pág. 86). También, en las **Hojas Informativas Nº 23** (pág. 53), **Nº 26** (págs. 124-125), y **Nº 32** (pág. 162); y en las referencias citadas allí; así como en "***Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo***" (pág. 55), y en "***Los mamíferos del Refugio de Montejo (2ª parte)***" (pág. 12).

47.- **CORZO** (*Capreolus capreolus*) (1,2,3,4)

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-

--- El 7 de mayo, a las 9 h. 11 m., dos corzos machos jóvenes (varetos), muy bien vistos y durante un rato, en el sabinar alto de la margen izquierda del barranco de Valdecasuar (cuadrícula 3). Uno tiene el cuerno aún con pelusa, el otro no. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 14 de mayo, a las 19 h. 30 m., un corzo hembra joven, en lo alto del Murujón de la Hoz (Refugio de Montejo, cuadrícula 1). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 20 de mayo, a las 9 h. 19 m., un corzo, no grande, junto a un chozo, en los páramos del sureste (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 31 de mayo, entre las 14 h. 17 m. y después de las 14 h. 22 m., un corzo macho joven (vareto), en la parte final de V.D.I. (Cuesta Agria, cuadrícula 4), lame las paredes. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 10 de junio, entre las 11 h. 12 m. y las 11 h. 22 m., un corzo hembra, seguido por un corcino pequeñito con pintas, en la ladera de la margen izquierda del Reguerillo del Boquerón (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 18 de julio, a las 13 h. 21 m., una corza y su cría, vistos muy cerca, en la parte alta de la ladera justo antes de Los Poyales (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 24 de julio, a las 8 h. 1 m., una corza y su cría, no muy pequeña, cerca de Pajares de Pedraza (Segovia, cuadrícula VL25), en la zona del nido Nº A del alimoche. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 2 de agosto, a las 8 h. 55 m., una corza con su cría, cerca de Aldealengua de Santa María, entre los chopos, al sur del río Riaza. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 6 de agosto, a las 7 h. 47 m., un corzo macho joven cruza la carretera, entre Renales y Abánades (Guadalajara, cuadrícula WL42). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 21 de agosto, a las 8 h. 54 m., tres corzos, una hembra y dos crías un tanto crecidas, cruzan el camino entre la vía del tren y la carretera Sg-945, en la zona de Vallejo del Charco, y los sigo largo rato. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 10 de octubre, a las 12 h. 56 m., dos corzos, una hembra adulta y un posible macho joven, por la ladera de Peña de la Zorra (Refugio de Montejo, cuadrícula 1). A las 13 h. 52 m., dos corzos, probablemente los mismos, bajo Peña Grillo. (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 10 de noviembre, a las 3 h. 16 m., tres corzos jóvenes cruzan la carretera Sg-945, cerca del embalse (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 1**1** de noviembre, a las 9 h. 22 m., dos corzos, una hembra adulta con una cría de este año, en tierras cerca del monte de Linares, en Valdemoyuelo (Primer Valle); y a las 10 h. 19 m., un corzo, macho joven, en el cerro frente al Cerrejón. (Juan Francisco Martín Calleja).

Otras agrupaciones (de al menos cinco ejemplares).- Año 2018 (a partir de abril).-
--- El 21 de abril, a las 9 h. 34 m., un grupo de seis corzos, un macho y cinco hembras, muy bien vistos, frente a Peñalba. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- En la noche del 27 de abril, durante un censo nocturno de WWF España, un total de 34 corzos, 8 jabalíes, dos liebres, un conejo, y dos perdices. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el Refugio).
--- En la noche del 29 de abril, durante un censo diurno (en torno al amanecer) de WWF España, un total de 8 corzos, un conejo, y 6 perdices. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el Refugio).
--- En la noche del 9 al 10 de noviembre, a las 1 h. 35 m. / 1 h. 37 m., siete corzos, cerca del cementerio de Montejo, en campos de alfalfa al otro lado del camino. (Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra, José Luis Romero Carayol, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.)
--- El 10 de noviembre, por la tarde, cinco corzos en el sabinar del Refugio de Montejo, cerca del comedero de buitres. (José Antonio Dávila García, Javier Eduardo Cabello Stom, y Marta Herrero Villar).
--- El 11 de noviembre, a las 6 h. 48 m., un grupo de al menos ocho corzos a la derecha del camino, en la zona de El Carrascal ap. (Juan Miguel Velasco de Miguel).
--- El mismo día 11 de noviembre, a las 9 h. 40 m., cinco corzos sobre Peña de la Zorra. (Marta Gatti, Angelo Spada, Florino Cavallotti y Augusta Ripamonti).
--- El 26 de diciembre, a las 10 h. 52 m., cinco corzos en la margen izquierda del embalse, en un barbecho sin labrar, entre la ensenada del somormujo y la vía del tren. (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 27 de diciembre, por la tarce, un total de 18 corzos, con un máximo de seis juntos cerca de Vallejo del Charco. (Juan José Molina Pérez y Leo Molina Novo).

Comienzo de 2019.-
--- El 28 de enero, a las 8 h. 33 m., cinco corzos al suroeste de Bercimuel; y a las 10 h. 32 m., cinco corzos (cuatro hembras y un macho) entre la Alduela y la cta. de la coronación. (José Luis López-Pozuelo García).
--- El mismo día 28 de enero, **71** corzos, durante el censo noctuno de WWF España. (Jesús Hernando Iglesias, guarda del Refugio).
--- El 20 de febrero, por la tarde, seis corzos, junto al comedero de buitres de Campo de San Pedro. (Manuel López Lázaro y David Fajardo Orellana).
--- Hacia el 20 de febrero, a las 13 h. ap., **15** corzos, entre Montejo y Fuentelcésped. (Miguel Ángel Sanz Gutiérrez y María Izquierdo Blasco).

--- El 21 de febrero, por la tarde, **10** corzos, junto al comedero de buitres de Campo de San Pedro. (Manuel López Lázaro y David Fajardo Orellana).
--- El 20 de marzo, a las 16 h. 30 m., **16** corzos en un campo, cerca del pinar próximo a Campo de San Pedro. (José Luis López-Pozuelo García).
--- El 23 de febrero, por la tarde, seis corzos, junto al comedero de buitres de Campo de San Pedro. (Manuel López Lázaro).

Comienzo de 2019.-

--- En la noche del 26 de febrero de 2019, durante un censo nocturno de WWF España, un total de 90 corzos, 27 jabalíes, siete liebres, y un conejo. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el Refugio; Jesús Cobo Anula, asesor técnico de WWF en el Refugio; Joel Reyes Núñez, Keyla Mejía y Paola Mejía).

Nota.- En el censo de otoño de 2010, con 65 participantes, se detectaron no menos de unos 50-54 corzos (49-53 vistos, y uno más sólo oído). Entre ellos, se identificaron como mínimo cuatro machos, trece hembras, y tres jóvenes de sexo no determinado (uno o dos de ellos, nacidos este año). Además, el martes se vieron otros dos corzos en una zona cercana de Soria. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 42-45).

En el censo de otoño de 2011, con 58 participantes, se detectaron no menos de unos 47-50 corzos (46-49 vistos, y uno más sólo oído), y probablemente más. Entre ellos, se identificaron seguramente no menos de siete machos, 26 hembras, y tres jóvenes de sexo no determinado (al menos uno de ellos, nacido este año). (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 32-34.)

En el censo de otoño de 2012, con 71 participantes, se detectaron no menos de unos 54-61 corzos (50-59 vistos, y 2-4 más sólo oídos), y probablemente más. Entre ellos, se identificaron seguramente no menos de cuatro machos (dos de ellos jóvenes), 11-12 hembras (una de ellas joven), y un joven de sexo no determinado. Además, se encontró una cuerna de corzo. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 45-49.)

En el censo de otoño de 2013, con 66 participantes, se detectaron no menos de unos 71-73 corzos (vistos), y probablemente más. Entre ellos, se identificaron seguramente no menos de cinco machos, 14 hembras, y uno o dos jóvenes. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 35-38).

En el censo de otoño de 2014, con 74 participantes, se detectaron no menos de unos 42-51 corzos (42-50 vistos, y 0-1 más sólo oídos), y probablemente más. Entre ellos, se identificaron seguramente no menos de 4-5 machos, y 9-11 hembras. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 35-38).


En el censo de otoño de 2015, con 94 participantes, se detectaron no menos de unos 64 corzos (61 vistos, y 3 más sólo oídos), y probablemente más. Entre ellos, se identificaron seguramente no menos de 10 machos, y 15 hembras. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 33-36).

En el censo de otoño de 2016, con 76 participantes, se detectaron no menos de unos 87 corzos (vistos), y seguramente más. Entre ellos, se identificaron seguramente no menos de 5 machos, y 15 hembras. En el suroeste de Soria, Fermín Redondo vio 12 corzos más. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 41-45).

En el censo de otoño de 2017, con 108 participantes, se detectaron no menos de unos 72-73 corzos (71-72 vistos y uno más sólo oído), y seguramente más. Entre ellos, se identificaron seguramente no menos de 4 machos, 13 hembras, y 3 crías. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 38-41).

En el censo de otoño de 2018, con 125 participantes, se detectaron no menos de unos 79 corzos (vistos), y seguramente más. Entre ellos, se identificaron seguramente no menos de 4 machos (uno de ellos joven), 14 hembras, y una cría. (Véase el **Informe final** correspondiente, págs. 33-36).

Comentario.- Los censos de otoño en que se han registrado más corzos son los de **2016** (al menos unos 87), **2018** (al menos unos 79), **2017** (al menos unos 72-73), **2013** (al menos unos 71-73), **2015** (al menos unos 64), **2012** (al menos unos 54-61), **2010** (al menos unos 50-54), **2011** (al menos unos 47-50), **2014** (al menos unos 42-51), **2008** (no menos de unos 39-47), **2009** (no menos de unos 36), **2006** (no menos de unos 31-36, y seguramente 34-36 corzos distintos como mínimo), **2003** (al menos 28-34), **2007** (al menos unos 29-32), **2004** (al menos 22-24), **2001** (al menos 21-25), y **2005** (al menos 19-22).



Otras observaciones interesantes o curiosas.-

1) --- El 21 de marzo de 2018, a las 17 h. 2 m., en la ladera alta bajo La Catedral, dos corzos (hembras adultas) corren detrás de un zorro. (José Luis López-Pozuelo García).

Sobre persecuciones de corzo a zorro, véanse las **Hojas Informativas Nº 34** (págs. 207-208) y **Nº 48** (pág. 98).

2) --- El 17 de abril de 2018, entre las 20 h. 0 m. y las 20 h. 8 m., veo muy bien un corzo macho pastando, en la parte final de la margen derecha del barranco del Boquerón, sobre el nido de buitres leonados Nº 4. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

(En el mismo año, más observaciones de un corzo pastando, por el mismo autor.)

--- El 9 de junio de 2018, a partir de las 10 h. 52 m., en la parte alta de la margen derecha del barranco de Los Callejones (El Carlanco, cerca de Villaverde de Montejo; cuadrícula 3), un corzo macho pasta y ramonea, va seleccionando su alimento, y repetidas veces le veo comer amapolas (*Papaver sp.*). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Pueden verse observaciones anteriores, sobre la alimentación del corzo en la zona, en "**Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo**", pág. 53; y en las **Hojas Informativas Nº 24** [pág. 93], **Nº 26** [pág. 122], **Nº 30** [pág. 122], **Nº 32** [pág. 166], **Nº 34** [pág. 208], **Nº 36** [pág. 196], **Nº 46** [pág. 88], y **Nº 48** [pág. 98].

3) Las observaciones del corzo de día, y en terrenos descubiertos, son frecuentes en los últimos años en la comarca (y también en otras zonas), de acuerdo con lo que se hizo notar en las **Hojas Informativas Nº 30** (pág. 122), **Nº 32** (pág. 166), **Nº 34** (págs. 209-210), y **Nº 36** (págs. 196-197).

4) --- El 15 de mayo de 2018, a las 9 h. 3 m., al este y cerca de la ermita de Valdeherreros (Milagros, Burgos, cuadrícula 1), dos corzos, la hembra primero y el macho detrás. El macho es claramente mayor que la hembra. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 26 de mayo de 2018, a las 10 h. 46 m., dos corzos, macho y hembra, separados, suben corriendo y "bramando" por encima de la boca del túnel del viaducto (al sur). El macho va primero, pero no van juntos. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 27 de julio de 2018, a las 18 h. 3 m., cerca de Pedraja de San Esteban (Soria, cuadrícula VM80), una pareja de corzos. El macho sigue a la hembra. (Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García, Cristian Calvo Vergara, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 12 de agosto de 2018, a las 15 h. 50 m., dos corzos, macho y hembra, en zona despejada y a pleno Sol, justo antes de la antigua zona húmeda de Vallejo del Charco (cuadrícula 3). A las 15 h. 53 m., se van, y corre primero la hembra. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Comentario.- De al menos 45 observaciones realizadas por el autor en la zona, de una pareja de corzos que huye o corre o anda, en 35 de ellas va primero la hembra y después el macho (corresponden a los días 16-6-1991, 12-6-1998, 25-7-1998, 25-7-1999, 31-7-1999, 20-7-2005, 22-7-2006, 13-11-2006, 15-6-2009, 11-6-2010, 18-7-11, 31-7-11, 4-6-12, 13-6-12, 5-7-12, 28-7-12 [dos], 5-5-13, 6-5-13, 29-5-14, 8-6-14, 9-7-14, 28-8-14, 21-7-15, 24-7-15[dos], 5-8-15, 11-6-16, 2-8-16, 31-3-17, 11-4-17, 30-7-17, 15-5-18, 27-7-18, y 12-8-18), mientras que en las diez restantes (días 8-5-2011, 10-7-2011, 4-6-12, 28-7-12, 22-5-13, 17-6-14, 8-11-15, 30-4-16, 1-7-17, y 26-5-18) ocurre al revés. Una observación similar (con la hembra primero y el macho después), fue realizada en Riba de Santiuste (Guadalajara), con Paloma Fraguío Piñas, el 29-7-2009. Sin embargo, el 25-4-16 vi un macho con dos hembras, e iba primero el macho. Posteriormente, el 10-11-17 vi un macho con dos hembras, y el macho iba el último; el mismo día, vi otro grupo, de un macho con tres hembras, y el macho iba de los últimos.

En este sentido, merecen destacarse también las observaciones reseñadas en la **Hoja Informativa Nº 40** (pág. 254).

5) El 25 de mayo de 2006, de día (desde las 15 h. 10 m. hasta las 15 h. 39 m.), veo a distancia, en la margen derecha del barranco de Valugar, dos corzos hembras en las cuevas (por tanto, a la sombra) y cerca, que lamen y comen algo (¿sal?), sobre todo una de ellas, de la pared rocosa y del techo. (Citado en la **Hoja Informativa Nº 30**, pág. 122). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

El 2 de mayo de 2008, de día (desde las 13 h. 26 m. hasta las 13 h. 49 m., al menos), veo, a distancia, en el Cerro Pelado, un corzo hembra que come o lame sal (o minerales), en la oquedad baja, del suelo y de las paredes. A las 14 h. 2 m., lo veo de nuevo, ahora al lado de la oquedad. (Citado en la **Hoja Informativa Nº 32**, pág. 167). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

El 29 de mayo de 2013, de día (desde las 10 h. 7 m. hasta las 10 h. 29 m.), veo a distancia, bajo las rocas de la margen izquierda del Tercer Cañón (parte final), un corzo hembra que permanece en el mismo sitio (una especie de oquedad, a la derecha del antiguo "corral") y lame y come de algo bajo la roca. Puede que sea sal lo que come. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

El 12 de mayo de 2014, a partir de las 13 h. 21 m., un corzo hembra lame (¿sal?) en la pared de la oquedad grande del Cerro Pelado. Es la 2ª vez que veo esto allí (la observación anterior, también referida a un corzo hembra, tuvo lugar el 2 de mayo de 2008). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

El 19 de mayo de 2015, a las 12 h. 55 m., un corzo macho parece lamer de la roca, un buen rato, en V.A.I. (cuadrícula 4), debajo y a la izquierda del nido de buitres Nº X. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

El 7 de junio de 2016, a las 17 h. 14 m., un corzo hembra en una oquedad baja (bajo extraplomo) del Circo del barranco de Valdecasuar (margen derecha, cuadrícula 3), bajo el nido de buitres Nº 56 (vacío), comiendo o lamiendo del techo de la cueva. Vuelve. A las 17 h. 17 m., está cerca, lamiendo rocas cercanas. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

El 11 de abril de 2017, desde las 9 h. 2 m. hasta las 9 h. 22 m., un corzo macho lame la roca del cortado, en la oquedad accesible del final de la Cuesta Agria (V.D.I.). Se obtiene foto. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

El 14 de mayo de 2017, a las 10 h. 14 m., un corzo macho, en la repisa larga de las rocas de la margen derecha del barranco del Boquerón, come de la pared. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

El 31 de mayo de 2018, entre las 14 h. 17 m. y después de las 14 h. 22 m., un corzo macho joven (vareto), en la parte final de V.D.I. (Cuesta Agria, cuadrícula 4), lame las paredes. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

6) --- El 9 de agosto de 2018, a las 10 h. 30 m., un corzo cruza a nado el embalse, hacia la isla. (Xavier Parra Cuenca).

--- El 11 de noviembre de 2018, a las 7 h. 49 m., un corzo, ladrando, va de la ladera de Las Torcas a la ladera de El Campanario, cruzando el río. (Antonio Sanz Carro y Andrés Requejo de las Heras).

Sobre observaciones anteriores de corzo cruzando el río o el embalse, véanse las **Hojas Informativas Nº 32** (pág. 167, con una fotografía), **Nº 34** (págs. 212-213), **Nº 36** (pág. 198), **Nº 38** (pág. 205), **Nº 40** (pág. 254), **Nº 42** (pág. 93), y **Nº 48** (pág. 99).

7) Pueden verse datos sobre observaciones de perros sueltos persiguiendo a corzos, en el **informe final** del censo de otoño de 1989 (pág. 3), en la **Lista de vertebrados del Refugio** (pág. 49), en "**Los**

mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo" (pág. 53; 12 de noviembre de 1989, Luis Die Dejean), y en las **Hojas Informativas Nº 23** (pág. 53; 15 de junio de 1996; José Román Rodríguez), y **Nº 34** (pág. 213; Sergio Arís Arderiu).

8) El 11 de octubre de 2018, al anochecer, dos corzos bajan a beber al embalse. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).

Sobre corzos acudiendo a beber, puede verse un primer resumen de las observaciones que conocemos en la **Hoja Informativa Nº 34**, pág. 211, apartado 6. Datos posteriores aparecen en las **Hojas Informativas Nº 38** (pág. 205), **Nº 40** (págs. 254-255), **Nº 42** (pág. 93), **Nº 46** (pág. 89), y **Nº 48** (pág. 100).

Nuevos datos sobre la mortalidad.- Año 2018.-

--- El 12 de junio de 2018, a las 22 h. 23 m., en la carretera de Santa Cruz de la Salceda a Fuentelcésped (provincia de Burgos, cuadrícula 1), antes de la estación, veo una corza viva pero con alguna pata trasera colgando, sin duda recién atropellada, que consigue dejar la carretera y se tumba a un lado.
--- El 17 de junio, encontramos la pata de un corzo pequeño, de 15 cm. de longitud (12´5 cm. sin la pezuña), en el camino de Torremocha de Ayllón a Piquera de San Esteban (Soria). (Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García, Cristian Calvo Vergara, Antonio Romera Camarero, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 22 de julio, en el fondo y la parte final del Reguerillo del Boquerón (cuadrícula 4), restos de un corzo muerto; y una pluma de buitre leonado. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 30 de julio, un corzo atropellado, en Torregalindo (Burgos, cuadrícula VM30), según las noticias recibidas.
--- El 18/19 de agosto, un corzo macho matado por cazadores en el sur de Burgos (cuadrícula VL39), según las noticias recibidas.
--- El 23 de diciembre, un corzo macho muerto, al parecer atropellado, en Languilla (Segovia, cuadrícula VL68). (Lourdes Tiemblo Blázquez).

Notas.- 1) En carreteras de zonas relativamente cercanas al Refugio, hemos tenido noticias de 43 corzos muertos por atropello (o como consecuencia de un atropello): uno en febrero de 2001 y otro hacia diciembre de 2002 (véase la **Hoja Informativa Nº 26**, pág. 122), dos ejemplares en 2006 (una cría del año en octubre, y una hembra en diciembre; véase la **Hoja Informativa Nº 30**, pág. 123), dos ejemplares en 2007 (uno en agosto y uno en septiembre; véase la **Hoja Informativa Nº 32**, pág. 169), cinco en 2008 (tres en enero y dos en noviembre), tres en 2009 (uno en abril, uno en junio, y uno [hembra] en septiembre; véase la **Hoja Informativa Nº 34**, págs. 214-216), tres en 2011 (una hembra en abril, y un macho en mayo; véase la **Hoja Informativa Nº 36**, págs. 198-199), al menos siete en 2012 (uno a finales de abril, otro el 5 ó 6 de julio, otro el 11 de agosto, uno el 26 de agosto, uno el 7 de septiembre, y dos el 27 de octubre; véase la **Hoja Informativa Nº 38**, págs. 205-207), tres en 2013 (uno el 28 de julio, un macho joven el 16 de septiembre, y una hembra el 20 de noviembre; véase la **Hoja Informativa Nº 40**, págs. 256-257), tres en 2014 (un ejemplar el 1-2 de mayo, una cría el 29 de junio, y una hembra el 7 de julio, como antes se indicó), tres en 2015 (uno en enero, en el sur de Burgos [véase la **Hoja Informativa Nº 42**, pág. 94], uno en mayo y otro el 13 de junio Burgos [véase la **Hoja Informativa Nº 44**, pág. 84]), dos en 2016 (uno en julio y uno en octubre, sin incluir un caso dudos en Soria y en julio [véase la **Hoja Informativa Nº 46**, pág. 90]), seis en 2017 (uno en mayo, dos en junio, uno en julio, uno en noviembre, y uno en diciembre; antes reseñados), y tres en 2018 (uno en junio, uno en julio, y uno en diciembre).

También ha habido datos sobre tres corzos atropellados por el tren. Uno fue encontrado en noviembre de 2005 (véase la **Hoja Informativa Nº 30**, pág. 123), y los otros dos en mayo de 2008 (aunque llevaban tiempo; véase la **Hoja Informativa Nº 32**, pág. 169).

En el trabajo "**Mortalidad de vertebrados en carreteras. Proyecto provisional de seguimiento de la mortalidad de vertebrados en carreteras (PMVC)**" (Documento Técnico de Conservación de la SCV, Sociedad para la Conservación de los Vertebrados, Nº 4; Madrid, 2003, 346 pp.; pág. 159), se comentan datos sobre 22 corzos atropellados en España. Ninguno de ellos corresponde a los cuatro meses comprendidos entre diciembre y marzo (ambos inclusive), y tampoco a octubre.

En el trabajo de la Sociedad para la Conservación de los Vertebrados, SCV, titulado "**Mortalidad de vertebrados en líneas de ferrocarril**" (Documento Técnico de Conservación de la SCV, Nº 1; Madrid, 1996; 23 pp.), se registran (pág. 7) dos corzos atropellados por el tren en España (entre 125 mamíferos, y 329 vertebrados), entre 1990 y 1995. En la misma publicación se incluyen interesantes comentarios y referencias sobre los atropellos de vertebrados por el tren.

2) Sobre ocho casos de corzos ahogados en el Refugio (o muy cerca), véase las **Hojas Informativas Nº 23** (pág. 53), **Nº 26** (págs. 123-124, Nota 3), **Nº 34** (pág. 217, Nota 4), y **Nº 38** (pág. 205, mayo de 2012 ap.); y los dos antes reseñados, de noviembre de 2016. Nótense también todos los casos de ahogamientos de corzos en canales del sur de Burgos (véanse la Nota 1 de la **Hoja Informativa Nº 40**, pág. 257; y la Nota 2 de la **Hoja Informativa Nº 42**, pág. 95).

3) Sobre nuevas fotos o filmaciones de corzos, en 2017, ha habido nuevos datos. Por ejemplo, todos los correspondientes al **censo de otoño** (debidos a distintos autores; véase el **Informe final** correspondiente, págs. 38-41); los que figuran aquí, o en el Anexo fotográfico; y otros.

4) Cuadrículas donde aparecen observaciones o registros en 2018 del corzo, debidas a otros naturalistas o al autor, que no están señaladas en el "**Atlas de los Mamíferos Terrestres de España**" [Palomo Muñoz, L. J.; y Gisbert, J. (eds.), 2002; Dirección General de Conservación de la Naturaleza—SECEM—SECEMU, Madrid, 564 págs.; p. 319], ni en el "**Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España**" [Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J. C.; 2007; Dirección General para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU, Madrid, 588 págs.; p. 360]:

30TVL: 25, 29, 58, 68, 89, 97, 98. / 30TVM: 30, 60, 80. /

En todas estas cuadrículas, ya se publicó algún registro del corzo en Hojas Informativas anteriores.

Por tanto, el resumen conjunto, de las cuadrículas nuevas para el corzo (con respecto a los Atlas referidos) en las Hojas Informativas, queda así:

30TVL: 03, 04/05, 25, 29, 58, 68, 69, 79, 89, 97, 98. / 30TVM: 20, 30, 31, 60, 70, 80, 81. /
30TWL: 26 (Guadalajara).

5) Sobre los transectos mensuales realizados por WWF España, véanse las referencias citadas en las **Hojas Informativas Nº 36** (pág. 202, Nota 15), **Nº 40** (pág. 259), **Nº 42** (pág. 95), **Nº 44** (pág. 86), **Nº 46** (pág. 92), y **Nº 48** (págs. 101-102).

Nuevos datos aparecen en:

--- WWF España (2019). **Informe anual del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia). Datos del año 2018.** Informe presentado el 13-3-2019, en la reunión del Patronato del Parque Natural. 26 págs. (sin los Anexos).

Según se indica en el mencionado Informe (pág. 11), el zorro "*el corzo y el jabalí continúan mostrando una tendencia positiva en los valores de abundancia, y en 2018 se obtiene el 2º valor más alto para los índices de todo el periodo (el valor más alto se obtuvo el año anterior)*". (IKA: 1,011. IHA: 16,833.)

6) Sobre corzos con la cuerna trabada, véase la **Hoja Informativa Nº 40**, pág. 255.

NOTAS

1) Sobre indicios de la presencia antigua de CASTORES (*Castor fiber*) en la comarca, véase la **Hoja Informativa Nº 26**, pág. 125, Nota.

Véase también la **Hoja Informativa Nº 44**, pág. 86, Nota.

2) Sobre los fósiles de mamíferos prehistóricos, véase lo indicado en la **Lista de vertebrados del Refugio** (pág. 49), y en la **Hoja Informativa Nº 26** (pág. 125).

3) Si prescindimos de los datos dudosos, se obtiene, para el periodo de estudio (desde que comenzó el Refugio), y para cada una de las cuatro cuadrículas (1, 2, 3 y 4), unos totales respectivos de 37, 30, 36 (35+1) y 38 especies de mamíferos, respectivamente.

REPTILES Y ANFIBIOS.-

Véase lo indicado, sobre publicaciones recientes, en las **Hojas Informativas Nº 26** -pág. 126- y **Nº 28** –pág. 104-, **Nº 30** –págs. 124-125-, **Nº 32** –págs. 172-197-, **Nº 34** –pág. 221-, **Nº 36** -pág. 203-, **Nº 40** –pág. 261-, y **Nº 42 –**pág**. 96-** .

Notas.- 1) En el SIARE (Servidor de Información de Anfibios y Reptiles de España), del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, se pueden consultar, y comunicar (después de registrarse), citas sobre herpetos (http://siare.herpetologica.es/index.php).

2) Los interesados en contactar con el **Grupo Herpetológico Segoviano**, pueden dirigirse a Honorio Iglesias Garcías (honorio_iglesias@yahoo.es).

A) REPTILES.-

1.- **GALÁPAGO LEPROSO** (*Mauremys leprosa*) (1, [3], 4)

El total de registros que conocemos asciende a 72 (sin contar los datos sobre sueltas, y sin incluir citas en que es muy posible o seguro que al menos parte de los ejemplares vistos fueran exóticos).

Nuevas citas de galápagos en el embalse de Linares.- No hemos conocido datos nuevos en 2018.

Notas.- 1) Sobre el galápago de Florida (*Trachemys scripta*), véase lo indicado en las **Hojas Informativas Nº 26** (pág. 127, Nota 3), **Nº 28** (pág. 104, Notas 1 y 2), **Nº 30** (págs. 125-126, Nota 3), **Nº 32** (pág. 173, Nota 2), **Nº 36** (págs. 203-204, Notas 1 y 2), **Nº 38** (pág. 212, Nota 1), **Nº 40** (págs. 263-265, fotos y Nota 1), **Nº 42** (págs. 97-98, Nota 1), **Nº 44** (pág. 87, Nota 1), y **Nº 48** (págs. 102-103, Nota 1).

---

2) Sobre el galápago europeo (*Emys orbicularis*), véanse las **Hojas Informativas Nº 30** (pág. 125, Nota 2), y **Nº 38** (págs. 212-213, Notas 2 y 3).

S/n.- ***SALAMANQUESA COMÚN** (*Tarentola mauritanica*) A ?

2.- **LAGARTIJA COLILARGA** (*Psammodromus algirus*) (1,2,3,4) N

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- En mayo, y junio, nuevas observaciones de ejemplares pequeños (cuadrículas 3, 4, y VL69). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Notas.- 1) La presencia de la lagartija colilarga en las cuadrículas VL69, VL89 y VL25, donde la he visto en 2018, no está señalada en el "**Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España**" (Pleguezuelos, J. M.; Márquez, R.; y Lizana Avia, M. -eds.-; Dirección General de Conservación de la Naturaleza – Asociación Herpetológica Española; Madrid, 2002, 585 pp.; pág. 260); y tampoco, en el libro "**Naturaleza en Castilla y León. Los Reptiles**" (Ortiz-Santaliestra, M. E.; Diego-Rasilla, F. J.; Ayres Fernández, C.; y Ayllón López, E.; Asociación Herpetológica Española, 2011; Caja de Burgos, Aula de Medio Ambiente, Burgos; 295 pp., pág. 164), ni en el libro "**Reptiles de España. Identificación, historia natural y distribución**", de Alfredo Salvador y Juan Manuel Pleguezuelos (Canseco Editores,

Granada, 2013, 462 pp., pág. 283), ni en el libro "**Reptiles. 2ª edición revisada y aumentada**", coordinado por Alfredo Salvador (Vol. 10 de *Fauna Ibérica*, 2014, Ramos Sánchez, M.ª Á. et al. [eds.], Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid 1.372 pp., pág. 300).

2) El 7 de junio de 2018, a las 11 h. 10 m., veo bien cómo una lagartija colilarga, de flancos amarillo-verdosos y con ocelos azules, come un insecto alado, que al parecer acaba de cazar, en el sabinar alto de la margen izquierda del barranco de Valdecasuar (cuadrícula 3). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

3) El 1 de agosto de 2018, a las 15 h. 18 m., una lagartija colilarga salta al huir, en la margen derecha del barranco de Bocalavoz (Soria, cuadrícula VL88). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

(Véase la **Hoja Informativa Nº 48**, pág. 103, Nota).

3.- **LAGARTIJA CENICIENTA** (*Psammodromus hispanicus*) (1,[2],3,4)

Véase lo indicado sobre esta especie en las **Hojas Informativas Nº 40** (pág. 366) y **Nº 42** (págs. 98-99), y en las referencias citadas allí.

4.- **LAGARTIJA COLIRROJA** (*Acanthodactylus erythrurus*) B n? ?

Véase la discusión hecha sobre esta especie en la **Hoja Informativa Nº 23** (pág. 54). Véanse también las **Hojas Informativas Nº 26** (pág. 128), **Nº 30** (pág. 127), y **Nº 34** (pág. 223).

5- **LAGARTO OCELADO** (*Lacerta lepida* [*Timon lepidus*]) (1,2,3,4) N

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-

Nuevos datos sobre la mortalidad.- Año 2018.-
--- El 27 de mayo, a las 18 h. 2 m., un lagarto ocelado muerto, atropellado, en la carretera Sg-945, en la zona de Maluque (cuadrícula 3). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 17 de junio, a las 11 h. 48 m., un lagarto ocelado muerto, atropellado, cerca de la ermita de San Hipólito (Soria, cuadrícula VL89). (Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García, Cristian Calvo Vergara, Antonio Romera Camarero, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Véase lo indicado sobre atropellos en las **Hojas Informativas Nº 28** (pág. 105), **Nº 34** (pág. 224), **Nº 42** (pág. 99), y **Nº 48** (pág. 103).

Nota.- El 21 de agosto de 2018, a las 12 h 14 m., un lagarto ocelado, cerca de Navares de las Cuevas (Segovia, cuadrícula VL38). (Carlos Palma Barcenilla y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

La presencia del lagarto ocelado en la cuadrícula VL38 no está señalada en el "**Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España**" (Pleguezuelos, J. M.; Márquez, R.; y Lizana Avia, M. -eds.-; Dirección General de Conservación de la Naturaleza – Asociación Herpetológica Española; Madrid, 2002, 585 pp.; pág. 225); y tampoco, en el libro "**Naturaleza en Castilla y León. Los Reptiles**" (Ortiz-Santaliestra, M. E.; Diego-Rasilla, F. J.; Ayres Fernández, C.; y Ayllón López, E.; Asociación Herpetológica Española, 2011; Caja de Burgos, Aula de Medio Ambiente, Burgos; 295 pp., pág. 176); ni en el libro "**Reptiles de España. Identificación, historia natural y distribución**", de Alfredo Salvador y Juan Manuel Pleguezuelos (Canseco Editores, Granada, 2013, 462 pp., pág. 173), ni en el libro "**Reptiles. 2ª edición revisada y aumentada**", coordinado por Alfredo Salvador (Vol. 10 de *Fauna Ibérica*, 2014, Ramos Sánchez, M.ª Á. et al. [eds.], Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid 1.372 pp., pág. 629).

6- ***LAGARTO VERDINEGRO** (*Lacerta schreiberi*) ([3]) B

Véase lo anotado sobre esta especie en las **Hojas Informativas Nº 26** [págs. 129-130], **Nº 28** [pág. 105], y **Nº 30** [pág. 131]. No hemos conocido datos posteriores.

7.- ***LAGARTIJA ROQUERA** (*Podarcis muralis*) B ?

Véase lo indicado sobre esta especie en las **Hojas Informativas Nº 26**, pág. 130, y **Nº 30**, pág. 131; y en la **Lista de vertebrados del Refugio**, pág. 42, Nota 136.

8.- **LAGARTIJA IBÉRICA [PARDA]** (*Podarcis hispanica[us]* [*liolepis*]) (1,2,3,4) N [*guadarramae*]

Nota.- En 2018, vi la primera lagartija ibérica (o parda) del año el 28 de marzo (un macho, a las 14 h. 36 m., en el barranco de San Andrés, al fin del barranco lateral). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

En 2019, ha habido una cita el 23 de febrero (un macho fotografiado, en la ermita de El Casuar). Había dos ejemplares jóvenes, de unos 5 cm. de longitud. (Francisco Jesús Fernández Herrera, y Sara Fernández Aguirre).

S/n.- ***LUCIÓN** (*Anguis fragilis*)

Véanse las referencias de la especie anotadas en la **Hoja Informativa Nº 30** (págs. 132-133).

9.- ***ESLIZÓN IBÉRICO** (*Chalcides bedriagai*) A (1,[3],4)

Véase lo indicado sobre esta especie en las **Hojas Informativas Nº 30** (págs. 133-134) y **Nº 40** (págs. 271-273), y en las referencias citadas allí.

S/n.- ***ESLIZÓN TRIDÁCTILO (IBÉRICO)** (*Chalcides striatus*) ([2], ¿[4]?)

Véase lo indicado sobre esta especie en las **Hojas Informativas Nº 26** (págs. 130-131), **Nº 30** (pág. 135), **Nº 32** (pág. 178), **Nº 44** (pág. 89), y **Nº 46** (portada y págs. 95, 288).

10.- ***CULEBRILLA CIEGA** (*Blanus cinereus*) B ([1],[2],3,4)

Las tres primeras citas que conocemos, de la especie en la zona, están reseñadas en la **Lista de vertebrados del Refugio** (pág. 42, Nota 137); la cuarta, en la **Hoja Informativa Nº 26**, pág. 131; las seis posteriores, éstas en el término de Fuentespina (Burgos), en las **Hojas Informativas Nº 28** (pág. 106), **Nº 30** (págs. 135-136), y **Nº 32** (pág. 178); y la última, en la **Hoja Informativa Nº 42** (pág. 100).
Véanse también las referencias anotadas en la **Hoja Informativa Nº 30** (págs. 135-136).

11.- **CULEBRA BASTARDA (OCCIDENTAL)** (*Malpolon monspessulanus*) (1,2,3,4) n

El total de registros que conocemos es de 103.

Sobre atropellos.- En relación con los atropellos y con otras cuestiones sobre la especie, véanse las referencias o informaciones citadas en las **Hojas Informativas Nº 26** (págs. 131-133), **Nº 32** (pág. 179), **Nº 34** (pág. 227), **Nº 36** (pág. 207), **Nº 42** (págs. 100-101), **Nº 44** (pág. 90), y **Nº 46** (págs. 95-96).

En el Parque del Foix y su entorno (Barcelona), Pedro Torres Expósito, desde el año 2000, ha recogido, en sus **Memorias de fauna**, datos sobre 133 culebras bastardas atropelladas, que se reparten así: 86 en primavera, 37 en verano, siete en otoño y tres en invierno. Y por meses: Una en febrero, una en marzo, trece en abril, 32 en mayo, 50 en junio, trece en julio, ocho en agosto, nueve en septiembre, cuatro en octubre, una en octubre, y una en diciembre.

12.- **CULEBRA DE ESCALERA** (*Rhinechis* [*Elaphe*] *scalaris*) (1,2,3,4) N

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- El 1 de julio, miembros de WWF, del campamento "Gredos San Diego en Valdevacas de Montejo, vieron una culebra de escalera joven.

Nota.- El 19 de julio de 2018, Pascual Mate Alonso obtuvo fotografías de una culebra de escalera en un árbol, en el monte de Cedillo de la Torre.

Nota.- Mariano de Diego Casado, pastor de Fuentenebro (Burgos, cuadrícula VL39), comunica haber presenciado, el 29 de julio de 2018, cómo un alimoche cogía una culebra de escalera que había sido matada poco antes.

Hasta el momento, hemos recogido datos sobre 59-60 culebras de escalera muertas en la zona: 29 atropelladas (al menos en un caso, intencionadamente, según los testimonios recogidos), otras 18 matadas intencionadamente, 8 muertas por causas desconocidas, una en un sifón, y cuatro (una de ellas, todavía no muerta del todo) relacionadas con predadores o con carroñeros. La relación de estas cuatro últimas puede verse en la **Hoja Informativa Nº 40** (pág. 276).

Sobre atropellos.- Ya hemos tenido referencias de 29 culebras de escalera muertas por atropello en la zona. Los 25 casos en que conocemos la fecha se reparten así: Uno en abril, nueve en mayo, diez en junio, cuatro en julio, tres en agosto, y uno en septiembre.

En el Parque del Foix y su entorno (Barcelona), Pedro Torres Expósito recoge datos sobre 33 culebras de escalera atropelladas en dieciséis años (2002-2017), y en 32 de ellas se indica la fecha. Se reparten así: una en marzo, dos en abril, catorce en mayo, nueve en junio, una en julio, dos en agosto, dos en septiembre, y una en octubre. ("**Informe faunístic del Parc del Foix. Any 2002**", pág. 44; "**Parc del Foix. Memoria de fauna 2003**", pág. 30; "**Parc del Foix. Memòria de fauna 2004-2005**", pág. 56; "**Parc del Foix. Memòria de Fauna 2006**", pág. 32; "**Parc del Foix. Memòria de Fauna 2007**", pág. 38; "**Parc del Foix. Memòria de Fauna 2008**", pág. 44; "**Parc del Foix. Memòria de Fauna 2009**", pág. 44; "**Parc del Foix. Memòria de Fauna 2010**", pág. 56; "**Parc del Foix. Memòria de Fauna 2011**", pág. 62; "**Memoria de Fauna 2012**", pág. 106; "**Memoria de Fauna 2013**", pág. 96; "**Memoria de Fauna 2014**", pág. 97, "**Memoria de Fauna 2016**", pág. 152; y "**Memoria de Fauna 2017**", pág. 151).

(Pueden verse otras referencias sobre el tema en las **Hojas Informativas Nº 30**, pág. 139; y **Nº 46**, pág. 97.)

13.- **CULEBRA DE COLLAR** (*Natrix natrix*) (1,¿2?,[2],3,4) N

No hemos conocido nuevas citas en 2018.

El total de registros que conocemos asciende a 50, sin incluir los de zonas próximas.

14.- **CULEBRA VIPERINA** (*Natrix maura*) (1,[2],3,4) N

Nuevos datos sobre la mortalidad.- Año 2018.-

--- El 11 de noviembre, una culebra viperina muerta, muy reciente, junto al comedero de buitres del Refugio de Montejo. (José Antonio Dávila García, Javier Eduardo Cabello Stom, y Marta Herrero Villar).

Comentario.- La culebra viperina sólo había sido citada en tres censos de otoño anteriores, los de **1997** (dos ejemplares atropellados, citados por Juan Prieto Martín; véase el **Informe final** correspodiente, pág. 20), **2006** (una culebra de agua nadando, en las charcas de Berlangas de Roa; Javier Vitores Casado;

véase el **Informe final** correspodiente, pág. 76), y **2007** (una culebra viperina en el río Riaza, bajo Peña Portillo; José Luis González del Barrio, Diego Álvarez Escaladas y Fernando Álamo Ruiz; véase el **Informe final** correspondiente, pág. 95). Otra cita en otoño corresponde al 22 de septiembre de 2007, en la parte alta del barranco de Valdecasuar, y se debe a Ricardo Ramos Sánchez y José Liarte de Blas (véase la **Hoja Informativa Nº 32**, pág. 181).

15.- **CULEBRA LISA (o CORONELA) MERIDIONAL** (*Coronella girondica*) (1,[2],3,4) N

Nuevas citas.- Año 2018.-

59) El 29 de mayo de 2018, a las 14 h. 28 m., en lo alto de la margen izquierda (parte final, no total) del barranco de El Gordo (cuadrícula 4), una gran culebra lisa meridional, muy bien vista. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

El total de registros que conocemos asciende a 59 (y cuatro más en zonas cercanas).

Nota.- Sobre la **culebra lisa (o coronela) europea** (*Coronella austriaca*), citada en zonas relativamente cercanas en distintas referencias bibliográficas, véase lo indicado en las **Hojas Informativas Nº 26** (pág. 136, caso 36), **Nº 32** (pág. 183, Nota 4), y **Nº 44** (pág. 92, Nota).

16.- **VÍBORA HOCICUDA** (*Vipera latasti*) (1,[2],3,4) n

El total de registros (sin incluir zonas relativamente cercanas) es de 82. En el Refugio y cercanías, no hemos conocido datos posteriores a los indicados en la **Hoja Informativa Nº 48** (pág. 185).

Las 75 citas con fecha conocida se reparten así: Una en enero o febrero, una en marzo, ocho en abril, trece en mayo, doce en junio, quince en julio, once en agosto, cuatro en septiembre, dos en octubre, ocho en noviembre, y cero en diciembre.

Sobre las fechas de las observaciones y el periodo de hibernación, véanse las referencias citadas en la **Hoja Informativa Nº 28** (pág. 110); así como los libros "**Naturaleza en Castilla y León. Los Reptiles**" (Ortiz-Santaliestra, M. E.; Diego-Rasilla, F. J.; Ayres Fernández, C.; y Ayllón López, E.; Asociación Herpetológica Española, 2011; Caja de Burgos, Aula de Medio Ambiente, Burgos; 295 pp., pág. 242), "**Anfibios y reptiles de la Península Ibérica, Baleares y Canarias**" (Masó, A.; y Pijoan, M.; ed. Omega, Barcelona, 2011, 848 pp., págs. 725-726), "**Reptiles de España. Identificación, historia natural y distribución**" (Salvador, A.; y Pleguezuelos, J. M.; Canseco Editores, Granada, 2013, 462 pp., pág. 433), y "**Reptiles. 2ª edición revisada y aumentada**", coordinado por Alfredo Salvador (Vol. 10 de *Fauna Ibérica*, 2014, Ramos Sánchez, M.ª Á. et al. [eds.], Museo Nacional de Ciencias Naturales, CSIC, Madrid 1.372 pp., pág. 931-933), entre otros.

Nota.- La presencia de la víbora hocicuda en Montejo de la Vega está mencionada también en:
--- González, J. L. (2006). **Temida por desconocida.** Págs. 318-324 en: ***Caminos de El Espinar.*** Ayuntamiento de El Espinar (Segovia). 2ª ed. (Pág. 318).

NOTA

Si prescindimos de los datos dudosos, se obtiene, para el periodo de estudio (desde que comenzó el Refugio), y para cada una de las cuatro cuadrículas (1, 2, 3 y 4), unos totales respectivos de 13, 12 (11+1), 14 y 13 especies de reptiles, respectivamente.

--- -

B) ANFIBIOS.-

Nota.- Nuevos trabajos sobre el tema son los siguientes:

--- Cobo Anula, J. (2019). **Seguimiento de anfibios en las hoces del Riaza. Año 2018.** Informe inédito para WWF España. 8 págs. (Con fotografías del autor.) (Los muestreos, con Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio).
--- WWF España (2019). **Informe anual del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia). Datos del año 2018.** Informe presentado el 13-3-2019, en la reunión del Patronato del Parque Natural. 26 págs. (sin los Anexos).

Nota.- Sobre las charcas preparadas o restauradas por WWF España, véanse la Nota y las citas que figuran en las **Hojas Informativas Nº 36** (pág. 213), **Nº 38** (pág. 232), **Nº 40** (pág. 282), **Nº 42** (pág. 105), y **Nº 44** (pág. 93).

1.- ***SALAMANDRA COMÚN** (*Salamandra salamandra*) (1,3) A

Véase lo indicado sobre esta especie en las **Hojas Informativas Nº 26** (pág. 137) y **Nº 30** (págs. 147-148).

2.- **GALLIPATO** (*Pleurodeles waltl*) (1,3,4) B

Nuevas observaciones.- Año 2018.-

--- En la noche del 27 al 28 de julio, en una charca cerca de Vicálvaro (Soria, cuadrícula VM81), cinco gallipatos, un adulto y cuatro jóvenes (tres sin branquias, uno con branquias externas). El gallipato adulto tiene 20 cm. de longitud (9 cm. de cabeza y cuerpo, y 11 cm. de cola). (Cristian Calvo Vergara, Marta Llorente Sancho, Fermín Redondo Ramírez, Helena Jáuregui Díaz de Cerio, Gabriel Redondo Jáuregui, Ángel Bocos García, Antonio Romera Camarero, Laura S., y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 4 de agosto, a las 14 h. 3 m., en una charca del pinar de Fuentenebro (la más próxima al camino, de las del sur; Burgos, cuadrícula VL39), un gallipato adulto, visto perfectamente, que nada y se sumerge. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- En la noche del 10 al 11 de noviembre, a las 0 h. 35m., un gallipato en Grajera (Segovia, cuadrícula VL48). (Fernando ÁvilaVico, Juan Luis Galindo Estévez, y MarioBenedited Guerrero).

Nota.- La presencia del gallipato en las cuadrículas VL39 (donde ya había sido citado anteriormente; véase la **Hoja Informativa Nº 34**, págs. 233-234), VL48, y VM81 no está señalada en el "**Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España**" (Pleguezuelos, J. M.; Márquez, R.; y Lizana, M. (eds.); Dirección General de Conservación de la Naturaleza – Asociación Herpetológica Española; Madrid, 2002, 585 pp.; pág. 52), ni en el libro "**Naturaleza en Castilla y León. Los Anfibios**" (Diego-Rasilla, F. J.; y Ortiz-Santaliestra, M. E.; Asociación Herpetológica Española, AHE; 2009; Caja de Burgos, Aula de Medio Ambiente, Burgos, 237 pp.; pág. 59).

Véase lo indicado sobre esta especie en las **Hojas Informativas Nº 26** (págs. 137-138), **Nº 28** (pág. 111), **Nº 30** (pág. 148), **Nº 34** (págs. 233-234), **Nº 36** (pág. 213), **Nº 38** (pág. 233), **Nº 40** (pág. 282), **Nº 42** (pág. 106), **Nº 44** (págs. 93-94), **Nº 46** (pág. 99), y **Nº 48** (pág. 108).

3.- **TRITÓN JASPEADO** (*Triturus marmoratus*) (1,[2],3,4) N

Nuevas citas en el Refugio o en su entorno inmediato: Año 2018 (a partir de marzo inclusive).-

42) --- El 27 de marzo, un tritón jaspeado hembra, fotografiado, en el patio de una casa, en Villaverde de Montejo (cuadrícula 3). (Cándido de la Fuente de la Osada). (Comunicado por Martí Alexandre Dot Ventalló).

S/n) --- El 17 de junio, a las 12 h. 58 m., dos larvas de tritón jaspeado, en la charca de San Juan, cerca de Atauta (Soria, cuadrícula VL89). (Cristian Calvo Vergara, Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García, Antonio Romera Camarero, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Nota.- La presencia del tritón jaspeado en la cuadrícula VL89 no está registrada en el "**Atlas y Libro Rojo de los Anfibios y Reptiles de España**" (Pleguezuelos, J. M.; Márquez, R.; y Lizana, M. (eds.); Dirección General de Conservación de la Naturaleza – Asociación Herpetológica Española; Madrid, 2002, 585 pp.; pág. 68), ni en el libro "**Naturaleza en Castilla y León. Los Anfibios**" (Diego-Rasilla, F. J.; y Ortiz-Santaliestra, M. E.; Asociación Herpetológica Española, AHE; 2009;Caja de Burgos, Aula de Medio Ambiente, Burgos, 237 pp.; pág. 83).

43) --- El 25 de junio, entre las 17 h. 40 m. y las 18 h. 0 m., dos adultos (al menos uno hembra) y 25 larvas de tritón jaspeado, en el antiguo lavadero de Valdevacas de Montejo (cuadrícula 3). Se obtienen fotografías. (Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias, biólogo conservador y guarda del Refugio de Montejo, respectivamente, de WWF España).

Véase también lo indicado sobre este tritón en las **Hojas Informativas Nº 26** (pág. 138, Nota 2), **Nº 32** (págs. 187, 188 y 360; con fotos), **Nº 34** (págs. 234-235), **Nº 36** (págs. 213-214), **Nº 38** (pág. 233-236), **Nº 40** (pág. 283), **Nº 42** (pág. 106), **Nº 44** (pág. 94), **Nº 46** (pág. 100), y **Nº 48** (pág. 108).

S/n.- ***TRITÓN PALMEADO** (*Triturus* [*Lissotriton*] *helveticus*)

Véase lo indicado sobre esta especie en las **Hojas Informativas Nº 26** (pág. 139), **Nº 30** (pág. 148), **Nº 36** (pág. 214), y **Nº 46** (págs. 100, 294).

4.- **SAPILLO PINTOJO IBÉRICO / MERIDIONAL** (*Discoglossus galganoi / jeanneae*)
(1,[3],4) N

Nuevas citas: Año 2018.-

48) --- En la noche del 29 al 30 de mayo, entre las 23 h. 38 m. y las 23 h. 50 m., al menos 22 renacuajos de sapos parteros comunes (y oídos cinco machos adultos cantando), y al menos 4 renacuajos de sapillos pintojos ibéricos, en la fuente habitual del oeste del Refugio (cuadrícula 1). (Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias, biólogo conservador y guarda del Refugio de Montejo, respectivamente, de WWF España).

49) --- El 25 de junio, entre las 16 h. 30 m. y las 16 h. 50 m., sapillo pintojo ibérico (un adulto y 11 renacuajos) y sapo partero común (51 renacuajos) en la fuente habitual del oeste del Refugio (cuadrícula 3). (Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias, biólogo conservador y guarda del Refugio de Montejo, respectivamente, de WWF España). El adulto fue fotografiado, por Luis Suárez Arangüena (de WWF España).

50) --- En la noche del 8 al 9 de noviembre, a las 23 h. 7 m., un sapillo pintojo, en la fuente habitual del oeste del Refugio. (Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra, José Luis Romero Carayol, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

51) --- En la noche del 9 al 10 de noviembre, a las 1 h. 32 m. —1 h. 42 m., dos sapillos pintojos, uno manchado (moteado) y otro rayado, en la fuente habitual del oeste del Refugio. (Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra, José Luis Romero Carayol, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

El ejemplar listado es fotografiado (José Luis Romero Carayolm Alfonso Lario Doylataguerra y Raúl González Rodríguez).

Se obtienen las siguientes medidas.-

	Longitud cabeza y cuerpo	Longitud pata trasera
Ejemplar listado	5´5 cm.	7´8 cm.
Ejemplar moteado (manchado)	6´2 cm.	8´7 cm.

Ha habido, que sepamos, 51 citas de este sapillo en el Refugio e inmediaciones, sin contar los datos sobre puestas. Pueden verse algunas de las últimas noticias en las **Hojas Informativas Nº 26** (pág. 139), **Nº 28** (pág. 111), **Nº 30** (págs. 148-149), **Nº 32** (págs. 188-191), **Nº 34** (págs. 235-239), **Nº 36** (págs. 214-217), y **Nº 38** (págs. 236-237), **Nº 40** (págs. 284-285), **Nº 44** (pág. 95), y **Nº 48** (págs. 108-109). En las Hojas Nº 32, Nº 34, Nº 36 y Nº 40 se incluyen en total quince fotografías.

Nota.- Sobre *Discoglossus galganoi* y *D. jeanneae*, véanse las referencias indicadas en las **Hojas Informativas Nº 30** (pág. 149, Nota 2) y **Nº 38** (págs. 236-237, Nota).

5.- **SAPO PARTERO COMÚN** (*Alytes obstetricans*) (1,¿2?,[2],3,4) N

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-

--- En la noche del 29 al 30 de mayo (datos de Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias, biólogo conservador y guarda del Refugio de Montejo, respectivamente, de WWF España).-
--- En la charca de los Ausentes (cuadrícula 1), entre las 23 h. 15 m. y las 23 h. 45 m., oídos dos sapos parteros comunes.
--- En la charca de Peña Rubia (cuadrícula 1), entre las 23 h. 25 m. y las 23 h. 30 m., oídos dos sapos parteros comunes.
--- En la fuente de la Vega (cuadrícula 3), entre las 23 h. 38 m. y las 23 h. 50 m., al menos 22 renacuajos de sapos parteros comunes (y oídos cinco machos adultos cantando), y al menos 4 renacuajos de sapillos pintojos ibéricos.
--- En la charca de La Pisadera (cuadrícula 1), entre las 1 h. 0 m. y las 1 h. 12 m., oídos dos sapos parteros comunes.

--- El 25 de junio (datos de Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias, biólogo conservador y guarda del Refugio de Montejo, respectivamente, de WWF España).-
--- En el reguero del Pontón (cuadrícula 1), entre las 14 h. 15 m. y las 14 h. 30 m., 7 renacuajos de sapo partero común, y al menos 79 juveniles y 31 renacuajos de sapo corredor.
--- En la fuente de la Vega (cuadrícula 1), entre las 16 h. 30 m. y las 16 h. 50 m., sapillo pintojo ibérico (un adulto y 11 renacuajos) y sapo partero común (51 renacuajos).

--- El 11 de octubre, en el abrevadero de la cooperativa agrícola de Milagros (Burgos), renacuajos de tres especies: unos negros tipo *Bufo* (probable sapo corredor), otros de sapo partero común (fotografiados), y otros quizá de sapillo. Se obtienen fotos. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).

(Agradecemos, a Juan Prieto Martín y Pedro Torres Expósito, su ayuda en la identificación).

--- En la noche del 8 de noviembre de 2018, a las 23 h. 7 m., varios renacuajos de sapo partero, en la fuente de la Vega (cuadrícula 1). (Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra, y José Luis Romero Carayol).

--- En la noche del 9 de noviembre de 2018, renacuajos de sapo partero, en la fuente de la Vega (cuadrícula 1). (Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra, José Luis Romero Carayol, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Un ejemplar es bien identificado, fotografiado (por Alfonso Lario Doylataguerra), y medido; tiene 3´2 cm. de longitud (1´2 cm. de cabeza y cuerpo, y 2 cm. de cola).

(Véanse las **Hojas Informativas Nº 46**, pág. 101, y **Nº 48**, pág. 109.)

Nuevos datos sobre la mortalidad.-

--- El sábado 10 de noviembre de 2018, sapos parteros jóvenes atropellados, en la Sg-945, cerca y al noroeste del desvío a Santa Cruz. (Pedro Luis Castilla Apolonio).

6.- ***SAPO PARTERO IBÉRICO** (*Alytes cisternasii*) (1) A ?

La información que conocemos, sobre la especie en la zona, sigue siendo la señalada en la **Lista de vertebrados del Refugio** (página 43, Nota 145), que ha sido recogida posteriormente en bastantes publicaciones.

Véase también la Nota de la **Hoja Informativa Nº 28** (pág. 113).

7.- **SAPO DE ESPUELAS** (*Pelobates cultripes*) B (1,[2],[3],4) n

Nuevas observaciones.- Verano de 2018.-

--- En la noche del 27 al 28 de julio, en una charca cerca de Vicálvaro (Soria, cuadrícula VM81), renacuajos grandes de sapo de espuelas. Cinco de ellos (hay más) son cogidos, y liberados de nuevo. (Cristian Calvo Vergara, Marta Llorente Sancho, Fermín Redondo Ramírez, Helena Jáuregui Díaz de Cerio, Gabriel Redondo Jáuregui, Ángel Bocos García, Antonio Romera Camarero, Laura S., y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Véase lo indicado sobre esta especie en la **Hoja Informativa Nº 26** (pág. 140); así como la Nota de las **Hojas Informativas Nº 30** (pág. 150), y **Nº 34** (págs. 240-241); y las **Hojas Informativas Nº 36** (pág. 219), **Nº 38** (págs. 239-241), **Nº 40** (págs. 287-288), **Nº 42** (pág. 108), **Nº 44** (pág. 96), y **Nº 48** (pág. 110).

8.- **SAPILLO MOTEADO (COMÚN)** (*Pelodytes punctatus*) (1,2,3,4) N

Nuevos registros:

26) --- En la noche del 29 al 30 de mayo, oídos al menos tres sapillos moteados en el reguero de Los Frailes (cuadrícula 2; entre las 23 h. 45 m. y las 24 h. 0 m.), y oídos tres sapillos moteados en el reguero del Pontón (cuadrícula 1; entre las 0 h. 5 m. y las 0 h. 15 m.). (Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias, biólogo conservador y guarda del Refugio de Montejo, respectivamente, de WWF España).

(Veáse la **Hoja Informativa Nº 48**, pág. 110).

Hasta el momento, hemos conocido 26 citas del sapillo moteado en el Refugio e inmediaciones. Por otra parte, sólo tenemos noticias de cinco sapillos moteados adultos fotogafiados en la zona. (Véanse las **Hojas Informativas Nº 21** [pág. 20], **Nº 26** [pág. 141], **Nº 28** [pág. 113], **Nº 30** [págs. 150-151], **Nº 40** [págs. 288-291], y **Nº 44** [pág. 96], y **Nº 48** [pág. 110]).

9.- **SAPO COMÚN** (*Bufo bufo* [*spinosus*]) (1,2,3,4) N

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-

--- El 3 de julio, entre las 10 h. 36 m. y las 11 h. 59 m., un total de 12 sapos comunes (y un sapo corredor) pequeñitos, en la orilla de la margen izquierdadel embalse, frente a la isla. Cinco de ellos (y también el sapo corredor) son medidos; sus longitudes respectivas son: 1´3 cm., 1´2 cm., 1´4 cm., 1´3 cm., y 1´1 cm. (y la del sapo corredor, 1´1 cm.).

(Pueden verse citas de sapos comunes diminutos, recién metamorfoseados, en la misma zona de la margen izquierda del embalse, y en verano, en las **Hojas Informativas Nº 26** [pág. 141], **Nº 32** [pág. 194], **Nº 42** [págs. 109, y 358-359], **Nº 44** [pág. 96], y **Nº 46** [pág. 102]).

Nuevos datos sobre ejemplares adultos vivos medidos.- Año 2018.-

--- En la noche del 28 al 29 de marzo, a las 0 h. 19 m., en la carretera de La Sequera de Haza a Hontangas (provincia de Burgos, cuadrícula VM30), un sapo común, al parecer hembra, de 8 cm. de longitud, y 7´8 cm. de pata trasera. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Nuevos datos sobre atropellos.- Año 2018.-

--- En la noche del 28 al 29 de marzo, a las 0 h. 50 m., en la carretera de Hontangas a Adrada de Haza, cerca de Adrada (provincia de Burgos, cuadrícula VM30), un sapo común atropellado, muy reciente, probablemente hembra, de 10´5 cm. de longitud. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Pueden verse datos sobre los casos anteriores más recientes en las **Hojas Informativas Nº 26** (pág. 141) **Nº 28** (pág. 113) y **Nº 42** (pág. 109).

Como es sabido, el problema de los atropellos es común a otros muchos lugares. Por ejemplo, en el Parque del Foix y su entorno (Barcelona), Pedro Torres Expósito recoge datos sobre 76 sapos comunes atropellados en 2017 ("**Memoria de fauna 2017**", págs. 159-16), 17 sapos comunes atropellados en 2016 ("**Memoria de fauna 2016**", pág. 163), 14 sapos comunes atropellados en 2015 ("**Memoria de fauna 2015**", págs. 150-151), 51 sapos comunes atropellados en 2014 ("**Memoria de fauna 2014**", págs. 105-106), 27 sapos comunes atropellados en 2013 ("**Memoria de fauna 2013**", págs. 101-102), 18 sapos comunes atropellados en 2012 ("**Memoria de fauna 2012**", pág. 112), 16 sapos comunes atropellados en 2011 ("**Parc del Foix. Memòria de fauna 2011**", págs. 66-67), 21 sapos comunes atropellados en 2010 ("**Parc del Foix. Memòria de fauna 2010**", págs. 59-60), 23 sapos comunes atropellados en 2009 ("**Parc del Foix. Memòria de fauna 2009**", pág. 49), dos sapos comunes atropellados en 2008 ("**Parc del Foix. Memòria de fauna 2008**", pág. 47), 15 sapos comunes atropellados en 2007 ("**Parc del Foix. Memòria de fauna 2007**"; págs. 39-40); seis sapos comunes atropellados en 2006 ("**Parc del Foix. Memòria de fauna 2006**"; pág. 35); 11 sapos comunes atropellados en 2005 y 9 en 2004 ("**Parc del Foix. Memòria de fauna 2004-2005**"; pág. 60), 14 en 2003 ("**Parc del Foix. Memoria de fauna 2003**"; pág. 33), 44 en 2002 ("**Informe faunístic del Parc del Foix. Any 2002**"; pág. 47), 2 en 2001 ("**Observacions de fauna a l´Espai Natural del Parc del Foix i el seu entorn. Any 2001**"; pág. 41), y 16 en 2000 ("**Observacions de fauna a l´Espai Natural del Parc del Foix i el seu Entorn. Any 2000**"; pág. 21); lo que da un total de 382 sapos comunes atropellados en dieciocho años.

(Véanse también las referencias citadas en las **Hojas Informativas Nº 30** [págs. 151-152], y **Nº 42** [pág. 110]).

10.- **SAPO CORREDOR** (*Bufo* [*Epidalea*] *calamita*) (1,2,3,4) N

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.-

--- El 2 de abril, a las 18 h. 25 m., cordones de huevos de sapo corredor en una charca entre Milagros y Montejo, en el término de Milagros (provincia de Burgos, muy cerca del límite con Segovia, cuadrícula 1). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Son vistos también, y fotografiados, el 7 de abril (Juan José Molina Pérez).

--- El 15 de abril, a las 0 h. 49 m., sapos corredores en un charco, en el pinar de Valdevacas (cuadrícula 3). Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 28 de abril, a las 18 h. 25 m., renacuajos de sapo corredor en la charca de las citas anteriores. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 29 de abril, a las 18 h. 54 m., renacuajos pequeños de sapo corredor en un charco del páramo, en la zona del barranco de la Retuerta, cerca del chozo grande (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 24 de mayo, a las 22 h. 20 m., **nueve** sapos corredores en un pequeño charco de la cantera (cuadrícula 4). Croan. Dos parejas están en cópula. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 25 de mayo, a las 2 h. 18 m., cordones dobles de puestas de sapo corredor, en el charco de la cantera. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 28 de mayo, a las 18 h. 38 m., siguen las hileras de huevos de sapo corredor en el charco de la cantera; no veo renacuajos. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
El mismo día, a las 22 h. 50 m. ap., cuatro sapos corredores en el charco de la cantera; hay dos ejemplares en cópula o amplexo (luego se separan), uno más en el agua, y uno junto al agua (éste, de 8 cm. de longitud, y 7´7 cm. de longitud de la pata trasera). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- En la noche del 29 al 30 de mayo (datos de Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias, biólogo conservador y guarda del Refugio de Montejo, respectivamente, de WWF España).-
--- En la charca del Carrascal (cuadrícula 1), entre las 23 h. 15 m. y las 23 h. 45 m., vistos **32** sapos corredores adultos, con 8 amplexus, y coros de machos.
--- En el reguero de Los Frailes (cuadrícula 2), entre las 23 h. 45 m. y las 23 h. 55 m., oído un sapo corredor macho.
--- En el reguero del Pontón (cuadrícula 1), entre las 0 h. 5 m. y las 0 h. 15 m., oído un coro muy numeroso de sapos corredores.
--- En el lavadero viejo y los pilones de Valdevacas de Montejo (cuadrícula 3), entre las 1 n. 30 m. y las 1 h. 50 m., oído un coro numeroso de sapos corredores.

--- El 13 de junio, a las 6 h. 57 m., frente a Haza y en la margen izquierda del río Riaza (provincia de Burgos, cuadrícula VM30), un minúsculo sapito corredor de 2 cm. de longitud. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 19 de junio, a las 20 h. 47 m., en Riofresno (Segovia-Burgos, cuadrícula VL39), muchísimos renacuajos negros, pequeños, de sapo corredor,, en un charco del camino. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 25 de junio (datos de Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias, biólogo conservador y guarda del Refugio de Montejo, respectivamente, de WWF España).-
--- En la charca del Carrascal (cuadrícula 1), entre las 13 h. 30 m. y las 13 h. 40 m., al menos 26 jóvenes de sapo corredor, de menos de 2´5 cm. de longitud.
--- En el reguero del Pontón (cuadrícula 1), entre las 14 h. 15 m. y las 14 h. 30 m., 7 renacuajos de sapo partero común, y al menos 79 juveniles y 31 renacuajos de sapo corredor.
--- En la charca de anfibios en Valdevacas (Prado del Adra, cuadrícula 3) creada por la Junta de Castilla y León, entre las 18 h. 0 m. y las 18 h. 15 m., al menos 150 renacuajos de sapo corredor, y un ejemplar recién metamorfoseado.

--- El 3 de julio, a las 9 h. 17 m., en la orilla de la margen izquierda del embalse, frente a la isla, antes del nido Nº 19 de águila calzada, un diminuto sapo corredor, de 1´1 cm. de longitud. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 12 de julio, crías de sapo corredor en charcas del Refugio. (Juan José Molina Pérez y Leo Molina Novo).

--- El 11 de agosto, a las 16 h. 5 m., en la zona húmeda de Vallejo del Charco (cerca y al este de la vía del tren, cuadrícula 3), al menos cinco sapitos corredores. Mido dos de ellos, cuyas longitudes respectivas son de 1´8 cm. (con 2 cm. de pata trasera) y de 2´5 cm. (con 2´3 cm. de pata trasera), respectivamente. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 11 de octubre, en el abrevadero de la cooperativa agrícola de Milagros (Burgos), renacuajos de tres especies: unos negros tipo *Bufo* (probable sapo corredor), otros de sapo partero común (fotografiados), y otros quizá de sapillo. (José Liarte de Blas y Mario Liarte Lozano).

--- El 10 de noviembre, a las 19 h. 13 m., un sapito corredor en la carretera, en D.E.L.C. (Rosa Díez de Artazcoz Abellán y Pilar Díez de Artazcoz Abellán).

--- En la noche del 10 al 11 de noviembre, un sapo corredor pequeño fotografiado, y otros sapos corredores vistos fugazmente, en la zona del sur/sureste. (Xavier Martín Vilar).

--- El 18 de noviembre, un sapo corredor joven, en las afueras del pueblo de Montejo. (Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España).

Nuevos datos sobre ejemplares adultos medidos.- Año 2018.-

--- En la noche del 28 al 29 de marzo, medidos dos sapos corredores:
1.- A las 23 h. 41 m., en la carretera de Fuentenebro a La Sequera de Haza, pasada la desviación a Aldehorno (provincia de Burgos, cuadrícula VL39), un sapo corredor casi seguro macho, de 7 cm. de longitud, y 7 cm. de pata trasera.
2.- A las 0 h. 7 m., en La Sequera de Haza (Burgos, cuadrícula VM30), un sapo corredor probablemente macho, de 7 cm. de longitud, y 8 cm. de pata trasera.
(Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 15 de mayo, a las 23 h. 3 m., un sapo corredor, en la zona oeste del Refugio de Montejo (cuadrícula 1). Mide 6´7 cm. de longitud, y 6´7 cm. de longitud de la pata trasera. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- En la noche del 28 de mayo, a las 22 h. 50 m. ap., hay cuatro sapos corredores en el charco de la cantera (cuadrícula 4); hay dos ejemplares en cópula o amplexo (luego se separan), uno más en el agua, y uno junto al agua (éste, de 8 cm. de longitud, y 7´7 cm. de longitud de la pata trasera). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 8 de junio, a las 9 h. 3 m., un gran sapo corredor, al parecer hembra (no emite sonido al cogerlo por las axilas), en el sabinar al este de la Cuesta Blanca (cuadrícula 3), lejos de cualquier sitio con agua permanente. Mide 8´9 cm. de longitud, y 8´2 cm. de pata trasera. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 1 de julio, a las 23 h. 36 m., un sapo corredor, gordito, en la parte alta de D.E.L.C. (cuadrícula 4). Mide 6´3 cm. de longitud, y 5´6 cm. de pata trasera. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- En la noche del 8 al 9 de noviembre, a las 23 h. 12 m., un sapo corredor, junto al cementerio de Montejo. Es fotografiado y medido. (Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra, y José Luis Romero Carayol).
Tiene 3´7 cm. de longitud, y ap. 3 cm. de longitud de la pata trasera.

--- En la noche del 9 al 10 de noviembre, a las 1 h. 45 m. / 1 h. 46 m., un sapo corredor, en el oeste del Refugio. (Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra, José Luis Romero Carayol, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
Tiene 3´6 cm. de longitud, y 3´3 cm. de longitud de la pata trasera.

Nota.- Sobre nuevas observaciones de sapo corredor en noviembre (2018), véase el **Informe final** correspondiente al censo de otoño, págs. 89-90.

Nota sobre ejemplares anteriores medidos.- Pueden verse datos sobre diez sapos corredores de gran tamaño en la zona (de longitud igual o superior a 8´4 cm.), medidos por el autor, en las **Hojas Informativas Nº 13** (un ejemplar de 9´5 cm., que emite algún sonido, el 13-8-1984; pág. 3), **Nº 19** (un ejemplar de 8´4 cm., que emite con frecuencia curiosos sonidos sin abrir la boca, el 5-6-1991; pág. 18), **Nº 22** (un ejemplar de 9´0 cm., que chilla, el 27-5-1994; pág. 52), **Nº 23** (una hembra atropellada, muy reciente, con huevos, de 9´0 cm. de longitud, el 14-11-1997; pág. 57; citado también, por Juan Prieto Martín, en el **Informe final del censo de otoño** de ese año, pág. 20), **Nº 24** (un ejemplar de 8´5 cm., que había sido atropellado, el 6-6-1998; pág. 97), **Nº 30** (un ejemplar de 8´8 cm., el 1-4-2006; pág. 152), **Nº**

34 (dos ejemplares, ambos de 8´8 cm., el 25-5-2009; pág. 244), **Nº 40** (un ejemplar muerto, de 8´5 cm., el 1-5-2013; pág. 294), y **Nº 50** (un ejemplar de 8´9 cm., al parecer hembra, el 8-6-2018, antes señalado). Puede añadirse el dato de un ejemplar de 8´2 cm. de longitud, el 1-5-2005, en la **Hoja InformativaNº 44** (pág. 97).

Nuevos datos sobre la mortalidad.- Año 2018.-

--- En la noche del 9 al 10 de noviembre, a las 2 h. 45 m., se encuentra un sapo corredor muerto por atropello, en el oeste del Refugio. (Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra, José Luis Romero Carayol, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 11 de noviembre, a las 11 h. 37 m., se encuentra un sapo corredor muerto por atropello, en la Sg-945 ap. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

11.- ***RANITA DE SAN ANTÓN** (**o de SAN ANTONIO**) (*Hyla arborea* [*molleri*]) A ([1],4)

Véase lo indicado sobre esta especie en las **Hojas Informativas Nº 26** (págs. 142-143), **Nº 28** (pág. 114), **Nº 30** (págs. 153-154), **Nº 34** (pág. 248), **Nº 36** (págs. 221-222), **Nº 38** (pág. 243), **Nº 40** (págs. 295-296), **Nº 42** (pág. 111), y **Nº 44** (pág. 98).

12.- **RANA (VERDE) COMÚN** (*Rana [Pelophylax] perezi*) (1,2,3,4) N

Nuevos datos sobre la reproducción.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, excepto aquellas en que se indique otro autor).

--- En el arroyo de Vallunquera (cuadrícula 4).- El 14 de julio, entre las 14 h. 10 m. y las 14 h. 37 m., una rana, y renacuajos posiblemente de rana.
(Véanse las **Hojas Informativas Nº 38**, pág. 244; **Nº 40**, pág. 297; **Nº 42**, pág. 112; **Nº 44**, pág. 99; y **Nº 46**, pág. 104).

--- En la fuente de los Anillos (Ayllón, cuadrícula VL68).- El 18 de junio, a las 12 h. 51 m., tres ranas vistas y otras oídas. / El 1 de julio, a las 15 h. 13 m., ranas. / El 15 de agosto, a las 13 h. 28 m., muchas ranitas. Mido una, que tiene **3´2 cm.** de longitud y 4´2 cm. de pata trasera. / El 15 de septiembre, a las 8 h. 43 m., ranas / El 13 de noviembre, a las 11 h. 51 m., saltan ranas al agua; varias de ellas son pequeñas.
(Véanse las **Hojas Informativas Nº 36**, pág. 222; **Nº 38**, pág. 244; **Nº 40**, págs. 297-298; **Nº 42**, pág. 112; **Nº 44**, pág. 98; y **Nº 46**, pág. 104).

--- En el Navajo Grande (Corral de Ayllón, cuadrícula VL68).- El 13 de agosto, a las 16 h. 37 m. veo una o dos ranitas pequeñas, junto a la charca.
(Véanse las **Hojas Informativas Nº 42**, pág. 112; y **Nº 48**, pág. 112).

--- En la charca del alto del Bercial (Riaguas, cuadrícula VL58).- El 13 de agosto, a las 18 h. 10 m., tres ranas, de las que dos son pequeñas.

--- En las charcas del pinar de Fuentenebro (Burgos, cuadrícula VL39).- El 16 de junio, a las 9 h. 59 m., **más de 40** ranas. / El 3 de julio, a las 17 h. 39 m., alguna rana. / El 4 de agosto, a las 14 h. 10 m., ranas.
(Véanse las **Hojas Informativas Nº 36**, pág. 223; **Nº 38**, pág. 244 –Nota 3-; **Nº 40**, pág. 297; **Nº 42**, pág. 112; **Nº 44**, pág. 99; **Nº 46**, pág. 104; y **Nº 48**, pág. 111).

--- En el pilón de Fuentenebro (Burgos, cuadrícula VL39).- El 28 de marzo, a las 23 h. 26 m., una rana. / El 7 de agosto, a las 8 h. 55 m., una rana. / El 14 de agosto, a las 9 h. 58 m., una rana.
(Véanse las **Hojas Informativas Nº 36**, pág. 222; **Nº 38**, pág. 245 –Nota 6-; **Nº 40**, pág. 297; **Nº 42**, pág. 112; **Nº 46**, pág. 104; y **Nº 48**, pág. 111).

--- En una alberca cerca de Campo de San Pedro (cuadrícula VL58).- El 19 de junio, a las 11 h. 16 m., al menos dos ranas, incluyendo un ejemplar adulto bien visto.

(Véanse las **Hojas Informativas Nº 42**, pág. 112; **Nº 44**, pág. 99; **Nº 46**, pág. 104; y **Nº 48**, pág. 112).

--- En la charca de Cascajares (Segovia, cuadrícula VL58).- El 19 de junio, a las 17 h. 30 m., una rana vista y alguna oída.

--- En una acequia cerca de Mazagatos (cuadrícula VL68).- El 1 de julio, a las 12 h. 12 m., saltan al agua dos ranitas pequeñas.
(Véase la **Hoja Informativa Nº 48**, pág. 112).

--- En la charca de Barahona de Fresno (Segovia, cuadrícula VL57).- El 14 de junio, a las 15 h. 30 m., ranas vistas y oídas.

--- Cerca y al norte de Castillejo de Mesleón (Segovia, cuadrícula VL47).- El 30 de junio, a las 17 h. 30 m., una rana salta a un charco, en una pista forestal.

--- En el lavadero de El Arenal (Segovia, cuadrícula VL35).- El 25 de julio, tres ranas. (Jesús Cobo Anula y Fidel José Fernandez y Fernández-Arroyo).

--- En la charca cerca de Soto de Sepúlveda (Segovia, cuadrícula VL56).- El 18 de agosto, a las 17 h. 29 m., una rana.

--- En la fuente de La Granja (Segovia, cuadrícula VL78).- El 18 de junio, entre las 14 h. 32 m. y las 15 h. 10 m., al menos **nueve** ranas (vistas). / El 1 de julio, entre las 12 h. 50 m. y las 13 h. 39 m., ranas y ranitas, y renacuajos que parecen de rana.
(Véanse las **Hojas Informativas Nº 34**, pág. 248; **Nº 36**, pág. 222; **Nº 38**, pág. 243; **Nº 40**, pág. 296; y **Nº 42**, pág. 111; **Nº 44**, pág. 98; y **Nº48**, pág. 112).

--- En la charca junto al comedero de buitres de Caleruega (Burgos, cuadrícula VM62).- El 3 de agosto, a las 12 h. 58 m., una rana salta al agua.

--- En una charca aislada al sur de Montejo de Tiermes y no lejos del arroyo de Montejo, junto a la carretera de Montejo de Tiermes a Pedro (Soria, cuadrícula VL87).- El 31 de julio, a las 18 h. 24 m., ranas.
(Véanse las **Hojas Informativas Nº 34**, pág. 248; **Nº 36**, pág. 222; **Nº 38**, pág. 244, Nota 4; **Nº 40**, pág. 298; y **Nº 42**, pág. 112; **Nº 44**, pág. 99; **Nº 46**, pág. 104; y **Nº 48**, pág. 112).

--- En la charca de San Juan, cerca de Atauta (Soria, cuadrícula VL89).- El 17 de junio, entre las 12 h. 43 m. y las 13 h. 2 m., al menos 10 ranas posiblemente adultas, una rana pequeña, y tres renacuajos de rana. Es medido un renacuajo, que tiene **6 cm.** de longitud. (Cristian Calvo Vergara, Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García, Antonio Romera Camarero, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- En la charca grande cerca de Vicálvaro (Soria, cuadrícula VM81).- En la noche del 27 al 28 de julio, tres ranas adultas, ranitas pequeñas, y renacuajos de rana. Las tres ranas y un renacuajo son cogidos, y liberados de nuevo. (Cristian Calvo Vergara, Marta Llorente Sancho, Fermín Redondo Ramírez, Helena Jáuregui Díaz de Cerio, Gabriel Redondo Jáuregui, Ángel Bocos García, Antonio Romera Camarero, Laura S., y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Las medidas de las tres ranas son las siguientes.-

	1	2	3
Longitud total	10 cm.	10´5 cm.	8 cm.
Longitud pata trasera	14 cm.	13´5 cm.	11´3 cm.

--- En la fuente de Valdevacas (junto al lavadero viejo, cuadrícula 3), el 25 de junio, entre las 17 h. 30 m. y las 17 h. 40 m., una rana común adulta. (Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias, biólogo conservador y guarda del Refugio de Montejo, respectivamente, de WWF España).

--- En la charca de anfibios en Valdevacas (Prado del Adra, cuadrícula 3) creada por la Junta de Castilla y León, el 25 de junio, entre las 18 h. 0 m. y las 18 h. 15 m., dos ranas comunes adultas. (Jesús Cobo Anula

y Jesús Hernando Iglesias, biólogo conservador y guarda del Refugio de Montejo, respectivamente, de WWF España).

--- En el río de la Hoz (Barbolla, Segovia, cuadrícula VL47).- Entre el 6 y el 8 de julio, "*se ven bastantes renacuajos en el río y se escucha croar a las ranas, hace años que no se sentían tanto*". (Antonio Fernández Ortiz).

--- En el arroyo (seco) de Valdearcos (Guadalajara, cuadrícula WL26).- El 5 de agosto, estando el arroyo seco, veo ranitas pequeñas que saltan, en el suelo (o muy cerca) de una pequeña charca que acaba de secarse. Cojo una, compruebo que se trata de una rana común, y la mido. Tiene **1´8 cm.** de longitud, y 2´4 cm. de longitud de la pata trasera.

NOTA

Si prescindimos de los datos dudosos, se obtiene, para el periodo de estudio (desde que comenzó el Refugio), y para cada una de las cuatro cuadrículas (1, 2, 3 y 4), unos totales respectivos de 11, 7, 10 y 10 especies de anfibios, respectivamente.

--- -

Para el total de herpetos (anfibios y reptiles), el número de especies seguras citado en cada una de las cuatro cuadrículas es de 24, 19 (18+1), 24 y 23, respectivamente.

PECES.-

Seguiremos con la misma notación de la **Hoja Informativa Nº 26** (véase la pág. 143).

Nota.- En 2015, fue prohibida la pesca, desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, en un tramo de la cola del embalse (aguas abajo del puente de Alconadilla); tramo que es importante para las aves acuáticas.

S/n.- ***ANGUILA** (*Anguilla anguilla*)

Véase lo anotado sobre esta especie en la **Lista de vertebrados del Refugio** (Apéndice 2, pág. 47), y en las **Hojas Informativas Nº 22** (pág. 52), **Nº 26** (pág. 144), **Nº 28** (pág. 115), y **Nº 34** (pág. 250).

1.- **TRUCHA COMÚN** (*Salmo trutta*) (1,3,4) [Atlas.- (1,4) (p. 130)]

Notas.- 1) Una fotografía, obtenida por Javier López Hernando, de una "*trucha de gran tamaño capturada con pesca eléctrica en el río Riaza y posteriormente liberada*", aparece en:

--- Santiago Sáez, J. M.; y García de Jalón, D. (2018). **Más ríos sin truchas en los tiempos del cambio climático.** *Quercus*, Nº 390, agosto de 2018, pp. 31-34. (Pág. 32).

2) Nuevos artículos relativos a la trucha en la zona son los siguientes:

--- El Adelantado de Segovia (2018). **La Junta incluye el río Riaza en su totalidad como "aguas trucheras".** *El Adelantado de Segovia*, miércoles 4-4-2018, pág. 14.

--- El Adelantado de Segovia (2019). **La Junta mejora la reproducción de la trucha común en el río Riaza. / Se ha llevado a cabo la incubación de ejemplares durante la freza de la especie, con un sistema que asegura un 90% de nacimientos frente al 20% en condiciones naturales.** *El Adelantado de Segovia*, martes 5-2-2019. (Con una fotografía).

---

3) En la "**Memoria anual del Parque Natural Hoces del río Riaza. Año 2018**" (Junta de Castilla y León, págs. 85-86), se indica:

3.I) "*El 2 de octubre de 2018 se realizó el* ***muestreo de la red de seguimiento de peces en Castilla y León*** *con periodicidad de muestreo bianual. Están establecidos dos puntos de estaciones de muestreo en el entorno del parque: uno en el Parque Natural de las Hoces del Riaza antes de llegar a Peña Portillo y otro en la estación SG-ARE-1 que se encuentra fuera del parque, aguas abajo de la anterior* [ap. bajo Covanegra]*, con el siguiente resultado:*"

En la primera, en la zona de Peña Portillo, 51 truchas, 173 gobios, 1 bordallo, y 12 cangrejos.

En la segunda, ap. en la zona de Covanegra, 35 truchas, 142 gobios, 8 bermejuelas, 4 bogas, 2 bordallos, y 2 cangrejos.

(Resumen de datos que aparecen en la Memoria mencionada).

3.II) "*Se han realizado nuevamente* ***actuaciones en frezaderos del río Riaza*** *en el Parque Natural de las Hoces del Riaza en colaboración con la Asociación de Pescadores "CD Pesca Mosca Segovia", estas actuaciones estaban encaminadas a la mejora de las poblaciones de trucha, en este año 2018 sólo fue posible la que se refiere a la reproducción asistida con cajas tipo incubator.*

Las actuaciones se realizaron el 1 de diciembre de 2018 en la zona de Peña Portillo, fundamentalmente. La captura de reproductores se realizó por Agentes Medioambientales de este Servicio Territorial. La freza de las truchas estaba en el momento adecuado por lo que el número de huevos de las truchas reproductoras fue abundante, colocándose 1.600 huevos en las cajas incubadoras en el río Riaza.

Esta Asociación quiere colaborar en la restauración de las márgenes del río Riaza con vegetación autóctonas, de este modo se programarán estas actuaciones para años sucesivos."

Véase lo indicado sobre la trucha en las **Hojas Informativas Nº 26** (pág. 144), **Nº 30** (pág. 155), **Nº 34** (pág. 250), **Nº 36** (pág. 224), **Nº 38** (pág. 246), **Nº 40** (pág. 300), **Nº 42** (pág. 113), **Nº 46** (pág. 105), y **Nº 48** (págs. 113-114).

2.- **BARBO IBÉRICO (o COMÚN)** (*Barbus bocagei*) (1,3,4) [Atlas.- (1,2,3,4) (p. 145)] (¿*Luciobarbus bocagei*?)

Notas.- Año 2018.- 1) El 22 de abril, a las 17 h. 1 m., un posible barbo en la cola del embalse, frente al mirador de Peñalba. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

2) El 25 de abril, en el embalse de Linares, muchos peces frezando, al parecer barbos. (José Luis López-Pozuelo García).

3) El 3 de julio, en el embalse, junto a la margen izquierda, frente a la isla, un probable barbo a las 10 h. 53 m., y un barbo grande a las 12 h. 26 m. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

3.- **PEZ ROJO (o CARPÍN DORADO)** (*Carassius auratus*) I (4) [Atlas.- No citado en el Riaza; p. 166]

Véase lo indicado sobre esta especie en las **Hojas Informativas Nº 21** (pág. 21) y **Nº 30** (pág. 156).

4.- **CARPA** (*Cyprinus carpio*) E I (4) [Atlas.- (4) (p. 188)]

Nota.- Año 2018.- --- El 21 de abril, una posible carpa en el embalse, bajo la isla. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

5.- **BERMEJUELA o BERMEJA** (*[A]Chondrostoma arcasii*) (1,4) [Atlas.- (1,2,3,4) (p. 168)]

Notas.- Año 2018.- 1) En la noche del 18 al 19 de junio (entre las 22 h.15 m. y las 0 h. 20 m.), posibles bermejuelas en el canal de Corral de Ayllón (Segovia, cuadrícula VL68). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

2) El 3 de julio, en torno a las 12 h. 20 m., bermejuelas en el embalse, junto a la margen izquierda, frente a la isla. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

3) Véase la Nota 3.I en el apartado sobre la trucha.

Véase lo indicado sobre la especie en las **Hojas Informativas Nº 30** (pág. 157), **Nº 38** (pág. 247), **Nº 40** (pág. 302), **Nº 42** (pág. 114), **Nº 46** (pág. 106), y **Nº 48** (págs. 113, 115).

6.- **BOGA DEL DUERO** (*[Pseudo]Chondrostoma duriense*) (1,4) [Atlas.- (1,2,3,4) (p. 173)]

--- Véanse la Nota 3.I en el apartado sobre la trucha; y lo indicado sobre esta especie en las **Hojas Informativas Nº 30** (pág. 157), **Nº 38** (pág. 247), **Nº 40** (pág. 302), y **Nº 48** (págs. 113, 115).

7.- **GOBIO** (*Gobio gobio*) [(*Gobio lozanoi*)] I (1,4) [Atlas.- (1,4) (p. 191)]

--- Véanse la Nota 3.I en el apartado sobre la trucha; y lo indicado sobre esta especie en las **Hojas Informativas Nº 30** (pág. 157), **Nº 38** (pág. 248), **Nº 40** (pág. 302), **Nº 42** (pág. 115), y **Nº 48** (págs. 113, 115).

8.- ***BORDALLO (o CACHO)** (*Squalius carolitertii*) (1,3,4) [Atlas.- (1,4) (p. 204)]

--- Véanse la Nota 3.I en el apartado sobre la trucha; y las notas sobre esta especie en las **Hojas Informativas Nº 30** (pág. 157), **Nº 34** (pág. 252), **Nº 38** (pág. 248), **Nº 40** (pág. 302), y **Nº 48** (págs. 113, 115).

S/n.- ***PISCARDO** (*Phoxinus phoxinus [bigerri]*) I

En el Refugio, seguimos sin noticias de este pez, que sin embargo está citado en localidades cercanas. Véase lo indicado al respecto en la **Lista de vertebrados** (Apéndice 1, pág. 45), y en las **Hojas Informativas Nº 21** (pág. 21), **Nº 26** (pág. 145), **Nº 32** (págs. 199-200), **Nº 34** (pág. 292), **Nº 38** (pág. 248), y **Nº 40** (pág. 303).

9.- ***TENCA** (*Tinca tinca*) A E ? (4) [Atlas.- No citada en el Riaza; p. 214]

10.- ***** **LAMPREHUELA** (*Cobitis calderoni*) A (1) [Atlas.- Citada en el Riaza, aguas arriba del área de estudio; p. 217]

Véanse lo indicado sobre esta especie en la **Lista de vertebrados del Refugio** (Nota 146, págs. 43-44); y en las **Hojas Informativas Nº 32** (pág. 200), y **Nº 38** (pág. 248).

S/n.- ***PEZ SOL** (*Lepomis gibbosus*) A E I (4)

Véase lo indicado sobre este pez, del que no conímamos noticias anteriores en la zona, en la **Hoja Informativa Nº 42** (págs. 97-98, 115).

11.- ***PERCA AMERICANA (o "BLACK-BASS")** (*Micropterus salmoides*) A I (4)
[Atlas.- (4) (p. 260)]

Véanse lo indicado sobre la especie en las **Hojas Informativas Nº 30** (pág. 158), **Nº 40** (págs. 303-305), **Nº 43** (pág. 116), y **Nº 48** (pág. 116).

NOTA

Si prescindimos de los datos dudosos, se obtiene, para el periodo de estudio (desde que comenzó el Refugio), y para cada una de las cuatro cuadrículas (1, 2, 3 y 4), unos totales respectivos de 7, 3 (0+3), 5 (3+2) y 10 especies de peces, respectivamente.

Frases diversas

"*De nuevo ha sido estupendo este tiempo en el Refugio, este año con mi hija, viendo a viejos y nuevos amigos, y disfrutando de ese lugr donde dijo Félix Rodríguez de la Fuente que "encontraréis un pedazo de felicidad"".*

[Elías Gomis Martín (2018). **Censando en el Refugio de Rapaces de Montejo.** Publicado en eliasgomis.blogspot.com. 16 págs. Con fotografías del autor.]

"*En las lagunas de Cantalejo no hay papeleras ni contenedores; es mucho más lógico y cívico que, después de disfrutar de una jornada en el campo, recojamos todos nuestros desperdicios y nos los llevemos de vuelta a casa."*

[Pérez-Cecilia Carrera, P.; Rosa Cubo, E; y Cirujano Bracamonte, S. (2010). **Las lagunas de Cantalejo (Segovia). Volumen II.** Fundación Biodiversidad, Junta de Castilla y León y Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León. Serie Técnica. Valladolid. 180 págs.]

"*Las hoces del Riaza (…), lugar hermoso que tiene que seguir permaneciendo así, intacto y repleto de buitres surcando libres los cielos."*

[Emilia Sánchez Coca. Carta del 25-11-2018.]

"*¡Qué maravillosos momentos pasé con Félix en aquellas cárcavas salvajes! ¡Cuántos recuerdos en un lugar perdido en el tiempo, hoy protegido gracias a su ilusión, perseverancia y trabajo! Hace pocos años volví a recorrer en soledad los cañones del río Riaza, en Montejo (…).*"

"*Hoticiano era un hombre enjuto, fuerte, entrañable, bondadoso, enamorado de aquel lugar, de los animales, y con unas cualidades humanas insuperables. Nos recibió a la entrada de la reserva (…).*"

[Carlos Llandrés Domínguez, y Jesús del Río, J. (2017). **Contaba Félix… Relatos e historias contadas por Félix Rodríguez de la Fuente.** VintalCrea Ediciones. 144 págs. (Págs. F-14, 115-118. *¡Félix, lo has conseguido!*, en *Historias vividas con Félix.*).]

"*El pastoreo general está en crisis, y aunque parezca paradójico esto conduce a la degradación de los prados naturales, según afirma el ilustre botánico Dr. Montserrat.*"

[Ramón Elósegui (1972). **Sobre los "comederos de buitres".** *ADENA* 3, mayo de 1972, págs. 20-23.]

(Véanse también los párrafos citados en las **Hojas Informativas Nº 29** [págs. 205-206], **Nº 30** [págs. 158-168], **Nº 31** [págs. 291-297], **Nº 32** [págs. 201-224], **Nº 33** [págs. 347-353], **Nº 34** [págs. 253-264], **Nº 35** [págs. 426-432], **Nº 36** [págs. 227-229], **Nº 38** [págs. 249-261], **Nº 40** [págs. 307-311], **Nº 42** [págs. 116-120], **Nº 44** [págs. 102-105], **Nº 46** [págs. 107-108], y **Nº 48** [págs. 116-117].).

Notas sobre invertebrados.-

Nuevos artículos o informes sobre el tema son los siguientes:

---- WWF España (2018). **Informe anual del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia). 2017.** 62 págs. (con los Anexos).
--- WWF España (2019). **Informe anual del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia). Datos del año 2018.** Informe presentado el 13-3-2019, en la reunión del Patronato del Parque Natural. 26 págs. (sin los Anexos).

---

1) Sobre moluscos de agua dulce, o terrestres.- Véase lo indicado al respecto en las **Hojas Informativas Nº 27** (pág. 210, Nota 1), **Nº 29** (pág. 207, Nota 1), **Nº 30** (pág. 169, Nota 1), **Nº 33** (pág. 356, Nota 1),**Nº 34** (pág. 265, Nota 1), **Nº 35** (págs. 433-434), **Nº 40** (págs. 313-315), **Nº 42** (pág. 121), **Nº 44** [pág. 106], **Nº 46** [pág. 109], y **Nº 48** [pág. 118];; y en las referencias allí citadas.

Nuevos datos.-

--- El 10/11 de noviembre de 2018, en la zona de La Raya / El Campanario ap., junto al río, rastros de nutria, "*con abundantes conchas de bivalvos de río de dos especies, muy escasos en otros lugares*". (Andrés Requejo de las Heras).

--- En la noche del 12 al 13 de marzo de 2019, en el pueblo de Fuentenebro (Burgos, cuadrícula VL39), Yolanda Calleja Corento me enseña bastantes babosas (¿de sótano?), grandes y pequeñas. Al menos siete son adultas; la mayor de ellas tiene unos 7 cm. de longitud.

2) Sobre sanguijuelas.- --- El 17 de junio de 2018, a las 12 h. 53 m., una sanguijuela de banda roja, en la charca de San Juan, cerca de Atauta (Soria, cuadrícula VL89). (Cristian Calvo Vergara, Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García, Antonio Romera Camarero, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

---

2) Sobre lombrices de tierra.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).- Registrada la lombriz de tierra el 21 de abril (a las 18 h. 32 m., un gran ejemplar, frente a Peñalba).

3) Sobre cangrejos.- Año 2018.-

--- En la noche del 18 al 19 de junio, a las 23 h. 50 m. ap. y a las 0 h. 36 m., sendos cangrejos señales (*Pascifastacus leniusculus*), distintos, en el canal de Corral de Ayllón (Segovia, cuadrícula VL68). El segundo, que avanza contra corriente, sólo tiene la pinza derecha, y mide 11´5 cm. de longitud. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 17 de agosto, se descubre muerto un cangrejo señal en el río de la Hoz, a la altura de Covachuelas (cerca de Barbolla, Segovia, cuadrícula VL47). El día 18 de agsto "*se inspecciona el trao del mismo río desde su desembocadura en el Duratón hasta Covachuelas y se ven cuatro cangrejos señales en diferentes puntos del río*", "*de cuyas aguas desapareció el cangrejo autóctono hace años*". (Antonio Fernández Ortiz).

--- Referente al 2 de octubre, véase la Nota 3.I en el apartado sobre la trucha.
--- El 15 de septiembre, algún cangrejo señal muerto en el río Pedro, en la zona del Molino de Torraño (Soria, cuadrícula VL78). Después, algún cangrejo ¿rojo?, posiblemente muerto, en el río Aguisejo, cerca de Santibáñez de Ayllón (Segovia, cuadrícula VL77). (Participantes en una excursión del Fondo para el Refugio, guiada por Jorge Andrés Remacha Lorenzo).
(Puede verse una foto, obtenida por Jorge Andrés Remacha, en la Circular Nº 21 del Fondo, pág. 12. Figura también en el Anexo I.)

--- Entre el 9 y el 11 de noviembre, cangrejo rojo (*Procambarus clarkii*), en las charcas del sur de Burgos. (Javier Vitores Casado).

--- El 10 de noviembre, un cangrejo señal (*Pascifastacus leniusculus*), en el río, bajo V.D.I. (Bruno Chacón Espinosa, Daniel Carrera Estévez y Diego Carrera Sánchez).

Comienzo de 2019.-

--- El 23 de febrero, restos de cangrejo, posiblemente dejados por una garza real, en el poyete de la carretera, bajo La Catedral. Se obtienen fotos. (Francisco Jesús Fernández Herrera y Sara Fernández Aguirre).

Nota.- En la reunión del Patronato del Parque Natural, celebrada en Valdevacas de Montejo el 13-3-2019, Jesús Hernando Iglesias comentó que había visto en el río, bajo Peña Portillo, hace años, un cangrejo señal intentando cazar a un cangrejo rojo.

(Véanse las **Hojas Informativas Nº 34** [págs. 265-266, Nota 2], **Nº 35** [pág. 434, Nota 2], **Nº 36** [págs. 230-231, Nota 2], **Nº 38** [págs. 262-263, Nota 2], **Nº 40** [págs. 316-317, Nota 2], **Nº 42** [págs. 97-98, y 121-Nota 2], **Nº 44** [pág. 106, Nota 2], **Nº 46** [pág. 109, Nota 2], y **Nº 48** [pág. 118, Nota 2]).

---

4) Sobre escolopendras y milpiés.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 2 de mayo, a las 18 h. 53 m., un milpiés, bajo tierra, en lo alto del final de la margen derecha del barranco de Valdecasuar (cuadrícula 3).
--- El 25 de mayo, a las 7 h. 50 m., una escolopendra pequeña o milpiés, junto al chozo de La Raya (cuadrícula 4).
--- El 30 de mayo, a las 12 h. 17 m. y a las 15 h. 22 m., sendas escolopendras pequeñas, cada una bajo una piedra, en el páramo alto de S.I.1ª (cuadrícula4).
--- En la noche del 9 al 10 de noviembre, a las 1 h. 55 m., una escolopendra, en el suroeste del Refugio, en el camino entre el pueblo de Montejo y el cementerio. (Alfonso Lario Doylataguerra, Raúl González Rodríguez, José Luis Romero Carayol, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

---

5) Sobre escorpiones.- Año 2018.-

--- El 12 de agosto, a las 14 h. 34 m., un escorpión amarillo (*Buthus occitanus*), grande para lo que es habitual aquí, en el sabinar alto de la margen derecha del barranco de Valdecasuar (cuadrícula 3). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 21 de agosto, a las 20 h. 20 m., en la parte oeste del sabinar del norte del Refugio de Montejo (cuadrícula 2), un escorpión amarillo (*Buthus occitanus*), bajo una piedra. Es fotografiado. (Jesús Hernando Iglesias –guarda de WWF España en el Refugio-, Carlos Cuéllar Basterrechea –de GREFA-, Carlos Palma Barcenilla, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Véanse las Hojas Informativas **Nº 23** (pág. 58), **Nº 24** (pág. 98), **Nº 32** (pág. 225), **Nº 40** (págs. 317-318), y **Nº 42** (pág. 121).

---

6) Sobre arañas.- Año 2018.-

--- El 13 de julio, a las 13h. 58 m., una tarántula (*Lycosa ¿hispanica?*), en el Cerro de los Ataques (Refugio de Montejo, cuadrícula 1). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 23 de julio, a las 7 h. 57 m., una tarántula (*Lycosa ¿hispanica?*), en la margen derecha del embalse de Linares, aguas abajo del viejo nido Nº 38 de águila calzada (cuadrícula 4). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 18 de agosto, una araña *Agelena labyrinthica*, fotografiada, en el barranco de Pardebueyes, en Villaverde de Montejo. (Xavier Parra Cuenca).

Nota.- Tal como distintos naturalistas han hecho nota, la fotografía de una araña obtenida por Juan Francisco Martín Calleja en Valdevacas de Montejo, en enero de 2018, que figura en la **Hoja Informativa Nº 48** (pág. 339), corresponde a una araña de la cruz (o araña de cruz blanca, o araña de los jardines) (*Araneus diadematus*).

---

7) Sobre odonatos (libélulas y similares).- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, excepto aquellas en que se indique otro autor).

--- El 1 de junio, a las 13 h. 53 m., en lo alto del comienzo total de V.D.I., una libélula azul por encima, tal vez un ejemplar macho de *Orthetrum brunneum* u *Orthetrum coerulescens*.

--- El 17 de junio, a las 12 h. 53 m., una larva de libélula de 4 cm. de longitud, en la charca de San Juan, cerca de Atauta (Soria, cuadrícula VL89). (Cristian Calvo Vergara, Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García, Antonio Romera Camarero, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 1 de julio, a las 13 h. 41 m., en la fuente de La Granja (Segovia, cuadrícula VL78), una libélula macho de la especie *Orthetrum ¿brunneum*?
(Recuérdese que, en la misma fuente, el 20 de junio del año anterior vi una libélula de la especie *Orthetrum brunneum*.)

--- El 31 de julio, a las 11 h. 50 m., un abejaruco posado en un cable, con una libélula en el pico, entre Castro y Valvenedizo, cerca de Valvenedizo (Soria).

--- El 3 de agosto, en la charca junto al comedero de buitres de Caleruega (Burgos, cuadrícula VM62), libélulas de dos especies. Una, con tórax y abdomen azules, es al parecer un ejemplar macho del género *Orthetrum* (posiblemente *Orthetrum coerulescens* u *Orthetrum brunneum*). La otra es mayor, con el abdomen también azul y el tórax más o menos verdoso; quizás podría ser un ejemplar macho del género *Aeshna* (posiblemente *Aeshna mixta* o *Aeshna affinis*), o tal vez de *Anax imperator*.

--- El 11 de agosto, a las 16 h. 8 m., en la pequeña zona húmeda temporal de Vallejo del Charco (antes de la vía, cuadrícula 3), libélulas azules del género *Orthetrum*, y libélulas rojas (posiblemente machos de *Crocothemis erythraea*, o de *Sympetrum sp.*).

--- El 11 de agosto, una libélula en Cabeza Calderón (cuadrícula 4).

--- El 20 de agosto, a las 12 h. 44 m., una libélula en lo alto de Peña Cuervo (cuadrícula 4).

--- El 8 de septiembre, una libélula *Aeshna mixta*, macho, fotografiada, junto al puente de Alconadilla. (Xavier Parra Cuenca).

--- El 13 de noviembre, a las 14 h. 20 m., dos libélulas en la fuente de Valdespino (Castillejo de Robledo, Soria, cuadrícula VM50-VL59).

Bibliografía consultada.-
--- Dijkstra B., K.-D. (2013). **Guía de campo de las Libélulas de España y de Europa.** (Ilustrado por R. Lewingyon). Ed. Omega. Barcelona. 318 págs.

(Véanse las **Hojas Informativas Nº 29** –pág. 207, Nota 2-, **Nº 30** –pág. 169, Nota 4-, **Nº 34** –págs. 266-267, Nota 5-), **Nº 35** –pág. 434, Nota 5-, **Nº 36** –pág. 231, apartado 5-, **Nº 38** –págs. 264-265, apartado 5-, **Nº 40** –pág. 319, apartado 6-, **Nº 42** –pág. 122, apartado 7-, **Nº 44** –págs. 106-107, apartado 5-, **Nº 46** –pág. 110, apartado 5-, y **Nº 48** –págs. 119-120, apartado 5-).

---

8) Sobre insectos palo.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 16 de junio, a las 8 h. 42 m., en la zona del Risco (Fuentenebro, Burgos, cuadrícula VL39), un insecto palo verde, de 3´8 cm. de longitud.
--- El 15 de julio, a las 8 h. 22 m., en la alto del final de la margen derecha del barranco de Valdecasuar (cuadrícula 3), un insecto palo verde, de 5´8 cm. de longitud.
--- El 26 de julio, por la tarde, un gran insecto palo como el anterior, entre Torraño y la N-110 (Soria, cuadrícula VL78). (Con el agente medioambiental Fernando García Fernández).

Sobre citas anteriores de insectos palo, véanse las **Hojas Informativas Nº 27** (pág. 212, Nota 7), **Nº 29** (pág. 207, Nota 4), **Nº 34** (pág. 267, Nota 7), **Nº 36** (págs. 231-232, Nota 6), **Nº 38** (pág. 265), y **Nº 40** (pág. 320, Nota 8).

---

9) Sobre ortópteros.-

--- Sobre grillos.- Año 2018.- En la noche del 9 al 10 de noviembre, dos grillos (*¿Gryllus sp.?*), a las 1 h. 55 m. y a las 2 h. 51 m. respectivamente, en el suroeste del Refugio, en el camino entre el pueblo de Montejo y el cementerio. El primero mide unos 2 cm. de longitud. (Alfonso Lario Doylataguerra, Raúl González Rodríguez, José Luis Romero Carayol, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 21 de agosto de 2018, una **chicharra alicorta** (o **grillo verde**) (*Ephippiger[a] ephippiger*), bien grande, en los páramos de Corral Nuevo (no lejos de Castroserracín, Segovia, cuadricula VL38. Es fotografiado. Mide 6 cm. de longitud, de los que 3´8 cm. corresponden al apéndice caudal. (Carlos Palma Barcenilla y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
(Véanse las **Hojas Informativas Nº 40** [pág. 319] y **Nº 42** [págs. 122, 369]).

---

10) Sobre himenópteros.- Véanse las **Hojas Informativas Nº 29** [pág. 207, Nota 5], **Nº 34** [pág. 268], **Nº 35** [págs. 434-435], y **Nº 36** [pág. 231], **Nº 40** [págs. 322-323], **Nº 42** [pág. 123], **Nº 44** [pág. 107], y **Nº 48** [pág. 120].

Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, excepto aquellas en que se indique otro autor).

--- El 2 de junio, a las 14 h. 41 m., un gran abejorro negro, en el Barranco de los Fósiles (cuadrícula 4).
(Estos grandes abejorros negros quizás podrían ser la abeja carpintero o abeja azul de la madera, *Xylocopa violacea*).
--- El 15 de septiembre, un nido de grandes avispas o avispones o similares (negras, con rayas amarillas), junto al río Pedro, en la zona del Molino de Torraño (Soria, cuadrícula VL78). (Participantes en una excursión del Fondo para el Refugio, guiada por Jorge Andrés Remacha Lorenzo).

11) Sobre escarabajos.-

11.1) Nuevas citas de aceitera.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 9 de mayo, a las 17 h. 8 m., una aceitera coralina (*Physomeloe corallifer*), de 3´1 cm. de longitud, en lo alto de Peña Cuervo (2ª parte, cuadrícula 4). Era toda negra, salvo dos puntitos rojos a cada lado del tórax.
--- El 12 de mayo, a las 12 h. 18 m., una aceitera coralina, de 3´7 cm. de longitud, en lo alto del cerro "Los Colmenares" (Refugio de Montejo, cuadrícula 1). Era como la del día 9.
--- El 14 de julio, a las 13 h. 27 m., una aceitera común (*Berberomeloe majalis*), de 3´7 cm. de longitud, cerca de un chozo de la margen derecha del embalse (cuadrícula 4).
--- El 16 de julio, a las 11 h. 29 m. y a las 11 h. 33 m., sendas aceiteras comunes, de 3´9 cm. y 4´0 cm. de longitud respectivamente, en la margen izquierda del embalse, aguas arriba del Chorrillo (cuadrícula 4).
--- El 21 de julio, a las 12 h. 16 m. y a las 19 h. 56 m., sendas aceiteras comunes, de 4´1 cm. y 5´1 cm. de longitud respectivamente, en la parte alta del barranco lateral al de San Andrés y en los páramos de la margen izquierda del barranco de la Retuerta (cuadrícula 4).

De la aceitera común (*Berberomeloe majalis*), pueden verse 33 citas de los años anteriores en las **Hojas Informativas Nº 27** (pág. 213, apartado 10.2), **Nº 29** (pág. 208, apartado 6.3), **Nº 30** (pág. 170, apartado 8.1), **Nº 31** (pág. 299, apartado 5.1), **Nº 32** (pág. 228, apartado 11.1), **Nº 38** (pág. 266,apartado 9.1), **Nº 40** (págs. 323-324), **Nº 42** (págs. 123, 374), **Nº 44** (págs. 107, 273), y **Nº 48** (pág. 121, Nota 10.1).

En las **Hojas Informativas Nº 34** (pág. 269, apartado 12.1), **Nº 42** (pág. 123, nota 12.1.III), **Nº 46** (pág. 111, nota 8.1, y pág. 299), y **Nº 48** (pág. 121, nota 10.1), pueden verse cinco registros anteriores de la aceitera coralina (*Physomeloe corallifer*). En la **Nº46** aparece también la cita, con foto, de una probable carraleja azul (*Meloe proscarabeus*).

11.2) Nuevas citas de escarabajos acuáticos.- Año 2018.-
--- El 8 de noviembre, a las 17 h. 15 m., en el abrevadero cerca de la carretera de Valdevacas de Montejo a Moral de Hornuez, un escarabajo acuático, posiblemente un ditisco (*Dytiscus sp.*). Es fotografiado. (Alfonso Lario Doylataguerra, Raúl González Rodríguez y José Luis Romero Carayol).

11.3) Nuevas citas de escarabajos peloteros.- Año 2018.- (Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- El 16 de abril, a las 16 h. 37 m., junto a la vía del tren, no lejos del Primer Valle (cuadrícula 4), un escarabajo pelotero, con estrías en el abdomen (¿*Scarabeus sp., o Geotrupes sp.*?), de 1´5 cm. de longitud.

Véanse las **Hojas Informativas Nº 28**, pág. 213, apartado 10.3; **Nº 38**, pág. 267, apartado 9.2; **Nº 40**, pág. 324, apartado 13.5; **Nº 42**, pág. 123, apartado 12.2; **Nº 46**, pág. 111, apartado 8.2; y **Nº 48**, pág. 121, apartado 10.2.

11.4) Como es habitual, ha habido nuevas citas del escarabajo tenebriónido *Blaps gigas*. En 2018, medí cuatro ejemplares: uno en Cenegro (Soria, cuadrícula VL69), de 3´1 cm. de longitud; dos en el fondo de una cueva (cuadrícula 1), ambos de 2´5 cm. de longitud (los dos); y uno en la ladera alta de la margen izquierda del barranco del Boquerón (cuadrícula 4), de 3´5 cm. de longitud.

11.5) Nuevas citas, en 2018, del escarabajo rinoceronte (*Oryctes nasicornis*).-

--- En la noche del 18 al 19 de junio, entre las 23 h. 58 m. y las 0 h. 32 m., un gran escarabajo rinoceronte en el pueblo de Corral de Ayllón (Segovia, cuadrícula VL68). Viene y sale volando. Mide 3´2 cm. de longitud.
--- En la noche del 12 al 13 de julio, a las 0 h.43 m., en la salida este del pueblo de Montejo de la Vega (Segovia, cuadrícula 1), un escarbajo rinoceronte macho, con cuerno pequeño, de 2´9 cm. de longitud.

(Observaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Puede verse un resumen de la información anterior que conocemos, sobre el escarabajo rinoceronte en la comarca, en las **Hojas Informativas Nº 27** (pág. 213, apartado 10.2), **Nº 29** (pág. 208, apartado 6.2), **Nº 30** (pág. 170, apartado 8.3), **Nº 32** (pág. 228, apartado 11.4), **Nº 34** (pág. 269, apartado 12.6), **Nº 38**

(pág. 367, apartado 9.5), **Nº 40** (pág. 325, apartado 13.7), **Nº 44** (pág. 108, apartado 8.5), y **Nº48** (pág. 122, apartado 10.6).

11.6) El 1 de junio de 2018, a las 12 h. 27 m., en lo alto del comienzo total de V.D.I. (la Cuesta Agria), muchos escarabajos que posiblemente sean mascadores mesetarios (*Mylabris hieracii*). Es la primera vez que los veo este año. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
(Véase la **Hoja Informativa Nº 34**, pág. 269).

---

12) Sobre hormigas león.- El 15 de septiembre de 2018, bajo una cueva junto al río Pedro, en la zona del Molino de Torraño (Soria, cuadrícula VL78), alguna larva de hormiga león (¿*Myrmeleon formicarius*?), con su trampa característica. (Participantes en una excursión del Fondo para el Refugio, guiada por Jorge Andrés Remacha Lorenzo).

---

13) Sobre mariposas.- 13.1) Mariposas diurnas.- A) Sobre los trabajos realizados por José Manuel Boy Carmona en las cercanías de Languilla, véanse las **Hojas Informativas Nº 40** (págs. 327-331), **Nº 42** (págs.. 124-128), **Nº 44** (págs. 108-111), y **Nº 46** (págs. 112-116).

Sobre los trabajos realizados por Juan Carlos Vicente Arranz y Beatriz Parra Arjona en el Parque Natural, véanse la **Hoja Informativa Nº 42**, págs. 129-133; y la *Circular Informativa* Nº 15 del Fondo para el Refugio, págs. 23-27.

B) Entre las especies anotadas por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, en 2018, destacaremos el piérido "cleopatra" (*Gonepteryx cleopatra*) (un posible ejemplar, el 17 de abril, a las 17 h. 4 m.), el piérido "limonera" (*Gonepteryx rhamni*) (un ejemplar, el 21 de abril, a las 14 h. 19 m., en Languilla [cuadrícula VL68], con José Manuel Boy Carmona que la identifica), el ninfálido "atalanta" o "numerada" (*Vanessa atalanta*) (el 15 de junio, a las 10 h. 43 m., en los páramos segovianos del Botijas [cuadrícula VL29]; el 14 de julio, a las 11 h. 43 m., en los páramos del nordeste [cuadrícula 4]), el papiliónido "macaón"(*Papilio machaon*) (el 15 de junio, a las 11 h. 59 m., en los páramos segovianos del Botijas [cuadrícula VL29]; el 19 de agosto, a las 16 h. 48 m., en Cabeza Calderón [cuadrícula 4]), el ninfálido "pandora" o "maja" (*Argynnis [Pandorina] pandora*) (el 3 de julio, a las 12 h. 21 m., no segura, en la margen izquierda del embalse [cuadrícula 4]), posiblemente el ninfálido "rey mozo" (*Kanetisa [Brintesia] circe*) (el 21 de julio, a las 16 h. 33 m., junto al nido de alimoche Nº E [con un pollo] del barranco de la Retuerta [cuadrícula 4]; el 19 de agosto, a las 15 h. 5 m., junto a un chozo de los páramos del sureste [cuadrícula 4]), el ninfálido "saltacercas" (*Lasiommata megera*) (el 23 de julio, a las 18 h. 55 m., junto a la torre de Corcos [Burgos, cuadrícula VM20]), el piérido "blanquita de la col" (*Pieris rapae*) (el 26 de julio, a las 16 h. 36 m., en el Molino de Torraño [Soria, cuadrícula VL78]), posiblemente el ninfálido "lobito jaspeado" (*Pyronia ¿cecilia?*) (el 4 de agosto, a las 10 h. 8 m., entre la tenada y El Peñascal [Burgos, cuadrícula VL39]), y posiblemente el licénido "ícaro" o "dos puntos" (*Polyomnatus icarus*) (el 17 de septiembre, a las 11 h. 29 m., un macho, en la senda de los Caracoles [Segovia, cuadrícula VL77-87).

Nota.- --- El 16 de julio, a las 15 h. 42 m., en el camino, bajo La Catedral (cuadrícula 4), veo dos mariposas satíridos que vuelan juntas, unidas por la cloaca.

Algunas observaciones de orugas en 2018 (por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).-
--- El 29 de mayo, a las 11 h. 52 m., en la ladera antes de S.I., una oruga verde que parece algo vegetal.
--- El 15 de junio, a las 11 h. 9 m., en la carretera de los páramos del Botijas (Segovia, cuadrícula VL29), una gran oruga verdosa de ap. 4´5-5 cm. de longitud. No es urticante.

13.2) Mariposas nocturnas.-

13.2.1) Nuevas observaciones, en 2018, de la esfinge colibrí (*Macroglossum stellatarum*): el 24 de julio (dos ejemplares y luego uno, a las 20 h. 42 m., en Peñarrubias de Pirón; Segovia, cuadrícula VL04-05). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

(Véanse las **Hojas Informativas Nº 38**, pág. 269; **Nº 40**, pág. 332; **Nº 42**, pág. 124; **Nº 44**, pág. 108; **Nº 46**, pág. 117; y **Nº 48**, pág. 123, apartado 11.2.2.)

---

14) Se han registrado nuevas observaciones de otras especies de invertebrados, cuya relación sería larga.

Nota sobre plantas.-

Los sabinares "*son algunos de los parajes más salvajes y bellos del continente europeo*".
"*Los sabinares son bosques para seres muy resistentes.*"

[Planeta Selva. "*El bosque mágico*". Emitido en TVE-2 el 22-XII-2018.]

Un nuevo artículo relacionado con las plantaciones de WWF en el Refugio es el siguiente:

--- El Norte de Castilla (2017). **Plantación en defensa de los bosques.** *El Norte de Castilla* (edición de Segovia), martes 28 de noviembre de 2017, pág. 14. (Con una fotografía, de WWF).

Nuevos artículos relacionados con la tala de árboles en Riaguas son los siguientes:

--- Águeda, V. (2018). **Los chopos de Castilla.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 206, abril de 2018, pág. 4. (Con dos fotografías).
--- Asociación Sociocultural de Riaguas de San Bartolomé (2018). **Y los árboles volvieron a Riaguas.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 207, mayo de 2018, pág. 18. (Con una fotografía).
--- Asociación Cultural de Riaguas de San Bartolomé (2018). **Riaguas de San Bartolomé, cada vez más verde.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 214, diciembre de 2018, pág. 4. (Con dos fotografías).
--- El Adelantado de Segovia (2018). **Riaguas de San Bartolomé. / La Asociación Sociocultural presenta la segunda parte del proyecto "Riaguas Verde". / Esta iniciativa se inició hace más de un año después de la tala de 200 árboles que bordeaban el pueblo criticada por los vecinos.** *El Adelantado de Segovia*, martes 21 de agosto de 2018, pág. 15. (Con una fotografía).
--- El Norte de Castilla (2018). **Riaguas de San Bartolomé inicia la segunda fase del proyecto de reforestación. / El objetivo final es tener plantados 250 árboles a finales de 2019 con la ayuda comprometida por la Diputación Provincial.** *El Norte de Castilla* (edición de Segovia), martes 21 de agosto de 2018, pág. 10. (Con una fotografía).
--- El Nordeste de Segovia (2018). ***Riaguas Verde*, un proyecto de reforestación que sigue adelante.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 211, septiembre de 2018, pág. 25. (Con una fotografía).

Notas.- I.- Sobre amapolas.- I.1) El 6 de junio de 2018, veo amapolas al parecer comunes (*Papaver rhoeas*), y otras que parecen amapolas tristes (*Papaver hybridum*), a las que se dedica el siguiente y muy interesante artículo:
--- Gómez, J. R. (2018). **La prudente amapola triste.** *Quercus*, Nº 387, mayo de 2018, págs. 66-67.

I.2) --- El 9 de junio de 2018, a partir de las 10 h. 52 m., en la parte alta de la margen derecha del barranco de Los Callejones (El Carlanco, cerca de Villaverde de Montejo; cuadrícula 3), un corzo macho pasta y ramonea, va seleccionando su alimento, y repetidas veces le veo comer amapolas (*Papaver sp.*). (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

II) El 19 de junio de 2018, en la charca de Cascajares (Segovia, cuadrícula VL58), plantas acuáticas con hojas flotantes y con flores rosadas que sobresalen. ¿Posible persicaria anfibia o polígono anfibio (*Polygonum amphibium*)? (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

Bibliografía consultada.-

--- Confederación Hidrográfica del Duero (2008). **Guía de las plantas de los ríos y riberas de la cuenca del Duero.** 2ª ed. CHD. Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino. Burgos. 160 págs.
--- Penas, A.; Díez, J.; Llamas, F.; y Rodríguez, M. (1991). **Plantas silvestres de Castilla y León.** Ed. Ámbito. Valladolid. 472 págs.

Entre los trabajos realizados y libros o artículos publicados en los últimos años, que incluyen datos o noticias relacionados con la flora (o con los hongos) del Refugio (o de zonas próximas), se encuentran las publicaciones citadas en las **Hojas Informativas Nº 23** [pág. 58], **Nº 24** [pág. 99], **Nº 27** [págs. 215-216], **Nº 29** [págs. 208-209], **Nº 30** [págs. 171-172], **Nº 31** [pág. 300], **Nº 32** [págs. 231-233], **Nº 34** [págs. 271-272], **Nº 35** [págs. 436-438], **Nº 36** [pág. 235], **Nº 40** [págs. 335-342], **Nº 44** [pág. 112], y **Nº 48** [pág. 123].

Nota sobre hongos.-

Año 2018.-
--- El 16 de abril, en el viaducto viejo (cuadrícula 4), una posible seta de cardo (*Pleurotus eryngii*), de unos 5 cm. de diámetro. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- El 15 de septiembre, no lejos de Santibáñez de Ayllón (cuadrícula VL77), un posible boleto (*Boletus sp.*). (Participantes en una excursión del Fondo para el Refugio, guiada por Jorge Andrés Remacha Lorenzo).

(Véanse las **Hojas Informativas Nº 24**, pág. 99; **Nº 27**, págs. 217-218; **Nº 30**, pág. 172; **Nº 32**, págs. 232-233; **Nº 34**, pág. 278; **Nº 35**, pág. 438; **Nº 36**, pág. 235; **Nº 38**, pág. 270; **Nº 40**, pág. 343; **Nº 42**, pág. 134; **Nº 44**, pág. 112; **Nº 46**, pág. 118; y **Nº 48**, pág. 124.)

Miscelánea.-

1) En los últimos meses, agradecemos la gran colaboración fotográfica (y/o de filmación), absolutamente desinteresada, de Abubilla Ecoturismo, León Adrados Rincón, José Manuel Aguilera Sanz, Javier Alcalde Cuña, Carolina Álvarez Cano, Marina Arévalo de la Plaza, Martín Francisco Arévalo Sánchez, Damián Arguch Sánchez, José Luis Armendáriz Sanz, Rubén Arrabal Espeja, Fernando Ávila Vico, Gema Cáceres Miguel, Javier Cano Sánchez, Antonio Cavadas Sanz, María José Chicharro Lafuente, Jesús Cobo Anula, Yolanda de la Cruz Rubio, Carlos Cuéllar Basterrechea, FAB (Fondo Amigos del Buitre), David Fajardo Orellana, Sara Fernández Aguirre, Antonio Jesús Fernández y Fernández-Arroyo, Francisco Jesús Fernández Herrera, Antonio Fernández Ortiz, Luisa Fragua Domínguez, Adolfo Frías Fernández, Cándido de la Fuente de la Osada, José Luis de la Fuente Mayoral, Ana Belén Fuentenebro Rubio, Juan Luis Galindo Estévez, Susana García Andrés, Ricardo García Fernández, Pilar García San José, Antonio Gómez Manzano, Elías Gomis Martín, Ana Belén González Piriz, Raúl González Rodríguez, GREFA, José Antonio Hernando García, Jesús Hernando Iglesias, Candelas Iglesias Aparicio, Junta de Extremadura, Mikel Kebuteh Sanno, Alfonso Lario Doylataguerra, Mario Liarte Lozano, Alfredo López Hernangómez, Manuel López Lázaro, Juan Francisco Martín Calleja (guarda de la CHD), Miguel Ángel Martín Jiménez, Xavier Martín Vilar, María Luisa Martínez Flores, José María Martínez Mediano, Pascual Mate Alonso, Sebastián Molano, Juan José Molina Pérez, Xavier Parra Cuenca, José Miguel Pascual Arranz, Jorge Andrés Remacha Lorenzo, Andrés Requejo de las Heras, Juan Carlos Rincón García, José Luis Romero Carayol, Benito Ruiz Calatayud, Antonio Ruiz Heredia, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez, Inmaculada San José Negro, Antonio Sanz Carro, Santiago Sanz Rincón, Luis Sitges Aparicio, Lourdes Tiemblo Blázquez, Juan Miguel Velasco de Miguel, Antonio Velasco Pineda, Almudena Vicente López, WWF España, etc.

En particular, agradecemos su colaboración a los 29 autores de las fotos que ilustran la presente Hoja Informativa Nº 50: Marina Arévalo de la Plaza, Martín Francisco Arévalo Sánchez, Fernando Ávila Vico, Jesús Cobo Anula, Sara Fernández Aguirre, Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Francisco Jesús Fernández Herrera, Luisa Fragua Domínguez, Adolfo Frías Fernández, Cándido de la Fuente de la Osada, Juan José Fuentenebro Martín, Juan Luis Galindo Estévez, Pilar García San José, Elías Gomis Martín, Raúl González Rodríguez, Jesús Hernando Iglesias, Candelas Iglesias Aparicio, Mario Liarte Lozano, Juan Francisco Martín Calleja, Xavier Martín Vilar, Pascual Mate Alonso, Juan José Molina Pérez, Xavier Parra Cuenca, Jorge Andrés Remacha Lorenzo, Juan Carlos Rincón García, José Luis Romero Carayol, Santiago Sanz Rincón, Luis Sitges Aparicio, y Juan Miguel Velasco de Miguel.

Del mismo modo, agradecemos su colaboración a los 32 autores de las fotos o dibujos que ilustran la Hoja Informativa Nº 51: Martín Francisco Arévalo Sánchez, Gema Cáceres Miguel, Jesús Cobo Anula, Yolanda de la Cruz Rubio, Carlos Cuéllar Basterrechea, Sara Fernández Aguirre, Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Francisco Jesús Fernández Herrera, Luisa Fragua Domínguez, José Luis de la Fuente Mayoral, Ana Belén Fuentenebro Rubio, Juan Luis Galindo Estévez, Pilar García San José, Elías Gomis Martín, Raúl González Rodríguez, GREFA, José Antonio Hernando García, Jesús Hernando Iglesias, Candelas Iglesias Aparicio, Alfonso Lario Doylataguerra, Mario Liarte Lozano, Manuel López Lázaro, Juan Francisco Martín Calleja, Xavier Martín Vilar, Juan José Molina Pérez, Xavier Parra Cuenca, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez, Inmaculada San José Negro, Luis Sitges Aparicio, Lourdes Tiemblo Blázquez, Juan Miguel Velasco de Miguel, y Antonio Velasco Pineda.

(Las Hojas Informativas 50 y 51 incluyen fotos de 42 autores distintos).

2) También en 2018-2019, Marianne Delacrétaz, la viuda de Daniel Magnenat, hizo llegar una nueva ayuda económica póstuma de Daniel, de 500 euros, a Fidel José Fernández, para contribuir a hacer posibles las Hojas Informativas y otros trabajos sobre el Refugio. Otras ayudas económicas recibidas en el mismo periodo, que debemos agradecer, proceden de Lucía García Cornejo y Asier Martínez Arrieta (el 29-3-18), y de Juan Francisco Martín Calleja (el 30-3-18).

3) Conviene resaltar, una vez más, que el Refugio no habría podido mantenerse sin la extraordinaria labor de los **guardas** (en la actualidad, Jesús Hernando Iglesias, de WWF España [Adena], y Juan Francisco Martín Calleja, de la CHD; y los guardas suplentes de WWF España [Adena] durante las vacaciones de Jesús Hernando Iglesias: Juan José Molina Pérez (en 2001 y 2002), Pilar Martín Miguel (en 2003), Pablo Sanz Trillo (en 2004), David Muñoz González (en 2005), Iván García Izquierdo (en 2006), Miriam Domingo García (en 2007, 2008, 2009, y 2010), Wilmer Rivera Ramos (en 2011 y 2012), y Héctor Osvaldo Rivera (en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, y 2018). Sin olvidar a los que ya no están; entre los que merece una mención especial el guarda de Honor del Refugio, Hoticiano Hernando Iglesias. Por otra parte, la actuación del **SEPRONA** (Servicio de Protección de la Naturaleza, de la Guardia Civil), ha sido y es fundamental. Destacaremos, en particular, la eficaz colaboración, durante años, de Héctor Miguel Antequera. En cuanto al Parque Natural, los agentes actuales. A ellos se añaden otras personas vinculadas a estas tierras, sin olvidar a quienes trabajan en la **Casa del Parque** (entre ellos, David Muñoz González).

AVISOS

1) Como antes se indicó, el Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza publicó dos nuevas **Circulares Informativas**, **Nº 21,** y **Nº 22**, de 60 y 96 páginas, en octubre de 2018 y marzo de 2019 respectivamente. Resumen bastantes novedades recientes. Revisadas por Elías Gomis Martín, han sido posibles gracias al meritorio trabajo altruista de gran número de colaboradores (33 y 42, respectivamente). Están disponibles en Naturalicante (**www.naturalicante.com**), gracias a la labor también desinteresada de Raúl González Rodríguez.

2) NUEVOS TRABAJOS SOBRE EL REFUGIO EN NATURALICANTE

Gracias a la meritoria labor desinteresada de Héctor Miguel Antequera y Raúl González Rodríguez, está disponible en Naturalicante, con el permiso de la Biblioteca de Aranda, y con acceso libre y gratuito, el trabajo "**El alimoche en el Refugio de Rapaces de Montejo**" (publicado en el Volumen 9, de 1994, de "*Biblioteca, estudio e investigación*", editada por el Ayuntamiento de Aranda de Duero, Burgos), del Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. También están ya disponibles los dos trabajos sobre "**Los**

mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo" (primera y segunda parte), y el trabajo sobre "**La alondra ricotí (*Chersophilus duponti*) en la zona del Refugio de Montejo**", del mismo autor; así como todas las **Hojas Informativas sobre el Refugio** (números 1 a 47), gracias al trabajo altruista de Héctor Miguel Antequera y de Juan Luis Galindo Estévez respectivamente, y a la eficaz colaboración de Raúl González Rodríguez.

Gracias asimismo a Raúl González Rodríguez, también ha sido posible incluir nuevos artículos y entrevistas de radio sobre el Refugio.

En la página web **www.naturalicante.com** (sección "La mochila del naturalista") pueden verse también, entre otras cosas, las **Circulares del Fondo para el Refugio**, los libros colectivos **La Leyenda de las cárcavas / Crónicas de naturalistas españoles en el Refugio de Montejo de la Vega (Segovia)**" (editado por José Luis Nava Rueda; Universa Terra; 252 páginas), "**Guardianes del Refugio / Historias de naturalistas en el Refugio de Montejo**" (editado por José Luis Nava Rueda; Universa Terra, 291 páginas), los libros colectivos "**Y cuando hagamos la reserva de los buitres…**" y "**30 años guardando un Refugio con encanto**" (éste, en la Circular 22 del Fondo), los **Informes finales de los censos de otoño desde 2001 inclusive**, la **Breve reseña sobre la historia del Refugio**, el texto de las anteriores **Hojas Informativas a partir de la Nº 1 inclusive** (la digitalización ha sido posible gracias al trabajo desinteresado de Raúl González Rodríguez y Juan Luis Galindo Estévez), el trabajo "**El águila perdicera en el Refugio de Rapaces de Montejo**", las cuatro partes del artículo "**Algunos descubrimientos zoológicos recientes**" (que se publicaron en la revista "*Argutorio*", de la Asociación Cultural "Monte Irago", de Astorga, León), el artículo "**Observaciones de buitres africanos en España**" (publicado en la revista de la Facultad de Ciencias de la UNED, *100cias@uned*, Nº 1), diversas novedades en relación con la polémica suscitada por la **"senda larga"**, y otras cuestiones y/o reportajes acerca del Refugio. También puede encontrarse, en la indicada página web, una amplia y rigurosa información, magníficamente presentada, sobre ornitología en Alicante y en otras zonas.

Casi todo lo anterior está también en un USB, gracias al trabajo altruista de Manuel de Andrés Romero.

3) Nuestro nuevo libro colectivo "**Guardianes del Refugio / Historias de naturalistas en el Refugio de Montejo**", de 291 páginas, editado por Universa Terra gracias al trabajo generoso de José Luis Nava Rueda, que contiene relatos variados de bastantes personas que han dedicado a estas tierras buena parte de sus vidas, puede comprarse impreso a través de Lulu (**www.lulu.com**). Fue anunciado en la revista "*Quercus*" en enero de 2013 (Nº 323, pág. 71), y en la revista "*Panda*" en invierno de 2012 (Nº 119, pág. 46). También puede verse o descargarse en pdf, de forma gratuita, en **www.naturalicante.com** o en **www.bubok.es**.

Se recuerda que nuestro libro colectivo anterior, "**La Leyenda de las cárcavas / Crónicas de naturalistas españoles en el Refugio de Montejo de la Vega (Segovia)**", de 252 páginas, editado también por Universa Terra gracias al trabajo generoso de José Luis Nava Rueda, que contiene asimismo relatos variados de bastantes personas que han dedicado a estas tierras buena parte de sus vidas, puede descargarse también en Naturalicante. Fue anunciado en la revista "*Quercus*" en abril de 2009 (Nº 278, pág. 73), y en la revista "*Panda*" en otoño de 2009 (Nº 107, p. 46).

4) Sobre los dos nuevos libros publicados en 2016 por Antonio Ruiz Heredia ("**Remembranzas de un malandrín**", y "**Desde mi cabaña / Historias de animales para leer en familia**"), editados por José Luis Nava Rueda (Universa Terra), véase lo indicado en la *Circular Informativa* Nº 17 *del Fondo para el Refugio*, pág. 9.

5) Los interesados en el estudio y la defensa del Refugio y su entorno, también pueden escribir, para solicitar información sobre el **Fondo** o para inscribirse como socios, enviando sus datos (nombre y dos apellidos, DNI, dirección postal y electrónica, y teléfono), a fondorapaces@yahoo.com.

6) Los interesados en inscribirse en nuestro **foro "*Montejanos*"**, pueden solicitarlo escribiendo a montejanos-subscribe@yahoogroups.com.

También pueden visitar el espacio web http://es.groups.yahoo.com/group/montejanos/.

7) Un nuevo libro que recoge bastantes datos recientes sobre las aves de la zona, y de otras localidades, es el siguiente, que recomendamos:

--- Román Sancho, F.; Lobo Cueva, J. L.; y Fernández González, R. (2018). **Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos. Volumen V.** Caja de Burgos. Aula de Medio Ambiente. Burgos. 300 págs.

(Puede verse la reseña del Volumen 1 en la página 2 de la **Hoja Informativa Nº 33**; del Volumen 2, en la página 2 de la **Hoja Informativa Nº 35**; del Volumen 3, en la página 2 de la **Hoja Informativa Nº 39**; y del Volumen 4, en la página 2 de la **Hoja Informativa Nº 44**.)

En la versión digital del mencionado **Anuario Ornitológico de Burgos** también se puede consultar, o enviar, información sobre esta provincia. La página web es: http://www.avesdeburgos.com/anuario.htm.

8) Seguimos recomendando el maravilloso libro "***Uñas de cristal***" (ed. Prames, Zaragoza, 2007, 352 págs.), la obra póstuma de David Gómez Samitier, en el que han participado más de 90 colaboradores, incluyendo a buena parte de los mejores especialistas en rapaces ibéricas. Véase lo indicado al respecto en las **Hojas Informativas Nº 31** (pág. 313, Aviso), **Nº 32** (pág. 241, Nota 9; y pág. 357, Nota 4), y **Nº 34** (pág. 282, Aviso 12).

9) Recordamos que el libro colectivo "***Y cuando hagamos la reserva de los buitres…***", coordinado por Elías Gomis Martín con la participación de docenas de naturalistas "montejanos", que se le dio como homenaje a Fidel José después del homenaje a Daniel Magnenat realizado al finalizar el censo de otoño de 2006, puede verse íntegramente en www.naturalicante.com (sección "*La mochila del naturalista*", apartado sobre el Refugio de Rapaces de Montejo; en "*Noticias, informes y artículos 2007*"). Véase lo señalado en la **Hoja Informativa Nº 32** (pág. 243, Nota 13).

Vaya también nuestro agradecimiento a todos los que participaron de una u otra forma en la elaboración del libro, y/o en aquel homenaje.

También reiteramos nuestro agradecimiento, sobre todo a Raúl González Rodríguez y a Elías Gomis Martín, por toda su amable colaboración en lo relativo a lo que aparece sobre el Refugio en la magnífica página web de Naturalicante (www.naturalicante.com).

10) El libro colectivo "**30 años guardando un Refugio con encanto**", coordinado por Elías Gomis Martín con la participación de docenas de naturalistas "montejanos", que se le dio como regalo al guarda Jesús Hernando Iglesias durante el homenaje que le hicimos justo antes del censo de otoño de 2018, aparece íntegramente en la Circular 22 del Fondo, de acuerdo con lo acordado en la Asamblea General, y por tanto puede verse también en Naturalicante.

11) **CONVOCATORIA DEL PRÓXIMO CENSO DE OTOÑO, Y DE LA PRÓXIMA ASAMBLEA GENERAL DEL FONDO PARA EL REFUGIO / 16-17 NOVIEMBRE 2019**

De conformidad con lo acordado en la Asamblea General del Fondo, con la presente se convoca a todos aquellos interesados al próximo censo de otoño que en principio queremos realizar los próximos días 16 y 17 de noviembre de 2019. Los que quieran participar deberán comunicárselo a la organización del mismo, como fecha tope el 31 de octubre. Correo electrónico: censomontejano@gmail.com. (Juan José Molina). Como siempre, deben enviar también: nombre y dos apellidos, teléfono, correo electrónico, dirección postal, DNI, modelo y matrícula y color del vehículo, y otros datos de interés (como conocimiento de la zona y de la fauna, en su caso).

La reunión previa al censo tendrá lugar, en principio, el sábado 16 de noviembre, a las 12 h., en el local amablemente prestado para tal fin por la Asociación Cultural "Nuevo Horizonte", de Villaverde de Montejo. A esta reunión, y también a las reuniones posteriores al censo, podrán asistir todas las personas que lo deseen.

Habrá una comida el domingo 17 como fin de censo, en principio en Montejo de la Vega. Deberán apuntarse previamente todos los interesados, comunicándolo a Antonio Ruiz Heredia. Como siempre, en la comida podrá participar quien quiera, pagando cada uno su parte.

Antes de la comida, se celebrará, en el mismo local, la nueva Asamblea General ordinaria del Fondo para el Refugio. La convocatoria se publica también en "Naturalicante", en "Montejanos", en el Informe final del censo de otoño anterior (pág. 12), y en la Circular Informativa Nº 22 del Fondo (pág. 75).

12) Sobre la labor del **Colectivo Azálvaro** (**colectivoazalvaro@hotmail.com**), pueden verse novedades en **www.**colectivoazalvaro**.com**.

(Véase también la **Hoja Informativa Nº 34**, págs. 283-284, Aviso 18).

13) Aunque se refiera a otra zona, en la provincia de Madrid, queremos reiterar la llamada en favor del espléndido retamar de **Venta La Rubia** (en el término de Alcorcón), magnífico enclave donde Eliseo Gómez García y Antonio Gómez Manzano obtuvieron muy bonitas filmaciones en vídeo de liebres en

libertad, que fue conocido por el autor en 1976, y que en la actualidad se encuentra gravemente amenazado. Puede obtenerse más información, sobre éste y otros parajes amenazados de la misma provincia, comunicando con Francisco José Coronado Manzano (tfno.- 916109674 / c/ Urano, 9-Ático / San José de Valderas / 28925-Alcorcón, Madrid).

14) Miguel del Pino Luengo (mdelpinoluengo@gmail.com) dirige el programa "*Jungla de asfalto*" (esradio, 99.1 fm, los sábados y domingos de 11 a 12 h., con la colaboración del Padre Mundina y de Elia Rodríguez), disponible también por Internet, en el que ha aparecido bastantes veces el Refugio de Rapaces.

15) Se agradece, una vez más, el esfuerzo generoso y la colaboración desinteresada de bastantes personas y entidades, cuya relación sería muy larga.

Respuestas de la Ciencia (Radio 5). Nuevos mini-programas grabados el 30 de octubre de 2018.

¿Cuáles son las aves rapaces más grandes?

El cóndor de los Andes, y en segundo lugar el cóndor de California, son las mayores rapaces vivas. Después, ya en el Viejo Mundo, las más grandes serían el buitre negro (en peso), el quebrantahuesos (en longitud), y posiblemente el buitre del Himalaya (en envergadura). Todos pueden alcanzar o casi, y algunos sobrepasar, los tres metros de envergadura. Pero hubo rapaces mayores. Los buitres del género *Teratornis*, por ejemplo, podían pasar de cuatro metros. La mayor rapaz de todos los tiempos fue también un buitre, el *Argentavis magnificens,* cuyos fósiles se han hallado en Argentina; con unos siete metros de envergadura, sus alas eran tan grandes como las alas de un *Pteranodon.* En cuanto a las águilas, la mayor fue el águila de Haast, de Nueva Zelanda, extinguida después de la llegada de los maoríes. Las mayores águilas vivas podrían ser el enorme pigargo gigante, y la poderosa águila arpía.

¿Qué es el Día de los Buitres?

El primer sábado de septiembre es el Día Internacional de Concienciación sobre los Buitres, sobre su importancia y su dramático declive en gran parte del mundo, con todas sus consecuencias. Según publicó *National Geographic*, solamente en la India la pérdida de millones de buitres se relaciona con la muerte de casi 50.000 personas (por el avance de enfermedades, y de los perros y ratas que las transmiten). En amplias regiones de África, los cazadores furtivos envenenan los elefantes muertos, expresamente para acabar con los buitres y que éstos no los delaten. Amenazados por el hambre, venenos y otros productos, tendidos eléctricos, parques eólicos, molestias humanas en épocas y sitios de cría, en algunos lugares persecución directa o saqueos de nidos, ciertas alteraciones del hábitat, etc., los viejos grandes buitres, que son muy anteriores al hombre, sobreviven en bastantes sitios gracias al enorme esfuerzo realizado por muchas personas para conservarlos.

¿Es cierto que un búho real puede matar a un tejón?

El 8 de julio de 2014, encontré el cráneo de un tejón, joven pero grandecito, en un nido donde el búho real había sacado dos pollos, en el Refugio de Montejo (Segovia). La determinación fue confirmada por los biólogos Jorge González Casanovas y Alfredo Ortega Sirvent. El 14 de junio del mismo año, en otra región de España, Javier Abrego García encontró restos de un tejón joven en un nido de búho real, según publicó en su blog. Antes, hacia mediados del siglo pasado, März encontró restos de un tejón joven entre 2.590 presas del búho, en Suiza. Además, en Francia, Gilles Tavernier y otros hallaron un tejón entre 14.806 presas del búho. Aparte de unas pocas referencias generales, no conocemos más datos concretos que los cuatro mencionados. Todo esto fue recogido en las Hojas Informativas sobre el Refugio de Montejo.

Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo
Profesor Titular de Análisis Matemático de la UNRD

La primera apareció en diciembre de 2018. La segunda, en enero de 2019. La tercera, en abril de 2019.

Además, en mayo, julio y septiembre de 2018, respectivamente, se emitieron las respuestas a las preguntas "*¿Cuántos pollos puede haber en un nido de cuervo?*", "*¿Cómo fue descubierto el pavo del Congo?*", y "*¿Cuál es el ave que más nombres recibe en España?*".



Alimoche inmaduro del tercer año ap., y buitres leonados, en el comedero de buitres del Refugio de Montejo. (Fotografía: Jesús Cobo Anula, biólogo conservador del Refugio, de WWF España, el 16-7-18).



El arco iris al anochecer, sobre la Retuerta. (Foto: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 29-4-18.)

ANEXO 0

Hoces del Riaza: el Refugio de Rapaces cumple 44 años

El 13 de enero se cumplen 44 años de la inauguración de los Refugios de Montejo y del embalse de Linares, administrados respectivamente por WWF España y la CHD. Asistieron entonces muchas personas de los pueblos; y también, los gobernadores civiles de Segovia, Burgos, Soria, Valladolid y Toledo; los presidentes de las Diputaciones de Segovia, Lugo, Orense, Santander y Valencia; el Director General del ICONA y otros altos cargos del Ministerio de Agricultura, así como el ministro de Información y Turismo y el subsecretario del Departamento; el alcalde de Segovia, el alcalde y el secretario del Ayuntamiento de Montejo, y otras autoridades locales; tres altezas reales, incluidos los Príncipes de Holanda (entonces Presidente del WWF internacional) y de España (entonces Presidente de ADENA); miembros de la Junta Rectora de ADENA (entre ellos, su Vicepresidente, Félix Rodríguez de la Fuente, que fue quien lo propuso) y otros importantes naturalistas y personalidades de la época; etc. En 1991, "*El Adelantado de Segovia*", en el monográfico sobre sus 90 años, lo destacó como la principal noticia de 1975 en la provincia. En 2018, WWF España, en la revista "*Panda*" dedicada a sus 50 años, remarcaba que el Refugio fue "*el primer acuerdo de custodia del territorio de España*"; y desde su inauguración, "*se ha convertido en una escuela de naturalistas y defensores del medio ambiente, algo que no hubiera sido posible sin el compromiso de la población, de los guardas de WWF Hoticiano Hernando y su hijo Jesús, o de los voluntarios del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*"; y añadía que el "*trabajo incansable*" allí desarrollado "*ha convertido este lugar en uno de los espacios naturales de nuestro país con un seguimiento más detallado de su biodiversidad.*"

El 20 de junio de 1974, el Pleno de la Diputación Provincial de Segovia, "*puesto que se estima es competencia de esta Diputación contribuir, en la medida de sus posibilidades económicas, a la defensa y conservación de su riqueza ornitológica y, en general, a los programas de conservación y defensa de la naturaleza"*, acordó por unanimidad "*felicitar muy efusivamente"* a ADENA, *y "contribuir con la cantidad de 400.000 pesetas*" al proyecto del Refugio; que costó aquel año unos once millones de pesetas, surgidos casi de la nada. Puso de acuerdo a muchísimas personas y entidades; incluyendo a los habitantes de Montejo, que renunciaron a cazar en gran parte del término para hacer posible esa ilusión, de una forma tan generosa y bonita que no conocíamos precedentes en España. A muchos, el Refugio nos parecía entonces un sueño increíble. Mantenerlo ha resultado todavía mucho más difícil.

En 2018, el Centro Cultural San José (del Ayuntamiento de Segovia) y el Ayuntamiento de Montejo acogieron la exposición sobre el aniversario del Refugio, organizada por Juan José Molina, que estuvo anteriormente en la Casa de las Ciencias de Logroño (2015), el Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid (2016), la Casa de la Cultura de Aranda de Duero (2017), y el Ayuntamiento de Montejo. En noviembre, al menos unas 150 personas acudieron, en Villaverde de Montejo, al emotivo homenaje a Jesús Hernando, que cumplía 30 años como guarda de WWF en el Refugio (donde relevó a su padre el inolvidable guarda Hoticiano), como recoge este mes la revista "*Quercus*", que considera el Refugio "*uno de los espacios naturales más emblemáticos de España*".

Gracias a la Diputación Provincial y la Caja de Burgos, en 2018 apareció el Volumen V del *Anuario Ornitológico de Burgos* (coordinado por Fernando Román, José Luis Lobo y Rufino Fernández), que recoge aportaciones de 247 colaboradores, e incluye bastantes datos sobre la comarca. Con este libro, el Refugio ha aparecido ya en 4.514 publicaciones impresas de todo tipo, 54 congresos científicos (18 internacionales), 329 charlas o conferencias, 263 programas de televisión y 778 de radio, 1.437 trabajos o informes naturalistas (sin contar los de censos, que son muchos más), varios cursos (incluidas las tres Jornadas sobre Buitres de la UNED), 17 tesis doctorales y distintos proyectos fin de carrera, múltiples sitios de Internet, etc. El Refugio o su entorno, o trabajos realizados allí, ha recibido 25 premios, y 18 títulos o figuras de protección (desde ZEPA, hasta Parque Natural).

También en 2018, las "Hojas" Informativas del Refugio cumplieron 40 años. Sus 49 números (8.995 páginas) son, según señaló "*Quercus*" en octubre, "*la crónica naturalista más longeva y exhaustiva dedicada a un espacio natural de la que tengamos noticias"*. Gracias al trabajo altruista de Raúl González y otros, pueden verse asimismo en Naturalicante (Internet), con acceso libre y gratuito. Y del mismo modo, las circulares del Fondo, con bastantes noticias del último año; desde la tercera observación de un pechiazul (fotografiado junto al embalse de Linares, el 9 de septiembre, por Xavier Parra y Montserrat Gutiérrez), hasta los trabajos realizados en la comarca por WWF, GREFA (en Montejo y Maderuelo, y Burgos), la Fundación Alondra Ricotí (en el páramo de Corcos), SEO-Segovia (con aguiluchos), y otras entidades y personas. Además, las memorias de WWF y del Parque Natural resumen cada año sus actuaciones y otras novedades.

El Refugio fue uno de los primeros espacios naturales protegidos en Castilla y León. Se hizo para conservar un paraje excepcional, su enorme población de rapaces, y toda su fauna. Soy testigo de la ilusión que despertó, y que sigue motivando. Desde que empezó, le he entregado casi toda mi vida.

Que sepamos, ninguna otra gran población salvaje en España, de buitres leonados y alimoches, ha sido objeto de un seguimiento semejante. Desde 1975, durante 45.772 horas, he censado personalmente, cada año, todos los nidos con éxito (en conjunto, 925 y 87, respectivamente), y también los de zonas próximas. En el nido "campeón" de los buitres, he podido constatar que ha salido adelante el pollo en 36 años; mientras que otro nido ha sido usado con éxito durante 20 años consecutivos. No tengo noticias de cifras tan altas, para esta especie, en ningún otro lugar.

También se han hecho allí otros muchos censos, por distintas personas. Entre ellos, desde 1983, los 36 censos colectivos de otoño, en los que han participado más de 800 ornitólogos. Continúo revisando los informes parciales del último (2018), coordinado por el agente forestal Juan José Molina (Vicepresidente del Fondo para el Refugio). Ha aportado una gran sorpresa, la observación (por primera vez para Castilla y León, que sepamos), de un coliazul cejiblanco, pájaro de la taiga siberiana o cerca, a miles de kilómetros de aquí. Fue fotografiado, en el pinar de Valdevacas de Montejo, por los biólogos Xavier Parra y Montserrat Gutiérrez, y fue visto el día siguiente por Andrés Requejo, ornitólogo asimismo de Barcelona. La difusión por Internet atrajo a bastantes naturalistas; algunos también vieron, y fotografiaron de nuevo, a este visitante insólito. Así, son ya 333 las especies de vertebrados citadas en la zona; al menos 165 se han reproducido allí, según recogen las Hojas Informativas sobre el Refugio.

Precisamente del censo de otoño, la doctora Marta Novo escribió en 2015: "*Ver esta pasión (…) en toda la gente que colabora hace que vuelva a tener fe en la sociedad*".

El 7 de enero de 1975 tuvo lugar, gracias al grupo de empresas Pascual, el primer aporte (26 cerdos) al comedero de buitres de WWF en el Refugio de Montejo; que sigue siendo fundamental, como otros siete muladares cercanos, cuatro en Segovia y tres en Burgos (el de Caleruega y anexos ha sido premiado en 2018, por la Junta de Castilla y León). Los grandes buitres son los vertebrados europeos que se reproducen más despacio. Los dramáticos declives recientes habidos en bastantes zonas de Asia y África (reflejados en *Vulture News* y en otras muchas publicaciones), y sus consecuencias, indican que no podemos bajar la guardia. En los últimos años he comprobado descensos en pequeñas colonias cercanas (no en todas), de las tres provincias. Quizás estén relacionados con la disminución de los rebaños, los parques eólicos, y los demás problemas ya conocidos. El censo de otoño ofrece en 2018 el mejor resultado aún provisional, aunque no así el de pollos volados en primavera y verano (número sin duda influido por molestias humanas en determinados lugares, entre otros motivos).

El Refugio no sólo detuvo el declive de la gran población de los buitres, conservando también su mundo. Durante 44 años, su influencia ha sido enorme. Ha inspirado otros muchos proyectos (podría poner bastantes ejemplos), y ha movido voluntades e ilusiones hasta extremos sorprendentes, a pesar de muchas dificultades. Debemos agradecerlo también a sus guardas (de WWF y la CHD), a los agentes del actual Parque Natural y del Seprona, y a muchísimas personas y entidades que trabajaron noblemente para estudiarlo y protegerlo, incluso a costa de auténticos y callados sacrificios. Deseamos que siga salvaje y hermoso, con toda su fauna y su fuerza; y que continúe sembrando esperanza.

Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo
Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza

Publicado en páginas web como "*Naturalicante*" (22-1-2019), o la del Grupo Local SEO-Barcelona (14-1-2019); en varios foros de Internet ("*Montejanos*" [también en Facebook], 12-I-19; "*Grupos Naturalistas de Castilla y León*", 12-I-19; "*Raptor Conservation*", 12-I-19; "*Avesforum*", 13-I-19; "*Goce*", 13-I-19; "*SEO-Guadarrama*", 13-I-19; "*SEO-Soria*", 12-I-19); en los periódicos "*El Adelantado de Segovia*" (13-I-19, págs. 1, 18-19), y "*El Norte de Castilla*" (ed. de Segovia; 13-I-19, pág. 10 [parcialmente]); en el *Informe final del censo de otoño de 2018* (marzo de 2019, págs. 103-104); y en la *Circular Nº 22 del Fondo para el Refugio* (marzo de 2019, págs. 3-10.)



La base del nido de la cigüeña, en Montejo. (Fotografía: Juan Carlos Rincón García. 18-XI-2018.)

INFORME PRESENTADO EL 13-3-19, EN LA REUNIÓN DEL PATRONATO DEL PARQUE NATURAL

Informe presentado (previsto) el 13 de marzo de 2019, en la **reunión del Patronato del Parque Natural** de las Hoces del río Riaza, en el Ayuntamiento de Valdevacas de Montejo, por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Presidente del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza y representante de las asociaciones para la defensa de la naturaleza, y director de las Jornadas sobre Buitres de la UNED.

D. Fidel José Fernández agradece, a D. **Rafael Marina García** (Director del Parque Natural**)**, y a Dª **Laura Moreno Ruiz** (Técnico del Programa de Especies, de WWF) que se hayan incorporado sus sugerencias en las **Memorias del Parque** y **de WWF sobre el Refugio**, respectivamente.

Fidel José agradece también, al **Centro Cultural San José del Ayuntamiento de Segovia**, así como al **Ayuntamiento de Montejo de la Vega (Segovia)** y en particular a su alcalde (Luis Martín Moral), el haber acogido, en la primavera (entre el 15 de mayo y el 15 de julio) y el verano (entre el 21 y el 29 de agosto) de 2018 respectivamente, la **exposición** "*Donde los buitres encontraron Refugio*", que estuvo en 2015 (entre el 8 de septiembre y el 8 de diciembre) en la **Casa de las Ciencias de Logroño** (que la patrocinó), en 2016 (entre el 30 de septiembre y el 12 de diciembre) en el **Museo Nacional de Ciencias Naturales** (en Madrid), en 2017 (entre el 19 de julio y el 31 de agosto) en la **Casa de la Cultura de Aranda de Duero (Burgos)**, y también en 2017 (entre el 4 y el 14 de noviembre) en el salón del **Ayuntamiento de Montejo de la Vega (Segovia)**; exposición que contó con la amable colaboración de distintas personas y entidades (entre ellas, **WWF España**, y el **Parque Natural**), que Fidel José agradece también; y que fue posible gracias sobre todo al inmenso trabajo altruista de Juan José Molina Pérez, comisario de ambas exposiciones y Vicepresidente del **Fondo para el Refugio**, y encargado de esta zona **IBA** (Área Importante para las Aves en Europa), "*Refugio de Montejo de la Vega / Hoces del río Riaza*", para la Sociedad Española de Ornitología (**SEO/BirdLife**). Fidel José agradece asimismo, a Juan José Molina, su meritorio trabajo desinteresado de coordinación del **censo de otoño** nº 36, a pesar de sus otras ocupaciones, tanto familiares (él y su mujer Noa Novo Rodríguez, que se conocieron en las Jornadas sobre Buitres de la **UNED**, tienen ya dos hijos, Leo y ahora también Vega, nombres debidos al buitre leonado y a Montejo de la Vega respectivamente) como profesionales (en 2017, Juanjo Molina sacó las oposiciones para **agente forestal** en La Rioja, en las que había 10 plazas y 152 aspirantes).

Por otro lado, y con respecto al mismo censo de otoño, realizado por **125** ornitólogos venidos de doce provincias y ocho comunidades autónomas de España, y de dos países más, Fidel José agradece asimismo la valiosa colaboración del **Ayuntamiento de Montejo de la Veg**a (y de su alcalde, Luis Martín Moral), y de la **Asociación Cultural "Nuevo Horizonte" de Villaverde de Montejo**, que cedieron amablemente sus locales, como cada año; de **WWF** y la **CHD**, que también lo hicieron, y cuyos **guardas** (Jesús Hernando Iglesias y Juan Francisco Martín Calleja) participaron; del **Director del Parque Natural**, que avisó a los cotos de caza de la zona; de la **Casa del Parque**, que tramitó permisos; del **Jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia**, por su mensaje de apoyo; y de otras muchas personas, cuya relación sería muy larga. En la reunión previa tuvo lugar el **homenaje** a **Jesús Hernando Iglesias**, que ese mes cumplió **30 años** como guarda de WWF España en el Refugio. Al menos unas 150 personas (entre ellas, miembros de WWF, y el guarda de la CHD) acudieron al homenaje, durante el cual se le dieron a "Susi" diferentes regalos: una **placa** del Fondo ("*A D. Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF en el Refugio de Rapaces de Montejo, en agradecimiento a su trabajo por la conservación de la vida salvaje*"), un **libro sobre él** con artículos y fotografías dedicados a Jesús Hernando por distintos naturalistas que han entregado a este Refugio buena parte de sus vidas, **un libro de firmas** donde bastantes personas le han escrito dedicatorias, y varias **publicaciones** (el libro "*Aves que dejan huella*" -de Luisa Abenza-, la Circular 21 del Fondo en color, y otras). Todo ello fue preparado con cariño, durante meses, por una treintena de colaboradores; entre los que se puede destacar a Juan José Molina Pérez (agente forestal, coordinador del censo de otoño, y Vicepresidente del Fondo para el Refugio), Noa Novo Rodríguez, Elías Gomis Martín, Antonio Ruiz Heredia, Jesús Cobo Anula, Félix Martínez Olivas, Javier Alcalde Cuña (que, además, filmó los actos del homenaje), Rubén Arrabal Espeja, Dr. Pedro Rodríguez Panizo (sacerdote que, además, celebró en Montejo de la Vega la **Misa** del domingo 11, justo al terminar el censo de otoño), Américo Cerqueira Valle, Milagros Pérez Cuevas, Manuel de Andrés Moreno, Andrés Romero Bravo, Juan Carlos Rincón García, José Luis Armendáriz Sanz, Francisco Jesús Fernández Herrera, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, etc. Todos ellos han querido darle a Jesús Hernando, "Susi", una sorpresa y una alegría, reconociendo su prolongada y gigantesca labor; y todos los ánimos posibles para continuar con la defensa y el estudio de este Refugio que ha movido tantas voluntades, y ha sembrado tantas esperanzas e ilusiones. El acto tuvo amplia resonancia en la Prensa y la radio segovianas, en los foros naturalistas, y en la revista "**Quercus**" (que publicó en enero el artículo "**Homenaje a un**

guardián de la naturaleza", de Fidel José, indicando además que el Refugio es "*uno de los espacios naturales más emblemáticos de España*"). Por otra parte, el Fondo para el Refugio también dio, al **Ayuntamiento de Montejo de la Vega**, una **placa** en agradecimiento por su colaboración.

Además, el domingo 11 tuvo lugar, en el salón del Ayuntamiento de Montejo, la **Asamblea General** del Fondo para el Refugio; durante la cual, la Junta Directiva fue reelegida por unanimidad.

Puede verse la relación completa de agradecimientos, del Fondo para el Refugio, en el **Informe final**, de 110 páginas, que resume los informes parciales de los **125** participantes, cuya revisión ha llevado más de 246 horas, y que Fidel José reparte a los presentes. Está disponible también en Internet, en **Naturalicante** (**www.naturalicante.com**); y se envía al director del parque, así como a WWF y a otras muchas entidades y personas interesadas. Se contaron al menos **1.368 buitres leonados**, la cifra más alta para los 36 censos de otoño; superándo los 1.214 del año 2017, los 1.161 de 2016, los 1.117 de 2004, los 1.115 de 2015, y los 1.109 de 2014. Otros muchos datos pueden verse en el referido Informe final. En los censos de otoño han participado ya **799** naturalistas; coordinados en los 6 últimos años por Juan José Molina, en los 19 años anteriores por Juan Prieto, y en los 11 primeros años por Fidel José.

A continuación, D. Fidel José Fernández presenta un resumen de sus últimos censos, que le han llevado **44 años** y más de 45.772 horas de campo; e indica que una información más extensa está disponible, tanto en Internet (con acceso libre y gratuito, en **Naturalicante**, www.naturalicante.com, gracias al trabajo desinteresado de Raúl González Rodríguez) como en su versión impresa, en las últimas **Circulares (Nº 21** y **Nº 22)** del Fondo para el Refugio (156 [60+96] páginas entre las dos, que reparte a los presentes), y con más detalle en las dos últimas **Hojas Informativas** sobre el Refugio publicadas por él (**números 48 y 49**, con 782 páginas entre ambas, y fotos de 39 autores); y para los trabajos colectivos, también en el **Informe final del último censo de otoño** (110 páginas). Las ediciones impresas de las Hojas Informativas, que han sido posibles en parte gracias a la ayuda generosa de Marianne Delacrétaz (la viuda del experto ornitólogo suizo Daniel Magnenat) están agotadas, pero todas siguen disponibles en Naturalicante. Además, datos de los últimos censos realizados por Fidel José han aparecido también en otros medios, incluyendo el último número (66-1, de 2019) de la revista científica "**Ardeola**" (de la Sociedad Española de Ornitología). Otras novedades pueden verse en el Volumen V del **Anuario Ornitológico de Burgos** (coordinado por Fernando Román, José Luis Lobo y Rufino Fernández), de 300 páginas, aparecido en 2018, que recoge aportaciones de 247 colaboradores); en www.avesdeburgos.com (donde se incluyen los nuevos informes ornitológicos trimestrales de dicha provincia); en la revista "**Argutorio**" (cuyo número 40, de 2018, incluye un artículo de Fidel José [págs. 96-99], sobre el **aniversario** del Refugio, con gran cantidad de datos, del que se repartió un avance en la reunión anterior); y en otras publicaciones.

En primavera y verano de 2018, Fidel José censó **264** pollos de **buitre leonado** que llegaron a volar (de estos 264 pollos, había 261 en la IBA, 254 en la ZEPA, 225 en el Parque Natural, y 189 en el Refugio). Es una de las cinco cifras más altas de los 44 años; por debajo de los **313** pollos en 2017, **295** en 2014, y **284** en 2015; y por encima de los **244** en 2016.


Durante estos **44** años, Fidel José ha podido comprobar que, en las hoces del Riaza, los buitres leonados han criado con éxito en **925** nidos diferentes, en los que han salido adelante **6.446** pollos. Por otra parte, Fidel José ha constatado al menos otros 56 nidos más que no tuvieron nunca éxito en la cría, pero en los cuales llegó a haber alguna vez pollo o huevo (entre ellos, 39 nidos con pollo que no salió adelante pero que llegó a ver, y 6 nidos más con huevo que no prosperó y que pudo ver); aunque los números de nidos fracasados sin duda han sido bastante mayores.

En 2018, **24** de los nidos de buitre leonado han sido **nuevos**, con respecto a todos los años anteriores. El nido campeón, el Nº 5 de V.A.D, ha sido usado con éxito durante **36** años (de ellos, 15 consecutivos); pero otros cinco nidos lo han sido más años seguidos (el nido Nº 12 del barranco de Valdecasuar ha conseguido sacar pollo durante **20** años seguidos, y 24 en total). No conocemos ninguna otra gran población salvaje, de buitres leonados y alimoches, que haya sido seguida así; con extremo rigor y respeto, durante 44 años, por una misma persona.


En 2018, Fidel José comprobó que al menos **58** nidos más de buitre leonado, en **34** de los cuales llegó a nacer el pollo, se perdieron después de comenzado el mes de abril/mayo. Entre ellos, había **40** nidos tardíos, **16** de ellos con pollo nacido. Los nidos tardíos con éxito (**70**, incluyendo **12** muy tardíos, algunos con pollos que posiblemente no volaron por primera vez hasta septiembre; sin incluir **12** más, incluyendo **2** muy tardíos, en zonas cercanas) fueron este año (2018) el 26,52% (de los nidos con éxito), porcentaje igual al del año anterior; pero llama la atención el porcentaje de nidos tardíos que se perdieron (el 36´36%). Es posible que, como señala Jesús Hernando (guarda de WWF España en el Refugio), parte de estos nidos tardíos corresponda a puestas de reposición.

También en 2018, Fidel José ha podido censar otros **148** pollos de buitre leonado que han salido adelante, en **32** zonas más o menos cercanas, de cuatro provincias; incluyendo **37** pollos en **ocho** parajes próximos. La desigual evolución de algunas de estas pequeñas colonias, algunas de las cuales llevan años


disminuyendo claramente, parece un síntoma bastante claro de que no se debe bajar la guardia; pues la situación global, de los buitres leonados, podría ser al menos en parte de España, más preocupante de lo que algunos parecen suponer. Un resumen de los resultados, de estos censos de Fidel José, se publicó, en enero de 2019, en la revista científica ***Ardeola*** de SEO/BirdLife (Vol. 66-1, Noticiario Ornitológico, págs. [209], 221, 224, 243, y 253).




Número de buitres leonados obtenido en los censos colectivos de otoño, en las hoces del Riaza. (Censos organizados por el Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza).



Número de pollos volados de buitre leonado, en las hoces del Riaza y en sus alrededores. (Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).



Número de parejas de alimoche, en las hoces del Riaza y en sus alrededores.
(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).



Número de pollos volados de alimoche, en las hoces del Riaza y en sus alrededores.
(Censos realizados por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

(En las **Hojas Informativas** sobre el Refugio pueden verse detalles, y los datos desde **1975** inclusive).

En este sentido, Fidel José destaca la importancia de las **autorizaciones** concedidas a los ganaderos, para poder dejar reses muertas para los buitres, como se había hecho siempre; y desea que en lo sucesivo se concedan todas las solicitudes recibidas.

Llaman la atención, por otra parte, los nuevos datos publicados sobre **viajes** extraordinarios de buitres leonados **anillados**, como pueden verse en la Circular 22 y en la prevista Hoja Informativa Nº 50.

También en 2018, Fidel José registró **12-13** parejas de **alimoches**, **11** nidos en los que comenzó la reproducción, al menos **8-9** nidos con algún pollo nacido, **8** nidos con éxito (o con pollo que llegó a la etapa final de su desarrollo en nido), y **9** pollos que salieron adelante (cinco en la ZEPA, todos ellos en el Parque Natural, y cuatro dentro del Refugio); y al menos otros **13** territorios ocupados y **10** nidos más con éxito (con otros **14** pollos volados) en parajes relativamente próximos de distintas provincias. Durante 44 años, Fidel José ha encontrado, en las hoces del Riaza, **87** nidos con éxito (y **105** en total), para este "buitre blanco", con un máximo de 12 (con 19 pollos volados) en 1988. No se incluye un nido que fracasó en 2010 en una zona burgalesa cercana, ni un posible nido en un paraje próximo de Soria. Sí se incluye un nido de 2018 cuyo pollo (único, y anillado por el Grupo Pyrrhocorax) llegó a la etapa final de su desarrollo en nido, pero tenía el plumaje en mal estado y fue llevado al Centro de Recuperación de Animales Salvajes "Los Lavaderos" de Segovia, por los agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León, según las noticias recibidas. Llegó a haber 19 parejas de alimoche (en 1991 y en 1993).

De **371** reproducciones con éxito (de alimoche) que Fidel José ha podido controlar, en 44 años, llegaron a volar **501** pollos, lo que da una tasa de vuelo de **1´35**; que sube a **1´37** (390 pollos de 285 nidos con éxito) si nos restringimos a las hoces del Riaza.

El nido campeón de los alimoches ha sido usado con éxito **22** años, mientras que otro nido lo ha sido durante 11 años consecutivos, según Fidel José ha podido constatar.

El 13 de agosto de 2018, **Jesús Hernando**, guarda de WWF España en el Refugio de Montejo, y **Fidel José** descubrieron el **dormidero** de alimoches del Refugio, seguramente el principal de los cuatro dormideros de alimoches localizados hasta ahora en la comarca. A veces, cuando se consigue resolver un problema de investigación en matemáticas, la solución sorprende por su sencillez. De modo parecido, aquí llamaba la atención que algo aparentemente tan simple no se le hubiera ocurrido antes a nadie. El hallazgo del dormidero fue comentado en el artículo "**Día de los buitres**", publicado por Fidel José en distintos medios de comunicación, en torno a esa fecha (el primer sábado de septiembre), como contribución del Fondo (junto con la **excursión**, guiada este año por **Jorge Andrés Remacha Lorenzo**) al **Día Internacional de Concienciación sobre los Buitres**, sobre su importancia y su dramático declive en gran parte del mundo. En España, organizaciones como **GREFA** en la Demanda (Burgos), el **Colectivo Azálvaro** en el sur de Segovia, **AMUS** en Extremadura, la **FVSM** en Mallorca, o el **Fondo para el Refugio** cerca de las hoces del Riaza, realizaron, en 2018, actividades hacia a esa fecha.

El 2 de agosto de 2018, **Carlos Cuéllar Basterrechea** y **Víctor García Matarranz**, de **GREFA** y de **MTE** respectivamente, registraron **33** alimoches simultáneamente, en el comedero del Refugio. La observación fue citada, por Carlos Cuéllar, en la **Circular Nº 21** del Fondo (pág. 15). Es el récord que conocemos, para este comedero.

El récord que conocemos, para la comarca, es una concentración excepcional **de 36 a 40** alimoches (con dos buitres leonados), cerca del comedero de Campo de San Pedro, el 16 de agosto de 1995, a las 18 h. 30 m. (Javier Marchamalo de Blas, José María Traverso Martínez, e Iván Fernández Romero; véase la **Hoja Informativa Nº 22**, pág. 7).

Ya ha sido visto el **primer alimoche** de **2019**, como puede verse en la Circular Nº 22 del Fondo.


En estos 44 años, Fidel José ha comprobado que **75 (67+8)** nidos de **buitre**, **61 (56+4)** de **alimoche**, **29 (27+2)** de **cuervo**, **25 (24+1)** de **búho real**, **17 (17+0)** de **halcón peregrino, 20** (**14+6)** de **águila real**, y **11 (9+2)** de **cernícalo**, han sido usados, antes o después, por otras especies de aves. (Se indica entre paréntesis, para cada especie, y en segundo lugar, los nidos que corresponden a zonas cercanas). La **alternancia**, seguida a largo plazo, parece bastante natural.

Del **buitre negro**, ha habido ya, de acuerdo con los datos recopilados por Fidel José, **803** observaciones en las hoces, con un máximo de **66** citas en **2018**, y bastantes más en parajes cercanos. No se incluyen los registros obtenidos con cámara automática, por GREFA, en el comedero de WWF en el Refugio (por ejemplo, el 21-6-18).

En 275 ocasiones en que se pudo distinguir la edad, las aves observadas eran jóvenes o inmaduras (o subadultas) en las mayor parte de los casos; pero también ha habido al menos 83 observaciones de aves adultas, a partir del año 1993 (la primera vez, por Daniel Magnenat).

No se incluyen en los datos anteriores las observaciones de un ave de cuatro años liberada en el Refugio en 1998, después de su rehabilitación y aclimatación, por GREFA, en el marco del Proyecto

Monachus (véanse la **Hoja Informativa Nº 24**, pág. 36; así como el artículo "**Recent vulture censuses in the Montejo Raptor Refuge, Spain**", publicado en 2004 en *Vulture News* [Nº 51, págs. 46-53]).



Número de observaciones registradas de buitre negro en las hoces del Riaza.

Con respecto a las agrupaciones del buitre negro, a los números más altos, que Fidel José presentó en sus Informes anteriores, pueden añadirse, para fechas posteriores, la observación de al menos **11** buitres negros en el comedero del Refugio de Montejo el 20 de julio de 2018, por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, lo cual representa el récord que conocemos para este comedero [junto con la observación de 11 buitres negros en la zona, con 7 en el comedero, realizada el 1-2-2017 por Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio].

Otro dato reciente notable, para la provincia de Burgos, es la observación de **24** buitres negros, de los que 18 eran exógenos (no procedían del Proyecto Monachus), el 31 de mayo de 2018, por Lorena Juste (bióloga de GREFA, responsable del Proyecto Monachus en la provincia), en el PAE (Punto de Alimentación Específico) de Huerta de Arriba; lo cual representaba entonces la mayor concentración registrada en Burgos, de acuerdo con los datos publicados en www.avesdeburgos.com. Un nuevo artículo sobre este Proyecto Monachus, de recuperación del buitre negro en el Sistema Ibérico, aparece publicado, por Lorena Juste, en el Volumen V del **Anuario Ornitologico de Burgos** (págs. 237-250).

Posteriormente, ha habido registros de más aves, debidos a GREFA y publicados en el **Informe 70** del **Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos**: en el mismo lugar, el PAE de Huerta de Arriba, **49** buitres negros (al menos 25 exógenos, y el resto del Proyecto Monachus) el 9 de octubre de 2018, y **46** buitres negros (32 exógenos, de ellos cinco anillados –uno, de origen portugués-, y 14 del Proyecto Monachus, de los que 7 fueron liberados en 2017 y los otros 7 en 2018) el 11 de octubre de 2018.

El récord que conocemos, para el nordeste de Segovia, sigue siendo el de **28** buitres negros (con 137 buitres leonados, 30 milanos reales, un ratonero, cuervos, cornejas, y urracas) observados en el comedero de buitres de Campo de San Pedro, el 15 de enero de 2006, por Jorge Andrés Remacha Lorenzo.

En el comedero de buitres de Ayllón, el récord que conocemos es de **17** buitres negros (y 539 buitres leonados, 12 alimoches, al menos 5-6 cuervos, y volando un milano negro), observados el 31 de julio de 2006 por Álvaro Camiña Cardenal.

En el comedero de buitres de Maderuelo, el récord que conocemos es de **14** buitres negros (posados cerca del comedero; se obtiene foto), con otras aves (más de 130 buitres leonados, dos milanos reales, y más de 30 cuervos), registrados el 26 de noviembre de 2017, por Juan Luis Galindo Estévez.

En el comedero de buitres de Fresno de Cantespino, el récord que conocemos es de cinco buitres negros (con al menos 216 buitres leonados, dos alimoches en vuelo, un milano real en vuelo, un milano negro en vuelo, y al menos 14 cuervos), observados el 27 de agosto de 2014, por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.

En 2018, y además de nuevas citas en el sur de Burgos, hubo dos nuevas citas de **águila imperial** en la zona (en el nordeste de Segovia, en las hoces o muy cerca): un ejemplar subadulto fotografiado por Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, en la estepa norte del Refugio de Montejo, el 26 de abril (puede verse una foto en la **Circular Nº 21** del Fondo, pág. 25); y un posible joven fotografiado por Xavier Parra Cuenca al este del Cerro Lucas, el **14 de agosto**. Puede verse una relación detallada, de todos los registros anteriores de esta soberbia rapaz que conocemos en la comarca, en las **Hojas Informativas** sobre el Refugio.

En zonas cercanas de las tres provincias, Fidel José vio, en 2018, y gracias en parte a la amable colaboración de distintas personas (incluyendo **naturalistas y agentes medioambientales o guardas** de **Soria**, **Burgos**, y **Segovia**), sólo cinco nidos ocupados (de **águila real**), de los que uno fracasó, y en los cuatro restantes salieron adelante cinco pollos en total (todos ellos fuera de las hoces).

En 2018, Fidel José vio tres territorios ocupados por el **halcón** en las hoces del Riaza, aparte de realizar observaciones en otras zonas, y registró algunos territorios más en parajes cercanos de las tres provincias (Segovia, Burgos y Soria). En las hoces, se mantienen las dos parejas de 2017 (ese año, una pareja formada por dos adultos y otra por un adulto y un inmaduro -el inmaduro podría ser la hembra-, como Fidel José señaló en la **Hoja Informativa Nº 49** *sobre el Refugio de Rapaces de Montejo* [marzo de 2018, páginas. 189-195], con un resumen de la reproducción en el "*Noticiario ornitológico*" de **Ardeola** [Vol. 65-1, enero de 2018, pág. 161], y en el **Informe** que presentó en 2018 en la reunión del Patronato del Parque Natural (publicado en la **Circular Informativa Nº 20** *del Fondo para el Refugio* [marzo de 2018, págs. 48-61, con los datos del halcón en la pág. 53]; y además, después de años de ausencia, en 2018 aparece de nuevo el halcón en uno de los antiguos territorios, además de haber observaciones en otras zonas. En 2018, Fidel José vio al halcón (uno, o dos) en sendos antiguos nidos de los dos primeros territorios señalados; pero no encontró ningún nido con éxito en las hoces, y cree que no lo hubo. En parajes cercanos, aunque en 2018 Fidel José detectó al halcón en antiguos territorios de las tres provincias, sólo consiguió localizar un nido ocupado (casi seguro), pero no pudo averiguar si la reproducción tuvo éxito o no. Una relación detallada de las observaciones de halcón registradas en los ocho primeros meses del año apareció en la **Circular Informativa Nº 21** *del Fondo para el Refugio* [octubre de 2018, págs. 50-54]. Una relación ampliada a todas las observaciones realizadas o recibidas en 2018 está previsto aparezca en la **Hoja Informativa Nº 51** sobre el Refugio (en preparación).

En el último **censo de otoño**, los 125 participantes registraron al menos 6-8 halcones peregrinos.


En 2018, Fidel José localizó 7 nidos de **búho real** (todos en la provincia de Segovia), 4 de ellos con éxito; uno con tres pollos y tres con un pollo (en un nido hubo al principio dos pollos, y en otro dos huevos), dando así un total de seis pollos volados. Dos de los tres nidos fracasados eran nuevos. De los siete nidos, cinco (tres con éxito, con tres pollos volados) estaban en la ZEPA, cuatro (dos con éxito) en el Parque Natural, y tres (dos con éxito) en el Refugio. Además, en 2018 Fidel José detectó al gran búho en nueve territorios más (otros cuatro en las hoces y cinco más en zonas próximas).

Uno de los nidos, según los datos de Fidel José, había sido utilizado con éxito en **1984** (tres pollos, aunque José Luis Perea constató que volaron dos, que anilló); de nuevo treinta años después, en **2014** (dos pollos); y cuatro años más tarde, en **2018** (dos pollos, aunque sólo uno llegó a volar).

Sobre la utilización de cada nido durante los 44 años de seguimiento, puede verse un detallado resumen en la **Hoja Informativa Nº 51** (en preparación).

En el último censo de otoño, los 125 participantes detectaron al menos unos 13-14 búhos reales al parecer distintos, en 8 de los cuales se determinó el sexo (4 machos y 4 hembras), en unos 8-9 territorios. Fueron localizadas 3-4 parejas (en tres de ellas se distinguieron un macho y una hembra), y en otros 4-6 territorios se registró al menos un búho (en uno de ellos una hembra). En un territorio se registraron dos machos y una hembra. Pueden verse los datos detallados en el **Informe final**, que se reparte a los presentes.

En 2018, Fidel José registró al **mochuelo** en 14 territorios (tres en el Parque, y también en el Refugio), donde pude confirmar la presencia de al menos 4 parejas, y un solo nido con éxito (con dos pollos). De los 14 territorios, había uno en Burgos (con el único nido con éxito localizado), tres en Soria, y 10 en Segovia (con al menos tres parejas, dos de ellas en el Refugio).



Número de búhos reales registrados en los censos de otoño, organizados por el Fondo para el Refugio.

También en 2018, Gema Cáceres Miguel informó amablemente sobre un nido ocupado de **búho chico**, en el término de Maderuelo. Siguiendo sus indicaciones, Fidel José pudo verlo también. La reproducción fracasó, entre el 28 de mayo y el 4 de junio, tal vez por las tormentas y las continuadas lluvias que hubo.

En 2018, Fidel José comprobó la reproducción con éxito del **cernícalo** en cinco nidos, dos en el nordeste de Segovia (uno en roca y uno en una caja nido) y tres en el suroeste de Soria (uno en una nave, uno en un poste del tendido eléctrico, y uno en un chopo), con un total de veinte pollos [un nido con cinco pollos, tres nidos con cuatro pollos, y un nido con al menos tres pollos]); comprobó la reproducción con éxito en un territorio más (casi seguro en roca, en el suroeste de Soria, con al menos un pollo); y registró al menos otros 5 territorios (dos de ellos en el Refugio) posiblemente, o con seguridad, ocupados por el cernícalo. Se obtendría así un total de unos 11 territorios como mínimo (cuatro en el nordeste de Segovia, dos en el sur de Burgos, y cinco en el suroeste de Soria), con reproducción exitosa al menos en 6 (uno con cinco pollos, tres con cuatro pollos, uno con al menos tres pollos, y uno con al menos un pollo; dos en Segovia, y cuatro en Soria), y con cinco nidos localizados (uno en roca, uno en una caja nido, uno en un poste del tendido, uno en una nave, y uno en un chopo). Los nidos y pollos en Soria fueron vistos gracias a la amabilidad de Fermín Redondo Ramírez, Jesús Javier Andrés Rodríguez, y otros.

Con respecto a la reproducción del cernícalo, en 2018, en las 53 **cajas nido** instaladas por **GREFA** (con financiación de **WWF España**), en Montejo / Fuentelcésped y en Maderuelo, puede verse una detallada información en el artículo de Carlos Cuéllar Basterrechea, de GREFA, Coordinador del Proyecto de Control Biológico de la plaga de topillo campesino, publicado en octubre de 2018 en la **Circular 21** del Fondo (págs. 28-29). El total es de **9** cajas nido ocupadas por el cernícalo, con 23 pollos vivos (y tres muertos) en la visita realizada el 16 de julio.

En el último **censo de otoño**, los 125 participantes registraron al menos 16 cernícalos vulgares.

En 2018, Fidel José vio **7** pollos de **águila calzada** (al menos 6 de fase clara) que salieron adelante, en **7** nidos con éxito (cada uno con un solo pollo volado). De los 7 nidos con éxito observados por Fidel José, había dos en el nordeste de Segovia, cuatro en el suroeste de Soria, y uno en el sur de Burgos. Tres nidos con éxito estaban en chopo (uno en Segovia y dos en Soria), uno en un sauce (en Segovia), dos en pino (uno en Soria y uno en Burgos), y uno en encina (en Soria). Los dos nidos con éxito del nordeste de Segovia estaban en la IBA (Área Importante para las Aves), y también en la ZEPA y en el Parque Natural; y de éstos, uno (con un pollo volado), estaba en el Refugio de Montejo. Los nidos en Soria fueron descubiertos y amablemente comunicados, en este año o en los anteriores, por Fermín Redondo Ramírez y Ángel Bocos García. Además, Xavier Parra Cuenca informa sobre otro nido con éxito, en el pinar de Valdevacas (Segovia). Es muy posible que haya habido más nidos.

En 2018, Fidel José localizó dos nidos ocupados de **milano negro**, ambos en chopo, y al menos uno de ellos con éxito. Un nido estaba dentro del Parque Natural, y salieron adelante dos pollos; es el viejo nido Nº XIX de la **garza real**. Otro nido era el viejo nido Nº 51 del **águila calzada**, y se desconoce el resultado de la cría del milano. También en el nordeste de Segovia, José Manuel Boy Carmona localizó un tercer nido de ratonero, con un pollo, en chopo, ,Además, en el suroeste de Soria, Fermín Redondo Ramírez descubrió un nido, en chopo, donde el milano negro sacó adelante un pollo en 2018, y donde en 2016 habían criado con éxito primero la **corneja negra** (tres pollos, según constató Fermín Redondo) y luego (en el mismo año) el **alcotán** (dos pollos, aunque Fermín Redondo constató que nacieron tres).

En 2018, Fidel José vio 3 pollos de **ratonero o águila ratonera**, en 2 nidos con éxito (un nido con dos pollos, y un nido con un pollo). Los dos nidos estaban en sendos chopos, y en el suroeste de Soria; fueron descubiertos, en este año o en años anteriores, por Fermín Redondo Ramírez; quien comunica que, además, en 2018 crió con éxito el ratonero en el viejo nido Nº S-To-2 del águila calzada (en un chopo, cuadrícula VM80, provincia de Soria), donde el águila calzada sacó adelante dos pollos (ambos de fase oscura) en 2017 (véase la Hoja Informativa Nº 49 sobre el Refugio, pág. 177). Varias observaciones de Fidel José, de parejas en época de cría o en verano, indican que es muy posible que haya habido más nidos en la comarca.

En 2018, Fidel José vio cuatro nidos ocupados de **azor**, todos ellos en pino; dos en el suroeste de Soria, uno en el sur de Burgos, y uno en el nordeste de Segovia. Comprobó que nacieron al menos seis pollos (3+1+1+1), y volaron en principio cuatro pollos en total (2+1+1+0), en tres nidos con éxito. Los nidos de Soria fueron descubiertos y amablemente comunicados por Fermín Redondo Ramírez y otros. El nido de Burgos fue descubierto y amablemente comunicado, hace varios años, por los pastores Antonio Casado Iglesias (actualmente fallecido) y Yolanda Calleja Corento. El nido en Segovia fue descubierto en años anteriores por el autor, en un territorio amablemente comunicado por Juan Luis Galindo Estévez.

Además, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez informa amablemente sobre otros tres nidos ocupados de azor que descubrió, en 2018, en pinos del nordeste de Segovia. Localizó uno el 25 de junio (en un pinar de *Pinus nigra*), otro el 30 de junio (con desplumaderos de paloma torcaz en el entorno), y otro el 7 de julio (con dos pollos, uno de ellos a punto de volar, en un *Pinus sylvestris*). Envía fotografías.

Por otro lado, Fidel José comprobó que en 2018 no hubo reproducción con éxito en otro nido de azor, también en un pino, en el suroeste de Soria, que fue descubierto y amablemente comunicado, en años anteriores, por José Manuel Boy Carmona.

En 2018, Fidel José no localizó ningún nido de **alcotán**.

Con respecto al **aguilucho cenizo**, para el nordeste de Segovia se ha realizado de nuevo un trabajo considerable por **SEO-Segovia** en 2018; cuyos resultados se resumen en el artículo publicado, por Candelas Iglesias Aparicio, en la **Circular 21 del Fondo para el Refugio** (páginas 30-31), que se reparte a los presentes. Más datos sobre la reproducción en el nordeste de Segovia y el suroeste de Soria, debidos a distintos ornitólogos (Antonio Fernández Ortiz, Jorge Andrés Remacha Lorenzo, Xavier Parra Cuenca, Juan Luis Galindo Estévez, Fermín Redondo Ramírez, Ángel Bocos García, Jesús Javier Andrés Rodríguez, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, y otros) está previsto aparezcan en la Hoja Informativa Nº 51 sobre el Refugio (en preparación). En el interior del Refugio, no se ha encontrado en 2018 ningún nido, que sepamos.

En 2018, ha habido bastantes nuevas observaciones del **aguilucho lagunero**, y al parecer menos que otros años del **aguilucho pálido**.

En 2018, Fidel José no encontró ningún nido ocupado de **gavilán**, y realizó pocas observaciones de la especie. Sin embargo, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez informa sobre un nido ocupado de gavilán que encontró, en el nordeste de Segovia, el 30 de junio de 2018. En el nido, situado en un pino, vio un gavilán adulto y un pollo con plumón, y bajo el nido estaba la cáscara de un huevo.

En el último censo de otoño, puede destacarse el hallazgo de un nuevo dormidero de **milano real**, por Fidel José, con al menos 21 aves hacia el anochecer del 12 de noviembre de 2018, cerca de Riahuelas. En el comedero de buitres de Campo de San Pedro, la mayor agrupación que conocemos es de **55-60** milanos reales el 26 de diciembre de 2015 (observada por José Liarte de Blas, Mario Liarte Lozano, y Rosa Lozano Hernando); aunque en las choperas próximas se han se han señalado concentraciones bastante mayores, como por ejemplo las indicadas en la **Hoja Informativa Nº 39** sobre el Refugio (pág. 87). En el comedero de buitres de Ayllón, la mayor agrupación registrada, según los datos que conocemos, es de

52 milanos reales el 16 de noviembre de 2008 (observada por Raúl Navas Sanz; véase la **Hoja Informativa Nº 33** sobre el Refugio, pág. 70). La mayor agrupación de milanos reales de la que tenemos noticias en la comarca, corresponde a **150** milanos reales en el basurero de Aranda de Duero (Burgos), el 8 de diciembre de 1992 (Fernando Román Sancho; publicado en el "**Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos. *Volumen I***" [González Ortega, D.; Román Sancho, F.; Fernández González, R.; y Lobo Cueva, J. L.; Caja de Burgos, Aula de Medio Ambiente, Burgos, 2006, 431 pp.; págs. 93-95]).

Puede remarcarse también la observación, por Candelas Iglesias Aparicio (de Abubilla Ecoturismo), el 3 de enero de 2019, de un milano real marcado, una hembra joven que había sido anillada de pollo en su nido en Alemania, el 21 de junio de 2018, por Oliver Krüger. Puede verse una fotografía en la **Circular Nº 22** del Fondo, que se reparte a los presentes. En el nordeste de Segovia o muy cerca, y según los datos publicados en las **Hojas Informativas** sobre el Refugio [**Nº 31** (págs. 49-50), **Nº 33** (pág. 72), **Nº 35** (págs. 79-80), y **Nº 39** (págs. 93-94)], se han registrado observaciones de siete milanos reales marcados (cinco en la zona de Campo de San Pedro, uno cerca de Languilla, y uno entre Montejo y Milagros); se sabe el origen de cuatro de estas aves, que procedían de Francia (tres) y de Segovia (uno). Otros dos milanos reales marcados, registrados en el sur de Burgos (incluido el de enero de 2019), venían de Alemania. En los **Anuarios Ornitológicos de Burgos** [**Volúmenes I** (págs. 93-95), **II** (págs. 85-87), **III** (págs. 76-77), **IV** (págs. 85-86), y **V** (págs. 68-70)], pueden verse datos anteriores de milanos reales anillados, registrados en esa provincia. 34 de estas aves procedían de Alemania (25, incluyendo la última antes señalada), Francia (5), Bélgica (1), Suecia (1), Navarra (1), y Soria (1). Datos posteriores aparecen en los Informes trimestrales correspondientes.

También en 2018, merecen destacarse un nuevo registro del **elanio azul** en zonas cercanas (en el sur de Burgos, por Javier Vitores Casado); nuevas citas del **águila pescadora** en el embalse de Linares o muy cerca, en septiembre (debidas a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, para el nordeste de Segovia), nuevos registros del **esmerejón** (por distintos ornitólogos) y del **cernícalo primilla** (un ejemplar fotografiado el 19 de agosto, por Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández, entre Moral y Fuentemizarra; y en Caleruega, un registro de **80** ejemplares juntos el 25 de agosto, debido a José Luis Arroyo y publicado en el Informe 69 del Anuario Ornitológico de Burgos), una nueva observación del **águila perdicera** (un joven , el 1 de agosto, por Jesús Cobo Anula [Biólogo Conservador del Refugio, de WWF], Carlos Cuéllar Basterrechea y Laura Suárez Regalado [ambos de GREFA],), etc.

Sobre la **cigüeña blanca**, en 2018, y en 54 pueblos de la comarca (36 de Segovia, 11 de Burgos, y 7 de Soria), Fidel José revisó **113** nidos, de los que vio **81** ocupados alguna vez, y **60** tuvieron éxito en la cría, con un total de **138** pollos volados (aunque nacieron más): cuatro nidos con cuatro pollos, 21 nidos con tres pollos, 24 nidos con dos pollos, y 11 nidos con un pollo. (Productividad de 1´71, y tasa de vuelo de 2´29; las medias de los 16 últimos años son de 1´44 y 1´95, respectivamente). En la **circular 21 del Fondo** (páginas 38-49) pueden verse los resultados para cada pueblo, que aparecen también en **Naturalicante**. El resumen fue publicado en la revista "***Ardeola***" (Vol. 66(1) I-2019, pág. 221, en el Noticiario Ornitológico), y en muchos otros medios. En los trece últimos años, Fidel José censó 133 pollos volados en 2006, 117 en 2007, 86 en 2008, 107 en 2009, 77 en 2010, 163 en 2011, 25 en 2012, 99 en 2013, 112 en 2014, 104 en 2015, 126 en 2016, 74 en 2017, y 113 en 2018.

También de la cigüeña blanca, en la comarca y en 2018, llama la atención el vídeo filmado el 10 de julio, en Fresnillo de las Dueñas (Burgos), por **Candelas Iglesias Aparicio**, de una cigüeña blanca (posiblemente hembra) en su nido, **capturando en vuelo un vencejo común**. Tal como señala la autora, "*podría tratarse de un registro audiovisual único*". Fue publicado, con fotos, en el Facebook de Montejanos y otros sitios de Internet, en la Circular Nº 21 del Fondo para el Refugio (pág. 38), y en la Hoja Informativa Nº 51 sobre el Refugio (en preparación).

En 2018, en las hoces del Riaza y su entorno, Fidel José registró al menos 10-12 parejas, y **ocho nidos** del gran **cuervo**; de los que dos fracasaron (ambos en el Parque Natural, y uno también en el Refugio), y seis tuvieron éxito (cuatro en Segovia [uno en el Refugio], y dos en Soria), con un total de **20 pollos** volados (dos nidos con 5 pollos, un nido con 4 pollos, un nido con 3 pollos, un nido con dos pollos, y un nido con un pollo). Cuatro nidos estaban en roca (dos con cinco pollos cada uno, y dos fracasados), dos en postes del tendido eléctrico (con cuatro y tres pollos respectivamente), uno en un chopo (con dos pollos), y uno en el interior de una nave (con un pollo). El único nido con éxito del Refugio (y del Parque, que sepamos) tuvo cinco pollos. Tres nidos de zonas cercanas fueron descubiertos y amablemente comunicados por Fermín Redondo Ramírez (dos, en Soria) y Raúl Navas Sanz (uno, en Segovia). El resultado también se publicó en ***Ardeola*** (Vol. 66(1), enero de 2016, pág. 253, en el Noticiario Ornitológico).

En el embalse de Linares, en 2018, Fidel José encontró 16 nidos de **garza real**, al menos 13 con éxito, y un mínimo de 28 pollos volados (cinco nidos ap. con con tres pollos, cinco con dos pollos, y tres con un pollo), aunque es muy posible que el número real de pollos haya sido superior. (F. J. Fernández y Fernández-Arroyo).

Con respecto a los censos y observaciones de **aves acuáticas** en el embalse de Linares y en otros sitios, en 2018, Fidel José se remite a la información que está previsto aparezca en la Hoja Informativa Nº 51 (en preparación), que incluye datos sobre especies reproductoras (la ya mencionada **garza real**, el **ánade azulón o real**, la **gallineta o polla de agua**, y el **somormujo lavanco**, si bien de este último Fidel José no vio pollos en 2017 ni en 2018).

Destacan también algunos registros nuevos de especial interés. Por ejemplo, dos nuevas observaciones del **zarapito real** en este mismo año 2019 (dos aves fotografiadas el 6 de enero, en los páramos de Campo de San Pedro, por Juan Luis Galindo Estévez; y tres aves anotadas el 20 de febrero, junto al comedero de Campo de San Pedro, por Manuel López Lázaro y David Fajardo Orellana). Como puede verse en la **Hoja Informativa Nº 49** (pág. 214) sólo conocíamos dos noticias anteriores de la especie en el nordeste de Segovia (un ejemplar cerca de Corral de Ayllón el 14 de abril de 2014, y un ave fotografiada cerca de Bercimuel el 28 de junio de 2017), ambas debidas a Xavier Martín Vilar. En el sur de Burgos hay unas pocas citas más, que pueden verse en las **Hojas Informativas Nº 22** (pág. 48)**, Nº 27** (pág. 181), y **Nº 39** (pág. 365).

Resaltaremos también nuevas observaciones, entre 2018 y comienzos de 2019, en el embalse o en zonas cercanas, la **garceta grande** (por bastantes observadores, entre el 10 de octubre y el 26 de diciembre, con un máximo de seis aves vistas el 10 de noviembre, por José Luis López-Pozuelo García), la **garza imperial** (un ejemplar joven fotografiado el 9 de agosto, por Xavier Parra Cuenca), la **cigüeña negra** (dos adultos observados el 4 de agosto, en la cola del embalse, con ocho cigüeñas blancas, por Juan Luis Galindo Estévez), la **cigüeñuela** (dos aves vistas el 15/17 de junio, cerca de Boceguillas, por Antonio Fernández Ortiz), etc.

En el Refugio, pueden destacarse asimismo nuevos registros del **vencejo real** en 2018 (en marzo, julio y agosto), por Martín Francisco Arévalo Sánchez y por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.

En los páramos del Refugio o muy cerca, en 2018, distintos naturalistas (Carlos Palma Barcenilla, Xavier Parra Cuenca, Javier Cano Sánchez, Carlos Cano Barbacil, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo) oyeron al menos **7-10 machos cantores** de **alondra ricotí o de Dupont**, aunque el número real puede ser muy superior. La especie ha sido registrada allí cada año, durante más de 31 años.

Muy cerca, en el **páramo de Corcos**, último reducto concido para la especie en la provincia de Burgos, destacan las importantes actuaciones realizadas los últimos meses en favor de este pájaro tan enigmático, sobre todo por la Fundación Alondra Ricotí y personas relacionadas.

Fidel José agradece a Carlos Palma, ornitólogo burgalés experto en la especie, haberle enseñado en 1018 la zona cercana de Segovia donde descubrieron, los dos años anteriores, la **nueva población** de alondra ricotí, "*el fantasma del páramo*", tal como se publicó en el *Noticiario Ornitológico* de *Ardeola* (Vol. 63 [2], 2016, pág. 441), y de la que Carlos Palma informó asimismo a la Junta de Castilla y León. Este pájaro tan interesante y especial también está amenazado por la reducción del pastoreo extensivo, como es bien sabido.

Sobre otras aves esteparias, como la **ortega**, el **sisón**, o la **avutarda**, pueden verse nuevas informaciones en la **Hoja Informativa Nº 21** (en preparación).

Otra novedad de 2018 se refiere a un **pechiazul** fotografiado, junto al embalse de Linares, los pasados días 8 y 9 de septiembre, por Xavier Parra Cuenca y Monserrat Gutiérrez Fernández (puede verse una foto en la Circular 21 del Fondo, página 55). En 44 años, es la primera cita conocida de la especie en el embalse, y la tercera en la zona de las hoces del Riaza, siendo las dos anteriores de 1980 y 2007 respectivamente, como se recoge en las **Hojas Informativas** sobre el Refugio. El dato apareció asimismo en el *Noticiario Ornitológico* de *Ardeola* (Vol. 66-1, enero de 2019, pág. 247). En una zona próxima (El Chaparral, en el término de Castillejo de Mesleón), fue visto un pechiazul el 12 de octubre (de 2018), por Antonio Fernández Ortiz.

El censo de otoño de 2018 aportó una gran sorpresa, la observación (por primera vez para Castilla y León, y nº 11 para España, que sepamos), de un **coliazul cejiblanco**, pájaro de la taiga siberiana o cerca, o de otras zonas lejanas de Asia, a miles de kilómetros de aquí. Fue fotografiado, en el pinar de Valdevacas de Montejo, por los biólogos Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández, y fue visto el día siguiente por Andrés Requejo de las Heras, ornitólogo asimismo de Barcelona. La difusión por Internet atrajo a bastantes naturalistas; algunos también vieron, y fotografiaron de nuevo, a este visitante insólito. Así, son ya **333** las especies de vertebrados citadas en la zona, de las que al menos 165

se han reproducido allí (puede verse la relación completa en la **Lista de vertebrados del Refugio**, elaborada y publicada por Fidel José en **1993**; y en las **Hojas Informativas** posteriores, del mismo autor).

Por otra parte, sobre la migración del **papamoscas cerrojillo** en Madrid, Javier Cano Sánchez y Carlos Cano Barbacil acaban de publicar sendos e importantes artículos en el **Calendario Meteorológico 2019** de la Agencia Estatal de Meteorología (págs. 304-314), **y en el Anuario Ornitológico de Madrid 2015-1017** de SEO-Monticola y otras entidades (págs. 24-39), donde también está mencionado el Refugio de Montejo.

Está previsto que en la próxima **Hoja Informativa** sobre el Refugio aparezcan otras muchas novedades, como las relativas al **colirrojo real** en 2018: un posible ejemplar visto en el término de Montejo el 20 de marzo, por Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio; y aves vistas y/o fotografiados en el término de Maderuelo o cerca, los días 9 y 12 de agosto y 8 y 10 de septiembre, por Xavier Parra Cuenca, biólogo de Barcelona. Por otro lado, pueden destacarse, en 2018, nuevas observaciones de pájaros tan interesantes como el **mirlo capiblanco** (los días 31 de marzo y 1 de abril, en total al menos cuatro ejemplares en el barranco de San Andrés, de los que se obtienen fotografías [de macho y de hembra], por Xavier Parra Cuenca y Montserrat Gutiérrez Fernández).

En los dos últimos años, llama la atención la escasez de observaciones de **collalba negra** (con un solo registro recibido en 2018, un macho observado en Peña Rubia el 23 de febrero, por Jesús Cobo Anula, biólogo conservador de WWF en el Refugio). Para esta ave, la zona está en el límite de su área de distribución, del mismo modo que sucede (o sucedía) con el **chotacabras pardo**.

En 2017 y 2018, Fidel José ha prestado una atención especial al **roquero solitario**. Entre las cuatro cuadrículas que incluyen el Refugio, en estos dos últimos años, obtuvo un total de **58-62** posibles territorios de este soberbio pájaro (o al menos, zonas donde Fidel José lo detectó en primavera o verano, o en marzo), todos ellos en Segovia, de los que **48-52** corresponden a la ZEPA (y **43-46** al Parque Natural, y **31-33** al Refugio). En cuadrículas cercanas de las tres provincias, y también en estos últimos años, se obtienen **13-14** lugares más; lo que da un total de **71-76** sitios donde Fidel José ha registrado la especie estos dos años. Hay más sitios donde sin duda habita el roquero solitario en el Refugio. Por ejemplo, muchos lugares más, donde Fidel José lo ha registrado en los años anteriores (desde 1975 inclusive), o donde ha sido detectado por otros observadores (pueden verse los datos que aparecen sobre ello en las Hojas Informativas). Para otras zonas de la provincia, mencionaremos los recientes informes realizados por Alfredo López Hernangómez sobre sus observaciones de los dos últimos años.

En cuanto a los **carnívoros**, destacaremos el hallazgo, en una zona muy cercana del sur de Burgos, entre Fuentenebro y Moradillo de Roa, el 15 de junio de 2018, por Santiago Sanz Rincón y Adolfo Frías Aguilera, de una **gineta** atropellada (un macho adulto), muy reciente, medida y fotografiada. Puede verse lo publicado al respecto, por Santiago Rincón, con fotografías de ambos, en la Circular Nº 21 del Fondo (págs. 26-27). Es el primer dato que que conocemos sobre la presencia de la gineta en la cuadrícula VL39, donde no está señalada en el "**Atlas de los Mamíferos Terrestres de España**" [L. Javier Palomo y Julio Gisbert (editores); Dirección General de Conservación de la Naturaleza – SECEM – SECEMU; Madrid, 2002, 564 pp.; pág. 291, ni en el "**Atlas y Libro Rojo de los Mamíferos Terrestres de España**" [Palomo, L. J.; Gisbert, J.; y Blanco, J. C.; 2007; Dirección General para la Biodiversidad – SECEM – SECEMU, Madrid, 588 págs.; pág. 331].

En los trece últimos años, hemos tenido pocas noticias nuevas de gineta. [Véanse "***Los mamíferos del Refugio de Rapaces de Montejo***" (págs. 43-44); y las **Hojas Informativas Nº 23** (pág. 51), **Nº 24** (pág. 90), **Nº 26** (pág. 116), **Nº 28** (pág. 98-99), **Nº 30** (págs. 111-115), **Nº 32** (pág. 154), **Nº 34** (pág. 190), **Nº 36** (págs. 180-181), **Nº 38** (pág. 187), **Nº 40** (pág. 234), **Nº 42** (pág. 85), **Nº 44** (pág. 76), **Nº 46 (**págs. 79-80), y **Nº 48 (**págs. 87-88).]

En 2018, y entre los muchos trabajos faunísticos realizados en la zona, destacan también los meritorios estudios de José Luis López-Pozuelo García, Jesús Abad Soria, León Adrados Rincón, José Aguilera Díez, José Félix Aladrén Rubio, Nuria Álvarez-Acebedo Salan, Eduardo Álvarez Cebrián, Manuel de Andrés Moreno, Marina Arévalo de la Plaza, Martín Francisco Arévalo Sánchez, José Luis Armendáriz Sanz, Yolanda Arrabal Agüera, Rubén Arrabal Espeja, Fernando Ávila Vico, Javier Balset Izquierdo, Pedro José Bartolomé Sanz, Manuel Pablo Box Sánchez, José Manuel Boy Carmona, Miguel Briones Díez, Pablo Briones González, Gema Cáceres Miguel, Cristian Calvo Vergara, Yolanda Calleja Corento, Javier Cano Sánchez, Juan Antonio de Cara García, Juan Luis Carranza Briones, Pedro Luis Castilla Apolonio, Bruno Chacón Espinosa, María José Chicharro Lafuente, Jesús Cobo Anula, Yolanda de la

Cruz Rubio, Carlos Cuéllar Basterrechea, Dr. José Antonio Dávila García, Rosa Díez de Artazcoz Abellán, Martí Alexandre Dot Ventalló, Sara Fernández Aguirre, Francisco Jesús Fernández Herrera, Antonio Fernández Ortiz, Luisa Fragua Domínguez, Paloma Fraguío Piñas, José Luis de la Fuente Mayoral, Juan José Fuentenebro Martín, Juan Luis Galindo Estévez, Pilar García San José, Elías Gomis Martín, Raúl González Rodríguez, Fernanda González Zubieta, Marta Gatti, GREFA (Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat), Montserrat Gutiérrez Fernández, Grupo Pyrrhocorax, Jorge Manuel Hernández Núñez, José Luis Hernández Pérez, José Antonio Hernando García, Jesús Hernando Iglesias (guarda de WWF España en el Refugio), Candelas Iglesias Aparicio, Mauricio Iglesias Sanz, Fernando Jiménez Raigón, Fernando Lafuente Aylagas, Alfonso Lario Doylataguerra, Ángel Leiva Lozano, José Liarte de Blas, Mario Liarte Lozano, Alfredo López Hernangómez, Manuel López Lázaro, José Luis López-Pozuelo García, Juan Francisco Martín Calleja (guarda de la CHD), Xavier Martín Vilar, José María Martínez Mediano, Félix Martínez Olivas, Pascual Mate Alonso, Juan José Molina Pérez, Laura Moreno Ruiz, Raúl Navas Sanz, Fernando Nieva Palacios, Carlos Palma Barcenilla, Xavier Parra Cuenca, Julio Peña Herrero, Juan Prieto Martín, Ricardo Ramos Sánchez, Fermín Redondo Ramírez, Jorge Andrés Remacha Lorenzo, Andrés Requejo de las Heras, Juan Carlos Rincón García, José Félix Rodríguez Calcerrada, Dr. Pedro Rodríguez Panizo, José Román Rodríguez, José Luis Romero Carayol, Benito Ruiz Calatayud, Antonio Ruiz Heredia, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez, Antonio Sanz Carro, Santiago Sanz Rincón, Luis Sitges Aparicio, Lourdes Tiemblo Blázquez, Pedro Torres Expósito, Juan Miguel Velasco de Miguel, Almudena Vicente López, Javier Vitores Casado, WWF España, etc.; además de los autores de artículos o trabajos citados en otros lugares. Merecen mencionarse también los trabajos relativos a los censos; incluyendo todos los informes correspondientes al último censo de otoño (organizado por el Fondo para el Refugio de Montejo, en el que participaron 125 ornitólogos, coordinados por Juan José Molina Pérez). Agradecemos, a todos los autores, el habernos proporcionado amablemente copia de sus trabajos, informes, fotografías, o filmaciones, en el Refugio. Destacaremos también la valiosa colaboración de la Asociación Cultural "Monte Irago" (de Astorga, León), Victorina Bernal Bernal, Cándido Calleja Tristán, Yolanda Calleja Corento, Juan Carlos Cano Calleja, María Cano Calleja, Abelardo Mínguez Bernal, todos los ya nombrados antes, y varios centenares más (pueden verse todos los que aparecen en los Agradecimientos de las últimas Hojas Informativas). En lo referente a las fotografías, es justo resaltar todas las obtenidas este año por Xavier Parra, de buena parte de las especies de la zona; puede verse un álbum de las mismas en Internet, en **Flickr**, tal como se recoge en la **Circular 21** del Fondo (pág. 5).

En las nuevas **Hojas Informativas** pueden verse también bastantes novedades sobre **mamíferos**, **reptiles**, **anfibios**, etc.

En **Segovia**, la exposición sobre el Refugio estuvo acompañada de las **charlas** impartidas por Juan José Molina Pérez (el 1 de junio, titulada "**Historia humana del Refugio de Rapaces de Montejo**"), y por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo (el 13 de junio, titulada "**44 años censando y defendiendo el Refugio de los buitres**"). Otras charlas de 2018, mencionadas en las Circular Nº 22 del Fondo, tuvieron lugar los días 21 de mayo y 15 de septiembre (en **Ayllón** y en **Campo de San Pedro**, y en **Sepúlveda** respectivamente, las tres sobre **aguiluchos**, a cargo de Candelas Iglesias Aparicio), 1 y 2 de septiembre (en Fiduero, en **Aranda de Duero**, tituladas "**Información sobre los packs de ecoturismo**" e "**Importancia del medio ambiente en la salud de los ecosistemas y en nuestra salud física, psíquica y emocional**", asimismo por Candelas Iglesias Aparicio, de Abubilla Ecoturismo), y 8 de febrero (en **Sevilla**, sobre el **Refugio** y su historia, por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, organizada por los grupos de **WWF** en Sevilla y en Doñana); y, ya en 2019, el 7 de febrero (en **Mérida [Badajoz]**, también dada por Fidel José, sobre el Refugio y su historia, organizada por ADENEX).

A propósito de esto último, y de la relación entre el Refugio y **Extremadura**, pueden verse dos artículos en la **Circular 22** del Fondo, debidos a Ismael Sánchez Expósito (ex Presidente de **Adenex**), y a Álvaro Guerrero Mayo (Presidente de **AMUS**), respectivamente.

Entre los nuevos programas de **televisión** relativos a las hoces del Riaza, de los que puede verse una relación detallada en las Hojas Informativas, mencionaremos la nueva emisión, el jueves 9 de agosto de 2018, en el "*Canal 24 horas*" de Televisión Española, del programa de Crónicas sobre "**El Refugio**". Fue emitido varias veces en los últimos años, tanto en "*La 2*" como en el "*Canal 24 horas*" y en el "*Canal Internacional*" de Televisión Española, como se detalló en la **Hoja Informativa Nº 48** sobre el Refugio.

El Refugio o su entorno, o trabajos realizados allí, ha recibido 25 **premios**, y 18 **títulos** o figuras de protección (desde ZEPA, hasta Parque Natural); ha aparecido en 54 **congresos** científicos (18 internacionales), 17 **tesis** doctorales, distintos **proyectos** fin de carrera, varios **cursos** (incluidas las tres Jornadas sobre Buitres de la **UNED**), 1.447 **trabajos o informes** naturalistas (sin contar los de censos,

que son muchos más), 333 **conferencias**, 4.529 **publicaciones** impresas (científicas o de divulgación), 264 programas de **televisión** y 779 de **radio**, múltiples sitios de **Internet**, etc.

En las nuevas Hojas Informativas, Nº 48 y Nº 49, Fidel José actualiza la información que publicó en la **Lista de vertebrados del Refugio**. Como antes se indicó, son ya **333** las especies citadas (323 seguras y 10 dudosas): 247 especies de aves (243 + 4), 47 de mamíferos (45 + 2), 16 de reptiles (14 + 2), 12 de anfibios (11 + 1), y 11 de peces (10 + 1). Al menos 165 se han reproducido allí, y 8 más en zonas próximas [156 (+5) seguras, 8 (+2) probables, y 1 (+1) posibles], sin contar (entre las especies reproductoras) los peces (ni los datos dudosos).

Entre tantas malas noticias sobre la situación de los buitres en otros países, brilla con luz propia el increíble proyecto "***Occipitalis Station***", del que puede verse novedades en las Circulares 21 y 22 del Fondo, gracias a José Manuel Aguilera Sanz (Presidente del **FAB**, Fondo Amigos del Buitre).

A propósito de la última **excursión** del Fondo para el Refugio, a zonas cercanas de Soria y Segovia, puede verse el artículo publicado en la Circular 21 del Fondo, por Jorge Andrés Remacha Lorenzo, guía de la excursión.

Los guardas han sido esenciales para lograr el valioso apoyo de muchos habitantes de la zona, seguramente como en pocos espacios naturales; y la colaboración de cientos de naturalistas que dedicaron generosamente, a estudiar y defender estos parajes, buena parte de sus vidas, incluso con auténticos sacrificios personales. El trabajo desinteresado del gran ornitólogo suizo **Daniel Magnenat** (sin olvidar la ayuda actual de su viuda, **Marianne Delacrétaz**) es un ejemplo asombroso, y no es el único. También debe recordarse la importante labor de los **agentes medioambientales de la Junta de Castilla y León**; y del **SEPRONA**.

En 2018, Fidel José ha seguido comentado diversas cuestiones sobre la vida salvaje, con bastantes datos obtenidos por él en el Refugio durante estos 44 años, en los programas de la serie "***Respuestas de la ciencia***", de **Radio 5**, para toda España. Puede verse el texto de varios de ellos en las **Circulares 21** y **22** del Fondo.

Un artículo de Fidel José, sobre el **44 aniversario** del Refugio, fue publicado, entre otros medios, en "**El Adelantado de Segovia**" del domingo 13 de enero de 2019. Se reparte copia a los presentes. El último párrafo es el siguiente:

"*El Refugio no sólo detuvo el declive de la gran población de los buitres, conservando también su mundo. Durante 44 años, su influencia ha sido enorme. Ha inspirado otros muchos proyectos (podría poner bastantes ejemplos), y ha movido voluntades e ilusiones hasta extremos sorprendentes, a pesar de muchas dificultades. Debemos agradecerlo también a sus guardas (de WWF y la CHD), a los agentes del actual Parque Natural y del Seprona, y a muchísimas personas y entidades que trabajaron noblemente para estudiarlo y protegerlo, incluso a costa de auténticos y callados sacrificios. Deseamos que siga salvaje y hermoso, con toda su fauna y su fuerza; y que continúe sembrando esperanza.*"

Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo



Nutria en el río Riaza, en el Refugio de Rapaces. (Fotografía: Candelas Iglesias Aparicio. 21-X-2018.)

ANEXO I

Nuevos datos sobre festines observados en los comederos de buitres.

A) En el comedero de buitres del Refugio de Montejo.

Año 2018 (después de la publicación de las **Hojas Informativas Nº 48 y Nº 49**).-

Fecha	Buitre leonado	Buitre negro	Buitre blanco (alim.)	Milano real	Milano negro	Cuervo	Otros córvidos	Otras aves, o zorros	Observadores
3-4	600-700 vol. (50-100 bajan)	2 (1 ad. o subad. y 1 joven) (bajan)	2 ad. (vol.)	1 (vol.)		4 (mín.)	4 grajillas (mín.)		J. Hernando y J. J. Molina
7-4	80 ap.	2 (1 vol., 1 baja fuera)	1 ad. (vol.)			8-9	Muchas grajillas		J. Hernando, J. J. Molina y otros
16-4	++	+							J. Hernando
18-4	++								J. Hernando
30-4	**Más de 300** (de distintas edades) (+220 pos.)	4 (1 ad., 2 subad., y 1 del 2º año)	**10** (7 ad., 2 del 4º año, 1 del tercer año) (1 ad. vol.)			1	5 grajillas	1 águila calzada fase clara volando	J. Hernando y F. J. Fernández
2-5	**+++**		2 ad. (vol.)						F. J. Fernández
14-5	++		1 del tercer año ap.				Alguna grajilla		J. Hernando, y J. J. Molina
5-5	+ (vol.)	1 ad. (vol.)	8 (6 ad., 1 del tercer año cerca, 1 del 2º año) (vol.)			4 (vol.)	Más de 9 grajillas (vol.)		F. J. Fernández
7-5	++					3			J. Hernando
7-5	+ 130 vol., 18 pos.								F. J. Fernández
8-5	**++260**	4 (inc. 2 ad. y 1 joven)	6 (inc. 4 ad., 1 del 4º año, y 1 del tercer año)				Muchas grajillas, y 2 rabilargos		F. J. Fernández
9-5	**+ 178**	**9** (2 ad., 5 subad., y 2 jóv.)	5 (4 ad. y 1 del 4º año, pos. o vol.)			1-2	3 grajillas		F. J. Fernández
14-5	Ap. **500-600**	1 joven (vol.)	4 (mín.) (2 ad. ap., 1 del				12-15 grajillas		J. Hernando, y J. J. Molina

			tercer año, 1 del 2º año, pos. o no).						
27-5	5 (mín.) (1 ad., 2 subad., y 1-2 inm.)	2-3 ad. (mín.)	2 (mín.) (1 ad., 1 del 4º-5º año) (vol.)				2-3 grajillas		F. J. Fernández
30-5	++	2							J. Hernando
2-6	2 ad.	1 joven del 2º año ap.							F. J. Fernández
5-6	**Unos 600**	2 (no anillados) (1, subad.)	**11** (inc. 2 ad., 1 del 4º-5º año, 1 del tercer año, 1 del 2º-tercer año, 1 del 2º año).				10 grajillas, 1 rabilargo		J. Hernando
7-6	30 (mín.)	2 (1 ad. y 1 joven)	3 (2 ad. y 1 del 2º año)			1 (vol.)			F. J. Fernández
8-6	13 (mín.) (1, ad.)	2 (1 ad. y 1 joven)	3 (1 ad., 1 del tercer año, y 1 del 2º año muy, muy oscuro)						F. J. Fernández
14-6	++								C. Cuéllar
20-6	++		1 ad.						GREFA, con cámara aut.
21-6	+++	3 (mín.)	Mín. **9** (inc. 5 ad. [1 del 5º año ap.], 1 del 4º año, 2 del tercer año, y 1 del 2º año)			1	1 grajilla		C. Cuéllar / GREFA, con WWF
22-6	+++	4 (inc. 2 ad. y 1 joven) (mín.)	Mín. **14** (12 ad., 1 del tercer año, 1				1 grajilla		C. Cuéllar / GREFA, con WWF

			del 2º año)						
23-6	+++	2 (1 ad. y 1 joven) (mín.)	Mín. **12** (6 ad., 2 del 4º año, 2 del tercer año, 2 del 2º año)				2 grajillas y 1 rabilargo		C. Cuéllar / GREFA, con WWF
25-6	+++	+	+++						C. Cuéllar
26-6	+++	4 (mín.) (inc. 1 subad., 3 jóvenes)	Mín. 6 (5 ad., 1 del 4º año, 1 del 2º año)				1 rabilargo		C. Cuéllar / GREFA, con WWF
2-7	**300** ap.	2	**9** (1, del 2º año)						J. Hernando, R. García, D. Hernando, y acampados WWF
10-7			++						C. Cuéllar
15-7	1								F. J. Fernández
16-7	**Unos 650** (ap. 500 pos. y 150 vol.)		4 (3 ad. y 1 del tercer año)						J. Hernando, y J. Cobo
16-7	3 (1, ad.), y muchos vol.	1	4 vol. (inc. 2 ad. y 1 i/s del ¿3º?)						F. J. Fernández
19-7	2 (mín)	1	**8** (6 ad., 1 del tercer año, y 1 del 2º año)						F. J. Fernández
20-7	19 (mín.) (inc. 2 jóvenes del año) + Muchos volando	**11** (mín.) (inc. 2 ad., 2 subad., y 1 joven)	**10** (mín.) (6 ad., 2 del 4º año, 1 del tercer año, y 1 del 2º año)			**3**	3 grajillas		F. J. Fernández
23-7	**+++**								J. Hernando
31-7	**+++**		1 ad. (vol.)						J. Hernando, y J. Cobo
2-8			**33**						C. Cuéllar
11-8	**267** (mín.) (inc. 1	1 (mín.)	6 (mín.)						J. Hernando, y F. J. Fernández

	joven del año)								
12-8	**116** (mín.)	**5** (mín.) (inc. 1 ad. y 2 jóvenes)	**11** (mín.) (4 ad., 3 del 4º año, 3 del tercer año, 1 joven del año)			1 (pos. cerca)			F. J. Fernández
13-8	**165** (mín.)	1 ad.	2 (vol.) + **14** pos. cerca						J. Hernando, y F. J. Fernández
14-8	**Más de 240**	1 (vol.)	8 (vol.)						J. Hernando, y F. J. Fernández
14-8	**Más de unos 300**	1	6 (mín.) (4 ad. -2 vol.-, 1 del 4º año vol., y 1 del tercer año)			1			J. Hernando, y F. J. Fernández
20-8	**Más de 1.000** (pos., **unos 500-600**)	2	2			3			J. Hernando
20-8	**Más de unos 700** (vol.) (29 pos.)	0-1 (vol.)	2 (1 ad., 1 del 2º año)						F. J. Fernández
21-8	**Más de 400** (275 desp.)	1 (vol.)	5 (inc. 2 ad., 1 del 4º año, y 1 del 2º año) + 9 pos. cerca			2 pos. cerca			J. Hernando, J. J. Molina, C. Cuéllar, C. Palma, y F. J. Fernández
22-8	**236** (mín.)		2 (1 ad. y 1 joven)						J. Hernando, I. Hernando, E. Jorde, V. Jorde, N. de Miño, C. de Miño, y F. J. Fernández
28-8	**Unos 200**	1	6-7						J. Hernando
11-9	**+++**		**10** ad.						J. Hernando
16-9	**302** al								J. Hernando,

	menos								J. Alcalde, D. T. Argüello, F. Redondo, G. Redondo, F. J. Fernández, y dos más
18-9	+++	7 (4 al menos ad.)							J. Hernando
8-11	+++								J. Hernando, R. González, A. Lario, P. Rodríguez y J. L. Romero
12-11	**248** al menos					2 (vol.)	1 grajilla		J. Hernando, F. Jiménez, M. Gasco, y F. J. Fernández
29-11	**Más de 400**			**6**(vol.) (mín.)		**7** (vol.) (mín.)			J. Hernando, y J. Cobo

Comienzo de 2019.-

Fecha	Buitre leonado	Buitre negro	Buitre blanco (alim.)	Milano real	Milano negro	Cuervo	Otros córvidos	Otras aves, o zorros	Observadores
19 ó 21-2	++			2		+			J. Hernando
22-2	Unos 100					**Unos 30-40 o más**			J. Hernando
13-3	1 ad. come, +++ vol.								J. Hernando y F. J. Fernández
23-3	+++	2 (vol.)				3	4 grajillas (mín.)		J. Hermando y J. J. Molina
26-3	Unos **700** (pos., 400 m.)	2 (1, vol.)				2			J. Hernando, J. Cobo, M. Á. Menéndez y M. Á. Vega

B) En el comedero de buitres de Campo de San Pedro.

Año 2018 (después de la publicación, en marzo, de las **Hojas Informativas Nº 48** y **Nº 49**).-

Fecha	Buitre leonado	Buitre negro	Buitre blanco (alim.)	Milano real	Milano negro	Cuervo	Otros córvidos	Otras aves, o zorros	Observadores
10-3			1 ad.						M. López
30-3	Unos 70	8 (mín.)							J. L. Galindo
30-3									F. J. Fernández
19-6									F. J. Fernández
5-7	4 (pos. cerca)	4	2 ad.		1		1 grajilla		F. J. Fernández
5-8	Unos		2 (1 ad.)		5				J. L. Galindo

	60		(vol.)		(vol.)				
9-8	+ (vol. cerca)	3 (vol.) (mín.) (cerca)			1 (cerca)				X. Parra
13-8	33 (mín.) (vol.)	3 (mín.) (vol.)	1 ad. (mín.) (vol.)						F. J. Fernández
15-8	6 (pos. cerca)	3	3 ad.		1	**10**			F. J. Fernández
18-8			2 inm.						X. Parra
16-9	1 (pos. cerca)					**15**		1 rat. (vol. cerca)	F. J. Fernández
17-9	6, +25 pos. cerca (25-31)	6 (pos. cerca) (inc. 1 ad./subad. y 1 joven)				1	1 urraca		F. J. Fernández
10-11	18	5		5 (vol.)				1 rat. (pos.)	M. López
12-11	106 (mín.)	**10**					1 urraca		F. J. Fernández
13-11	112 (mín.)	5		3		5	3 urracas (cerca)		F. J. Fernández
15-11	30 ap.	2		+		**16**			J. Liarte y R. Ramos
8 y 9-12	+	+		+		+			M. López
23-12	12 (pos. cerca)	2 (pos. cerca)		1			1 urraca (cerca)		F. J. Fernández

Comienzo de 2019.-

Fecha	Buitre leonado	Buitre negro	Buitre blanco (alim.)	Milano real	Milano negro	Cuervo	Otros córvidos	Otras aves, o zorros	Observadores
19-2	160	**10**		**10**		**15**		3 c.b.	M. López y D. Fajardo
20-2	70	6		**14**		**26**	6 urracas	1 águila real (vol.), 2 g.r.	M. López y D. Fajardo
21-2	6					2			M. López y D. Fajardo
26-2	94	4		5		**10**	6 urracas		M. López
3-3	6		1 ad.	2		2			M. López
12-3		1 (pos. cerca)				1 (vol. cerca)			F. J. Fernández

C) En el comedero de buitres de Maderuelo. Año 2018.-

Fecha	Buitre leonado	Buitre negro	Buitre blanco (alim.)	Milano real	Milano negro	Cuervo	Otros córvidos	Otras aves, o zorros	Observadores
22-4	18 pos. cerca		1 ad. (vol.)						F. J. Fernández
30-4	++45	4		1	2	3			F. J.

		(mín.)							Fernández
19-5									F. J. Fernández
1-7	25 (vol.) (mín.)								F. J. Fernández
5-7									F. J. Fernández
14-7	13 vol. (mín.)								F. J. Fernández
16-7									F. J. Fernández
23-7	1 (vol.)		**11** (mín.) (7 ad., 1 del 4º año, 2 del tercer año, 1 del 2º año)						F. J. Fernández
3-8							3 urracas		F. J. Fernández
15-8	8 (mín.) (vol.)	4 (mín.) (vol.) (inc. 1 ad. y 1 joven)	3 (vol.) (2 ad. y 1 del tercer año)				2 urracas		F. J. Fernández
19-8	Más de 10	**Más de 10**	**Más de 20**	1					J. L. Galindo
16-9	10 (pos. cerca)	2 (1 subad. y 1 del 2º-3er año, pos. cerca).				1-3	Más de 12 grajillas		F. J. Fernández
17-9	**Más de 90**	1 (mín.)	1 ad. (vol.)						F. J. Fernández
10-11	51 (vol.)					**22**	9 grajillas		F. J. Fernández
10-11				3					J. Aguilera, I. Jara, Y. Pando, y Á. Canales
13-11	1 (vol.)								F. J. Fernández
23-12	4 (cerca)								F. J. Fernández

Comienzo de 2019.-

Fecha	Buitre leonado	Buitre negro	Buitre blanco (alim.)	Milano real	Milano negro	Cuervo	Otros córvidos	Otras aves, o zorros	Observadores
14-3	19 pos. cerca, ++ vol.			2		6 (mín.)	1 urraca		F. J. Fernández

D) En el comedero de buitres de Ayllón. Año 2018.-

Fecha	Buitre leonado	Buitre negro	Buitre blanco (alim.)	Milano real	Milano negro	Cuervo	Otros córvidos	Otras aves, o zorros	Observadores
14-4			2 ad. pos. cerca						F. J. Fernández
22-4	28 pos. cerca								F. J. Fernández
4-5 ap.	500 (mín.)								F. Martín
19-5			**7** pos. cerca (1 del 2º año y 1 del tercero)				10 grajillas		F. J. Fernández
18-6	**139** (mín.)	3 (mín.)	1-2 vol. (1, del 4º-5º año)						F. J. Fernández
1-7	25 (mín.)	**6** (inc. 1 ad. y 1 joven)	1ad.						F. J. Fernández
12-7 ap.	10	**8**							M. Iglesias
25-7	++	**6-8**	3 (mín.) (pos. en árbol)						M. Iglesias
3-8	58 (mín.) (cerca)		1 del 4º-5º año (pos. cerca)	1	2-3 (mín.)			[1 aguilucho lagunero joven vol. cerca]	F. J. Fernández
4-8	**400** (ap.)	3							J. M. Martín
7-8	**500** (ap.)								V. Sanz
14-8	++	+							M. Iglesias
15-8				1 (vol. cerca)					F. J. Fernández
29-8	**Más de 600 ap.**	**9**	2 (pos. cerca)						M. Iglesias
15-9	4 pos. cerca								F. J. Fernández
17-9	**Más de 356**	**15**		1 (vol.)			1 corneja y 2 urracas		F. J. Fernández
13-11	5 (cerca)						4 urracas (cerca)		F. J. Fernández

E) En el comedero de buitres de Fresno de Cantespino. Año 2018.-

Fecha	Buitre leonado	Buitre negro	Buitre blanco (alim.)	Milano real	Milano negro	Cuervo	Otros córvidos	Otras aves, o zorros	Observadores
19-6	1 (vol.)	1 ad. (cerca)	1 del tercer año (cerca)						F. J. Fernández
13-8									F. J. Fernández
17-9	**98** (mín.) (inc. pos. cerca)			1 (vol. cerca)		**6** (inc. pos. cerca)			F. J. Fernández
13-11	1 (vol.)			1 (vol.)		3			F. J. Fernández

F) En el comedero de buitres de Caleruega (Burgos). 2ª parte de 2018 y comienzos de 2019.-

Fecha	Buitre leonado	Buitre negro	Buitre blanco (alim.)	Milano real	Milano negro	Cuervo	Otros córvidos	Otras aves, o zorros	Observadores
3-VIII-2018	++105-115 (mín. 1 joven del año)	3-4 (mín.)	2-3 ad. (mín.)					2 c.b. (1 vol., 1 pos. sobre el observatorio que luego parece ir al comedero)	F. J. Fernández
11-VIII-2018	+++								C. Iglesias (Abubilla Ecoturismo)
20-X-2018		1 joven							I. San José
3-I-2019				1 (mín.)		2 (mín.)			C. Iglesias (Abubilla)
9-III-2019		2							J. I. Delgado

G) En el comedero de buitres de Huerta de Rey (Burgos). Año 2018.-

Fecha	Buitre leonado	Buitre negro	Buitre blanco (alim.)	Milano real	Milano negro	Cuervo	Otros córvidos	Otras aves, o zorros	Observadores
3-VIII	2 (1 es ad.) (+ 19 pos. en roquedo cerca)					1 oído	1 urraca		F. J. Fernández

H) En el comedero de buitres de Arauzo de Miel (Burgos). Año 2018.-

Fecha	Buitre leonado	Buitre negro	Buitre blanco (alim.)	Milano real	Milano negro	Cuervo	Otros córvidos	Otras aves, o zorros	Observadores
3-VIII									F. J. Fernández

Otras aves.- c.b.- Cigüeña blanca. / g.r.- Garza real. / rat.- Ratonero.

Observadores.-
Á. Canales.- Ángel Canales Luna.
A. Lario.- Alfonso Lario Doylataguerra.
C. Cuéllar.- Carlos Cuéllar Basterrechea.
C. de Miño.- Celia de Miño Hernando.
C. Iglesias.- Candelas Iglesias Aparicio, de Abubilla Ecoturismo.
C. Palma.- Carlos Palma Barcenilla.
D. Fajardo.- David Fajardo Orellana.
D. Hernando.- David Hernando Tomé.
D. T. Argüello.- Diana Teresa Argüello Díaz.
E. Jorde.- Eric Jorde Hernando.
F. J. Fernández.- Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.
F. Jiménez.- Fernando Jiménez Raigón.
F. Martín.- Francisco Martín Arranz.
F. Redondo.- Félix Redondo Ramírez.
G. Redondo.- Gabriel Redondo Jáuregui.
I. Hernando.- Isabel Hernando García.
I. Jara.- Irene Jara Escobosa.
I. San José.- Inmaculada San José Negro.
J. Aguilera.- José Aguilera Díez.
J. Alcalde.- Javier Alcalde Cuña.
J. Cobo.- Jesús Cobo Anula.
J. Hernando.- Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio.
J. I. Delgado.- José Ignacio Delgado Palacios.
J. J. Molina.- Juan José Molina Pérez.
J. L. Galindo.- Juan Luis Galindo Estévez.
J. Liarte.- José Liarte de Blas.
J. L. Romero.- José Luis Romero Carayol.
J. M. Martín.- Juan Manuel Martín Yagüe.
J. Reyes.- Joel Reyes Núñez.
J. J. Molina.- Juan José Molina Pérez.
M. Á. Menéndez.- Miguel Ángel Menéndez García.
M. Á. Vega.- Miguel Ángel de la Vega Muñoz.
M. Gasco.- Mar Gasco González.
M. Iglesias.- Mauricio Iglesias Sanz.
M. López.- Manuel López Lázaro.
N. de Miño.- Nora de Miño Hernando.
P. Rodríguez.- Pedro Rodríguez Panizo.
R. García.- Rafael García Fernández.
R. González.- Raúl González Rodríguez.
R. Ramos.- Ricardo Ramos Sásnchez.
V. Jorde.- Vera Jorde Hernando.
V. Sanz.- Víctor Sanz Hernando.
X. Parra.- Xavier Parra Cuenca.
Y. Pando.- Yolanda Pando Díaz.

ANEXO II

Nuevos datos sobre anillas leídas de buitres leonados.

(Corresponde al apartado D, "*Nuevos datos sobre anillamientos*", del capítulo sobre el buitre leonado).

Véanse las **Hojas Informativas Nº 32** (Anexo III, págs. 283-318), **Nº 33** (Anexo III, págs. 401-426), **Nº 34** (págs. 347-405), **Nº 35** (págs. 455-469), **Nº 36** (págs. 252-265), **Nº 38** (págs. 285-297), **Nº 40** (págs. 358-379), **Nº 42** (págs. 157-169), **Nº 44** (págs. 140-158), **Nº 46** (págs. 147-156), y **Nº 48** (págs. 152-161).

Los datos posteriores a los allí indicados se reseñan a continuación.

Los anilladores fueron los siguientes:

Anilladores en las hoces del Riaza.-

Años 1990 a 2001.- Grupo Doval – Martínez y colaboradores.
Años 2004 a 2008, 2010, 2011, 2013, y 2015 a 2017.- Félix Martínez, Guillermo Blanco, Óscar Frías, y colaboradores (Grupo de Anillamiento "*Pyrrhocorax*").
Año 2007 (73_).- C.R.A.S. "Los Guindales" (Burgos).
Año 2008 (74_, 75_), y 2009.- Guardería o técnicos de la Junta de Castilla y León.
Año 2012.- C.R.A.S. "Los Lavaderos" (Segovia).

Anilladores en otras zonas.- Se indican en las **Hojas Informativas Nº 40** (páginas 437-456), **Nº 42** (págs. 158-159), **Nº 44** (páginas 144-148), y **Nº 46** (pág. 148). (Los buitres anillados en otras zonas se señalan en negrita).

--- Sobre los buitres leonados anillados en los últimos años, en el Refugio o en su entorno, véanse los datos aparecidos en las **Hojas Informativas** antes citadas. El total de buitres leonados anillados allí en estos 43 años, según los datos que conocemos, asciende a 770, incluyendo 18 en el Centro de Recuperación de Animales Salvajes de Burgos y uno en el de Segovia, y sin contar alguno más en zonas próximas.

(En España se habían anillado, hasta 2010 inclusive, 9.198 buitres leonados, según el "*Análisis Preliminar del Banco de Datos de Anillamiento de Aves del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente para la realización de un Atlas de migración de aves en España*", amablemente proporcionado por Francisco Javier Ortega Pinilla).

También se han seguido anillando otras muchas aves, incluyendo alimoches y otras rapaces (véase lo anotado en los capítulos correspondientes), así como bastantes paseriformes.

El total de aves anilladas en las hoces del Riaza, durante los 44 años de la historia del Refugio, es de al menos 4.668, de **96** especies distintas, según los datos que conocemos; y sin contar varios cientos de aves anilladas (y al menos tres especies más) en zonas cercanas del nordeste de Segovia.

Nota.- Benigno Varillas Suárez, en su libro "**La estirpe de los libres. Altamira, Atapuerca, Olduvai, Homo sylvestris. De Darwin a Félix Rodríguez de la Fuente**" (ed. del autor, 2018, 522 pp., págs. 74-75), se refiere al caso de un buitre que relatamos también, con algunos detalles a continuación.

--- El 29 de agosto de 1992, un buitre leonado, sin fuerzas para volar, fue cogido en el castillo de Arcos de la Frontera (Cádiz), propiedad de los marqueses de Tamarón, quienes pensaron en el Refugio de Montejo (que propuso y divulgó Félix Rodríguez de la Fuente) y comunicaron con Fidel José Fernández y Fernández-Arrroyo; el cual llamó a Chelo Atencia Páez y Saturnino Moreno Borrell, quienes recuperaron al buitre en el centro de "El Boticario" (Málaga) y lo liberaron, el 28 de diciembre de 1992, en El Chorro (Málaga), con la anilla amarilla **04U**.

--- El 3 de abril de 1996, a las 9 h. 39 m., Félix Martínez Olivas observó a este buitre, con la anilla **04U**, en el final de la margen izquierda del 2º Cañón, en las hoces del Riaza.

--- El 1 de julio de 1996, entre las 15 h. 30 m. y las 16 h. 40 m., Félix Martínez Olivas observó un festín con unos 120 buitres leonados, sobre una oveja muerta, en el comedero del Refugio de Rapaces de

Montejo; y uno de los buitres era éste, con la anilla 04U. [La oveja muerta fue aportada por Fermín Rodríguez Hervás, de Villalba de Duero –Burgos-].

Año 2018, y comienzo de 2019.-

--- Miércoles 31 de enero de 2018. La Catedral (Solteros Derecha, S.D.). José Luis López-Pozuelo García y Antonio Ruiz Heredia observan, poco antes de las 14 h., cerca del nido Nº 18, dos buitres leonados anillados.-

2005.- 4AA. / 2006.- 706. /

--- Martes 13 de febrero de 2018. De acuerdo con la información publicada, por Rufino Fernández González, en www.avesdeburgos.com (en el **Informe 67**, del primer trimestre de 2018, del Anuario Ornitológico de la Provincia de Burgos; y en su "**Hoja Informativa sobre la avifauna en el sureste de Burgos**", Nº 1, de agosto de 2018, pág. 17, con una fotografía), este día, en la dehesa de Costana (Salas de los Infantes, Burgos, cuadrícula VM75), tras una fuerte nevada, los agentes medioambientales recuperaron el cadáver de un buitre leonado con la anilla metálica 1111763 ESI. Este buitre había sido anillado de pollo, el 19 de mayo de 2013, con la anilla amarilla MHF, en el nido Nº 110 del en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda), por el Grupo Pyrrhocorax.
(Este mismo buitre fue visto, en el comedero de Maderuelo, el 8-9-2013, por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo; véase la **Hoja Informativa Nº 40**, pág. 370).

--- Viernes 16 de febrero de 2018. Peñalba 1ª. Jesús Cobo Anula y Jesús Hernando Iglesias, biólogo conservador y guarda (respectivamente) de WWF España en el Refugio, observan, a las 16 h. 42 m., un buitre leonado, con las alas desplegadas al Sol, que tiene, en el ala derecha, la banda amarilla **YA6** (o **YA5**), leída de arriba abajo; y en el ala izquierda, una banda negra (arriba) y blanca (debajo).

YA6 (o **YA5**).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores en la zona. /

--- Domingo 4 de marzo de 2018. Término de Moral de Hornuez. Yolanda de la Cruz Rubio fotografía un buitre leonado adulto que tiene, en la pata izquierda, la anilla amarilla **PAM** (se lee de abajo arriba); y tiene anilla de metal en la pata derecha.

2013.- PAM. /

--- Viernes 9 de marzo de 2018. Peñalba 2ª. Jesús Cobo Anula, biólogo conservador de WWF España en el Refugio, observa, a las 8 h. 47 m., en una cueva central de la pared, un buitre joven que tiene, en el ala derecha, la banda amarilla **YC9**, leída de arriba abajo. "*Es desplazado por otro buitre y se va volando bajo hasta el extremo de Peñalba 1ª*".

YC9.- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. /

--- Mismo día, viernes 9 de marzo de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo, Jesús Hernando Iglesias [guarda de WWF España], Joel Reyes Núñez, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, observan, entre las 18 h. 35 m. y las 19 h. 5 m. ap., un festín con bastantes buitres leonados (incluyendo adultos, y algún joven); y registran cuatro o cinco buitres anillados.-

2007.- 73X, ¿6XX? / 2008.- 74W. / 2013.- PCH, PCJ. /

--- Sábado 10 de marzo de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo, entre las 13 h. 40 m. y las 14 h. 6 m., un festín con más de 130 buitres leonados, un buitre negro (en Jesús Hernando Iglesias [guarda de WWF España], Joel Reyes Núñez, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, observan, vuelo), un buitre blanco o alimoche (en vuelo), al menos cuatro cuervos, y como mínimo tres grajilas; y registran cinco buitres leonados anillados.-

1997.- 12M. / 2013.- MH5, PAV, **Y78** (banda alar). / 2015.- **YC1** (banda alar). /

--- Lunes 12 de marzo de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, observa y fotografía un festín de buitres leonados; y registra (y fotografía) tres buitres leonados anillados o marcados.-

YA6 (banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí. /
YC2 (banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. /
Y un buitre con anilla amarilla en la pata derecha, y anilla de metal en la pata izquierda.

--- Miércoles 14 de marzo de 2018. Comedero de buitres de Ayllón. Víctor Sanz Hernando observa, en torno a las 12 h. 45 m., un festín con más de 100 buitres leonados, y 3 alimoches adultos; y registra tres buitres leonados anillados.-

2013.- **Y52** (banda alar) /
Y57 (banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. /
YC7 (banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. /

--- Martes 3 de abril de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, y Juan José Molina Pérez, observan y fotografían un festín con unos 600-700 buitres leonados (de los que unos 50-100 bajan), dos buitres negros (un adulto y un joven, que bajan), dos alimoches adultos (volando), un milano real (volando), al menos cuatro cuervos, y al menos cuatro grajillas; y registras dos buitres leonados anillados o marcados.-

2013.- **Y74** (banda alar). / 2014.- **YA7** (banda alar). /

--- Miércoles 18 de abril de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, observa un festín de buitres leonados; y fotografía un buitre leonado con anilla de metal en la pata izquierda, sin anilla amarilla.

--- Sábado 21 de abril de 2018. Peñalba. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 14 h. 38 m., en el nido Nº 21 de Peñalba (con pollo), un buitre adulto con anilla amarilla en la anilla derecha, y anilla de metal en la pata izquierda (luego, en el mismo nido hay otro buitre adulto, no anillado); y entre las 16 h. 50 m. y después de las 17 h. 10 m., en lo alto de la primera parte de la peña, un buitre leonado inmaduro con anilla amarilla en la pata derecha (se lee de abajo arriba, y comienza por **8**), sin anilla de metal.

--- Miércoles 25 de abril de 2018. La Catedral (S.D.). José Luis López-Pozuelo García observa, en el nido Nº 28 (nido reconstruido de forma muy elemental), dos buitres adultos, que se comportan como si atendieran a un pollo muy pequeño (no visto); uno de estos buitres lleva una anilla amarilla en la pata izquierda.

--- Lunes 30 de abril de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, observan, entre las 16 h. 48 m. y las 18 h. 56 m., más de 300 buitres leonados (incluyendo más de 220 posados, de distintas edades), cuatro buitres negros (un adulto, dos subadultos, y uno del segundo año), 10 alimoches (7 adultos, dos del 4º año, y uno del tercer año), un cuervo, cinco grajillas, y (volando) un águila calzada de fase clara. Distinguieron cinco buitres leonados anillados.-

2013.- PAL (la anilla amarilla se lee de abajo arriba), **Y83** (con banda naranja en ambas alas). /
746 (con anillas amarilla y de metal).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí.
YA9 (con banda naranja en el ala derecha, y con anilla amarilla).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí.
Y84 (con banda naranja en ambas alas).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí.

--- Martes 1 de mayo de 2018. Barranco de Valdecasuar, margen izquierda. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, entre las 19 h. 15 m. y las 19 h. 57 m. al menos, a la derecha y fuera del nido Nº 14, un buitre leonado adulto con la anilla amarilla **PAV** (se lee de abajo arriba) en la pata derecha, y con anilla de metal en la pata izquierda; y a las 19 h. 57 m., junto al nido Nº 52, un buitre leonado con anilla amarilla en la pata derecha.

2013.- PAV. /

--- Miércoles 2 de mayo de 2018. Barranco de Valdecasuar, margen izquierda. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 14 h. 20 m., en el nido Nº 52 (con pollo), el relevo de dos buitres leonados adultos, de los cuales uno (el que estaba en el nido, y se va), que parece viejo, tiene anillas amarilla (en la pata derecha) y de metal, mientras el otro (el recién llegado) no tiene anillas; y a las 15 h. 59 m. ap., en el Grupo I, un buitre leonado adulto con anilla amarilla.

--- Viernes 4 de mayo de 2018 ap. Comedero de buitres de Ayllón. Francisco Martín Arranz observa un festín con al menos 500 buitres leonados, y observa tres buitres leonados con banda alar.

--- Domingo 6 de mayo de 2018. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 20 h. 28 m., no lejos del nido Nº 26 del barranco de Valdecasuar (margen derecha), un buitre leonado adulto con anilla de metal en la pata izquierda; y a las 20 h. 37 m. (y antes, y después), en el nido Nº 19 de Peña Fueros (con pollo, de unos 50 días), un buitre leonado adulto con la anilla amarilla **240** (se lee de abajo arriba) en la pata izquierda, y con anilla de metal.

2000.- 240. /

--- Lunes 7 de mayo de 2018. Barranco de Valdecasuar, margen derecha. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 11 h. 56 m., cerca del nido Nº 26, un buitre leonado adulto con la anilla amarilla **PF-** (sólo se leen las dos primeras letras) en la pata izquierda, y con anilla de metal, que echa a volar; y a las 12 h. 41 m., en el nido Nº 27, junto al pollo, un buitre leonado adulto con anilla de metal en la pata izquierda, sin anilla amarilla.

2013.- PF-. /

--- Miércoles 9 de mayo de 2018. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, en el comedero de buitres del Refugio de Montejo, a las 10 h. 10 m., un buitre leonado con banda alar (y antes, un buitre leonado con anilla amarilla); a las 13 h. 10 m., dos buitres leonados con banda alar, **YC9** (en ambas alas; la banda es naranja, y se lee de arriba abajo) y **PX8** (en el ala izquierda, al menos; se lee de arriba abajo); a las 15 h. 16 m., en el nido Nº 6 de Peña Fueros (con pollo), dos buitres leonados adultos, uno de los cuales tiene anilla de metal en la pata izquierda, y no tiene anilla amarilla, mientras que el otro adulto no está anillado; y a las 16 h. 11 m., en el nido Nº10 de Peña Fueros (con pollo), un buitre leonado con anillas amarilla (en la pata izquierda) y de metal.

YC9.- Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto anteriormente en la zona. /
PX8.- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. /

--- Sábado 12 de mayo de 2018. Peña Rubia. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 12 h. 44 m., cerca del nido Nº 11, un buitre leonado adulto con anilla amarilla.

--- Mismo día, sábado 12 de mayo de 2018. Miembros de GREFA fotografían, en el Punto de Alimentación Suplementaria de Huerta de Arriba (Burgos), dentro del Proyecto Monachus, un buitre leonado con la anilla amarilla **MH5** (se lee de abajo arriba) en la pata izquierda.

2013.- MH5. /

--- Lunes 14 de mayo de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, y Juan José Molina Pérez, vicepresidente del Fondo para el Refugio, observan un festín de buitres leonados, al que acude también un alimoche del tercer año ap.; y registran un buitre leonado anillado.

2013.- PF5 (fot.; la anilla amarilla, en la pata derecha, se lee de abajo arriba).

--- Lunes 21 de mayo de 2018. Peña Rubia. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 10 h. 4 m., en el nido Nº 18 (con pollo), un buitre leonado adulto con anilla amarilla (en la pata derecha), y con anilla de metal.

--- Martes 22 de mayo de 2018. Presa Después Izquierda (P.D.I.) o Peña Inclinada (P.I.). Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 14 h. 0 m., en el nido Nº 1 (con pollo), un buitre leonado adulto con la anilla amarilla **73¿A?** (se lee de abajo arriba) en la pata derecha, que sigue cerca a las 19 h. 53 m.; y a las 15 h. 12 m., en el nido Nº 8 (sin pollo), un buitre leonado subadulto con anilla de metal en la pata derecha, sin anilla amarilla, y un buitre leonado adulto.

--- Miércoles 23 de mayo de 2018. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 9 h. 41 m., en la cueva del nido Nº 18 (sin pollo) de Los Poyales (S.I.), un buitre leonado adulto con anillas amarilla (antigua, en la pata izquierda) y de metal, que sigue allí a las 11 h. 22 m. (con otro buitre adulto, cerca del nido Nº 27 –sin pollo-); y a las 13 h. 29 m., en el pilón central de V.A.D., un buitre con una banda alar en el ala izquierda, que se ve invertida.

--- Jueves 24 de mayo de 2018. Los Poyales (S.I.). Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 14 h. 58 m., en el nido Nº 20 (sin pollo), dos buitres leonados adultos, uno no anillado y el otro con anilla de metal en la pata derecha (sin anilla amarilla); y a las 16 h. 6 m., en el nido Nº 9 (sin pollo), dos buitres leonados subadultos, uno de los cuales tiene anilla de metal en la pata derecha (no tiene anilla amarilla), y el otro tiene la pata derecha no anillada.

--- Sábado 26 de mayo de 2018. Las Torcas. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 20 h. 39 m., un buitre leonado adulto con nanilla de metal en la pata izquierda, sin anilla amarilla.

--- Domingo 27 de mayo de 2018. Las Torcas. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, entre las 15 h. 31 m. y las 17 h. 2 m., hasta 35 buitres leonados posados en lo alto de la peña (en la zona de la "Cabeza del Cocodrilo"), cuatro de los cuales tienen banda alar: un inmaduro o subadulto con la banda alar amarilla **YC9** (se lee de arriba abajo) en el ala derecha; un adulto con la banda alar amarilla **YA6** (se lee de arriba abajo) en ambas alas; un adulto con la banda alar naranja **Y57** (se lee de arriba abajo) en el ala derecha; y un cuarto buitre con banda alar, de la que sólo veo el reverso (dos cuadrados, uno blanco y otro negro, como en otras bandas alares).

YA6 (con banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto anteriormente en la zona.
YC9 (con banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto anteriormente en la zona.
Y57 (con banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto anteriormente en la zona.

--- Martes 5 de junio de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, observa, entre las 17 h. 30 m. y las 19 h. 30 m. ap., un festín con unos 600 buitres leonados, dos buitres negros (no anillados), al menos 11 alimoches (incluyendo dos adultos que parecen machos, uno del cuarto o quinto año, uno del tercer o cuarto año posiblemente macho, uno del tercer año, uno del segundo o tercer año, y uno del segundo año), 10 grajillas, y un rabilargo. Registra 3 buitres leonados anillados.-

2013.- PCJ. /
YA9 (con banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí.
YF2 (con banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí.

--- Jueves 7 de junio de 2018. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, entre las 14 h. 32 m. y las 14 h. 40 m., en el nido Nº 113 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda, Grupo I), un buitre leonado adulto que ceba al pollo y que parece tener anillas amarilla (en la pata izquierda) y de metal; y a las 18 h. 8 m., en el comedero de buitres del Refugio, un buitre leonado con banda alar en el ala izquierda, de la que se ve el reverso.

--- Viernes 8 de junio de 2018. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 20 h. 58 m., en el nido Nº 62 (sin pollo) del barranco de Valdecasuar, un buitre leonado adulto con anilla amarilla en el ala dereha.

--- Martes 12 de junio de 2018. Buitrera de Langa de Duero (provincia de Soria, cuadrícula VM60). Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 10 h. 30 m. (y antes, y después), en el nido Nº 4 (con pollo), un buitre leonado (adulto no viejo) con la anilla amarilla **750** (se lee de abajo arriba, en la pata izquierda), y con anilla de metal.

2008.- 750. /

--- Jueves 14 de junio de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Carlos Cuéllar Basterrechea, de GREFA, registra dos buitres leonados anillados.-

2013.- PAL. /
95V.- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí.

--- Lunes 25 de junio de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Carlos Cuéllar Basterrechea, de GREFA, registra nueve buitres leonados anillados, además de un buitre negro y tres alimoches también anillados.-

2000.- 244. /
2013.- PC5, **Y74** (banda alar), **Y95** (banda alar). /
JTJ.- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. /
YC9 (banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí.
474 (banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. /
T3N (banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. /
YAB (banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. /

--- Jueves 12 de julio de 2018 ap. Comedero de buitres de Ayllón. Mauricio Iglesias Sanz observa un festín con 10 buitres leonados, y ocho buitres negros; y registra cuatro buitres leonados marcados.-

2013.- **Y74**. /
YF2 (con banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores en el Refugio.
Y61 (con banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí.
Y un buitre con una tarjeta blanca con lazo amarillo, o algo similar, con un **¿8?**.

--- Domingo 15 de julio de 2018. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 11 h. 5 m., en el nido de buitres Nº 19 de Peña Fueros (con éxito en la cría este año, aunque ahora no está el pollo, un buitre leonado con la anilla amarilla **240** (se lee de abajo arriba) en la pata derecha, y con anilla de metal en la pata izquierda; y a las 16 h. 29 m., en el nido Nº 120 del barranco de Valdecasuar (margen derecha, en el Circo), con pollo que aún no vuela, un buitre leonado adulto con la anilla amarilla **PHH** (se lee de abajo arriba) en la pata derecha, y con anilla de metal.

2000.- 240. / 2015.- PHH. /

--- Lunes 16 de julio de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias y Jesús Cobo Anula, guarda y biólogo conservador de WWF en el Refugio respectivamente, observan, entre las 16 h. 15 m. y las 16 h. 55 m., un festín con unos 650 buitres leonados (ap. 500 posados en el comedero y otros 150 volando sobre el mismo), y cuatro alimoches (tres adultos y un joven del tercer año). Registran dos buitres leonados marcados.-

95V.- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí.
YL4 (con banda alar; fot.).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí.

--- Mismo día, lunes 16 de julio de 2018. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 8 h. 38 m., en lo alto de Peñalba (2ª parte), cerca de dos buitres negros posados, un buitre leonado con la anilla amarilla **781** (se lee de abajo arriba) en la pata derecha, y con anilla de metal en la otra parta; a las 8 h. 58 m., el mismo buitre con anilla **781** está en el nido Nº 21, donde ceba (o parece cebar) al pollo; a las 9 h. 0 m., el buitre adulto anillado ya no está en el nido Nº 21, donde hay un buitre adulto no anillado que pica al pollo en el dorso; a las 9 h. 31 m., en el nido Nº 21, está de nuevo el buitre adulto con anilla amarilla en la pata derecha, y sigue allí a las 10 h. 1 m.

2011.- 781. /

--- Jueves 19 de julio de 2018. Los Poyales. Candelas Iglesias Aparicio (de Abubilla Ecoturismo), Xavier Martín Vilar (Birding), y seis estadounidenses, observan y fotografían un buitre leonado con anilla amarilla en la pata derecha.

--- Viernes 20 de julio de 2018. Peña Fueros. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 13 h. 29 m., junto al nido Nº 18 (con pollo), un buitre leonado adulto con anilla amarilla en la pata izquierda (que termina en **A**), con anilla de metal en la otra pata; y a las 14 h. 46 m., en el nido Nº 10 (con pollo este año, que ahora no está), dos buitres leonados adultos, uno de los cuales tiene anilla amarilla en la pata derecha y anilla de metal en la otra pata.

--- Miércoles 25 de julio de 2018. Comedero de buitres de Ayllón. Mauricio Iglesias Sanz observa un festín de buitres leonados, con 6-8 buitres negros, y al menos tres alimoches posados en un árbol cercano; y registra un buitre leonado marcado.-

YA8 ó **YA9**.- Ignoramos el origen de este buitre. Del YA9 teníamos noticias anteriores en el Refugio.

--- Viernes 27 de julio de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, encuentra, a las 21 h. 0 m., en el suelo del comedero, la anilla metálica **1101855**. Se la entrega el día 30 a Jesús Cobo Anula, biólogo conservador del Refugio, de WWF.

1998.- 1101855 (1W6). /

--- Martes 31 de julio de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias y Jesús Cobo Anula, guarda y biólogo conservador de WWF en el Refugio respectivamente, observan un festín de buitres leonados, con un alimoche adulto volando; y registran un buitre leonado anillado.-

2013.- PCJ (fot.). /

--- Martes 7 de agosto de 2018. Comedero de buitres de Ayllón. Víctor Sanz Hernando observa un festín con unos 500 buitres leonados; y registra tres buitres leonados marcados.-

2013.- **Y52** (con banda alar). /
YCT (con banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí.
Y91 (con banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí.

--- Viernes 10 de agosto de 2018. Las Torres. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, entre las 18 h. 36 m. y las 17 h. 13 m. al menos, en el nido Nº 4 (con pollo, que aún no vuela), hasta tres buitres leonados adultos, uno de los cuales (que puede no ser del nido) tiene la anilla amarilla **PF7** (se lee de abajo arriba) en la pata derecha, y tiene anilla de metal en la pata izquierda. A las 17 h. 18 m., el buitre anillado ya no está; hay un buitre adulto no anillado que ceba al pollo, junto a otro buitre adulto no anillado.

2013.- PF7. /

--- Sábado 11 de agosto de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observan un festín con al menos 267 buitres leonados, 6 alimoches o buitres blancos, y un buitre negro; y registran tres buitres leonados anillados.-

2008.- 751, 75M. / 2013.- **Y59** (con banda alar). /

--- Mismo día, sábado 11 de agosto de 2018. Comedero de buitres de Caleruega. Candelas Iglesias Aparicio y otros, durante la ruta guiada de naturaleza "*Trashumancia, lobos y buitres*", de Abubilla Ecoturismo, registran y fotografían un buitre leonado con la marca **U5** en el ala derecha (código blanco sobre una banda verde), procedente de Portugal según averiguó Álvaro Camiña Cardenal. Pueden verse más datos sobre el tema en el Facebook de "*Montejanos*".
(Según la información publicada en www.avesdeburgos.com, este buitre, con marcas alares verdes y código blanco **U5**, anillado en Portugal, fue visto, por Javier Otal, en El Bardal, en el muladar de Mecerreyes [Burgos, cuadrícula VM56], el mismo día 11-8-18.)

--- Domingo 12 de agosto de 2018. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, entre las 8 h. 12 m. y las 8 h. 15 m., en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda, Grupo I, a la izquierda del nido Nº 15), un buitre leonado adulto con la anilla amarilla **77F** (se lee de abajo arriba) en la pata derecha, con anilla de metal en la pata izquierda; y junto a él, un buitre leonado adulto con sólo anilla de metal en la

pata izquierda; y a las 17 h. 0 m., en el nido Nº 18 de Peña Fueros (con éxito en la cría este año),), un buitre leonado adulto con anilla amarilla en la pata izquierda y con anilla de metal en la otra pata, como el anotado allí el 20 de julio.

2010.- 77F. /

--- Lunes 13 de agosto de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observan un festín con al menos 165 buitres leonados, 2 alimoches volando (y 14 posados cerca), y un buitre negro; y registran cuatro buitres leonados anillados.-

1998.- PCM. / 2008.- 751. /
YA6 (con banda en ala izquierda, rota –sólo esbozo- en el ala derecha).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí.
--- Y un buitre con anilla amarilla no leída.

--- Martes 14 de agosto de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observan un festín con más de 240 buitres leonados, al menos 8 alimoches volando, y un buitre negro volando; y registran seis buitres leonados anillados.-

2007.- 73J. / 2008.- 75C. / 2015.- PHL. /
902 (o **90L**).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí.
YC9 (con banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí.
--- Y un buitre con sólo anilla de metal en la pata izquierda.

--- Mismo día, martes 14 de agosto de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observan un festín con más de unos 300 buitres leonados, al menos 6 alimoches (incluyendo 4 adultos, de los que dos bajan, uno del cuarto año volando, y un inmaduro anillado del tercer año que baja), al menos un buitre negro (que baja), y un cuervo (que baja); y registran un buitre leonado anillado.-

--- Un buitre leonado con banda en el ala derecha.

--- Martes 21 de agosto de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias (guarda de WWF España en el Refugio), Juan José Molina Pérez, Carlos Cuéllar Basterrechea, Carlos Palma Barcenilla, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, observan un festín con más de unos 400 buitres leonados (después, al menos 275), al menos 5 alimoches (incluyendo 2 adultos, 1 del 4º año, y 1 del 2º año) (y 9 posados cerca), un buitre negro (en vuelo), y dos cuervos posados cerca; y registran tres buitres leonados anillados.-

2008.- 750. /
P¿EF?.- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí.
WJJ (banda en ambas alas).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí.

--- Miércoles 22 de agosto de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias (guarda de WWF España en el Refugio), Isabel Hernando García, Eric y Vera Jorde Hernando, Nora y Celia de Miño Hernando, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, observan un festín con al menos 236 buitres leonados (alguno es joven del año), y dos alimoches volando (un adulto y un joven); y registran siete buitres leonados anillados.-

1998.- PCM. / 2008.- 740. / 2013.- PAU, PC5, PCA. /
--- Un buitre leonado con anilla de metal en la pata izquierda, sin anilla amarilla.
--- Y un buitre leonado con banda alar.

--- Miércoles 29 de agosto de 2018. Comedero de buitres de Ayllón. Mauricio Iglesias Sanz observa un festín con más de unos 600 buitres leonados, 9 buitres negros, 2 alimoches (éstos, posados cerca), y otras rapaces; y registra tres buitres leonados marcados.-

2013.- **Y52** (con banda alar), **Y59** (con banda alar). /

Y un tercer buitre con banda alar que no pudo ser leída.

--- Domingo 16 de septiembre de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias (guarda de WWF España en el Refugio), Javier Alcalde Cuña, Diana Teresa Argüello Díaz, Fermín Redondo Ramírez, Gabril Redondo Jáuregui, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, y dos más, observan un festín con al menos 302 buitres leonados; y registran 10 buitres leonados anillados o marcados.-

1998.- PCM. / 2007.- 73A. / 2008.- 750, 759. / 2013.- MH5, PFF, **Y69** (con banda alar). / 2014.- **YA3**. /
2016.- RRX. /
YF2.- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí. /

--- Miércoles 10 de octubre de 2018. Peña Portillo. Durante una ruta guiada de naturaleza de Abubilla Ecoturismo, Candelas Iglesias Aparicio fotografía un buitre leonado adulto con la anilla amarilla **780** en la pata derecha, y con anilla de metal.

780.- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí.

--- Jueves 8 de noviembre de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias (guarda de WWF España en el Refugio), Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra, Pedro Rodríguez Panizo, y José Luis Romero Carayol, observan un festín de buitres leonados; y registran 8 buitres leonados anillados o marcados.-

2009.- FA3. / 2010.- 77F (fot.). / 2011.- 781, 785 (fot.). / 2013.- **Y87** (banda alar; fot.). /
2014.- **YA3** (banda alar; fot.). /
E97 (fot.).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. /
F9T.- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí. /

--- Sábado 10 de noviembre de 2018. Los Poyales. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, en M-1, a las 17 h. 51 m., un buitre leonado con banda alar amarilla, que dormirá allí.

--- Mismo día, sábado 10 de noviembre de 2018. V.A.D. Juan Prieto Martín y Alejandro Quecedo del Val observan, hacia las 17 h., un buitre leonado adulto con la marca alar naranja ¿**7**?**F2**, y con anilla de metal en la pata izquierda.

--- Mismo día, sábado 10 de noviembre de 2018. Peña Portillo 1ª. Félix Martínez Olivas observa varios buitres leonados con anilla amarilla. Las anillas no se pueden leer, por las condiciones de lluvia.

--- Domingo 11 de noviembre de 2018. Los Poyales. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo observa, a las 7 h. 50 m., en M-1, un buitre leonado con banda alar amarilla, que ha dormido allí (es el mismo del anochecer anterior); y a las 8 h. 20 m., en S.I.2ª, un buitre leonado que tiene, en el ala derecha, la banda naranja **Y99**.

2013.- **Y99** (banda alar). /

--- Mismo día, sábado 10 de noviembre de 2018. V.A.D. Juan Prieto Martín y Alejandro Quecedo del Val observan, a las 8 h. 47 m., un buitre leonado adulto que viene a la peña (antes estaba posado en V.D.D.); tiene bandas alares naranja **55** en el ala izquierda y **66** en el ala derecha, y tiene anilla de metal en la pata derecha. Observan también, a las 8 h. 58 m., en lo alto de la peña, un buitre leonado adulto anillado, con anilla amarilla **PF-**, y con anilla de metal en la pata izquierda.

2013.-PF-.
66 / **55** (bandas alares).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí.

--- Mismo día, domingo 11 de noviembre de 2018. La Raya. Antonio Sanz Carro y Andrés Requejo de las Heras observan, en el nido Nº 1 o cerca, dos buitres leonados, uno de los cuales es un adulto con anilla de metal en la pata izquierda.

--- Mismo día, domingo 11 de noviembre de 2018. Peña Portillo 1ª. Félix Martínez Olivas observa seis o siete buitres leonados con anilla amarilla, y lee tres de las anillas, todas ellas correspondientes a buitres

posados en lo alto de la peña, "*en los posaderos clásicos*": a las 9 h. 23 m., el buitre leonado con la anilla **240**; a las 9 h. 28 m., el buitre leonado con la anilla **26C**; y a las 9 h. 44 m., el buitre leonado con la anilla **785**.

1999.- 26C. / 2000.- 240. / 2011.- 785. /

--- Lunes 12 de noviembre de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias (guarda de WWF España en el Refugio), Fernando Jiménez Raigón, Mar Gasco González, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, observan un festín con al menos 248 buitres leonados (incluyendo adultos, y siete jóvenes del año), dos cuervos (en vuelo), y una grajilla; y registran 12 buitres leonados anillados.-

2008.- 74U. / 2010.- 77F. / 2007.- 73J. /
2013.- MH5, PAJ, PCC, PF2, **Y78** (con banda alar; con sólo anilla de metal en la pata derecha). /
CLF.- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. /
MNX.- Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto anteriormente allí. /
YF2 (con banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya conocíamos noticias anteriores allí. /
Y57 (con banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. No conocíamos noticias anteriores allí. /

--- Jueves 29 de noviembre de 2018. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias (guarda de WWF España en el Refugio) y Jesús Cobo Anula registran un festín con más de 400 buitres leonados, y volando 6 milanos reales y al menos 7 cuervos; y registran 13 buitres leonados anillados (todos ellos son fotografiados, por Jesús Cobo):

1996.- PCP. / 2005.- 4AA, 4AJ (no seguro). / 2007.- 73P, 73F, 6XX. / 2008.- 74T. / 2009.- FA3, /
2013.- PAJ, PAT, PF4, **Y78** (banda alar). / 2015.- PHH. /

--- Lunes 28 de enero de 2019. Peña Inclinada o Presa Después Izquierda (P.I., P.D.I.). José Luis López-Pozuelo García observa, a las 11 h. 15 m. ap., un buitre leonado con la anilla amarilla **244** (se lee de abajo arriba) en la pata izquierda, a la derecha (bien) del Nº 13.

2000.- 244. /

--- Miércoles 27 de febrero de 2019. Peña Inclinada o Presa Después Izquierda (P.I., P.D.I.). José Luis López-Pozuelo García observa, en el nido Nº 1, un buitre leonado adulto echado que tiene, en la pata derecha, una anilla amarilla que se lee de abajo arriba y termina en **3X**.

2007.- (¿7?)3X. /

--- Sábado 23 de marzo de 2019. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias (guarda de WWF España en el Refugio) y Juan José Molina Pérez observan un festín con muchos buitres leonados, dos buitres negros (en vuelo), tres cuervos, y al menos cuatro grajillas; y registran un buitre leonado anillado.-

2013.- PF2. /

--- Martes 26 de marzo de 2019. Comedero de buitres del Refugio de Montejo. Jesús Hernando Iglesias (guarda de WWF España en el Refugio), Jesús Cobo Anula (asesor técnico de WWF para el Refugio), Miguel Ángel Menéndez García y Miguel Ángel de la Vega Muñoz observan un festíun con unos 700 buitres leonados (aunque no llegaron a posarse más de 400 a la vez), dos buitres negros (uno se posó en el borde del cortado y otro pasó volando por el borde del cortado), y dos cuervos; y registran al menos cinco buitres leonados anillados o marcados.-

2013.- MH5, PC5. / 2014 (?).- **¿?A3** (banda alar). /
YA6 (banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto anteriormente allí. /
Y84 (banda alar).- Ignoramos el origen de este buitre. Ya había sido visto anteriormente allí. /

Anexo III

Datos sobre buitres leonados con anilla leída entre de 2007 y marzo de 2019.

Origen de los buitres leonados con anilla de PVC leída vistos en el Refugio y su entorno durante los año 2007 a 2018, y los primeros meses de 2019, según los datos que conocemos. Se indican los días conocidos en que se ha registrado cada uno, en el referido año.

R.- En el comedero de buitres del Refugio de Montejo.
C.- En el comedero de buitres de Campo de San Pedro, o en los campos cercanos.
A.- En el comedero de buitres de Ayllón, o en los campos cercanos.
M.- En el comedero de buitres de Maderuelo.
F.- En el comedero de buitres de Fresno de Cantespino, o en los campos cercanos.

Los anilladores en las hoces del Riaza son los indicados en el Anexo II.
Los anilladores en otras zonas se indican en cada caso.

Anillados en las hoces del Riaza o en su entorno.-

Anillados en 1990.-

F40.- Anillado de pollo, en el nido Nº 36 de Peña Portillo (2ª), el 1 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2008.- 19-1 (R) (?), 5-2 (R) (?), 22-2 (R) (?), 27-8 (R) (?).
Observaciones comunicadas en 2009.- 18-2 (R) (?), 1-3 (R), 11-3 (R), 14-4 (R), 16-4 (R), ¿1-5 (R)?, 12-8 (R), 28-8 (R), 16-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 3-1 (R), 19-1 (R), 25-1 (R), 23-2 (R), 26-2 (R), 24-3 (R), 26-3 (R).

F46.- Anillado de pollo, en el nido Nº 54 del barranco de Valdecasuar (margen derecha), el 1 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 19-2 (R), 21-2 (R), 26-2 (R), 6-3 (R), 30-8 (R), 2-12 (R) (?).
Observaciones comunicadas en 2008.- 12-2 (R) (?), 16-2 (R), 26-2 (R), 28-2 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 24-4 (R) (?), 19-8 (R), 23-12 (R), 25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 18-2 (R), 7-3 (R), 9-3 (R), 11-3 (R), 17-4 (R), ¿1-5 (R)?, 25-7 (R), 2-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 24-1 (R), 5-2 (R).

F49.- Anillado de pollo, en el nido Nº 30 del barranco de Valdecasuar (margen derecha), el 1 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 21-8 (R).

F96.- Anillado de pollo, el 1 de mayo, en el nido Nº 32 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 11-11 (Peña Portillo).
Observaciones comunicadas en 2009.- 21-7 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-11 (Peña Portillo), 18-11 (Peña Portillo).

H09.- Anillado de pollo, el 2 de mayo, en el nido Nº 2 de La Raya.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 4-5 (R), 24-10 (R), 12-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 13-1 (R), 10-6 (R) (la anilla está ya ennegrecida y es difícil de leer).

H10.- Anillado de pollo, el 2 de mayo, en el nido Nº 3 de Los Poyales.
Observaciones comunicadas en 2011.- 27-5 (R).

H20.- Anillado de pollo, el 2 de mayo, en el nido Nº 3 de La Raya.
Observaciones comunicadas en 2012.- Hacia primeros de agosto, encontrada la anilla, partida, en la zona de Los Frailes, por Crispín Núñez Serrano. (Amablemente comunicado por Miriam Domingo García).

H22.- Anillado de pollo, el 13 de mayo, en el nido Nº 9 de Peña Fueros.
Observaciones comunicadas en 2008.- 9-1 (R) (la anilla está rota y casi del todo negra), 12-1 (R) (casi ilegible, y casi del todo negra; sin anilla metálica), 19-1 (R), 22-11 (R) (la anilla está rota casi del todo, y es poco legible; sin anilla de metal), 16-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- ¿6-1 (R)?, 27-2 (R), 4-5 (R), 7-5 (R), ¿22-6 (R)?.
Observaciones comunicadas en 2010.- 20-2 (R).

H23.- Anillado de pollo, en el nido Nº 27 de Peña Rubia, el 14 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 15-2 (R), 19-2 (R), 21-2 (R), 20-4 (R), 24-5 (R), 12-6 (R), 20-6 (R), 17-8 (R), 21-8 (R), 28-8 (R), 7-9 (R), 9-11 (R), 28-11 (R), 29-11 (R), 2-12 (R), 7-12 (R), 11-12 (R), 18-12 (R), 22-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 8-1 (R), 9-1 (R), 28-2 (R), 3-3 (R), 17-5 (R), 10-7 (R), 11-7 (R), 22-7 (R), 28-7 (R), 29-7 (R), 13-8 (R), 16-9 (R), 28-9 (R), 29-9 (R), 7-10 (R), 8-11 (P.P.), 9-11 (P.P.), 10-11 (R), 8-12 (R), 16-12 (R), 25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 1-3 (R), 31-3 (R), 16-4 (R), 20-4 (R), 23-4 (R), 6-5 (R), 7-5 (R), 8-5 (R), 15-5 (R), 19-5 (R), 20-5 (R) (se lee de arriba abajo; con anilla de metal en pata dcha.), 22-5 (R), 31-5 (R), 12-6 (R), 19-6 (R), 25-6 (R), 28-6 (R), 3-7 (R), 9-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 15-7 (R), 19-7 (R), 24-7 (R), 27-7 (R), 10-8 (R), 12-8 (R), 17-8 (R), 20-8 (R), 26-8 (R), 27-8 (R), 28-8 (R), 2-9 (R), 10-9 (R), 24-10 (R), 2-11 (R), 6-11 (R), 12-11 (R), 15-11 (R), 23-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 29-3 (R), ¿5-4 (R)?, 26-4 (R), 10-6 (R) (Jesús Hernando lee también la anilla de metal, 1103216, puesta al revés, en la pata izquierda), 30-7 (R), ¿4-8 (R)? (casi del todo negra; con anilla de metal en pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2011.- 13-11 (Peña Portillo).

Anillados en <u>1991</u>.-

007.- Anillado de pollo, en el nido Nº 41 del barranco de Valdecasuar (margen derecha), el 4 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 16-12 (C) (fotografiado).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 15-6 (C).

006.- Anillado de pollo, en el nido Nº 44 del barranco de Valdecasuar (margen derecha), el 4 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 2-5 (C).
Observaciones comunicadas en 2009.- Según informa Álvaro Camiña Cardenal, el buitre fue encontrado muerto, el 5 de febrero, en un parque eólico, en el término de Caltojar (Soria).
(Pueden verse registros anteriores de este buitre en el Apartado G.3.3 del capítulo sobre el buitre leonado.)

010.- Anillado de pollo, en el nido Nº 1 del barranco de Valugar (margen derecha), el 3 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R), 1-4 (R), 2-4 (R), 26-5 (R), 8-6 (en el nido Nº 107, con pollo, del bco. de Valdecasuar), 9-7 (R), 21-8 (R), 11-11 (en el G.I del bco. de Valdecasuar, y en Peña Portillo), 18-12 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 2-1 (R), 5-1 (R), 9-1 (R), 8-5 (R), 19-5 (R), 7-10 (R), 28-10 (R), 10-11 (R), 8-12 (R), 10-12 (R), 14-12 (R). 25-12 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 21-1 (R), 28-1 (R), 1-3 (R), 1-4 (R), 1-5 (R), 7-5 (R), 31-5 (R), 9-7 (R), 14-7 (R), 27-10 (R), 29-10 (R), 16-11 (R) (con la anilla amarilla en la pata derecha), 17-11 (R), 23-11 (R), 14-12 (R), 21-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R), 13-1 (R), 23-2 (R), 12-3 (R), 21-3 (R), 12-4 (R),

22-4 (R), 26-4 (R), 27-4 (R), 14-6 (R), 2-7 (R), 6-9 (R), 3-11 (R), 2-12 (R), 31-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 14-1 (R).

018.- Anillado de pollo, en el nido Nº 10 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 4 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R).

01R.- Anillado de pollo, en el nido Nº 55 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 4 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 21-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 15-4 (R), 25-4 (R), 16-6 (R), 14-8 (R), 20-10 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 8-1 (R), 31-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-11 (Peña Portillo).

01J.- Anillado de pollo, en el nido Nº 35 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 4 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2011.- 12-11 (Peña Portillo).

01V.- Anillado de pollo, en el nido Nº 25 de Peña Rubia, el 4 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R), 12-6 (R), 11-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 12-1 (R) (no tiene anilla metálica), 12-2 (R), 8-3 (R), 10-3 (R), 9-4 (R), 12-4 (R), 18-4 (R), 29-4 (R), 3-5 (R), 8-5 (R), 17-5 (R), 18-5 (R), 30-5 (R), 19-6 (R), 20-6 (R), 1-8 (R), 13-8 (R), 18-8 (R), 27-8 (R), 4-9 (R), 6-9 (R), 16-9 (R), 26-10 (R), 28-10 (R), 10-11 (R), 19-11 (R), 22-11 (R), 16-12 (R), 28-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 8-1 (R), 15-1 (R), 28-1 (R), 3-2 (R), 6-2 (R), 18-2 (R), 23-2 (R) (fot.; la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha; sin anilla de metal), 26-2 (R), 7-3 (R), 11-3 (R), 31-3 (R), 6-4 (R), 7-4 (R), 8-4 (R), 11-4 (R), 14-4 (R), 17-4 (R), 1-5 (R), 4-5 (R), 7-5 (R), 1-6 (R), 4-6 (R), 6-6 (R), 11-6 (R), 12-6 (R), 19-6 (R), 22-6 (R), 25-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 7-7 (R), 9-7 (R), 14-7 (R), 15-7 (R), 19-7 (R), 21-7 (R), 24-7 (R), 25-7 (R), 27-7 (R), 3-8 (R), 31-8 (R), 8-9 (R), 14-9 (R), 15-9 (R), 15-10 (R), 17-10 (R), 24-10 (R) (en dos festines), 26-10 (R), 27-10 (R), 29-10 (R), 31-10 (R), 2-11 (R), 6-11 (R), 9-11 (R), 23-11 (R), 29-11 (R), 14-12 (R), 16-12 (R), 21-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R), 13-1 (R), 14-1 (R), 19-1 (R), 5-2 (R) (en dos festines), 16-2 (R), 19-2 (R), 26-2 (R), 24-3 (R), 31-3 (R), 3-4 (R), 6-4 (R), 12-4 (R), 22-4 (R), 26-4 (R), 27-4 (R), 2-5 (R), 14-5 (R), 17-5 (R), 19-5 (R), 21-5 (R), 24-5 (R), 3-6 (R), 9-6 (R) (la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha; sin anilla de metal), 10-6 (R), 17-6 (R), 22-6 (R), 7-7 (R), 13-7 (R), 24-7 (R), 6-9 (R), 8-10 (R), 14-11 (R), 16-11 (R) (la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha; sin anilla de metal; fot.), 23-11 (R), 5-12 (R), 25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 3-1 (R), 29-1 (R), 5-2 (R), 3-3 (R), 8-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 23-5 (R), 19-9 (R).

Pueden verse fotos del buitre con la anilla 01V en las **Hojas Informativas Nº 36** (página 269; foto del 16 de noviembre de 2010, obtenida por Elías Gomis Martín) y **Nº 38** (página 301; foto del 23 de febrero de 2009, obtenida por Jesús Cobo Anula).

Anillados en 1992.-

[05H] (con anilla de metal 1101101).- Anillado de pollo, en el nido Nº 38 del barranco de Valdecasuar (margen derecha), el 1 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2009.- 16-7 (R) (anilla de metal).

05N.- Anillado de pollo, en el nido Nº 28 del barranco de Valdecasuar (margen derecha), el 1 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 8-12 (R).

05P (con anilla de metal 1101106).- Anillado de pollo, en el nido Nº 25 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 1 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 28-3 (R), 14-5 (en el G.0 del bco. de Valdecauar), 24-5 (R), 7-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-1 (R), 5-2 (R), 7-4 (R), 1-5 (R), 29-7 (R), 8-11 (P.P.), 9-11 (P.P.), 16-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 1-2 (R), 27-3 (R), 24-4 (R), 5-5 (R), 26-5 (R), 3-7 (R), 7-7 (R), 12-7 (R), 20-9 (R), 14-12 (R), 16-12 (R), 25-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 14-1 (R), 24-1 (R), 26-1 (R), 5-2 (R), 20-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R), 12-3 (R), 12-4 (R), 22-4 (R) (en dos festines), 6-9 (R) (por primera vez, sólo anilla de metal).

085.- Anillado de pollo, en el nido Nº 12 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 30 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 4-2 (C; fot.), 28-3 (R), 12-6 (R), 12-6 (C), 6-8 (R), 7-8 (R), 30-8 (R), 2-9 (R), 7-9 (R), 28-10 (C), 29-11 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 12-4 (R), 16-4 (R), 25-4 (R), 18-8 (R), 20-10 (R), 8-11 (P.F.dcha./com.),10-11 (R), 29-11 (R), 8-12 (R), 28-12 (C; fot.).
Observaciones comunicadas en 2009.- 1-2 (R), 6-2 (R), 23-2 (R), 6-5 (R), 7-5 (R), 1-6 (R), 11-6 (R) (la anilla está rota en parte), 19-6 (R) (en dos festines), 30-6 (R), 12-7 (R), 17-8 (R), 8-9 (R), 9-9 (R), 14-9 (R), 20-9 (R), 15-11 (R), 26-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 12-4 (R), 15-4 (R), 27-4 (R), 23-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 7-1 (R), 12-11 (Peña Portillo), 13-11 (Peña Portillo).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-11 (Peña Portillo).

08N.- Anillado de pollo, el 30 de mayo, en el nido Nº 11 de La Raya.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 2-2 (R), 26-2 (R), 28-8 (R), 29-11 (R), 2-12 (R), 22-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 8-1 (R) (<u>la anilla está a punto de romperse</u>), 9-1 (R).

Anillados en <u>1993</u>.-

0C4.- Anillado de pollo, el 30 de abril, en el nido Nº 6 del 2º Cañón.
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R), 9-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-1 (R) (**recogida la anilla caída**, al parecer durante el festín).

07H.- Anillado de pollo, el 31 de mayo, en el nido Nº 25 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 3-2 (R).

07J.- Anillado de pollo, el 31 de mayo, en el nido Nº 4 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Se le puso el nombre de "*Stan*". Fue seguido con emisor, por Joachim Griesinger y su equipo.
Observaciones comunicadas en 2008.- 28-12 (R), ¿29-12 (R)?

07L.- Anillado de pollo, el 31 de mayo, en el nido Nº 4 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R; se lee de arriba abajo; leída de abajo arriba, es L70).

0HJ.- Anillado de pollo, el 9 de junio, en el nido Nº 14 de Los Poyales.
Se le puso el nombre de "*Guerrero*". Fue seguido con emisor, por Joachim Griesinger y su equipo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 14-6 (R), 20-6 (R), 11-8 (R), 17-8 (R), 21-8 (R), 3-9 (R), 6-9 (R), 8-9 (R), 18-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 25-1 (R), 13-3 (R), 15-4 (R), 18-4 (R).

0HL.- Anillado de pollo, el 9 de junio, en el nido Nº 32 de Los Poyales.
Observaciones comunicadas en 2007.- 27-1 (C) (fot.), 4-2 (C) (fot.), 29-4 (C) (fot.), 2-5 (C) (fot.), 0HL (C) (fot.).
Observaciones comunicadas en 2008.- ¿13-4 (C)?, 16-5 (C), 9-9 (C; fot.).
Observaciones comunicadas en 2009.- 13-1 (C), 12-2 (C) (fotografiado), 21-7 (R), 24-7 (C), 19-8 (R), 23-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 8-1 (C), 26-4 (R), 13-11 (C).
Observaciones comunicadas en 2011.- 13-11 (Peña Portillo).

Anillados en 1994.-

0J6.- Anillado de pollo, el 30 de abril, en el nido Nº 25 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2009.- 27-6 (R) (anilla de metal, 1101344).

0JH.- Anillado de pollo, el 1 de mayo, en el nido Nº 1 de La Calderona.
Observaciones comunicadas en 2007.- ¿2-4 (R)?, 12-6 (R).

0JN (con anilla de metal 1101355).- Anillado de pollo, el 1 de mayo, en el nido Nº 13 de La Raya.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 20-4 (R), 26-5 (R), 12-6 (R), 20-6 (R). 1-9.- Encontrada la anilla 0JN cerca y fuera de C.
Observaciones comunicadas en 2009.- 15-6 (R) (anilla de metal, 1101355), 25-6 (R) (anilla de metal, 1101355; no tiene anilla amarilla), 9-7 (R) (anilla de metal), 14-7 (R) (sólo anilla de metal), 16-7 (R) (anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2010.- 24-1 (R) (sólo anilla de metal), 10-6 (R) (sólo anilla de metal, en la pata izquierda), 11-9 (R) (sólo anilla de metal).

0JT (con anilla de metal 1101357).- Anillado de pollo, el 2 de mayo, en el nido Nº10 del bco. de Valugar.
Observaciones comunicadas en 2009.- 19-6 (R) (anilla de metal, 1101357).

Anillados en 1995.-

0U9 ([1101381]).- Anillado de pollo, el 30 de abril, en el nido Nº 41 del barranco de Valdecasuar (margen derecha).
Observaciones comunicadas en 2009.- 19-7 (R) (anilla de metal, 1101381), ¿17-11 (R)? (anilla de metal, 110138?).

0FN.- Anillado de pollo, el 30 de abril, en el nido Nº 63 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R), 13-1 (R), 2-2 (R), 4-4 (R), 26-5 (R), 20-6 (R), 16-7 (R) (?), 7-8 (R), 17-8 (R), 21-8 (R), 3-9 (R), 7-9 (R), 2-12 (R), 18-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 2-1 (R), 8-1 (R), 9-1 (R), 16-2 (R), 15-4 (R), 24-4 (R), 1-5 (R), 5-5 (en el nido Nº 106, con pollo, de Valdecasuar), 17-5 (R), 18-5 (R), 19-6 (R), 23-6 (R), 16-7 (R), 19-8 (R), 21-8 (R), 25-8 (R), 27-8 (R), 5-9 (R), 6-9 (R), 16-9 (R), 14-12 (R), 16-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 5-1 (R), 8-1 (R), 12-2 (R), 20-4 (R), 4-5 (R), 5-5 (R), 7-5 (R), 31-5 (R), 1-6 (R), 11-6 (R), 12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R), 22-6 (R), 25-6 (R), 28-6 (R), 3-7 (R), 9-7 (R) (se lee deabajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 11-7 (R), 19-7 (R), 24-7 (R), 28-8 (R), 15-11 (R), 29-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R), 17-5 (R), 19-5 (R), 21-5 (R), 24-6 (R), 28-6 (R), 2-7 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 17-1 (R), 12-11 (Peña Portillo).

0L0 ([1101386]).- Anillado de pollo, el 30 de abril, en el nido Nº 60 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2009.- 9-9 (R) (sólo anilla de metal), ¿20-9 (R) (anilla de metal)?

0L9 ([1101392]).- Anillado de pollo, el 1 de mayo, en el nido Nº 6 del barranco de Valdecasuar (margen Izquierda).
Observaciones comunicadas en 2011.- 9-3 (R) (sólo anilla de metal).

0L7.- Anillado de pollo, el 1 de mayo, en el nido Nº 15 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 16-7 (R), 8-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 4-6 (R), 6-6 (R), 3-7 (R), 11-7 (R), 16-7 (R), 19-8 (R), 2-11 (R), 15-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 20-1 (R), 28-1 (R), 28-3 (R), 22-4 (R), 27-4 (R), 23-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 24-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 25-4 (R), 18-11 (Peña Portillo).

0V8 (con anilla de metal 1101399).- Anillado de pollo, el 2 de mayo, en el nido Nº 3 de Peña de la Zorra.
Observaciones comunicadas en 2007.- 30-12 (C) (fotografiado).
Observaciones comunicadas en 2009.- 30-6 (R) (sólo anilla de metal, 1101399), 7-7 (R) (anilla de metal, 1101399), 9-9 (R) (anilla de metal).

0VC.- Anillado con red, como joven del año, en el Corral del Monte, el 28 de agosto.
Observaciones comunicadas en 2008.- 29-7 (R).

0VH.- Anillado con red, como joven del año, en el Corral del Monte, el 28 de agosto.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 20-1 (C), 21-2 (R), 8-3 (R), 28-3 (R), 29-3 (C), 3-6 (C), 12-6 (R), 26-7 (en el nido Nº 1-Va, con éxito), 6-9 (R), 11-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 25-1 (R), 16-2 (R), 3-3- (R), 31-3 (R), 19-5 (R), 8-6 (en el nido Nº 1-Va, con pollo), 15-6 (C), 29-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 5-3 (R), 19-5 (R), 31-5 (R), 7-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 21-7 (R), 2-9 (R), 8-9 (R), 20-9 (R), 26-10 (R), ¿14-12 (R)?
Observaciones comunicadas en 2010.- 31-3 (R), 27-5 (R), 17-6 (R), 22-6 (R), 30-6 (R), 13-7 (R), 24-7 (R), 30-8 (R), 6-9 (R), 11-9 (R), 22-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- ¿26-7? (en el nido Nº 14, con pollo, del bco. de Valdecasuar; la lectura de la anilla no es segura).
Observaciones comunicadas en 2012.- 23-5 (R), 29-7 (en Peña Inclinada, P.D.I., entre los nidos Nº 5 y Nº 8; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2015.- 25-I (en Peña Inclinada, P.D.I., en la repisa larga; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata dcha.; con anilla de metal; junto a otro buitre adulto, que tiene sólo anilla de metal en la pata izquierda; a las 12 h. 6 m., hay una cópula de dos buitres adultos, y el 0VH es el que está arriba).

0V7.- Anillado con red, como adulto, en el Corral del Monte, el 28 de agosto.
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R).

Anillados en 1996.-

0TP.- Anillado de pollo, el 10 de mayo, en el nido Nº 2 de La Hocecilla.
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-4 (Bocos de Duero, Valladolid), 26-6 (Bocos de Duero), 16-7 (?) (Bocos de Duero). (Véase la **Hoja Informativa Nº 32**, págs. 283-284).
Observaciones comunicadas en 2009.- 22-8 (R).

0TR.- Anillado de pollo, el 10 de mayo, en el nido Nº 5 de La Hocecilla.
Observaciones comunicadas en 2007.- 28-8 (R), 30-8 (R), 2-9 (R) (?), 29-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-1 (R), 1-7 (R), 11-7 (R), 1-8 (R), 10-11 (C).
Observaciones comunicadas en 2009.- 13-1 (C), 28-1 (R), 20-5 (R) (se lee de arriba abajo; con anilla de metal en pata izqda.), 12-7 (R), 8-9 (R), 25-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 13-7 (R), 30-8 (R), 23-9 (R), 8-10 (R), 4-12 (C), 5-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 10-4 (C) (fotografiado; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-3 (R) (anilla de metal), 15-4 (C).

Puede verse una foto del buitre con anilla 0TR, obtenida por Manuel López Lázaro el 10 de abril de 2011, en el comedero de Campo de San Pedro, en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 273.

0TH ([1101594]).- Anillado de pollo, el 11 de mayo, en el nido Nº 64 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).

113.- Anillado de pollo, el 11 de mayo, en el nido Nº 15 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R), 13-1 (R), 2-2 (R), 26-5 (R), 20-6 (R), 9-7 (R), 16-7 (R), 6-8 (R), 11-8 (R), 17-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 7-9 (R), 28-11 (R), 2-12 (R), 11-12 (R), 18-12 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-1 (R), 9-1 (R), 22-1 (R), 31-1 (R), 16-2 (R), 18-2 (R), 3-3 (R), 10-3 (R), 24-3 (R), 7-4 (R), 24-4 (R), 17-5 (R) (dos veces), 25-8 (R), 28-8 (R), 4-9 (R), 5-9 (R), 6-9 (R), 16-9 (R), 28-9 (R), 29-9 (R), 13-10 (R), 20-10 (R), 28-10 (R), 5-11 (R), 10-11 (R), 15-11 (R), 22-11 (R), 26-11 (R), 29-11 (R), 10-12 (R), 16-12 (R), 23-12 (R), 25-12 (R), 27-12 (R), 28-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 5-1 (R), 6-1 (R), 21-1 (R), 28-1 (R), 1-2 (R), 3-2 (R), 12-2 (R), 15-2 (R), 5-3 (R), 11-4 (R), 16-4 (R), 20-4 (R) 24-4 (R), 5-5 (R), 6-5 (R), 7-5 (R), 8-5 (R), 20-5 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en pata dcha.), 23-5 (R), 26-5 (R), 31-5 (R), 4-6 (R), 6-6 (R), 11-6 (R) (con anilla de metal en pata dcha.) (en dos festines), 12-6 (R), 15-6 (R), 22-6 (R), 24-6 (R), 25-6 (R), 27-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 7-7 (R), 9-7 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en pata derecha), 11-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R) (se lee de abajo arriba), 3-8 (R), 6-8 (R), 12-8 (R), 28-8 (R), 2-9 (R) (dos veces), 5-9 (R), 8-9 (R), 10-9 (R), 14-9 (R), 17-9 (R), 7-10 (R), 24-10 (R), 2-11 (R), 6-11 (R), 9-11 (R), 12-11 (R), 14-11 (Peña Portillo), 16-11 (R), 17-11 (R), 23-11 (R), 25-11 (R), 26-11 (R), 4-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 25-1 (R), 28-1 (R), 5-2 (R), 16-2 (R), 19-2 (R), 23-2 (R), 1-3 (R), 8-3 (R), 21-3 (R), 29-3 (R), 31-3 (R), 3-4 (R), 17-4 (R), 22-4 (R), 5-5 (R), 14-5 (R), 17-5 (G.I. del bco. de Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en pata derecha), 17-5 (R), 19-5 (R), 6-7 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en pata derecha), 13-7 (R), 14-7 (R), 19-7 (R), 9-8 (R), 6-9 (R), 9-9 (R), 18-9 (R), 8-10 (R), 13-11 (Peña Portillo), 2-12 (R), 5-12 (R), 8-12 (R) (la anilla amarilla está rota por abajo), 20-12 (R), 27-12 (R), 31-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 2-1 (R), 3-1 (R), 7-1 (R), 17-1 (R), 18-1 (R), 27-1 (R), 29-1 (R), 8-3 (R), 9-3 (R), 10-6 (R), 12-11 (Peña Portillo, 13-11 (Peña Portillo).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 21-1 (R), 15-4 (C), 19-9 (R) (con la anilla amarilla en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2013.- 18-11 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2014.- 28-1 (R; encontrada la anilla), 21-7 (R; sólo anilla de metal, 1101599, en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2016.- 6-8 (R; se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con

anilla de metal en la pata derecha), 10-9 (R; en la pata izquierda; con anilla de metal en la pata derecha).

[118] (con anilla de metal 1103205).- Anillado de pollo, el 12 de mayo, en el nido Nº 3 de La Calderona.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-11 (R) (fotografiado; no tiene anilla amarilla).
Observaciones comunicadas en 2008.- 24-4 (R) (no tiene anilla amarilla).
Observaciones comunicadas en 2009.- 23-2 (R) (fotografiado; no tiene anilla amarilla), 7-5 (R) (no tiene anilla amarilla), 21-7 (R) (anilla de metal), 27-7 (R) (anilla de metal), 8-9 (R) (anilla de metal), 17-11 (R) (anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2013.- 11-12 (R) (sólo anilla de metal; se le coloca la anilla amarilla PCP).
Observaciones comunicadas en 2014.- ¿14-5? (Nº 103-Vald., sin pollo; la lectura no es segura; la anilla amarilla, en la pata izquierda; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2016.- 2-5 (Nº 53-Vald., con pollo; la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal),
Observaciones comunicadas en 2018.- 29-11 (R; fotografiado; en la pata izquierda; adulto).

[119] (con anilla de metal 1103207).- Anillado de pollo, el 12 de mayo, en el nido Nº 9 de El Corralón.
Observaciones comunicadas en 2008.- 15-4 (R) (no tiene anilla amarilla), 7-5 (R) (no tiene anilla amarilla), 27-7 (R) (anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2009.- 25-6 (R) (anilla de metal, 1103207), 7-7 (R) (anilla de metal, 1103207), 12-7 (R) (anilla de metal), 16-7 (R) (anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2010.- 6-9 (R) (anilla de metal).

[11A] (con anilla de metal 1103208).- Anillado de pollo, el 12 de mayo, en el nido Nº 14 de El Corralón.
Observaciones comunicadas en 2010.- 26-3 (R) (anilla de metal).

11C.- Anillado de pollo, el 12 de mayo, en el nido Nº 44 del barranco de Valdecasuar (margen derecha).
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 23-1 (R) (fotografiado), 2-2 (R), 28-3 (R), 14-6 (R), 9-7 (R), 6-8 (R), 16-8 (R), 21-8 (R), 30-8 (R), 11-12 (R), 18-12 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 8-1 (R), 9-1 (R), 12-2 (R), 18-2 (R), 22-2 (R), 8-3 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 10-4 (R), 25-4 (R), 3-5 (R), 18-5 (R), 9-6 (R), 23-6 (R), 27-7 (R), 1-8 (R), 16-9 (R), 28-9 (R), 28-10 (R), 19-11 (R), 8-12 (R), 16-12 (R), 25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 5-1 (R), 28-1 (R), 1-2 (R), 3-2 (R), 18-2 (R), 27-2 (R), 1-4 (R), 7-4 (R), 16-4 (R), 5-5 (R), 15-5 (R), 22-5 (R), 31-5 (R), 19-6 (R), 7-7 (R), 9-7 (R), 11-7 (R), 14-7 (R), 25-7 (R), 3-8 (R), 10-8 (R), 19-8 (R), 14-9 (R).

[11H] (con anilla de metal 1103211).- Anillado de pollo, el 12 de mayo, en el nido Nº 38 del barranco de Valdecasuar (margen derecha).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-2 (R) (fotografiado; no tiene anilla amarilla).

12P.- Anillado de adulto, con red, el 1 de octubre de 1996, en el oeste del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 24-5 (R), 26-5 (R), 14-6 (R), 11-8 (R), 21-8 (R), 6-8 (R), 2-9 (R), 3-9 (R), 6-9 (R), 7-9 (R), 8-9 (R), 29-11 (R), 18-12 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 13-2 (R), 26-2 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 24-3 (R), 10-4 (R), 15-4 (R), 18-4 (R), 25-4 (R), 29-4 (R), 8-5 (R).

12V.- Anillado de adulto, con red, el 1 de octubre de 1996, en el oeste del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 9-7 (R), 16-8 (R), 21-8 (R), 30-8 (R), 2-9 (R), 11-11 (en Valdecasuar margen derecha 2; ha dormido), 12-11 (en el comedero de Julve, Teruel), 7-12 (en el nido Nº 2 de La Calderona), 18-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 8-1 (R), 9-1 (R), 12-1 (R), 8-2 (R), 3-3 (R),

25-4 (R), 1-7 (R), 27-7 (R), 29-7 (R), 1-8 (R), 14-8 (R), 19-8 (R), 21-8 (R), 5-9 (R), 7-10 (R), 28-10 (R), 10-11 (R), 22-11 (R), 31-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 6-2 (R), 20-2 (R), 26-2 (R), 1-5 (R), 4-5 (R), 5-5 (R), 11-5 (R), 19-5 (R), 1-6 (R) 11-6 (R) (con anilla de metal en pata izqda.) (en dos festines), 19-6 (R), 30-6 (R), 9-7 (R), 11-7 (R), 27-7 (R).

12W.- Anillado de adulto, con red, el 1 de octubre de 1996, en el oeste del Refugio.

Observaciones comunicadas en 2007.- 23-1 (C), 20-4 (R), 9-7 (R), 11-8 (R), 30-8 (R).

Observaciones comunicadas en 2008.- 8-3 (R), 12-3 (R), 25-4 (R), 3-5 (R), 28-7 (R), 29-7 (R), 19-8 (R), 6-9 (R), 11-9 (R), 16-9 (R), 26-10 (R), 9-11 (P.P.).

Observaciones comunicadas en 2009.- 28-1 (R), 6-2 (R), 5-3 (R), 7-5 (R), 8-5 (R), 11-5 (R), 15-5 (R), 20-5 (R), 22-5 (R), 6-6 (R), 19-6 (R), 28-6 (R), 7-7 (R) 9-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 12-8 (R), 14-9 (R), 15-11 (R), 27-11 (R), 16-12 (R), 21-12 (R), 29-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 3-1 (R), 16-2 (R), 20-2 (R), 23-2 (R), 2-3 (R), 5-3 (R), 24-3 (R), 29-3 (R), 15-4 (R), 22-4 (R), 28-4 (R), 15-5 (R), 17-5 (R), 27-5 (R), 24-6 (R), 9-8 (R), 24-9 (R), 13-10 (R), 31-10 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 5-2 (R), 16-3 (R), 27-5 (R).

Observaciones comunicadas en 2012.- 21-1 (R), 28-3 (R), 19-9 (R).

Observaciones comunicadas en 2013.- 24-7 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal en la pata dcha.).

121.- Anillado como subadulto de ap. cuatro años, con red, el 1 de octubre de 1996, en el oeste del Refugio.

Observaciones comunicadas en 2012.- 23-5 (R).

123.- Anillado de adulto, con red, el 1 de octubre de 1996, en el oeste del Refugio.

Observaciones comunicadas en 2007.- 2-9 (R).

Observaciones comunicadas en 2008.- 29-11 (R).

Observaciones comunicadas en 2012.- 17-11 (R).

Anillados en 1997.-

12C.- Anillado de pollo, en el nido Nº 22 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 10 de mayo.

Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R) (no es seguro que sea éste), 2-4 (R), 26-5 (R), 8-6 (en el Grupo I del barranco de Valdecasuar), 9-7 (R), 7-8 (R), 16-8 (R), 17-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 28-8 (R), 30-8 (R), 6-9 (R), 7-9 (R), 8-9 (R), 9-11 (R), 10-11 (en Peña Portillo), 18-12 (R), 30-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 9-1 (R), 12-1 (R), 12-2 (R), 16-2 (R), 8-3 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 14-3 (R), 24-3 (R), 7-4 (R), 10-4 (R), 18-4 (R), 24-4 (R), 25-4 (R), 27-4 (R), 29-4 (R), 3-5 (R), 6-5 (en el G. I. de Valdecasuar), 17-5 (R), 18-5 (R), 28-5 (R), 5-6 (en el Nº 40 de Valdecasuar), 19-6 (R), 20-6 (R), 1-7 (R), 14-8 (R), 18-8 (R), 19-8 (R), 21-8 (R), 25-8 (R), 28-8 (R), 5-9 (R), 16-9 (R), 18-9 (R), 24-9 (R), 29-9 (R), 2-10 (R), 7-10 (R), 8-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 1-2 (R).

12L.- Anillado de pollo, el 10 de mayo, en el nido Nº 60 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).

Observaciones comunicadas en 2007.- 6-9 (R).

Observaciones comunicadas en 2012.- 25-4 (R).

12J.- Anillado de pollo, el 10 de mayo, en el nido Nº 64 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).

Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 2-2 (R), 15-2 (R), 4-4 (R), 20-4 (R), 16-8 (R), 21-8 (R), 30-8 (R), 6-9 (R), 7-9 (R), 8-9 (R),

9-11 (R), 28-11 (R), 29-11 (R), 11-12 (R), 18-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2008.- 9-1 (R), 19-1 (R), 22-1 (R), 25-1 (R), 3-3 (R), 17-3 (R), 15-4 (R), 29-4 (R), 30-4 (R), 1-5 (R), 3-5 (R), 26-5 (R), 12-6 (R), 19-6 (R), 23-6 (R), 17-7 (R), 22-7 (R), 29-7 (R), 13-8 (R), 14-8 (R), 18-8 (R), 25-8 (R), 28-8 (R), 4-9 (R), 5-9 (R), 6-9 (R), 11-9 (R), 16-9 (R), 24-9 (R), 28-9 (R), 29-9 (R), 9-10 (R), 24-10 (R), 26-10 (R), 1-11 (R), 10-11 (R), 15-11 (R), 19-11 (R), 26-11 (R), 29-11 (R), 8-12 (R), 10-12 (R), 23-12 (R), 25-12 (R), 27-12 (R), 28-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 1-2 (R), 6-2 (R), 12-2 (R), 23-2 (R), 4-4 (R), 7-4 (R), 8-4 (R), 16-4 (R), 17-4 (R), 1-5 (R), 6-5 (R), 19-5 (R), 22-5 (R), 23-5 (R), 31-5 (R), 1-6 (R), 11-6 (R) (con anilla de metal) (en dos festines), 12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R), 22-6 (R), 24-6 (R), 25-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 3-7 (R), 9-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 15-7 (R), 19-7 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la otra pata), 21-7 (R), 3-8 (R), 4-8 (R), 14-8 (R), 5-9 (R), 8-9 (R), 9-9 (R), 20-9 (R), 2-10 (R), 19-10 (R), 24-10 (R), 26-10 (R), 27-10 (R), 28-10 (R), 12-11 (R), 15-11 (R), 16-11 (R) (con anilla de metal en pata izqda.), 23-11 (R), 25-11 (R), 26-11 (R), 27-11 (R), 29-11 (R), 4-12 (R), 14-12 (R), 16-12 (R), 21-12 (R) (en dos festines).

Observaciones comunicadas en 2010.- 7-1 (R), 13-1 (R), 14-1 (R), 20-1 (R), 26-1 (R), 30-1 (R), 1-2 (R), 2-2 (R), 7-3 (R), 6-4 (R), 9-4 (R), 12-4 (R), 22-4 (R) (en dos festines), 26-4 (R), 27-4 (R), 9-6 (R), 10-6 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 17-6 (R), 18-6 (R), 20-6 (R), 22-6 (R), 27-6 (R), 29-6 (R), 1-7 (R), 2-7 (R), 13-7 (R), 24-7 (R), 30-7 (R), 14-8 (R), 18-8 (R), 23-8 (R), 30-8 (R), 1-9 (R), 6-9 (R) (en dos festines), 9-9 (R), 11-9 (R), 18-9 (R), 24-9 (R), 27-9 (R), 5-10 (R), 6-10 (R), 7-10 (R), 8-10 (R), 12-10 (R), 13-10 (R), 15-10 (R), 17-10 (R), 14-11 (R), 16-11 (R; fot.; con anilla de metal en la pata izquierda), 29-11 (R), 2-12 (R), 5-12 (R), 8-12 (R), 13-12 (R), 16-12 (R), 20-12 (R), 25-12 (R), 30-12 (R), 31-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 17-1 (R), 18-1 (R), 22-1 (R), 5-2 (R), 4-6 (en el nido Nº 11 del 2º Cañón, con pollo; se lee de abajo arriba; con anilla de metal), 7-6 (R; fot.), 14-11 (R) (con anilla de metal en la pata izquierda).

Observaciones comunicadas en 2012.- 4-2 (R), 17-3 (R), 25-4 (R), 23-5 (R), 7-8 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 30-8 (R; la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha).

Observaciones comunicadas en 2013.- 6-11 (R).

Puede verse una foto del buitre con anilla 12J, obtenida por Raúl González Rodríguez el 16 de noviembre de 2010, en el comedero del Refugio de Montejo, en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 277.

[124] (1103232).- Anillado de pollo, el 10 de mayo, en el nido Nº 69 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).

Observaciones comunicadas en 2009.- 11-7 (R; sólo tiene anilla de metal, 1103232), 12-7 (R) (anilla de metal), 25-7 (R) (anilla de metal), 2-11 (R) (anilla de metal).

Observaciones comunicadas en 2010.- 16-11 (R) (sólo anilla de metal).

Observaciones comunicadas en 2011.- 8-3 (R) (sólo anilla de metal).

Observaciones comunicadas en 2013.- 11-12 (R) (sólo anilla de metal; se le coloca la anilla amarilla PCF).

Observaciones comunicadas en 2014 (PCF).- 28-6 (R), 21-7 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).

Observaciones comunicadas en 2015 (PCF).- 22-8 (R; con anilla de metal en la pata izquierda).

Observaciones comunicadas en 2016 (PCF).- 11-3 (R; con anilla de metal en la pata izquierda).

122.-Anillado de pollo, en el nido Nº 25 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 10 de mayo.

Este buitre fue encontrado muerto, por Daniel Fernández Muñiz, el 16 de febrero de 2918, en un parque eólico de Las Navas del Marqués (Ávila) (40º 38´N, 4º 24´W). (Amablemente comunicado por Jesús Cobo Anula, de WWF España).

12M.- Anillado de pollo, el 10 de mayo, en el nido Nº 32 del barranco de Valdecasuar (margen izqda..).

Observaciones comunicadas en 2018.- 10-3 (R).

128.-Anillado de pollo, en el nido Nº 12 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 10 de mayo.

Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 2-2 (R), 15-2 (R), 19-2 (R), 26-2 (R), 6-3 (R), 28-3 (R), 2-4 (R), 4-4 (R), 20-4 (R), 12-6 (R), 14-6 (R), 20-6 (R), 9-7 (R), 6-8 (R), 7-8 (R), 11-8 (R), 17-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 28-8 (R), 30-8 (R), 6-9 (R), 7-9 (R), 8-9 (R), 13-11 (R) (fotografiado), 28-11 (R), 2-12 (R), 7-12 (R), 18-12 (R), 22-12 (R), 30-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2008.- 2-1 (R), 5-1 (R), 9-1(R), 12-1 (R), 19-1 (R), 22-1 (R), 5-2 (R), 12-2 (R), 13-2 (R), 22-2 (R), 8-3 (R), 10-3 (R), 2-4 (R), 7-4 (R), 9-4 (R), 10-4 (R), 12-4 (R), 18-4 (R), 25-4 (R), 6-5 (en el G. I. de Valdecasuar), 8-5 (R), 17-5 (R) (dos veces), 18-5 (R), 19-5 (R), 24-5 (R), 29-V (en el Pos. 1 del 2º Cañón), 30-5 (R), 16-6 (R), 23-6 (R), 11-7 (R), 16-7 (R), 17-7 (R), 29-7 (R), 13-8 (R), 21-8 (R), 25-8 (R), 28-8 (R), 5-9 (R), 11-9 (R), 24-9 (R), 28-9 (R), 29-9 (R), 2-10 (R), 7-10 (R), 9-10 (R), 13-10 (R), 20-10 (R), 24-10 (R), 1-11 (R), 10-11 (R), 15-11 (R), 19-11 (R), 22-11 (R), 29-11 (R), 8-12 (R), 10-12 (R), 14-12 (R), 16-12 (R), 25-12 (R), 28-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 2-1 (R), 5-1 (R), 28-1 (R), 5-3 (R), 7-3 (R), 13-3 (R), 31-3 (R), 1-4 (R), 4-4 (R), 7-4 (R), 11-4 (R), 14-4 (R), 17-4 (R), 20-4 (R), 1-5 (R), 4-5 (R), 5-5 (R), 6-5 (R), 7-5 (R), 8-5 (R), 11-5 (R), 19-5 (R), 20-5 (R), 23-5 (R), 26-5 (R), 31-5 (R), 1-6 (R), ¿¿3-6 (m.d. bco. Valugar)??, 6-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R) (en dos festines), 22-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 3-7 (R), 9-7 (R) (en dos festines), 11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R), 23-7 (margen derecha, G. I., del barranco de Valdecasuar; cerca del Nº 15; la anilla amarilla, en la pata derecha), 25-7 (R), 3-8 (R), 4-8 (R), 10-8 (R), 17-8 (R), 22-8 (R), 31-8 (R), 8-9 (R), 9-9 (R), 15-9 (R), 17-9 (R), 25-9 (R), 28-9 (R), 2-10 (R), 7-10 (R), 15-10 (R), 19-10 (R), 24-10 (R) (en dos festines), 26-10 (R), 27-10 (R), 31-10 (R), 2-11 (R), 9-11 (R), 15-11 (R), 17-11 (R), 27-11 (R), 3-12 (R), 14-12 (R), 24-12 (R), 30-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 3-1 (R), 7-1 (R), 9-1 (R), 18-1 (R), 24-1 (R), 28-1 (R), 30-1 (R), 1-2 (R), 16-2 (R), 26-2 (R), 7-3 (R), 26-3 (R), 29-3 (R), 6-4 (R), 12-4 (R), 22-4 (R), 27-4 (R), 28-4 (R), 2-5 (R), 19-5 (R), 3-6 (R), 10-6 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 14-6 (R), 22-6 (R), 2-7 (R), 10-7 (R), 24-7 (ceba al pollo en el nido Nº 110 del barranco de Valdecasuar, junto al nido Nº 12 donde este buitre nació; la anilla amarilla se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 24-7 (R), 9-8 (R), 6-9 (R), 11-9 (R), 22-9 (R), 23-9 (R), 24-9 (R), 27-9 (R), 5-10 (R), 7-10 (R), 8-10 (R), 13-10 (R), 3-11 (R), 14-11 (R), 16-11 (R), 5-12 (R), 8-12 (R) (la anilla amarilla está rota), 13-12 (R), 16-12 (R), 31-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 2-1 (R), 5-1 (R), 7-1 (R), 8-1 (R), 14-1 (R), 29-1 (R), 31-1 (R), 9-3 (R), 10-3 (R), 27-3 (R), 11-5 (en el nido Nº

110, con pollo pequeño, del bco. de Valdecasuar; la anilla amarilla se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 24-5 (R), 26-7 (en el G.I. de Valdecasuar, cerca del Nº 15; la anilla amarilla se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2012.- 25-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 19-7 (en el nido Nº 15, sin pollo, del barranco de Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 28-7 (R), 12-8 (en el nido Nº 15, sin pollo, del barranco de Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 18-11 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda
Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R; con anilla de metal), 8-11 (Peña Portillo), 9-11 (Peña Portillo).
Observaciones comunicadas en 2015.- 8-11 (Peña Portillo).

180.- Anilado de pollo, en el nido Nº 15 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 10 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 21-6 (C; fotografiado).
Observaciones comunicadas en 2008.- 15-4 (C).

183.-Anillado de pollo, en el nido Nº 14 de El Corralón, el 11 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 19-2 (R), 21-2 (R), 26-2 (R), 6-3 (R), 20-6 (R), 7-8 (R), 11-8 (R), 21-8 (R), 28-8 (R), 30-8 (R), 2-9 (R), 6-9 (R), 22-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 8-1(R), 12-1 (R), 22-1 (R), 31-1 (R), 16-2 (R), 22-2 (R), 26-2 (R), 5-3 (R), 12-3 (R), 11-7 (R), 17-7 (R), 27-7 (R), 28-7 (R), 18-8 (R), 19-8 (R), 21-8 (R), 25-8 (R), 28-8 (R), 5-9 (R), 6-9 (R), 24-10 (R), 28-10 (R), 1-11 (R), 22-11 (R), 26-11 (R), 23-12 (R), 27-12 (R), 28-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 5-1 (R), 8-1 (R), 9-3 (R), 1-4 (R), 4-4 (R), 6-4 (R), 16-4 (R), 17-4 (R), 4-5 (R), 20-5 (R), 1-6 (R), 25-6 (R), 28-6 (R), 3-7 (R), 7-7 (R), 9-7 (R), 14-7 (R), 25-7 (R), 31-8 (R), 2-9 (R), 8-9 (R), 14-9 (R), 15-9 (R), 17-9 (R), 23-9 (R), 28-9 (R), 15-10 (R), 24-10 (R), 26-10 (R), 2-11 (R), 6-11 (R), 12-11 (R), 15-11 (R), 3-12 (R), 21-12 (R) (en dos festines), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 7-1 (R), 9-1 (R), 21-1 (R), 26-1 (R), 1-2 (R), 16-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R), 4-3 (R), 12-3 (R), 14-6 (R), 18-8 (R), 26-8 (R), 6-9 (R), 24-9 (R), 8-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 22-1 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 6-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 28-7 (R).

186.- Anillado de pollo, en el nido Nº 47 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 11 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 2-9 (R).

188.- Anillado de pollo, en el nido Nº 67 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 11 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 6-3 (R), 28-3 (R), 1-4 (R), 6-8 (R), 11-8 (R), 21-8 (R), 2-9 (R), 3-9 (R), 11-11 (en el G.I del barranco de Valdecasuar), 29-11 (R), 18-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-1 (R), 9-1 (R), 12-1 (R), 19-1 (R), 10-4 (R), 12-4 (R), 15-4 (R), 17-5 (R), 13-6 (R), 28-9 (R), 13-10 (R), 25-12 (R), 27-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 5-1 (R), 23-2 (R), 1-3 (R), 17-4 (R).

[18M] (1103248).- Anillado de pollo, en el nido Nº 44 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 11 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2010.- 22-4 (R) (sólo anilla de metal).

Anillados en 1998.-

1W0 ([1103249]).- Anillado de pollo, el 9 de mayo, en el nido Nº 37 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2012.- ¿17-3 (R)? (anilla de metal, 110¿1?249).

1W2.- Anillado de pollo, el 9 de mayo, en el nido Nº 22 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R), 13-1 (R), 23-1 (R), 15-2 (R), 26-2 (R), 6-3 (R), 4-4 (R), 20-4 (R), 26-5 (R), 9-7 (R), 6-8 (R), 11-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 30-8 (R), 2-9 (R), 3-9 (R), 6-9 (R), 13-11 (R) (fotografiado), 29-11 (R), 4-12 (R), 11-12 (R), 18-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 22-1 (R), 31-1 (R), 13-2 (R), 16-2 (R), 18-2 (R), 26-2 (R), 3-3 (R), 8-3 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 14-3 (R), 7-4 (R), 9-4 (R), 10-4 (R), 12-4 (R), 15-4 (R), 24-4 (R) 29-4 (R), 30-4 (R), 8-5 (R), 17-5 (R), 24-5 (R), 28-5 (R), 19-6 (R), 20-6 (R), 11-7 (R), 16-7 (R), 29-7 (R), 17-8 (en el G. I. del barranco de Valdecasuar), 27-8 (R), 4-9 (R), 5-9 (R), 6-9 (R), 28-9 (R), 20-10 (R), 24-10 (R), 1-11 (R), 15-11 (R), 14-12 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 2-1 (R), 5-1 (R), 28-1 (R), 20-2 (R), 23-2 (R) (fot.; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 9-3 (R), 13-3 (R), 27-3 (R), 31-3 (R), 6-4 (R), 7-4 (R), 8-4 (R), 14-4 (R), 20-4 (R), 23-4 (R), 4-5 (R), 7-5 (R), 19-5 (R), 20-5 (R), 22-5 (R), 23-5 (R), 27-5 (R), 1-6 (R), 6-6 (R), 11-6 (R), 12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R), 25-6 (R), 27-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 3-7 (R), 9-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 15-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R), 21-7 (R), 23-7 (se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; margen izquierda, G. I., del barranco de Valdecasuar), 24-7 (R), 25-7 (R), 27-7 (R), 4-8 (R), 5-8 (R), 12-8 (R), 17-8 (R), 26-8 (R), 31-8 (R), 2-9 (R), 8-9 (R), 9-9 (R), 15-9 (R), 20-9 (R), 28-9 (R), 17-10 (R), 2-11 (R), 12-11 (R), 17-11 (R), 26-11 (R), 16-12 (R), 21-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 14-1 (R), 25-1 (R), 20-2 (R), 2-3 (R), 5-3 (R), 12-3 (R), 26-3 (R), 5-4 (R), 8-4 (R), 9-4 (R), 13-4 (R), 22-4 (R), 27-4 (R), 15-5 (R), 21-5 (R), 14-6 (R), 17-6 (R), 27-6 (R), 1-7 (R), 2-7 (R), 7-7 (R), 2-8 (R), 9-8 (R), 6-9 (R), 11-9 (R), 24-9 (R), 27-9 (R), 5-10 (R), 8-10 (R), 13-10 (R), 14-11 (R), 16-11 (R) (con anilla de metal en la pata derecha; fot.), 23-11 (R), 20-12 (R), 27-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 2-1 (R), 3-1 (R), 17-1 (R), 18-1 (R), 5-2 (R), 9-2 (R), 3-3 (R), 11-4 (R), 8-5 (R), 27-5 (R), 13-11 (Valdecasuar m. i. 3, Grupo I), 14-11 (R) (la anilla amarilla, en la pata izqda.), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 27-2 (R), 17-3 (R), 13-5 (en el nido Nº 9, con pollo, del barranco de Valdecasuar, m. i.; se lee de abajo arriba; la anilla amarilla, en la pata izquierda), 31-7 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 19-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 24-7 (R) (tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda), 18-11 (R) (foto; misma observación).
Observaciones comunicadas en 2014.- 16-7 (en el Grupo I del barranco de Valdecasuar, a la izqda. del nido Nº 9; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal), 21-7 (R) (tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal).

Puede verse una foto del buitre con anilla 1W2, obtenida por Elías Gomis Martín el 16 de noviembre de 2010, en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 280. Puede verse otra foto, obtenida por Alfonso Lario Doylataguerra el 18 de noviembre de 2013, en la presente **Hoja Informativa**, pág. 475.

1W6.- Anillado de pollo, el 9 de mayo, en el nido Nº 64 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 2-4 (R), 4-4 (R), 3-6 (C), 6-8 (R), 21-8 (R), 8-9 (R), 8-12 (R), 11-12 (R), 22-12 (R), 27-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 9-1 (R), 12-1 (R), 13-2 (R), 16-2 (R), 18-2 (R), 26-2 (R), 3-3 (R), 5-3 (R), 8-3 (R), 12-3 (R), 7-4 (R), 29-4 (R), 1-5 (R), 11-5 (R), 12-6 (R), 1-7 (R), 11-7 (R), 17-7 (R), 13-8 (R), 21-8 (R), 27-8 (R), 16-9 (R), 7-10 (R), 24-10 (R), 9-11 (P. P.), 22-11 (R), 26-11 (R), 8-12 (R), 14-12 (R), 25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 18-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R), 23-4 (R), 24-4 (R), 4-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R), 25-6 (R), 7-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 21-7 (R), 24-7 (R), 25-7 (R), 12-8 (R), 17-8 (R), 22-8 (R), 31-8 (R), 15-9 (R), 28-9 (R), 17-10 (R), 31-10 (R), 15-11 (R), 26-11 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R), 20-1 (R), 30-1 (R), 1-3 (R), 24-3 (R), 9-4 (R), 12-4 (R), 13-4 (R), 15-4 (R), 27-4 (R), 28-4 (R), 19-5 (R), 27-5 (R), 24-6 (R), 29-6 (R), 1-7 (R), 2-7 (R), 6-7 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 13-7 (R), 30-7 (R), 14-8 (R), 23-8 (R), 11-9 (R), 16-11 (R; fot.).
Observaciones comunicadas en 2011.- 15-2 (R), 3-3 (R), 19-7 (Peñalba, sobre la piedra del Nº 12; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2012.- 27-2 (R) (con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda), 12-5 (en el nido Nº 12 de Peñalba, junto al pollo; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- El 27-7, en R, Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF, encuentra en el suelo la anilla de metal, 1101855.

Puede verse otra foto del buitre con anilla 1W6, obtenida por Raúl González Rodríguez el 16 de noviembre de 2010, en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 281.

1W7.- Anillado de pollo, el 9 de mayo, en el nido Nº 3 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 15-2 (R), 2-4 (R), 13-11 (R) (fotografiado).
Observaciones comunicadas en 2009.- 4-6 (R), 15-6 (R), 22-8 (R).

1W8.- Anillado de pollo, el 9 de mayo, en el nido Nº 69 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2009.- 18-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 8-5 (Peñalba; no es seguro; la anilla amarilla, en la pata izquierda; con anilla de metal).

1WA.-Anillado de pollo, en el nido Nº 12 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 9 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 23-1 (R), 15-2 (R), 21-2 (R), 20-4 (R), 26-5 (R), 12-6 (R), 20-6 (R), 9-7 (R), 6-8 (R), 17-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 28-8 (R), 3-9 (R), 6-9 (R), 7-9 (R), 8-9 (R), 9-11 (R), 27-11 (R), 28-11 (R), 2-12 (R), 7-12 (R), 18-12 (R), 22-12 (R), 27-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 8-1 (R), 9-1 (R), 12-1 (R), 12-2 (R), 13-2 (R), 28-2 (R), 5-3 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 17-3 (R), 31-3 (R), 2-4 (R), 7-4 (R), 15-4 (R), 18-4 (R), 24-4 (R), 25-4 (R), 29-4 (R), 30-4 (R), 8-5 (R), 18-5 (R), 24-5 (R), 28-5 (R), 30-5 (R), 16-6 (R), 11-7 (R), 16-7 (R), 22-7 (R), 1-8 (R), 21-8 (R), 25-8 (R), 4-9 (R), 16-9 (R), 29-9 (R), 7-10 (R), 9-10 (R), 13-10 (R), 20-10 (R), 24-10 (R), 28-10 (R), 10-11 (R), 22-11 (R), 29-11 (R), 8-12 (R), 10-12 (R),

14-12 (R), 16-12 (R), 25-12 (R), 27-12 (R), 28-12 (R), 29-12 (R), 31-12 (R), 21-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 2-1 (R), 6-1 (R), 8-1 (R), 28-1 (R), 1-2 (R), 3-2 (R), 6-2 (R), 12-2 (R), 15-2 (R), 18-2 (R), 1-3 (R), 9-3 (R), 31-3 (R), 4-4 (R), 8-4 (R), 11-4 (R), 14-4 (R), 18-4 (R), 20-4 (R), 23-4 (R), 24-4 (R), 1-5 (R), 6-5 (R), 7-5 (R), 8-5 (R), 15-5 (R), 19-5 (R), 20-5 (R), 23-5 (R), 27-5 (R), 1-6 (R), 11-6 (R) (se lee de arriba abajo; con anilla de metal en pata dcha.) (en dos festines), 12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R) (en dos festines), 22-6 (R), 25-6 (R), 27-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 7-7 (R), 9-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R) (se lee de arriba abajo), 21-7 (R), 25-7 (R), 3-8 (R), 6-8 (R), 10-8 (R), 12-8 (R), 17-8 (R), 19-8 (R), 20-8 (R), 28-8 (R), 31-8 (R), 2-9 (R), 8-9 (R), 15-9 (R), 17-9 (R), 20-9 (R), 7-10 (R), 24-10 (R) (en dos festines), 26-10 (R), 31-10 (R), 9-11 (R), 12-11 (R), 15-11 (R), 16-11 (R) (se lee de arriba abajo), 17-11 (R), 27-11 (R), 29-11 (R), 3-12 (R), 14-12 (R), 16-12 (R), 21-12 (R) (en dos festines).

Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R), 13-1 (R), 20-1 (R), 24-1 (R), 26-1 (R), 5-2 (R), 11-2 (R), 23-2 (R), 5-3 (R), 28-3 (R), 29-3 (R), 31-3 (R), 12-4 (R), 22-4 (R), 28-4 (R), 2-5 (R), 5-5 (R), 17-5 (R), 19-5 (R), 27-5 (R), 3-6 (R), 14-6 (R), 15-6 (R), 17-6 (R), 23-6 (R), 30-7 (R), 2-8 (R), 9-8 (R), 26-8 (R), 30-8 (R), 6-9 (R) (en dos festines), 11-9 (R), 8-10 (R), 12-10 (R), 13-10 (R), 31-10 (R), 14-11 (R), 5-12 (R), 25-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 8-1 (R), 17-1 (R), 22-1 (R), 29-1 (R), 9-2 (R), 15-2 (R), 27-2 (R), 8-3 (R), 14-3 (R).

1WH ([1101862]).- Anillado de pollo, en el nido Nº 10 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 9 de mayo.

Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R), 13-1 (R), 15-2 (R), 26-2 (R), 8-3 (R), 24-5 (R), 14-6 (R), 15-6 (R), 9-7 (R), 16-7 (R), 6-8 (R), 7-8 (R), 17-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 28-8 (R), 2-9 (R), 3-9 (R), 7-9 (R), 8-9 (R), 9-11 (R), 11-11 (en Peña Portillo), 27-11 (R), 28-11 (R), 29-11 (R), 7-12 (R), 18-12 (R), 22-12 (R), 27-12 (R), 30-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2008.- 2-1 (R), 5-1 (R), 8-1 (R), 9-1 (R), 17-1 (R), 25-1 (R), 31-1 (R), 5-2 (R), 12-2 (R), 13-2 (R), 16-2 (R), 18-2 (R), 22-2 (R), 26-2 (R), 5-3 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 14-3 (R), 17-3 (R), 24-3 (R), 31-3 (R), 4-4 (R), 9-4 (R), 10-4 (R), 15-4 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 11-7 (R) (sólo tiene anilla de metal, 1101862).

Observaciones comunicadas en 2011.- 12-11 (Peña Portillo).

Observaciones comunicadas en 2013.- 11-12 (R; sólo anilla de metal; se le coloca la anilla amarilla PCM).

Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R; tiene la anilla amarilla PCM, que se lee de arriba abajo, en la pata izquierda; con anilla de metal).

Observaciones comunicadas en 2017.- 24-4 (R).

Observaciones comunicadas en 2018.- 13-8 (R; tiene la anilla amarilla PCM, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal), 22-8 (R; tiene la anilla amarilla PCM en la pata izquierda; con anilla de metal), 16-9 (R; tiene la anilla amarilla PCM, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda).

1WJ ([1101862]).- Anillado de pollo, en el nido Nº 74 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 9 de mayo.

Observaciones comunicadas en 2009.- 17-11 (R) (sólo tiene anilla de metal, 1101864).

1WP.- Anillado de pollo, en el nido Nº 9 de El Corralón, el 10 de mayo.

Observaciones comunicadas en 2007.- 23-1 (C) (fot.).

1WT.- Anillado de pollo, en el nido Nº 15 de El Corralón, el 10 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 3-6 (C), 8-6 (en el Grupo I del barranco de Valdecasuar).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 25-4 (R)c.
Observaciones comunicadas en 2009.- 4-6 (R), 14-7 (R), 19-8 (R), 3-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 20-1 (R), 24-6 (R).

1AT.- Anillado de pollo, en el nido Nº 9 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 10 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 12-6 (C), 18-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 9-1 (R), 29-11 (R), 10-12 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 1-3 (R), 6-5 (R), 7-5 (R), 4-6 (R), 11-6 (R), 19-6 (R), 3-7 (R), 7-7 (R), 9-7 (R) (con anilla de metal en pata dcha.), 11-7 (R), 14-7 (R), 24-7 (R), 3-8 (R), 14-9 (R), 28-9 (R), 26-10 (R), 6-11 (R), 15-11 (R), 26-11 (R), 21-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 14-1 (R), 20-1 (R), 5-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R), 28-4 (R), 15-5 (R), 14-6 (R), 17-6 (R), 24-6 (R), 1-7 (R), 2-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R), 21-7 (cerca del nido Nº 63 de V.A.D., con pollo; la anilla amarilla se lee de abajo arriba; el buitre tiene anilla de metal en la pata derecha), 6-9 (R), 12-10 (R), 23-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 5-2 (R), 8-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 25-4 (R).

Anillados en 1999.-

250.- Anillado de pollo, el 8 de mayo, en el nido Nº 77 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2010.- 24-9 (R).

252.- Anillado de pollo, el 8 de mayo, en el nido Nº 22 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 2-5 (C).
Observaciones comunicadas en 2008.- 3-3 (R), 12-3 (R), 17-3 (R), 25-4 (R), 9-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 26-6 (R), 10-7 (R), 16-11 (R; fot.; con anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2012.- Ap. VI (Atauta, Soria; cuadrícula VL89).

Puede verse una foto del buitre con anilla 252, obtenida por Elías Gomis Martín el 16 de noviembre de 2010, en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 283.

253 (con anilla de metal 1102122).- Anillado de pollo, el 8 de mayo, en el nido Nº 23 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 8-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 7-5 (R) (no tiene anilla amarilla), 12-6 (R) (anilla de metal), 12-11 (R) (anilla de metal), 26-11 (R) (anilla de metal).

255.- Anillado de pollo, el 8 de mayo, en el nido Nº 60 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2009.- 11-6 (R) (ad. no viejo; la anilla amarilla, en la pata dcha., se lee de abajo arriba; no tiene anilla de metal).

258 (con anilla de metal 1102128).- Anillado de pollo, el 8 de mayo, en el nido Nº 3 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 26-5 (R), 20-6 (R), 21-6 (C), 6-8 (R), 16-8 (R), 28-8 (R), 3-9 (R), 6-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2008 (anilla de metal, 1102128).- 15-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2009 (anilla de metal, 1102128).- 15-5 (R) (no tiene anilla amarilla), 3-7 (R) (anilla de metal), 12-11 (R) (anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-11 (Peña Portillo) (?).
Observaciones comunicadas en 2016.- 12-11 (Peña Portillo).

25A.-Anillado de pollo, en el nido Nº 25 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 8 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-11 (P. F. dcha.).

25F.-Anillado de pollo, en el nido Nº 15 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 8 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2008.- 11-9 (R), 24-9 (R).

25L.-Anillado de pollo, en el nido Nº 12 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 8 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R), 13-1 (R), 23-1 (R), 19-2 (R), 6-3 (R), 6-8 (R), 16-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 28-8 (R), 30-8 (R), 3-9 (R), 6-9 (R), 8-9 (R), 10-11 (Peña de la Zorra), 27-11 (R), 29-11 (R), 7-12 (R), 8-12 (R), 22-12 (R), 27-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 2-1 (R), 5-1 (R), ¿9-1 (R)?, 12-2 (R), 16-2 (R), 22-2 (R), 26-2 (R), 3-3 (R), 8-3 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 2-4 (R), 7-4 (R), 15-4 (R), 29-4 (R), 3-5 (R), 8-5 (R), 11-5 (R), 18-5 (R), 30-5 (R), 11-7 (R), 17-7 (R), 13-8 (R), 21-8 (R), 25-8 (R), 27-8 (R), 6-9 (R), 16-9 (R), 18-9 (R), 24-9 (R), 28-9 (R), 9-10 (R), 20-10 (R), 1-11 (R), 19-11 (R), 22-11 (R), 26-11 (R), 29-11 (R), 8-12 (R), 25-12 (R), 28-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 6-1 (R), 8-1 (R), 21-1 (R), 28-1 (R), 6-2 (R), 15-2 (R), 20-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R), 1-3 (R), 5-3 (R), 9-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 27-3 (R), 31-3 (R), 8-4 (R), 11-4 (R), 23-4 (R), 24-4 (R), 4-5 (R), 7-5 (R), 25-6 (R), 27-6 (R), 9-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 23-7 (margen izqda., G.I., del bco. de Valdecasuar; la anilla amarilla, en la pata ¿izqda.?, se lee de abajo arriba), 25-7 (R), 3-8 (R), 10-8 (R), 12-8 (R), 22-8 (R), 24-8 (R), 28-8 (R), 2-9 (R), 14-9 (R), 15-9 (R), 17-9 (R), 25-9 (R), 28-9 (R), 15-10 (R), 29-10 (R), 2-11 (R), 9-11 (R), 12-11 (R), 23-11 (R), 25-11 (R), 27-11 (R), 29-11 (R), 3-12 (R), 14-12 (R), 16-12 (R), 21-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R), 14-1 (R), 20-1 (R), 21-1 (R), 23-2 (R), 5-3 (R), 26-3 (R), 31-3 (R), 6-4 (R), 9-4 (R), 15-4 (R), 17-4 (R), 27-4 (R), 28-4 (R), 2-5 (R), 5-5 (R), 17-5 (R), 19-5 (R), 9-6 (R), 15-6 (R), 17-6 (R), 20-6 (R), 22-6 (R), 29-6 (R), 2-7 (R), 24-7 (R), 4-8 (R), 9-8 (R), 6-9 (R), 5-10 (R), 15-10 (R), 29-10 (R), 5-12 (R), 7-12 (R), 13-12 (R), 25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 7-1 (R), 15-2 (R), 14-11 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal ¿izqda.?).
Observaciones comunicadas en 2012.- 25-4 (R), 14-5 (ceba al pollo del nido Nº 28 de Peña Fueros; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 23-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 18-11 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2015.- 12-5 (nido Nº 28 de P. Fueros, con pollo; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).

25J.-Anillado de pollo, en el nido Nº 52 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 8 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2010.- 17-10 (R).

25M.- Anillado de pollo, el 8 de mayo, en el nido Nº 78 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 20-1 (C) (fotografiado; tiene la anilla amarilla en la pata derecha, y la anilla metálica en la pata izquierda; se observa en la foto que varios de los dedos de la pata derecha están amputados), 27-1 (C) (fot.), 21-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 8-10 (R).

25N.- Anillado de pollo, el 8 de mayo, en el nido Nº 10 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).

Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 4-2 (C), 15-2 (R), 26-2 (R), 14-6 (R), 9-7 (R), 6-8 (R), 7-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 28-8 (R), 2-9 (R), 6-9 (R), 7-9 (R), 10-11 (en Peña Portillo), 11-11 (en Peña Portillo), 28-11 (R), 11-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 12-1 (R), 22-1 (R), 16-2 (R), 5-3 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 17-3 (R), 16-4 (R), 18-4 (R), 29-4 (R), 30-4 (R), 17-5 (R) (dos veces), 18-5 (R), 26-5 (R), 12-6 (R), 20-6 (R), 22-7 (R), 27-7 (R), 29-7 (R), 13-8 (R), 18-8 (R), 19-8 (R), 21-8 (R), 28-8 (R), 16-9 (R), 29-9 (R), 9-10 (R), 20-10 (R), 24-10 (R), 26-10 (R), 28-10 (R), 5-11 (R), 8-11 (P.F.dcha.), 22-11 (R), 10-12 (R), 27-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 6-1 (R), 15-1 (R), 6-2 (R), 12-2 (R), 18-2 (R), 7-3 (R), 12-3 (R), 31-3 (R), 1-4 (R), 4-4 (R), 11-4 (R), 13-4 (R), 23-4 (R), 24-4 (R), 1-5 (R), 4-5 (R), 5-5 (R), 7-5 (R), 8-5 (R), 15-5 (R), 19-5 (R), 20-5 (R), 26-5 (R), 31-5 (R), 1-6 (R), 6-6 (R), 11-6 (R) (en dos festines), 15-6 (R), 19-6 (R), 22-6 (R), 25-6 (R), 30-6 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R), 27-7 (R), 6-8 (R), 10-8 (R), 19-8 (R), 20-8 (R), 26-8 (R), 27-8 (R), 31-8 (R), 5-9 (R), 8-9 (R), 9-9 (R), 15-9 (R), 25-9 (R), 28-9 (R), 27-10 (R), 28-10 (R), 29-10 (R), 2-11 (R), 9-11 (R), 15-11 (R), 29-11 (R), 21-12 (R), 24-12 (R), 29-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 14-1 (R), 19-1 (R), 24-1 (R), 5-2 (R), 26-2 (R), 1-3 (R), 21-3 (R), 31-3 (R), 3-4 (R), 5-4 (R), 6-4 (R), 9-4 (R), 26-4 (R), 27-4 (R), 19-5 (R), 21-5 (R), 27-5 (R), 3-6 (R), 14-6 (R), 29-6 (R), 10-7 (R), 13-7 (R), 21-7 (R), 24-7 (R), 30-7 (R), 14-8 (R), 23-8 (R), 1-9 (R), 6-9 (R), 15-9 (R), 18-9 (R), 22-9 (R), 29-10 (R), 3-11 (R), 23-11 (R), 29-11 (R), 2-12 (R), 25-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 9-2 (R), 10-3 (R), 12-11 (Peña Portillo), 13-11 (Peña Portillo).

Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 21-1 (R).

25R.- Anillado de pollo, el 8 de mayo, en el nido Nº 40 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).

Observaciones comunicadas en 2009.- 27-6 (tiene un pollo muy grande en las hoces del Duratón, cerca de la ermita de San Frutos).

25V.-Anillado de pollo, en el nido Nº 6 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 8 de mayo.

Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R), 13-1 (R), 15-2 (R), 21-2 (R), 26-2 (R), 4-4 (R), 20-6 (R), 9-7 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 3-9 (R), 6-9 (R), 8-9 (R), 29-11 (R), 18-12 (R), 22-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2008.- 8-1 (R), 9-1 (R), 5-2 (R), 8-2 (R), 12-2 (R), 16-2 (R), 28-2 (R), 3-3 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 14-3 (R), 2-4 (R), 7-4 (R), 10-4 (R), 15-4 (R), 18-4 (R), 24-4 (R), 25-4 (R), 29-4 (R), 1-5 (R), 5-5 (R), 8-5 (R), 17-5 (R), 30-5 (R), 17-7 (R), 22-7 (R), 13-8 (R), 17-8 (en el G. I. del barranco de Valdecasuar), 19-8 (R), 21-8 (R), 27-8 (R), 5-9 (R), 28-9 (R), 29-9 (R), 2-10 (R), 9-10 (R), 26-10 (R), 15-11 (R), 26-11 (R), 29-11 (R), 8-12 (R), 10-12 (R), 16-12 (R), 25-12 (R), 28-12 (R), 29-12 (R), 31-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 5-1 (R), 6-1 (R), 17-1 (R), 21-1 (R), 1-2 (R), 12-2 (R), 15-2 (R), 20-2 (R), 27-2 (R), 5-3 (R), 7-3 (R), 9-3 (R), 11-3 (R), 25-3 (R), 27-3 (R), 1-4 (R), 7-4 (R), 8-4 (R), 11-4 (R), 14-4 (R), 16-4 (R), 17-4 (R), 18-4 (R), 20-4 (R), 24-4 (R), 7-5 (R), 8-5 (R), 19-5 (R), 26-5 (R), 1-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R), 22-6 (R), 25-6 (R), 27-6 (R), 28-6 (R), 3-7 (R), 7-7 (R), 9-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 27-7 (R), 3-8 (R), 10-8 (R), 17-8 (R), 19-8 (R), 22-8 (R), 24-8 (R), 26-8 (R), 27-8 (R), 8-9 (R), 20-9 (R), 28-9 (R), 7-10 (R), 19-10 (R), 27-10 (R), 31-10 (R), 2-11 (R), 9-11 (R),

15-11 (R), 25-11 (R), 29-11 (R), 3-12 (R), 16-12 (R), 25-12 (R), 30-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R), 18-1 (R), 20-1 (R), 21-1 (R), 24-1 (R), 5-2 (R), 16-2 (R), 20-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R) (en dos festines), 4-3 (R), 7-3 (R), 8-3 (R), 26-3 (R), 29-3 (R), 31-3 (R), 3-4 (R), 6-4 (R), 12-4 (R), 15-4 (R), 22-4 (R), 28-4 (R), 15-5 (R), 19-5 (R), 31-5 (R), 14-6 (R), 15-6 (R), 17-6 (R), 23-6 (R), 14-7 (R), 30-7 (R), 4-8 (R), 9-8 (R), 23-8 (R), 26-8 (R), 6-9 (R) (en dos festines), 18-9 (R), 23-9 (R), 27-9 (R), 5-10 (R), 8-10 (R), 12-10 (R), 18-10 (R), 2-12 (R), 27-12 (R), 31-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 3-1 (R), 7-1 (R), 17-1 (R), 22-1 (R), 5-2 (R), 27-3 (R), 14-11 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).

Observaciones comunicadas en 2012.- 26-7 (en el nido Nº 6 del barranco de Valdecasuar [margen Izquierda, Grupo I]; se lee de abajo arriba; en la pata derecha).

Observaciones comunicadas en 2013.- 6-11 (R).

25U.- Anillado de pollo, el 8 de mayo, en el nido Nº 16 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).

Observaciones comunicadas en 2012.- 17-3 (R).

25W.- Anillado de pollo, el 9 de mayo, en el nido Nº 67 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).

Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R).

Observaciones comunicadas en 2008.- 8-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 10-8 (R).

25X.-Anillado de pollo, en el nido Nº 47 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 9 de mayo.

Observaciones comunicadas en 2010.- 22-4 (R).

26A.-Anillado de pollo, en el nido Nº 55 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 9 de mayo.

Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R), 13-1 (R), 2-2 (R), 15-2 (R), 19-2 (R), 26-2 (R), 8 y 9-V (en el nido Nº 10 del bco. de Valdecasuar, con pollo), 8-VI (en el nido Nº 10 de Valdecasuar, fracasado), 14-6 (R), 6-8 (R), 17-8 (R), 21-8 (R), 8-9 (R), 2-12 (R), 22-12 (R), 27-12 (R), 30-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2008.- 2-1 (R), 8-1(R), 9-1 (R), 12-1 (R), 31-1 (R), 5-2 (R), 12-2 (R), 13-2 (R), 16-2 (R), 10-4 (R), 12-4 (R), 24-4 (R), 16-7 (R), 1-8 (R), 6-9 (R), 16-12 (R), 25-12 (R), 29-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 8-1 (R), 28-1 (R), 3-2 (R), 15-2 (R), 18-2 (R), 20-2 (R), 27-2 (R), 1-3 (R), 5-3 (R), 7-3 (R), 27-3 (R), 4-4 (R), 7-4 (R), 1-5 (R), 4-5 (R), 6-5 (R), 7-5 (R), 8-5 (R), 26-5 (R), 25-6 (R), 30-6 (R), 7-7 (R), 9-7 (R), 21-7 (R), 15-9 (R), 20-9 (R), 27-10 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 13-1 (R) (en dos festines), 24-1 (R), 28-1 (R), 5-2 (R), 18-2 (R), 23-2 (R), 9-3 (R), 11-3 (R), 12-3 (R), 21-3 (R), 29-3 (R), 31-3 (R), 6-4 (R), 8-4 (R), 9-4 (R), 13-4 (R), 22-4 (R), 26-4 (R), 28-4 (R), 17-5 (R), 19-5 (R), 24-5 (R), 27-5 (R), 10-6 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 14-6 (R), 27-6 (R), 1-7 (R), 7-7 (R), 24-7 (R), 4-8 (R), 9-9 (R), 24-9 (R), 15-10 (R), 20-12 (R), 25-12 (R), 30-12 (R), 31-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 5-1 (R), 7-1 (R), 8-1 (R), 14-1 (R), 17-1 (R), 18-1 (R), 27-1 (R), 29-1 (R) (en dos festines), 9-2 (R), 15-2 (R), 27-2 (R), 3-3 (R), 22-4 (R), 11-5 (cerca del nido Nº 40 del barranco de Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 11-5 (R), 26-7 (cerca del nido Nº 10 del barranco de Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).

Observaciones comunicadas en 2012.- 6-3 (R), 17-3 (R), 25-4 (R), 23-5 (R).

26C.- Anillado de pollo, en el nido Nº 80 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 9 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 26-5 (R), 1-6 (en el nido Nº 11 del 2º Cañón, con un pollo), 28-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 2-1 (R), 5-1 (R), 12-2 (R), 10-11 (R), 28-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 26-2 (R), 24-3 (R), 16-12 (R), 24-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 11-1 (R), 13-1 (R), 19-1 (R), 9-3 (R), 11-3 (R), 15-4 (R), 26-4 (R), 17-5 (R), 2-7 (R), 13-7 (R), 4-8 (R), 16-11 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda; fotografiado), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 3-1 (R), 10-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 17-3 (R), 21-1 (R), 28-3 (R), 25-4 (R), 23-5 (R), 30-5 (R), 30-8 (R; la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R; se lee de abajo arriba).
Observaciones comunicadas en 2015.- 15-6 (R; la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal en la pata izquierda), 22-7 (R).
Observaciones comunicadas en 2017.- 24-8 (R; la anilla amarilla, en la pata derecha; sin anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2018.- 11-11 (en lo alto de Peña Portillo).

Puede verse una foto del buitre con anilla 26C, obtenida por Elías Gomis Martín el 16 de noviembre de 2010, en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 287.

Anillados en 2000.-

24T.- Anillado de pollo, el 9 de mayo, en el nido Nº 12 de La Hocecilla.
Observaciones comunicadas en 2007.- 21-8 (R), 28-8 (R), 2-9 (R), 3-9 (R), 6-9 (R), 7-9 (R), 8-9 (R), 18-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 25-4 (R), 1-7 (R), 10-11 (R), 28-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 31-3 (R), 7-4 (R), 19-6 (R), 14-7 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 14-1 (R), 5-2 (R), 20-2 (R), 27-5 (R), 20-6 (R), 18-8 (R), 23-9 (R), 13-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 22-1 (R).

24V.-Anillado de pollo, en el barranco de Valdecasuar (margen derecha), el 13 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2009.- 28-9 (R), 2-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 17-4 (R).

24C.- Anillado de pollo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 6 de mayo.
Encontrado muerto, en el comedero de Campo de San Pedro, el 7-2-10 (por Manuel López Lázaro).
Tal como se indicó en la **Hoja Informativa Nº 31** (págs. 145, 152), este buitre fue anillado de pollo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 6 de mayo de 2000. Fue visto, en el comedero de buitres del Refugio de Montejo, el 12 de julio de 2000 (por Juan Prieto Martín, Olga Linares, Juncal Domingo, Miguel Ángel López y Jorge Díaz), el 4 de octubre de 2000 (por Juan Prieto Martín, Carmen Fernández, Mónica Nuevo, Jorge Arias Pozo, y Cristina Roldán), y el 8 de abril de 2003 (por Álvaro Camiña Cardenal e Ian McArthy). Posteriormente fue visto, en el comedero de buitres de Campo de San Pedro, por Manuel López Lázaro, el 1 de mayo de 2003, el 14 de abril de 2006, y el 26 de noviembre de 2006 (fotografiado).

240.- Anillado de pollo, el 6 de mayo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-1 (R), 9-7 (R), 6-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 28-8 (R), 30-8 (R), 6-9 (R), 7-9 (R), 8-9 (R), 11-11 (en el G.I del barranco de Valdecasuar), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 8-1 (R), 9-1 (R), 8-2 (R), 12-2 (R), 16-2 (R), 18-2 (R), 22-2 (R), 26-2 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 2-4 (R), 4-4 (R), 7-4 (R), 9-4 (R), 10-4 (R), 5-5 (R), 8-5 (R), 18-5 (R), 19-5 (R), 12-6 (R), 20-6 (R), 1-7 (R), 11-7 (R), 28-7 (R), 29-7 (R), 13-8 (R), 14-8 (R), 18-8 (R), 19-8 (R), 21-8 (R), 25-8 (R), 27-8 (R), 4-9 (R), 5-9 (R), 6-9 (R), 16-9 (R),

28-9 (R), 29-9 (R), 2-10 (R), 7-10 (R), 20-10 (R), 26-10 (R), 28-10 (R), 1-11 (R), 5-11 (R), 10-11 (R), 15-11 (R), 19-11 (R), 26-11 (R), 10-12 (R), 14-12 (R), 16-12 (R), 23-12 (R), 25-12 (R), 27-12 (R), 29-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 17-1 (R), 26-1 (R), 1-2 (R), 6-2 (R), 15-2 (R), 18-2 (R), 1-3 (R) (con la anilla amarilla en la pata izqda, y con anilla de metal en la pata derecha), 9-3 (R), 1-4 (R), 11-4 (R), 14-4 (R), 17-4 (R), 20-4 (R), 24-4 (R), 1-5 (R), 5-5 (R), 7-5 (R), 8-5 (R), 19-5 (R), 20-5 (R), 22-5 (R), 23-5 (R), 26-5 (R), 27-5 (R), 31-5 (R), 12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R) (en dos festines), 22-6 (R), 25-6 (R), 28-6 (R), 3-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 15-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R), 24-7 (R), 27-7 (R), 5-8 (R), 10-8 (R), 12-8 (R), 14-8 (R), 17-8 (R), 19-8 (R), 20-8 (R), 24-8 (R), 26-8 (R), 27-8 (R), 31-8 (R), 5-9 (R), 8-9 (R), 9-9 (R), 10-9 (R), 14-9 (R), 15-9 (R), 17-9 (R), 20-9 (R), 28-9 (R), 2-10 (R), 7-10 (R), 17-10 (R), 24-10 (R), 27-10 (R), 28-10 (R), 29-10 (R), 2-11 (R), 15-11 (R), 16-11 (R) (con anilla de metal en la pata derecha), 17-11 (R), 26-11 (R), 29-11 (R), 14-12 (R), 16-12 (R), 21-12 (R) (en dos festines), 25-12 (R), 29-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 18-1 (R), 21-1 (R), 24-1 (R), 28-1 (R), 30-1 (R), 2-2 (R), 5-2 (R), 16-2 (R), 18-2 (R), 19-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R) (en dos festines), 24-3 (R), 9-4 (R), 17-5 (R), 19-5 (R), 21-5 (R), 27-5 (R), 15-6 (R), 18-6 (R), 20-6 (R), 23-6 (R), 27-6 (R), 1-7 (R), 7-7 (R), 10-7 (R), 14-7 (R), 30-7 (R), 9-8 (R), 23-8 (R), 30-8 (R), 6-9 (R), 18-9 (R), 24-9 (R), 27-9 (R), 5-10 (R), 6-10 (R), 7-10 (R), 17-10 (R), 14-11 (R), 5-12 (R), 7-12 (R), 8-12 (R), 13-12 (R), 16-12 (R), 27-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 17-1 (R), 18-1 (R), 27-3 (R), 7-6 (R; fot.).

Observaciones comunicadas en 2012.- 11-1 (R), 17-1 (R), 17-3 (R; fot.; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izqda.; con anilla de metal), 15-4 (C), 25-4 (R), 30-5 (R), 30-8 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).

Observaciones comunicadas en 2013.- 8-9 (M; tiene la anilla amarilla en la pata izquierda), 6-11 (R).

Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R), 21-7 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata ¿derecha?; con anilla de metal).

Observaciones comunicadas en 2015.- 22-8 (R).

Observaciones comunicadas en 2016.- 22-7 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal).).

Observaciones comunicadas en 2017.- 18-7 (en el nido Nº 19 de Peña Fueros, con pollo que ahora no está; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda), 11-11 (Peña Portillo), 12-11 (Peña Portillo).

Observaciones comunicadas en 2018.- 6-5 (en el nido Nº 19 de Peña Fueros, con pollo de unos 50 días; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal), 15-7 (en el nido Nº 19 de Peña Fueros, con pollo que ahora no está; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal); 11-11 (en lo alto de Peña Portillo).

Puede verse una foto del buitre con anilla 240, obtenida por Javier Marchamalo de Blas el 17 de marzo de 2012, en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 289.

241.- Anillado de pollo, el 6 de mayo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda).

Observaciones comunicadas en 2007.- 2-4 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 1-5 (R).

244.- Anillado de pollo, el 6 de mayo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda).

Observaciones comunicadas en 2007.- 3-1 (en el nido Nº 25 de P.D.I.; J.L.L.-P.), 4-2 (C; fot.), 13-5 (C; fot.), 26-5 (R), 6-8 (R), 7-12 (R), 11-12 (R), 18-12 (R), 30-12 (C; fot.).

Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 16-2 (R), 18-2 (R), 26-2 (R), 28-2 (R), 13-3 (R), 2-4 (junto al nido Nº 8 de P.D.I.; J. L. L.-P.), 17-5 (R), 2-6 (cerca del nido vacío Nº 2 de P.D.D.; F. J.), 29-7 (R), 22-11 (R), 8-12 (R), 25-12 (R), 28-12 (C; fot.).
Observaciones comunicadas en 2009.- 28-I (llega al nido Nº 11 de P.I.), 12-2 (C) (fotografiado), 11-3 (R), 11-4 (R), 20-4 (R), 4-5 (R), ¿16-5 (Nº 11-P.D.I.)?, 20-5 (R), 23-5 (R), 6-6 (R), 11-6 (R -con anilla de metal en pata dcha.-, y C), 28-6 (R), 7-7 (R), 12-8 (R), 20-9 (R), 25-9 (R), 28-9 (R), 7-10 (R), 21-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 13-1 (R), 20-1 (R), 30-1 (R), 3-2 (P.D.I.; la anilla amarilla, en la pata izquierda), 5-2 (R), 20-2 (R), 23-2 (R), 5-3 (R), 3-4 (R), 12-4 (R), 17-4 (R), 22-4 (R), 14-6 (R), 21-7 (R), 23-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 5-2 (R), 3-3 (R), 5-3 (R), 9-3 (R), 14-3 (R), 24-3 (R), 22-4 (R), 23-5 (P.D.I., zona del Nº 8; la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda), 27-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 6-3 (R), 28-3 (R), 15-4 (C; fot.; la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda), 25-4 (R), 30-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 20-2 (P.D.I.; baja al nido Nº 1, con otro adulto; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izqda.), 20-3 (P.D.I.; baja junto al nido Nº Y´, y es expulsado; tiene la anilla amarilla en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2016.- 11-3 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2016.- 22-7 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2017.- 30-3 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 12-4 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata ¿izquierda?). 24-4 (R; no es seguro).
Observaciones comunicadas en 2018.- 25-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2019.- 28-1 (P.D.I.; la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda).

Puede verse una foto del buitre leonado con la anilla 244, con otro buitre adulto, obtenida por Fernando Alarcón García el 15 de abril de 2012, en la **Hoja Informativa Nº 38**, pág. 318.

Pueden verse otras dos fotos del buitre leonado con la anilla 244, obtenidas por Jesús Cobo Anula el 30 de marzo de 2017, en la **Hoja Informativa Nº 49**, Anexo fotográfico.

247.- Anillado de pollo, el 6 de mayo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R), 23-1 (R), 26-2 (R).
(Murió envenenado el 15/17 de marzo de 2007).

24L.- Anillado de pollo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 6 de mayo.
Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R), 13-1 (R), 28-3 (R), 2-4 (R), 20-4 (R), 24-5 (R), 9-7 (R), 6-8 (R), 11-8 (R), 17-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 28-8 (R), 30-8 (R), 3-9 (R), 6-9 (R), 7-9 (R), 8-9 (R), 29-11 (R), 8-12 (R), 22-12 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 9-1(R), 8-2 (R), 18-2 (R), 12-3 (R), 24-3 (R), 10-4 (R) 29-4 (R), 30-4 (R), 1-5 (R), 17-5 (R), 28-5 (R), 16-7 (R), 17-7 (R), 22-7 (R), 28-7 (R), 29-7 (R), 13-8 (R), 21-8 (R), 25-8 (R), 27-8 (R), 4-9 (R), 5-9 (R), 16-9 (R), 28-9 (R), 7-10 (R), 9-10 (R), 20-10 (R), 28-10 (R), 5-11 (R), 9-11 (Vald. m. i. 3 –G.I.-; vino de la zona de Peña Fueros), 10-11 (R) (fotografiado), 22-11 (R), 29-11 (R), 8-12 (R), 10-12 (R), 27-12 (R), 29-12 (R), 31-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 2-1 (R), 8-1 (R), 28-1 (R), 6-2 (R), 15-2 (R), 18-2 (R), 27-2 (R), 11-3 (R), 24-3 (R), 11-4 (R), 14-4 (R), 22-4 (R), 23-4 (R), 24-4 (R), 1-5 (R), 4-5 (R), 7-5 (R), 8-5 (R), 15-5 (R) (no tiene anilla de metal), 22-5 (R), 26-5 (R),

1-6 (R), 4-6 (R), 6-6 (R), 11-6 (R) (con la anilla amarilla en la pata izqda.), 12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R) (en dos festines), 25-6 (R), 28-6 (R), 7-7 (R), 9-7 (R) (con la anilla amarilla en la pata izqda.; no tiene anilla de metal), 11-7 (R), 14-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R), 21-7 (R), 25-7 (R), 10-8 (R), 12-8 (R), 14-8 (R), 24-8 (R), 26-8 (R), 28-8 (R), 31-8 (R), 9-9 (R), 28-9 (R), 17-10 (R), 24-10 (R), 26-10 (R), 27-10 (R), 29-10 (R), 2-11 (R), 9-11 (R), 15-11 (Valdecasuar m. i. 3 [Grupo I], al amanecer; y luego, R), 17-11 (R), 27-11 (R), 14-12 (R), 21-12 (R) (en dos festines), 24-12 (R), 30-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R), 30-1 (R), 11-2 (R), 23-2 (R), 28-3 (R), 28-4 (R), 2-5 (R), 14-5 (R), 19-5 (R), 21-5 (R), 27-5 (R), 3-6 (R), 10-6 (R) (en la pata izquierda; se lee de abajo arriba; al parecer, no tiene anilla de metal), 14-6 (R), 15-6 (R), 17-6 (R), 20-6 (R), 22-6 (R), 2-7 (R), 6-7 (R), 10-7 (R), 21-7 (R), 30-7 (R), 18-8 (R), 6-9 (R), 9-9 (R), 11-9 (R), 18-9 (R), 22-9 (R), 23-9 (R), 24-9 (R), 5-10 (R), 13-10 (R), 31-10 (R), 3-11 (R), 14-11 (en la pata izquierda; G.I. bco. Valdecasuar, al amanecer), 16-11 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha; fot.), 5-12 (R), 20-12 (R), 30-12 (R), 31-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 8-1 (R), 18-1 (R), 27-1 (R), 29-1 (R), 5-2 (R), 20-2 (R), 25-2 (R), 5-3 (R), 8-3 (R), 16-3 (R), 25-4 (R), 11-5 (R).

Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 27-2 (R) (en la pata izquierda; se lee de abajo arriba; no tiene anilla de metal; visto en dos festines), 17-3 (R: fot.; en la pata izquierda; se lee de abajo arriba; no tiene anilla de metal), 28-3 (R), 25-4 (R), 19-9 (R).

Pueden verse dos fotos del buitre con anilla 24L, ambas obtenidas en el comedero del Refugio de Montejo, una por Elías Gomis Martín el 16 de noviembre de 2010, y otra por Javier Marchamalo de Blas el 17 de marzo de 2012, en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 291.

24M.- Anillado de pollo, en el barranco de Valdecasuar (margen derecha), el 7 de mayo.

Observaciones comunicadas en 2010.- 7-10 (R).

24W.-Anillado de pollo, en el barranco de Valdecasuar (margen derecha), el 13 de mayo.

Observaciones comunicadas en 2007.- 15-2 (R), 19-2 (R), 2-4 (R), 16-7 (R), 6-8 (R), 21-8 (R), 28-8 (R), 30-8 (R), 3-9 (R), 6-9 (R), 8-9 (R), 7-12 (R), 18-12 (R), 22-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 9-1 (R), 12-2 (R), 16-2 (R), 26-2 (R), 10-3 (R), 14-3 (R), 17-3 (R), 10-4 (R), 30-4 (R), 16-6 (R), 19-6 (R), 1-8 (R), 13-8 (R), 18-8 (R), 19-8 (R), 25-8 (R), 4-9 (R), 5-9 (R), 6-9 (R), 28-9 (R), 29-9 (R), 7-10 (R), 20-10 (R), 5-11 (R), 10-11 (R) (fotografiado), 10-12 (R), 16-12 (R), 25-12 (R), 28-12 (R), 29-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 2-1 (R), 1-2 (R), 6-2 (R), 15-2 (R), 18-2 (R), 23-2 (R), 1-3 (R), 5-3 (R), 23-4 (R), 24-4 (R), 7-5 (R), 11-5 (R), 12-8 (R), 17-8 (R), 23-9 (R), 26-10 (R), 2-11 (R), 15-11 (R), 29-11 (R), 3-12 (R), 4-12 (R), 21-12 (R), 24-12 (R), 19-1 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 13-1 (R), 26-1 (R), 30-1 (R), 23-2 (R), 2-3 (R), 8-3 (R), 12-3 (R), 24-3 (R), 26-3 (R), 5-4 (R), 26-4 (R), 23-6 (R), 2-7 (R), 19-7 (R), 30-7 (R), 14-8 (R), 6-10 (R), 8-10 (R), 12-10 (R), 3-11 (R), 23-11 (R), 13-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 5-1 (R), 10-3 (R).

Observaciones comunicadas en 2012.- 28-3 (R), 25-4 (R).

Observaciones comunicadas en 2013.- 18-11 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata Derecha).

24J.- Anillado de pollo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 6 de mayo (del año 2000, no del 2004 como figuró por error en la **Hoja Informativa Nº 31**, pág. 144, donde pueden verse interesantes datos sobre este buitre).

El caso fue publicado en *Teruel* 92 (1), 2008-2009, págs. 151, 153.

[24N] 1102386 (anilla de metal).- Corresponde a la anilla amarilla 24N.- Anillado de pollo, en la margen izquierda del barranco de Valdecasuar, el 7 de mayo.

Observaciones comunicadas en 2008.- 26-2 (R), 10-11 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 7-7 (R) (anilla de metal, 1102386), 16-7 (R) (anilla de metal), 19-7 (R) (anilla de metal), 12-8 (R) (anilla de metal) 27-8 (R) (anilla de metal), 24-10 (R) (anilla de metal), 26-10 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 16-11 (R) (sólo anilla de metal, en la pata derecha).

Observaciones comunicadas en 2011.- 9-3 (R) (sólo anilla de metal).

Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R) (sólo anilla de metal, ¿11?02386, en la pata dcha.).

24R.- Anillado de pollo, el 9 de mayo, en el nido Nº 13 de La Hocecilla.

Observaciones comunicadas en 2011.- 29-1 (R).

Anillados en 2001.-

26V.- Anillado de pollo, en el nido Nº 79 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 19 de mayo.

Observaciones comunicadas en 2008.- 21-9 (C).

Observaciones comunicadas en 2010.- 19-2 (R).

265.- Anillado de pollo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 19 de mayo.

Observaciones comunicadas en 2007.- 13-5 (C).

267.- Anillado de pollo, en el nido Nº 46 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 19 de mayo.

Observaciones comunicadas en 2007.- 20-1 (C), 4-2 (C), 1-4 (C) (fot.), 2-5 (C) (fot.).

Fue encontrado muerto, y fotografiado, el 11 de octubre de 2015, a las 13 h. 5 m., en el parque eólico de "La Esperanza" cerca de Cantalojas (Guadalajara), por Juan Luis Galindo Estévez. Tenía la anilla amarilla, que se leía de abajo arriba, en la pata derecha; y tenía la anilla de metal 104085 en la otra pata.

26N.- Anillado de pollo, en el nido Nº 13 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 19 de mayo.

Observaciones comunicadas en 2008.- ¿9-11? (No es seguro; en El Corralón), 8-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 12-11 (Peña Portillo), 13-11 (Peña Portillo).

26L.- Anillado de pollo, en el nido Nº 52 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 19 de mayo.

Observaciones comunicadas en 2010.- 9-4 (R).

26M.- Anillado de pollo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 19 de mayo.

Observaciones comunicadas en 2008.- ¿18-5? (No es seguro; en el nido Nº 10 de La Hocecilla, junto al pollo; copula con otro buitre adulto, y el anillado es el que está encima).

Anillados en 2004.-

4CC.- Anillado de pollo, en el nido Nº 15 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 15 de mayo.

Observaciones comunicadas en 2007.- 21-8 (R).

Observaciones comunicadas en 2008.- 9-1 (R), 12-4 (R), 30-4 (R), 18-5 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 27-9 (R), 16-4 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 26-6 (R).

4CL.- Anillado de pollo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 15 de mayo.

Observaciones comunicadas en 2007.- 26-5 (R), 20-6 (R), 6-8 (R), 7-8 (R), 30-8 (R).

Observaciones comunicadas en 2008.- 19-1 (R), 22-1 (R), 13-2 (R), 16-2 (R), 18-2 (R), 22-2 (R), 26-2 (R), 28-2 (R), 8-3 (R), 24-3 (R), 7-4 (R), 9-4 (R), 12-4 (R), 24-4 (R), 25-4 (R), 3-5 (R), 5-7 (C), 8-5 (R), 11-5 (R), 20-6 (R), 23-6 (R), 11-7 (R), 16-7 (R), 22-7 (R),

29-7 (R), 18-8 (R), 19-8 (R), 21-8 (R), 25-8 (R), 27-8 (R), 4-9 (R), 5-9 (R), 6-9 (R), 29-11 (R), 8-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 6-2 (R), 15-2 (R), 18-2 (R), 7-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 27-3 (R), 31-3 (R), 4-4 (R), 14-4 (R), 16-4 (R), 17-4 (R), 18-4 (R), 20-4 (R), 22-4 (R), 23-4 (R), 24-4 (R), 5-5 (R), 7-5 (R), 8-5 (R), 11-5 (R), 20-5 (R), 22-5 (R), 23-5 (R), 4-6 (R), 11-6 (R), 12-6 (R), 15-6 (R), 25-6 (R), 28-6 (R), 9-7 (R) (en dos festines), 6-8 (R), 10-8 (R), 12-8 (R), 17-8 (R), 24-8 (R), 28-8 (R), 2-9 (R), 15-9 (R), 15-10 (R), 6-11 (R), 27-11 (R), 29-11 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 21-1 (R), 24-1 (R), 28-1 (R), 30-1 (R), 1-2 (R), 2-2 (R), 5-2 (R), 16-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R) (en dos festines), 3-3 (R), 4-3 (R), 7-3 (R), 8-3 (R), 12-3 (R), 24-3 (R), 26-3 (R), 3-4 (R), 17-5 (R), 17-6 (R), 23-6 (R), 29-6 (R), 30-6 (R), 1-7 (R), 2-7 (R), 7-7 (R), 10-7 (R), 13-7 (R), 21-7 (R), 30-7 (R), 2-8 (R), 9-8 (R), 18-8 (R), 23-8 (R), 5-12 (R), 8-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 17-1 (R), 18-1 (R), 29-1 (R), 9-2 (R), 15-2 (R), 3-3 (R), 5-3 (R), 8-3 (R), 10-3 (R), 24-5 (R), 31-7 (C) (fotografiado) (tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha), 14-11 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).

Observaciones comunicadas en 2012.- 4-2 (R), 6-3 (R), 28-3 (R), 23-5 (R).

Observaciones comunicadas en 2013.- 5-6 (en el Grupo I del barranco de Valdecasuar [margen izquierda]; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha).

Puede verse una foto del buitre con anilla 4CL, obtenida por Manuel López Lázaro el 31 de julio de 2011, en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 294.

4CV.-Anillado de pollo, en el nido Nº 82 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 15 de mayo.

Observaciones comunicadas en 2007.- 28-3 (R), 14-6 (R), 16-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 3-9 (R), 6-9 (R), 7-9 (R), 8-9 (R), 8-12 (R), 18-12 (R), 22-12 (R), 27-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2008.- 8-1 (R), 9-1 (R), 16-2 (R), 28-2 (R), 8-3 (R), 17-3 (R), 24-3 (R), 31-3 (R), 7-4 (R), 10-4 (R), 18-4 (R), 24-4 (R), 27-4 (R), 29-4 (R), 30-4 (R), 5-5 (R), 23-6 (R), 30-7 (R), 1-8 (R), 18-9 (R), 28-9 (R), 29-9 (R), 20-10 (R), 10-11 (R), 11-11 (R), 15-11 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 28-1 (R), 6-2 (R), 12-2 (R), 27-3 (R), 7-4 (R), 8-4 (R), 14-4 (R), 16-4 (R), 4-5 (R), 6-5 (R), 8-5 (R), 4-6 (R), 6-6 (R), 11-6 (R) (en uno o dos festines), 12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R), 24-6 (R), 25-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 3-7 (R), 7-7 (R), 9-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R), 24-7 (R), 27-7 (R), 3-8 (R), 12-8 (R), 17-8 (R), 19-8 (R), 22-8 (R), 26-8 (R), 28-8 (R), 31-8 (R), 2-9 (R), 5-9 (R), 8-9 (R), 9-9 (R), 15-9 (R), 17-9 (R), 20-9 (R), 7-10 (R), 19-10 (R), 24-10 (R) (en dos festines), 28-10 (R), 29-10 (R), 31-10 (R), 6-11 (R), 9-11 (R), 12-11 (R), 25-11 (R), 29-11 (R), 16-12 (R), 21-12 (R) (en dos festines), 24-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 13-1 (R), 5-2 (R) (en dos festines), 11-2 (R), 16-2 (R), 2-3 (R), 3-3 (R), 9-3 (R), 21-3 (R), 24-3 (R), 26-3 (R), 29-3 (R), 31-3 (R), 3-4 (R), 6-4 (R), 8-4 (R), 9-4 (R), 12-4 (R), 17-4 (R), 22-4 (R), 28-4 (R).

4CW.- Anillado de pollo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda), el 15 de mayo.

Observaciones comunicadas en 2007.- 28-3 (R), 2-4 (R), 16-5 (R), 8-6 (R), 12-6 (C), 20-6 (R), 6-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 30-8 (R), 6-9 (R), 7-9 (R).

Observaciones comunicadas en 2008.- 9-1 (R), 25-1 (R), 31-1 (R), 5-2 (R), 13-2 (R), 22-2 (R), 26-2 (R), 8-3 (R), 10-3 (R), 12-4 (R), 15-4 (R), 16-4 (R),

18-4 (R), 17-5 (R), 24-5 (R), 28-5 (R), 30-5 (R), 13-6 (R), 16-6 (R), 23-6 (R), 29-7 (R), 13-8 (R), 25-8 (R), 7-10 (R), 28-10 (R), 1-11 (R), 29-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 28-1 (R), 3-2 (R), 23-2 (R) (fot.; la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata dcha.), 26-2 (R), 5-3 (R), 9-3 (R), 11-3 (R), 12-3 (R), 31-3 (R), 6-5 (R), 7-5 (R), 19-5 (R), 20-5 (R), 6-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R) (en dos festines), 25-6 (R), 7-7 (R), 14-7 (R), 24-7 (R), 25-7 (R), 3-8 (R), 4-8 (R), 6-8 (R), 12-8 (R), 14-8 (R), 17-8 (R), 19-8 (R), 22-8 (R), 28-8 (R), 2-9 (R), 8-9 (R), 9-9 (R), 14-9 (R), 15-9 (R), 17-9 (R), 20-9 (R), 23-9 (R), 25-9 (R), 28-10 (R), 16-11 (R), 27-11 (R), 14-12 (R), 16-12 (R).

Puede verse una foto del buitre leonado con la anilla 4CW, con el buche lleno, y con otros buitres, obtenida por Jesús Cobo Anula el 23 de febrero de 2009, en la **Hoja Informativa Nº 38**, pág. 322.

4C1 ([1103916]).- Anillado de pollo, en el barranco de Valdecasuar (margen derecha), el 16 de mayo.

Observaciones comunicadas en 2009.- 15-6 (R) (sólo anilla de metal), 9-9 (R) (anilla de metal), 24-10 (R) (anilla de metal), 13-4 (R) (anilla de metal).

Observaciones comunicadas en 2011.- 3-3 (R) (anilla de metal, 110391-).

Anillados en 2005.-

6MT.- Anillado de pollo, el 7 de mayo, en el barranco de Valdecasuar.

Observaciones comunicadas en 2007.- 16- 7 (R), 16-8 (R).

Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 8-1 (R), 22-1 (R), 16-2 (R), 26-2 (R), 13-3 (R), 14-3 (R), 12-4 (R), 15-4 (R), 18-4 (R), 3-5 (R), 8-5 (R), 19-6 (R), 27-7 (R), 1-8 (R), 25-8 (R), 16-9 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 28-1 (R), 6-2 (R), 12-2 (R), 18-2 (R), 12-3 (R), 13-4 (R), 23-4 (R), 24-4 (R), 6-5 (R), 15-5 (R), 19-5 (R), 27-5 (R), 12-6 (R), 15-6 (R), 24-6 (R), 25-6 (R), 27-6 (R), 30-6 (R), 3-7 (R), 9-7 (R) (con la anilla amarilla en la pata izquierda; no tiene anilla de metal), 27-7 (R), 12-8 (R), 17-8 (R), 28-8 (R), 2-9 (R), 29-12 (R), 30-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 3-1 (R), 7-1 (R), 9-1 (R), 13-1 (R), 20-1 (R), 30-1 (R), 5-2 (R), 2-3 (R), 3-3 (R), 8-3 (R), 12-3 (R), 21-3 (R), 29-3 (R), 15-4 (R), 17-4 (R), 22-4 (R), 15-5 (R), 17-5 (R), 27-5 (R), 14-6 (R), 20-6 (R), 22-6 (R), 24-6 (R), 30-6 (R), 1-7 (R), 2-7 (R), 6-7 (R) (se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; no tiene anilla de metal), 13-7 (R), 19-7 (R), 24-7 (R), 30-7 (R), 2-8 (R), 4-8 (R) (se lee de abajo arriba, en la pata izquierda), 18-9 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 17-1 (R), 29-1 (R).

Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 28-3 (R), 15-4 (C), 17-11 (Peña Portillo), 18-11 (Peña Portillo).

Observaciones comunicadas en 2014.- 18-3 (R; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; sin anilla de metal; fotografiado), 21-7 (R; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; sin anilla de metal), 25-8 (R), 8-11 (P. Portillo).

Observaciones comunicadas en 2015.- 5-10 (R; con la anilla amarilla en la pata izquierda).

Observaciones comunicadas en 2016.- 12-11 (Peña Portillo), 15-11 (R; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda).

Puede verse una foto del buitre leonado con la anilla 6MT, con otros buitres leonados, obtenida por Carlos Parrado Mejuto el 18 de marzo de 2014, en la **Hoja Informativa Nº 40**, pág. 409.

Puede verse otra foto, obtenida por Raúl González Rodríguez el 15 de noviembre de 2016, en la **Hoja Informativa Nº 47**, Anexo fotográfico.

6MN.- Anillado de pollo, el 7 de mayo, en el barranco de Valdecasuar.

Observaciones comunicadas en 2007.- 6-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 22-1 (R), 16-2 (R), 3-3 (R), 17-3 (R), 24-3 (R), 31-3 (R), 2-4 (R), 7-4 (R), 10-4 (R), 12-4 (C), 15-4 (R), 29-4 (R), 30-4 (R).

6MJ.- Anillado de pollo, el 7 de mayo, en el barranco de Valdecasuar.
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-5 (C; fot.), 12-6 (C; fot.), 22-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-3 (R), 10-3 (R), 13-3 (R), 14-3 (R), 17-3 (R), 7-4 (R), 15-4 (R), 18-4 (R), 24-4 (R), 25-4 (R), 3-5 (R), 8-5 (R), 11-5 (R), 17-5 (R), 24-5 (R), 30-5 (R) (6_J), 21-8 (R), 28-8 (R), 4-9 (R), 22-10 (C), 26-10 (R), 10-11 (R y C [fot.]), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 13-1 (C), 9-3 (R), 1-4 (R), 4-4 (R), 8-4 (R), 11-4 (R), 16-4 (R), 23-5 (R), 28-6 (R), 5-7 (C), 4-8 (R), 5-9 (R), 20-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 13-1 (R), 30-1 (R), 2-2 (R), 26-3 (R), 5-4 (R), 12-4 (R), 15-4 (R), 22-4 (R), 27-4 (R), 28-4 (R), 15-6 (R), 17-6 (R), 29-6 (R), 1-7 (R), 2-7 (R), 14-7 (R), 2-8 (R), 18-8 (R), 23-8 (R), 6-9 (R), 8-10 (R), 31-10 (R), 3-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 2-1 (R), 13-11 (C).
Observaciones comunicadas en 2012.- 23-5 (R).

4AA.- Anillado de pollo, el 7 de mayo, ¿en el barranco de Valdecasuar?
Observaciones comunicadas en 2008.- 16-2 (R), 21-5 (P.D.I., Nº 8 y Nº 11), 30-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 12-2 (C) (fotografiado), 12-3 (R), 24-3 (R), 11-4 (R), 12-4 (C), 1-5 (R), 15-5 (R), 27-5 (R), 1-6 (R), 12-6 (R), 22-6 (R), 24-6 (R), 25-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 9-7 (R), 11-7 (R), 9-9 (R), 15-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 23-2 (R), 26-2 (R), 1-3 (R), 2-3 (R), 4-3 (R), 7-3 (R), 28-3 (R), 30-3 (R), 31-3 (R), 22-4 (R), 15-5 (R), 19-5 (R), 10-6 (R), 17-6 (R), 24-7 (R), 30-7 (R), 9-8 (R), 26-8 (R), 30-8 (R), 6-9 (R) (en dos festines), 11-9 (R), 27-9 (R), ¿13-11 (P.D.I., Nº 11; 16 h. 31 m.; anilla amarilla en pata dcha.)?.
Observaciones comunicadas en 2011.- 22-1 (R), 22-4 (R), 10-6 (R) (tiene la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2012.- 15-2 (Peñalba; la anilla amarilla, en la pata derecha), 6-3 (R), 25-4 (R), 19-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2017.- 30-3 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 31-1 (S.D.; el buitre es adulto), 29-11 (R; fotografiado; tiene la anilla amarilla en la pata derecha).

4AF.- Anillado de pollo, el 7 de mayo, ¿en el barranco de Valdecasuar?
Observaciones comunicadas en 2007.- 13-5 (C).
Observaciones comunicadas en 2008.- 22-1 (R), 16-2 (R), 28-2 (R), 12-4 (R), 3-5 (R), 17-5 (R), 26-5 (R), 30-5 (R), 5-9 (R), 29-9 (R), 22-10 (C), 10-11 (C), 15-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 23-2 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 1-4 (R), 7-4 (R), 8-4 (R), 13-4 (R), 16-4 (R), 20-4 (R), 4-5 (R), 6-5 (R), 8-5 (R), 20-5 (R), 4-6 (R), 6-6 (R), 15-6 (R), 30-6 (R), 9-7 (R), 21-7 (R), 12-8 (R), 31-8 (R), 9-9 (R), 14-9 (R), 15-9 (R), 28-9 (R), 2-10 (R), 15-10 (R), 24-10 (R) (en dos festines), 26-10 (R), 2-11 (R), 26-11 (R), 29-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 8-1 (C), 13-1 (R). 14-1 (R), 30-1 (R), 5-2 (R), 20-2 (R), 23-2 (R), 2-3 (R), 5-3 (R), 26-3 (R), 30-3 (R), 5-4 (R), 6-4 (R), 8-4 (R), 14-5 (R), 15-5 (R), 17-5 (R), 10-6 (R), 15-6 (R), 22-6 (R), 29-6 (R), 30-6 (R), 1-7 (R), 6-7 (R), 10-7 (R), 13-7 (R), 4-8 (R), 9-8 (R), 23-8 (R), 1-9 (R), 6-9 (R), 11-9 (R), 22-9 (R), 23-9 (R), 6-10 (R), 8-10 (R),

25-11 (R), 2-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 7-1 (R), 8-1 (R), 22-1 (R), 29-1 (R), 10-2 (R), 4-3 (C), 27-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-3 (R), 21-1 (R), 28-3 (R), 25-4 (R), 1-5 (R), 23-5 (R), 30-5 (R), 30-8 (R; la anilla amarilla, que se lee ¿de arriba abajo?, en la pata derecha), 19-9 (R).

4AJ.- Anillado de pollo, el 7 de mayo, ¿en el barranco de Valdecasuar?
Observaciones comunicadas en 2007.- 26-8 (C).
Observaciones comunicadas en 2008.- 16-2 (R), 8-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 14-3 (R), ¿24-3 (R)?), 15-4 (R), 16-4 (R), 24-4 (R), 30-4 (R), 8-5 (R), 16-5 (C), 17-5 (R), 18-5 (R), 28-5 (R), 12-6 (R), 20-6 (R), 17-7 (R), 29-7 (R), 18-8 (R), 27-8 (R), 28-8 (R), 4-9 (R), 5-9 (R), 6-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 28-1 (R), 1-2 (R), 6-2 (R), 12-2 (R), 13-3 (R), 31-3 (R), 1-4 (R), 4-4 (R), 13-4 (R), 23-4 (R), 24-4 (R), 6-5 (R), 8-5 (R) (lleva la anilla medio quitada y cojea al apoyar la pata), 15-6 (R), 19-6 (R) (con la anilla bien puesta; no cojea; tiene rozaduras en la pata bajo la anilla), 25-6 (R), 28-6 (R), 9-7 (R) (se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata derecha), 19-7 (R), 4-8 (R), 10-8 (R), 12-8 (R), 17-8 (R), 24-8 (R), 26-8 (R), 2-9 (R), 10-9 (R), 15-9 (R), 17-9 (R), 24-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 28-1 (R), 5-2 (R), 20-2 (R), 23-2 (R), 2-3 (R), 26-3 (R), 6-4 (R), 15-4 (R), 17-4 (R), 10-6 (R), 15-6 (R), 2-7 (R), 14-7 (R), 16-7 (R), 21-7 (R), 30-7 (R), 2-8 (R), 9-8 (R), 6-9 (R) (en dos festines), 11-9 (R), 7-12 (R), 13-12 (R), 16-12 (R), 25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 3-1 (R), 5-1 (R), 7-1 (R), 31-1 (R), 5-2 (R), 25-2 (R), 3-3 (R), 14-3 (R), 24-3 (R), 27-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 21-1 (R), 28-3 (R), 15-4 (C), 25-4 (R), 23-5 (R), 19-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2014.- 23-8 (en el barranco de Valdecasuar, junto al nido Nº 32; tiene la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2015.- 13-5 (nido Nº 94 y junto al nido Nº 33, ambos con pollo, del barranco de Valdecasuar; tiene la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2018.- 29-11 (R; fotografiado; no es seguro; tiene la anilla amarilla en la pata derecha; el buitre es adulto).

26W.- Anillado en el comedero de Campo de San Pedro el 24 de junio, por Guillermo Doval y Javier Marchamalo (Iberis).
Observaciones comunicadas en 2007.- 3-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 25-1 (R), 25-4 (R), 30-5 (R), 19-6 (R), 18-8 (R), 25-8 (R), 4-9 (R), 16-9 (R), 29-9 (R), 8-11 (C), 21-12 (C; fot.).
Observaciones comunicadas en 2009.- 18-2 (R), 5-3 (R), 7-3 (R), 7-4 (R), 8-4 (R), 6-5 (R), 20-5 (Nº 10-La Hocecilla, con pollo), 31-5 (R), 1-6 (R), 6-6 (R).

Anillados en <u>2006</u>.-

701.- Anillado de pollo, el 7 de mayo, en el nido Nº 6 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2010.- 16-2 (R).

704.- Anillado de pollo, el 7 de mayo, en el nido Nº 78 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2010.- 23-2 (R), 21-3 (R), 26-4 (R), 5-5 (R), 10-6 (R) (se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata izquierda), 30-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 29-1 (R), 9-2 (R), 3-3 (R).

Observaciones comunicadas en 2012.- 31-7 (R; se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata izquierda), 30-8 (R; la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R; la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha), 25-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2017.- 10-5 (en el nido Nº 39, con pollo, de P. Portillo; la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha; con anilla de metal), 13-5 (en el nido Nº 39, con pollo, de P. Portillo; lo señalado el 10-5).

705.- Anillado de pollo, el 7 de mayo, en el nido Nº 10 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 20-1 (C), 24-1 (C) (fot.), 27-1 (C) (fot.), 28-1 (C) (fot.), 4-2 (C) (fot.), 3-6 (C) (fot.), 12-6 (C) (fot.), 27-11 (R), 28-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 13-11 (Peña Portillo).

700.- Anillado de pollo, el 7 de mayo, en el nido Nº 13 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2008.- 18-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2014.- 13-12 (junto al nido Nº 7 de Peña Inclinada).

706.- Anillado de pollo, el 8 de mayo, en V.A.D.
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-5 (R), 29-7 (R), 21-8 (R), 25-8 (R), 27-8 (R), 28-8 (R), 4-9 (R), 6-9 (R), 11-9 (R), 16-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 26-1 (R), 28-1 (R), 20-2 (R), 27-2 (R), 1-3 (R), 7-3 (R), 9-3 (R), 12-3 (R), 6-5 (R), 19-5 (R), 20-5 (R) (se lee de arriba abajo; con anilla de metal en pata izqda.), 12-6 (R), 24-6 (R), 25-6 (R), 9-7 (R), 21-7 (R), 19-8 (R), 2-9 (R), 15-9 (R), 24-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 30-1 (R), 3-2 (P.D.I., nido Nº 32 o cerca; la anilla amarilla, en la pata derecha), 5-2 (R), 16-2 (R), 20-2 (R) (en dos festines), 2-3 (R), 5-3 (R), 8-3 (R), 9-3 (R), 12-3 (R), 28-3 (R), 29-3 (R), 30-3 (R), 31-3 (R), 12-4 (R), 22-4 (R), 26-4 (R), 27-4 (R), 5-5 (R), 15-5 (R), 19-5 (R), 26-5 (Los Poyales, Plataforma II; adulto no viejo; la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha; con anilla de metal), 15-6 (R), 17-6 (R), 20-6 (R) (en dos festines), 30-6 (R), 24-9 (R), 27-9 (R), 5-10 (R), 6-10 (R), 8-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 17-1 (R), 22-1 (R), 9-2 (R), 3-3 (R), 5-3 (R), 8-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 6-3 (R), 18-11 (Peña Portillo).
Observaciones comunicadas en 2013.- 20-2 (S.D.; cambia de lugar y pone palos en un nido nuevo, a la izquierda del Nº 9; la anilla amarilla, en la pata derecha), 17-11 (Plat. I de S.I.; con anilla de metal; la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2016.- 22-7 (R; la anilla amarilla, que se lee ¿de arriba abajo?, en la pata derecha), 13-11 (Peña Portillo).
Observaciones comunicadas en 2018.- 31-1 (S.D.; la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha).

707.- Anillado de pollo, el 7 de mayo, en el nido Nº 21 de V.A.D. (Beticuerpo).
Observaciones comunicadas en 2008.- 16-7 (R), 17-7 (R), 22-7 (R), 29-7 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 7-3 (R), 9-3 (R), 13-3 (R), 23-4 (R), 24-4 (R), 15-5 (R), 22-6 (R) (tiene pico y ojo de adulto), 28-6 (R), 19-7 (R) (se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la otra pata), 21-7 (R), 3-8 (R), 4-8 (R), 14-9 (R), 15-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 1-2 (R), 2-2 (R), 5-2 (R), 11-2 (R), 16-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R), 2-3 (R), 5-3 (R), 21-3 (R), 24-3 (R), 29-3 (R), 31-3 (R), 3-4 (R), 22-4 (R), 23-6 (R), 26-6 (R), 29-6 (R), 30-6 (R), 1-7 (R), 2-7 (R), 7-7 (R), 14-7 (R), 16-7 (R), 24-7 (R), 4-8 (R) (se lee de arriba abajo; con anilla de metal

en la pata izquierda), 9-8 (R), 6-9 (R), 9-9 (R), 11-9 (R), 23-9 (R), 15-10 (R), 18-10 (R), 26-10 (R), 13-11 (C), 28-11 (C), 25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 22-1 (R), 9-2 (R), 4-3 (C), 25-4 (R), 11-5 (R), 10-6 (R) (se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2012.- 27-2 (R), 28-3 (R), 23-5 (R), 30-8 (R; se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2015.- 15-6 (R; se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2016.- 10-3 (R; se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata izquierda).

70W.- Anillado de pollo, el 16 de mayo, en el nido Nº 5 de Peña Inclinada (P. I.). (P. D. I.).
Observaciones comunicadas en 2007.- 12-6 (C) (fot.).
Observaciones comunicadas en 2008.- 12-2 (R), 16-2 (R), 8-5 (R), 27-8 (R), 6-9 (R), 16-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 18-2 (R), 20-2 (R), 23-2 (R), 7-3 (R), 9-3 (R), 11-3 (R), 12-3 (R), 20-5 (R), 23-5 (R), 1-6 (R), 6-6 (R), 24-6 (R), 30-6 (R), 11-7 (R), 14-7 (R), 21-7 (R), 22-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 14-1 (R), 30-1 (R), 3-3 (R), 12-3 (R), 26-3 (R), 28-3 (R), 29-3 (R), 31-3 (R), 27-5 (R), 9-6 (R), 26-6 (R), 10-7 (R), 13-7 (R), 14-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 22-1 (R), 10-4 (C).
Observaciones comunicadas en 2012.- ¿27-2 (R) (leído 0W, en la pata derecha; con anilla de metal), 17-3 (R), 28-3 (R), 25-4 (R), 26-5 (C; fot.; se lee de arriba abajo; en la pata derecha).

Puede verse una foto del buitre leonado con la anilla 70W, y con otros buitres, obtenida por Fernando Alarcón García el 26 de mayo de 2012, en la **Hoja Informativa Nº 38**, pág. 326.

70T.- Anillado de pollo, el 16 de mayo, en el nido Nº 11 ó Nº 15 de Peña Inclinada (P. I.). (P. D. I.).
Observaciones comunicadas en 2012.- 25-4 (R).

70X.- Anillado de pollo, el 16 de mayo, en el nido Nº 20 de Peña Inclinada (P. I.). (P. D. I.), 21-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 4-4 (R), 15-6 (R) (en la pata izqda.; se lee de arriba abajo; sin anilla de metal), 27-6 (R), 30-6 (R), 10-7 (en P. D. I., junto al nido Nº 26 –con pollo, muy próximo al Nº 20-; la anilla amarilla se lee de arriba abajo; no tiene anilla de metal), 14-7 (R), 19-7 (R), 3-8 (R), 23-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 23-2 (R), 5-3 (R), 8-3 (R), 21-3 (R), 31-5 (R), 24-6 (R), 1-7 (R), 10-7 (R), 2-8 (R), 6-9 (R).

70P.- Anillado de pollo, el 16 de mayo, en V.A.D.
Observaciones comunicadas en 2008.- 17-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 7-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 8-12 (C).

709.- ¿Anillado de pollo, en mayo? (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2009.- 31-5 (R).

Anillados en 2007.-

N.- Recogido con vida, afectado por haber comido de un perro envenenado con Aldicarb, el 15/16 de marzo de 2007, en la zona de Santa Cruz de la Salceda (Burgos). Anillado el 22 de marzo en el Centro de Recuperación de Animales Salvajes “Los Guindales”, de Burgos. Liberado el mismo día 22 de marzo, por la tarde, en los páramos del nordeste, frente a Los Poyales.

73U (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 2-5 (C).

73P (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 28-3 (R), 13-5 (C), 9-7 (R), 6-9 (R), 27-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2008.- 8-1 (R), 31-1 (R), 5-2 (R), 12-2 (R), 13-2 (R), 18-2 (R), 22-2 (R), 3-3 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 14-3 (R), 17-3 (R), 24-3 (R), 4-4 (R), 10-4 (R), 12-4 (R), 12-4 (C), 18-4 (R), 27-4 (R), 29-4 (R), 1-5 (R), 3-5 (R), 8-5 (R), 18-5 (R), 24-5 (R), 28-5 (R), 19-6 (R), 10-7 (R), 11-7 (R), 16-7 (R), 17-7 (R), 28-7 (R), 13-8 (R), 19-8 (R), 21-8 (R), 27-8 (R), 6-9 (R), 2-10 (R), 20-10 (R), 26-10 (R), 29-10 (R), 1-11 (R), 10-11 (R), 19-11 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 8-1 (R), 15-1 (C), 1-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R), 1-3 (R), 5-3 (R), 7-3 (R), 9-3 (R), 11-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 27-3 (R), 31-3 (R), 1-4 (R), 7-4 (R), 8-4 (R), 11-4 (R), 14-4 (R), 16-4 (R), 23-4 (R), 24-4 (R), 4-5 (R), 5-5 (R), 6-5 (R), 8-5 (R), 15-5 (R), 20-5 (R), 22-5 (R), 1-6 (R), 4-6 (R), 11-6 (R), 12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R), 25-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 3-7 (R), 7-7 (R), 9-7 (R) (con la anilla amarilla en la pata derecha; sin anilla de metal), 11-7 (R), 14-7 (R), 15-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R), 21-7 (R), 27-7 (R), 3-8 (R), 4-8 (R), 17-8 (R), 19-8 (R), 27-8 (R), 28-8 (R), 31-8 (R), 2-9 (R), 9-9 (R), 14-9 (R), 15-9 (R), 17-9 (R), 23-9 (R), 25-9 (R), 28-9 (R), 2-10 (R), 26-10 (R), 31-10 (R), 2-11 (R), 6-11 (R), 12-11 (R), 21-12 (R), 28-12 (C).

Observaciones comunicadas en 2010.- 3-1 (R), 9-1 (R), 14-1 (R), 19-1 (R), 26-1 (R), 5-2 (R) (en dos festines), 16-2 (R), 1-3 (R), 2-3 (R), 4-3 (R), 28-3 (R), 3-4 (R), 6-4 (R), 13-4 (R), 15-4 (R), 21-4 (R), 22-4 (R), 27-4 (R), 28-4 (R), 19-5 (R), 31-5 (R), 3-6 (en lo alto de Las Torcas´´; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; sin anilla de metal), 14-6 (R), 17-6 (R), 18-6 (R), 20-6 (R), 23-6 (R), 29-6 (R), 30-6 (R), 6-7 (R) (se lee de abajo arriba), 13-7 (R), 19-7 (R), 21-7 (R), 30-7 (R), 2-8 (R), 30-8 (R), 1-9 (R), 6-9 (R) (en dos festines), 22-9 (R), 27-9 (R), 5-10 (R), 7-10 (R), 8-10 (R), 12-10 (R), 15-10 (R), 17-10 (R), 29-11 (R), 5-12 (R), 13-12 (R), 25-12 (R), 27-12 (R), 30-12 (R), 31-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 7-1 (R), 18-1 (R), 9-2 (R), 14-3 (R), 27-3 (R), 11-4 (R), 11-5 (R), 7-6 (R; fot.).

Observaciones comunicadas en 2012.- 28-3 (R), 25-4 (R), ¿31-7 (R)?, 7-8 (R), 30-8 (R; se lee de abajo arriba), 19-9 (R).

Observaciones comunicadas en 2013.- 18-11 (R; se lee de abajo arriba; ¿tiene anilla de metal en la pata derecha?) (?).

Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R).

Observaciones comunicadas en 2015.- 15-6 (R).

Observaciones comunicadas en 2018.- 29-11 (R; fotografiado; con la anilla amarilla en la pata derecha).

73V (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 28-3 (R), 4-4 (R), 20-4 (R), 16-5 (R), 12-6 (C), 20-6 (R), 6-8 (R), 11-8 (R).

Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 8-1 (R), 22-1 (R), 31-1 (R), 5-2 (R), 8-2 (R), 13-2 (R), 16-2 (R), 22-2 (R), 3-3 (R), 5-3 (R), 8-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 24-3 (R), 10-4 (R), 12-4 (R), 18-4 (R), 24-4 (R), 25-4 (R), 5-5 (R), 8-5 (R), 28-5 (R), 12-6 (R), 13-6 (R), 16-6 (R), 20-6 (R), 11-7 (R), 17-7 (R), 22-7 (R), 27-7 (R), 30-7 (R), 13-8 (R), 18-8 (R), 19-8 (R), 21-8 (R), 25-8 (R), 27-8 (R), 5-9 (R), 6-9 (R), 11-9 (R), 18-9 (R), 29-9 (R), 2-10 (R), 29-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 5-1 (R), 28-1 (R), 1-2 (R), 23-2 (R), 1-3 (R), 5-3 (R), 7-3 (R), 11-3 (R), 27-3 (R), 31-3 (R), 8-4 (R), 11-4 (R),

16-4 (R), 23-4 (R), 1-5 (R), 4-5 (R), 6-5 (R), 7-5 (R), 8-5 (R), 11-5 (R), 19-5 (R), 20-5 (R), 27-5 (R), 12-6 (R), 15-6 (R) (fotografiado), 19-6 (R), 25-6 (R), 7-7 (R), 14-7 (R), 19-7 (R), 14-8 (R), 17-8 (R), 24-8 (R), 26-8 (R), 8-9 (R), 10-9 (R), 28-9 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 8-1 (C), 14-1 (R), 16-1 (C), 20-1 (R), 21-1 (R), 24-1 (R), 26-2 (R), 1-3 (R), 15-5 (R), 19-5 (R), 27-5 (R), 31-5 (R), 21-7 (R), 4-8 (R), 31-8 (R), 6-9 (R), 24-9 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 14-1 (R).

Observaciones comunicadas en 2012.- 25-4 (R), 26-5 (en el nido Nº 9 de La Raya, con pollo; con anilla de metal en la pata derecha; la anilla amarilla es 73¿V?, y se lee de abajo arriba; es relevado por un buitre adulto no anillado).

(Puede verse una foto, obtenida por Marianne Delacrétaz el 15 de junio de 2009, en la **Hoja Informativa Nº 34**, pág. 318).

73M (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 28-3 (R), 1-4 (R), 20-4 (R), 24-5 (R), 3-6 (C), 12-6 (R), 9-7 (R), 16-7 (R), 27-7 (en el nido vacío Nº 6 de Valdecasuar), 11-8 (R), 16-8 (R), 17-8 (R), 30-8 (R), 2-9 (R), 3-9 (R), 6-9 (R), 7-9 (R), 8-9 (R), 9-11 (R), 11-11 (en el G.I del barranco de Valdecasuar), 27-11 (R), 29-11 (R), 2-12 (R), 8-12 (R), 18-12 (R), 22-12 (R), 27-12 (R), 30-12 (R).

Nota.- 27-7.- El buitre es subadulto.

Observaciones comunicadas en 2008.- 2-1 (R), 5-1 (R), 8-1 (R), 9-1 (R), 12-1 (R), 22-1 (R), 12-2 (R), 13-2 (R), 16-2 (R), 26-2 (R), 28-2 (R), 3-3 (R), 5-3 (R), 8-3 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 17-3 (R), 24-3 (R), 31-3 (R), 15-4 (R), 24-4 (R), 25-4 (R), 29-4 (R), 30-4 (R), 1-5 (R), 8-5 (R), 24-5 (R), 1-7 (R), 11-7 (R), 28-7 (R), 13-8 (R), 18-8 (R), 21-8 (R), 25-8 (R), 27-8 (R), 6-9 (R), 16-9 (R), 28-9 (R), 20-10 (R), 24-10 (R), 26-10 (R), 28-10 (R), 5-11 (R), 9-11 (P. Zorra), 9-11 (P.F.dcha.), 10-11 (R) (lleva emisor), 22-11 (R), 8-12 (R), 10-12 (R), 14-12 (R), 27-12 (R), 28-12 (R), 29-12 (R).

Nota.- 9-11.- El buitre es inmaduro o subadulto.

Observaciones comunicadas en 2009.- 5-1 (R), 1-2 (R), 6-2 (R), 18-2 (R), 1-3 (R), 1-4 (R), 14-4 (R), 4-5 (R), 6-5 (R), 15-5 (R), 20-5 (R), 31-5 (R), 11-6 (R), 15-6 (R) (se lee de abajo arriba; tiene anilla de metal en la pata izquierda; el buitre es subadulto; fotografiado), 19-6 (R), 24-6 (R), 9-7 (R) (en dos festines; con anilla de metal en la pata izquierda), 11-7 (R), 14-7 (R), 19-7 (R), 21-7 (R), 25-7 (R), 27-7 (R), 6-8 (R), 10-8 (R), 17-8 (R), 14-9 (R), 15-9 (R), 16-11 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 2-3 (R), 8-3 (R), 29-3 (R), 30-3 (R), 3-4 (R), 6-4 (R), 12-4 (R), 13-4 (R), 22-4 (R), 27-4 (R), 28-4 (R), 2-5 (R), 8-6 (P. P.; se lee de abajo arriba; tiene anilla de metal), 6-7 (R) (se lee de abajo arriba, en la pata dcha.; no tiene anilla de metal), 10-7 (R), 13-7 (R), 19-7 (R), 21-7 (R), 30-7 (R), 9-8 (R), 14-8 (R), 23-8 (R), 26-8 (R), 30-8 (R), 18-9 (R), 24-9 (R), 5-10 (R), 6-10 (R), 7-10 (R), 12-10 (R), 15-10 (R), 29-10 (R), 3-11 (R), 14-11 (R), 16-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 3-1 (R), 5-1 (R), 7-1 (R), 5-2 (R) (en dos festines), 3-3 (R), 9-3 (R), 14-3 (R).

Observaciones comunicadas en 2012.- 27-2 (R) (se lee de abajo arriba; tiene anilla de metal en

la pata izquierda), 21-1 (R), 23-5 (R), 30-5 (R), 19-9 (R).

Observaciones comunicadas en 2015.- 15-6 (R; se lee de abajo arriba, en la pata derecha), 22-8 (nido Nº 4 de Peña Rubia, en el que este año ha salido adelante un pollo, que ahora no está; se lee de abajo arriba, en la pata derecha; tiene anilla de metal).

Observaciones comunicadas en 2016.- 13-11 (Bco. Valdecasuar m.i., Grupo I, al amanecer; con la anilla amarilla en la pata derecha).

Puede verse una foto del buitre con la anilla 73M, obtenida por Marianne Delacrétaz el 15 de junio de 2009, en el comedero del Refugio de Montejo en la **Hoja Informativa Nº 34**, pág. 319.

73R (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 20-4 (R), 26-5 (R), 12-6 (R), 9-7 (R), 6-8 (R), 16-8 (R), 17-8 (R), 21-8 (R), 28-8 (R), 30-8 (R), 3-9 (R), 7-9 (R), 8-9 (R), 9-11 (R), 13-11 (R) (fotografiado), 27-11 (R), 28-11 (R), 29-11 (R), 11-12 (R), 18-12 (R), 27-12 (R), 30-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2008.- 2-1 (R), 5-1 (R), 8-1 (R), 9-1 (R), 12-1 (R), 17-1 (R), 19-1 (R), 25-1 (R), 31-1 (R), 5-2 (R), 12-2 (R), 13-2 (R), 16-2 (R),18-2 (R), 22-2 (R), 26-2 (R), 5-3 (R), 8-3 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 14-3 (R), 31-3 (R), 7-4 (R), 9-4 (R), 10-4 (R), 12-4 (R), 15-4 (R), 18-4 (R), 27-4 (R), 3-5 (R), 6-5 (en el G. I. del barranco de Valdecasuar), 8-5 (R), 17-5 (R), 18-5 (R), 19-5 (R), 24-5 (R), 30-5 (R), 11-7 (R), 16-7 (R), 17-7 (R), 27-7 (R), 29-7 (R), 13-8 (R), 19-8 (R), 21-8 (R), 25-8 (R), 5-9 (R), 2-10 (R), 7-10 (R), 9-10 (R), 13-10 (R), 26-10 (R), 28-10 (R), 9-11 (Vald. m. i. 3 –G. I.; pasó allí la noche), 10-11 (C), 19-11 (R), 8-12 (R), 16-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 5-1 (R), 6-1(R), 28-1 (R), 1-2 (R), 15-2 (R), 5-3 (R), 11-3 (R), 12-3 (R), 25-3 (R), 31-3 (R), 6-4 (R), 8-4 (R), 11-4 (R), 14-4 (R), 16-4 (R), 23-4 (R), 1-5 (R), 4-5 (R), 5-5 (R), 6-5 (R), 8-5 (R), 11-5 (R), 1-6 (R), 11-6 (R), 12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R) (en dos festines), 22-6 (R), 25-6 (R), 27-6 (R), 30-6 (R), 3-7 (R), 5-7 (C), 7-7 (R), 9-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 15-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R), 25-7 (R), 27-7 (R), 3-8 (R), 4-8 (R), 5-8 (R), 10-8 (R), 12-8 (R), 14-8 (R), 17-8 (R), 26-8 (R), 28-8 (R), 5-9 (R), 8-9 (R), 9-9 (R), 20-9 (R), 25-9 (R), 15-10 (R), 19-10 (R), 29-10 (R), 31-10 (R), 6-11 (R), 9-11 (R), 12-11 (R), 15-11 (R), 16-11 (R), 17-11 (R), 23-11 (R), 27-11 (R), 29-11 (R), 3-12 (R), 14-12 (R), 16-12 (R), 21-12 (R), 25-12 (R), 28-12 (C), 30-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 7-1 (R), 13-1 (R), 14-1 (R), 18-1 (R), 26-1 (R), 5-2 (R), 11-2 (R), 20-2 (R), 26-2 (R), 12-3 (R), 29-3 (R), 30-3 (R), 5-4 (R), 6-4 (R), 12-4 (R), 13-4 (R), 15-4 (R), 22-4 (R), 27-4 (R), 28-4 (R), 17-5 (R), 19-5 (R), 24-5 (R), 10-6 (R), 14-6 (R), 15-6 (R), 17-6 (R), 20-6 (R), 22-6 (R), 23-6 (R), 26-6 (R), 28-6 (R), 1-7 (R), 2-7 (R), 6-7 (R), 13-7 (R), 16-7 (R), 21-7 (R), 24-7 (R), 30-7 (R), 2-8 (R), 9-8 (R), 18-8 (R), 23-8 (R), 30-8 (R), 6-9 (R) (en dos festines), 18-9 (R), 27-9 (R), 6-10 (R), 7-10 (R), 8-10 (R), 15-10 (R), 26-10 (R), 31-10 (R), 16-11 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda; fot.), 23-11 (R), 25-11 (R), 2-12 (R), 5-12 (R), 7-12 (R), 16-12 (R), 25-12 (R), 30-12 (R), 31-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 7-1 (R), 14-1 (R), 17-1 (R), 18-1 (R), 5-2 (R),

27-2 (R), 24-3 (R), 22-4 (R), 1-5 (R), 11-5 (R), 10-6 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).

Observaciones comunicadas en 2012.- 15-4 (C), 30-5 (R), 19-9 (R).

Observaciones comunicadas en 2013.- 19-7 (en el Grupo I del barranco de Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izqda.), 24-7 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal), 18-11 (R; con anilla de metal en la pata izquierda).

Observaciones comunicadas en 2014.- 7-6 (en el nido Nº 52, con pollo, del barranco de Valdecasuar; se lee de abajo arriba; tiene la anilla amarilla en la pata derecha), 21-7 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha).

Observaciones comunicadas en 2015.- 5-10 (R; con la anilla amarilla en la pata derecha).

En la **Hoja Informativa Nº 34** (pág. 320), puede verse una foto del buitre con anilla 73R, obtenida por Jorge Javier Rubio Casado, el 5 de enero de 2008, en el comedero del Refugio de Montejo.

Pueden verse otras dos fotos del buitre con anilla 73R, ambas obtenidas en el comedero del Refugio el 16 de noviembre de 2010, una por Elías Gomis Martín y otra por Sergio Arís Arderiu, en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 302.

73F (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 22-5 (R), 26-5 (R), 9-7 (R), 6-8 (R), 7-8 (R), 16-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 2-9 (R), 3-9 (R), 6-9 (R), 7-9 (R), 8-9 (R), 27-12 (R), 30-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 8-1 (R), 9-1 (R), 12-1 (R), 31-1 (R), 5-2 (R), 13-2 (R), 16-2 (R), 18-2 (R), 22-2 (R), 26-2 (R), 3-3 (R), 5-3 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 14-3 (R), 7-4 (R), 10-4 (R), 3-5 (R), 8-5 (R), 11-5 (R), 17-5 (R), 18-5 (R), 20-6 (R), 23-6 (R), 22-7 (R), 28-7 (R), 29-7 (R), 13-8 (R), 14-8 (R), 18-8 (R), 21-8 (R), 25-8 (R), 27-8 (R), 28-8 (R), 4-9 (R), 5-9 (R), 6-9 (R), 11-9 (R), 16-9 (R), 18-9 (R), 28-9 (R), 29-9 (R), 2-10 (R), 28-10 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 8-1 (R), 28-1 (R), 1-2 (R), 3-2 (R), 6-2 (R), 18-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R), 1-3 (R), 5-3 (R), 7-3 (R), 9-3 (R), 11-3 (R), 25-3 (R), 28-3 (R), 31-3 (R), 1-4 (R), 7-4 (R), 11-4 (R), 13-4 (R), 14-4 (R), 16-4 (R), 17-4 (R), 18-4 (R), 23-4 (R), 24-4 (R), 1-5 (R), 4-5 (R), 6-5 (R), 7-5 (R), 8-5 (R), 11-5 (R), 15-5 (R), 19-5 (R), 20-5 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en pata dcha.), 22-5 (R), 23-5 (R), 4-6 (R), 6-6 (R), 11-6 (R), 12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R) (en dos festines), 22-6 (R), 24-6 (R), 25-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 3-7 (R), 7-7 (R), 9-7 (R) (en dos festines; con anilla de metal en la pata dcha.), 11-7 (R), 14-7 (R), 24-7 (R), 25-7 (R), 27-7 (R), 12-8 (R), 19-8 (R), 22-8 (R), 27-8 (R), 28-8 (R), 2-9 (R), 8-9 (R), 15-9 (R), 23-9 (R), 31-10 (R), 2-11 (R), 6-11 (R), 21-12 (R), 24-12 (R), 29-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 7-1 (R), 14-1 (R), 26-1 (R), 28-1 (R), 30-1 (R), 1-2 (R), 5-2 (R) (en dos festines), 8-2 (R), 16-2 (R), 20-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R) (en dos festines), 3-3 (R), 9-3 (R), 12-3 (R), 26-3 (R), 28-3 (R), 29-3 (R), 31-3 (R), 3-4 (R), 5-4 (R), 6-4 (R), 8-4 (R), 12-4 (R), 13-4 (R), 15-4 (R), 21-4 (R), 22-4 (R), 26-4 (R), 27-4 (R), 28-4 (R), 2-5 (R), 14-5 (R), 10-6 (R), 14-6 (R), 15-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 2-7 (R), 10-7 (R), 16-7 (R), 2-8 (R), 14-8 (R), 23-8 (R), 26-8 (R), 1-9 (R), 6-9 (R) (en dos festines), 11-9 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 14-1 (R), 18-1 (R), 22-1 (R), 29-1 (R), 5-2 (R), 15-2 (R), 3-3 (R), 5-3 (R), 8-3 (R), 9-3 (R), 14-3 (R), 11-4 (R), 7-6 (R; fot.), 27-5 (R), 16-11 (R).

Observaciones comunicadas en 2012.- 17-3 (R), 23-5 (R), 18-11 (V.A.D.).
Observaciones comunicadas en 2014.- 9-9 (muladar de Las Renovillas, en Quintanilla del Agua –Burgos, cuadrícula VM45-; Manuel Mata Hurtado; publicado en www.avesdeburgos.com).
Observaciones comunicadas en 2015.- 9-11 (R; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 29-11 (R; fotografiado; con la anilla amarilla en la pata izquierda).

73J (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 16-7 (R) (fotografiado), 6-8 (R), 17-8 (R), 21-8 (R), 30-8 (R), 3-9 (R), 7-9 (R), 8-9 (R), 27-11 (R), 29-11 (R), 2-12 (R), 18-12 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 12-2 (R), 18-2 (R), 28-2 (R), 3-3 (R), 8-3 (R), 13-3 (R), 17-3 (R), 2-4 (R), 12-4 (R), 15-4 (R), 24-4 (R), 25-4 (R), 24-5 (R), 26-5 (R), 30-5 (R), 19-6 (R), 20-6 (R), 6-7 (R), 27-7 (R), 1-8 (R), 13-8 (en Peña Portillo; fotografiado), 25-8 (R), 27-8 (R), 6-9 (R), 11-9 (R), 16-9 (R), 28-9 (R), 29-9 (R), 7-10 (R), 13-10 (R), 20-10 (R), 24-10 (R), 26-10 (R), 28-10 (R), 10-11 (R) (fotografiado), 15-11 (R), 29-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 3-2 (R), 18-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R), 1-3 (R), 5-3 (R), 7-3 (R), 9-3 (R), 13-3 (R), 27-3 (R), 4-4 (R), 6-4 (R), 11-4 (R), 24-4 (R), 4-5 (R), 6-5 (R), 7-5 (R), 12-5 (G.I.Vald.; con anilla de metal en la pata dcha.), 15-5 (R), 19-5 (R), 20-5 (R), 23-5 (R), 27-5 (R), 1-6 (R), 4-6 (R), 6-6 (R), 11-6 (R), 12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R), 22-6 (R), 24-6 (R), 25-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 3-7 (R), 7-7 (R), 9-7 (R), 12-7 (R), 15-7 (R), 19-7 (R), 21-7 (R), 3-8 (R), 12-8 (R), 19-8 (R), 26-8 (R), 31-8 (R), 8-9 (R), 14-9 (R), 2-10 (R), 20-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 26-1 (R), 30-1 (R), 5-2 (R), 19-2 (R), 23-2 (R), 2-3 (R), 5-3 (R), 7-3 (R), 12-3 (R), 21-3 (R), 26-3 (R), 28-3 (R), 29-3 (R), 3-4 (R), 5-4 (R), 15-4 (R), 22-4 (R), 26-4 (R), 28-4 (R), 2-5 (R), 15-5 (R), 17-5 (R), 21-5 (R), 24-5 (R), 27-5 (R), 31-5 (R), 3-6 (R), 9-6 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 10-6 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 17-6 (R), 22-6 (R), 23-6 (R), 24-6 (R), 30-6 (R), 14-7 (R), 2-8 (R), 4-8 (R), 14-8 (R), 26-8 (R), 18-9 (R), 23-9 (R), 24-9 (R), 6-10 (R), 7-10 (R), 8-10 (R), 13-10 (R), 15-10 (R), 18-10 (R), 14-11 (R), 16-11 (R; fot.), 2-12 (R), 13-12 (R), 31-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 2-1 (R), 8-1 (R), 14-1 (R), 31-1 (R), 5-2 (R), 9-2 (R), 10-2 (R), 15-2 (R), 16-2 (R), 8-3 (R), 11-6 (R), 16-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 4-2 (R), 21-1 (R), 30-8 (R), 19-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 19-5 (en el nido Nº 74-P.P.[2ª], con pollo; se lee de Abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 24-7 (R) (adulto no viejo; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 14-8 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 12-11 (R; con anilla de metal en la pata derecha).

Puede verse una foto del buitre con anilla 73J, obtenida por Elías Gomis Martín el 16 de noviembre de 2012, en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 304.

73A (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 24-5 (R), 6-8 (R), 11-8 (R), 16-8 (R), 17-8 (R), 21-8 (R), 3-9 (R), 6-9 (R), 7-9 (R), 8-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 2-1 (R), 8-1 (R), 9-1 (R), 31-1 (R), 8-2 (A), 12-2 (R), 16-2 (R), 22-2 (R), 28-2 (R), 3-3 (R), 8-3 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 14-3 (R), 17-3 (R), 31-3 (R), 9-4 (R), 10-4 (R), 12-4 (R), 16-4 (R), 18-4 (R), 3-5 (R) 24-4 (R), 25-4 (R), 27-4 (R), 1-5 (R), 3-5 (R), 5-5 (R), 8-5 (R), 5-6 (R), 16-6 (R), 19-6 (R), 23-6 (R), 29-7 (R), 19-8 (R), 22-8 (R), 25-8 (R), 27-8 (R), 28-8 (R), 4-9 (R), 5-9 (R), 16-9 (R), 29-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2018.- 22-5 (no es seguro; Peña Inclinada, en el nido Nº 1 y cerca; la anilla amarilla, leída de abajo arriba, en la pata derecha), 16-9 (R).

73C (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 4-4 (R), 11-8 (R), 16-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 30-8 (R), 3-9 (R), 2-12 (R), 8-12 (R), 18-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 12-1 (R), 17-1 (R), 19-1 (R), 22-1 (R), 25-1 (R), 16-2 (R), 18-2 (R), 8-3 (R), 2-4 (R), 12-4 (R), 25-4 (R), 1-8 (R), 19-8 (R), 9-10 (R), 20-10 (R), 24-10 (R), 26-10 (R), 15-11 (R), 22-11 (R), 10-12 (R), 16-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 5-1 (R), 28-1 (R), 1-2 (R), 12-2 (R), 27-2 (R), 1-3 (R), 7-3 (R), 9-3 (R), 11-3 (R), 13-3 (R), 27-3 (R), 31-3 (R), 4-4 (R), 7-4 (R), 11-4 (R), 4-5 (R), 5-5 (R), 6-5 (R), 8-5 (R), 15-5 (R), 20-5 (R), 23-5 (R), 1-6 (R), 6-6 (R), 19-6 (R), 22-6 (R), 30-6 (R), 3-7 (R), 11-7 (R), 14-7 (R), 25-7 (R), 27-7 (R), 20-9 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 7-1 (R), 8-1 (C), 13-1 (R), 21-1 (R), 30-1 (R), 2-2 (R), 5-2 (R), 11-2 (R), 20-2 (R), 26-2 (R), 9-4 (R), 19-5 (R), 21-5 (R), 23-5 (Peña Inclinada, zona del Nº 20; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izqda.; con anilla de metal), 10-6 (R), 17-6 (R), 24-7 (R), 12-10 (R), 15-10 (R), 25-11 (R), 2-12 (R), 25-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 9-2 (R), 8-3 (R), 11-4 (R), 21-7 (Peña Inclinada, cerca del Nº 5; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata ¿derecha?; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 6-3 (R), 28-3 (R), 15-4 (C), 25-4 (R), 1-5 (R) (tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izqda.), 30-5 (R), 19-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2017.- 24-4 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).

73W (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 21-8 (R), 29-11 (R), 7-12 (R), 18-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 13-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 5-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2017.- 12-6 (R; se lee de arriba abajo).

736 (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 1-4 (R), 2-4 (R), 4-4 (R), 2-5 (C), 16-5 (R), 22-5 (R), 24-5 (R), 12-6 (R), 14-6 (R), 20-6 (R), 6-8 (R), 7-8 (R), 11-8 (R), 17-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 28-8 (R), 30-8 (R), 3-9 (R), 7-9 (R), 8-9 (R), 2-12 (R), 18-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-1 (R), 12-1 (R), 25-1 (R), 31-1 (R), 12-2 (R), 16-2 (R), 20-2 (R), 22-2 (R), 26-2 (R), 28-2 (R), 3-3 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 17-3 (R), 24-3 (R), 31-3 (R), 2-4 (R), 7-4 (R), 10-4 (R), 12-4 (R), 18-4 (R), 24-4 (R), 25-4 (R), 29-4 (R), 30-4 (R), 1-5 (R), 8-5 (R), 18-5 (R), 24-5 (R),

30-5 (R), 12-6 (R), 16-6 (R), 19-6 (R), 20-6 (R),
4-7 (en el G. I. del bco. de Vald., cerca del Nº 16).

73N (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 8-6 (en el G. I del bco. de Valdecasuar), 7-8 (R),
28-8 (R), 3-9 (R), 6-9 (R), 7-9 (R), 30-12 (R).
Nota.- 8-6.- El buitre es subadulto.
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 12-1 (R), 17-1 (R), 31-1 (R), 12-2 (R),
13-2 (R), 28-2 (R), 5-3 (R), 8-3 (R), 10-3 (R),
12-3 (R), 24-3 (R), 31-3 (R), 7-4 (R), 18-4 (R),
24-4 (R), 30-4 (R), 5-5 (en el nido Nº 14, sin pollo, de
Valdecasuar), 8-5 (R), 17-5 (R), 18-5 (R), 5-6 (en el
nido Nº 16 de Valdecasuar, junto al pollo), 16-6 (R),
19-6 (R), 20-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 1-2 (R), 3-2 (R), 6-2 (R), 12-2 (R) (dos veces),
15-2 (R), 18-2 (R), 23-2 (R), 27-2 (R), 1-3 (R), 5-3 (R),
11-3 (R), 13-3 (R), 24-3 (R), 31-3 (R), 6-4 (R), 8-4 (R),
13-4 (R), 20-4 (R), 23-4 (R), 7-5 (R), 8-5 (R),
12-5 (G.I.Vald.; con anilla de metal en la pata dcha.),
15-5 (R), 19-5 (R), 20-5 (R), 23-5 (R), 11-6 (R),
12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R) (en dos festines), 24-6 (R),
25-6 (R), 28-6 (R), 3-7 (R), 7-7 (R), 9-7 (R) (con anilla
de metal en pata dcha.), 11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R),
15-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R) (con anilla de metal en
pata dcha.), 21-7 (R), 4-8 (R), 6-8 (R), 10-8 (R),
14-8 (R), 17-8 (R), 19-8 (R), 22-8 (R), 28-8 (R),
31-8 (R), 2-9 (R), 5-9 (R), 8-9 (R), 9-9 (R), 14-9 (R),
17-9 (R), 20-9 (R), 23-9 (R), 25-9 (R), 28-9 (R),
7-10 (R), 24-10 (R), 29-10 (R), 31-10 (R), 2-11 (R),
6-11 (R), 9-11 (R), 12-11 (R), 14-11 (Peña Portillo 2ª),
15-11 (Peña Portillo; con anilla de metal en pata dcha.),
16-11 (R), 26-11 (R), 29-11 (R), 3-12 (R), 4-12 (R),
14-12 (R), 16-12 (R), 21-12 (R), 25-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 1-1 (R), 7-1 (R), 9-1 (R), 13-1 (R), 19-1 (R), 21-1 (R),
25-1 (R), 26-1 (R), 2-3 (R), 3-3 (R), 8-3 (R), 9-3 (R),
11-3 (R), 21-3 (R), 28-3 (R), 29-3 (R), 30-3 (R),
5-4 (R), 6-4 (R), 9-4 (R), 15-4 (R), 22-4 (R), 26-4 (R),
27-4 (R), 2-5 (R), 15-5 (R), 17-5 (G.I. del bco. de
Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con anilla de metal
en pata derecha), 19-5 (R), 21-5 (R), 27-5 (R), 31-5 (R),
3-6 (R), 10-6 (R), 17-6 (R), 20-6 (R), 23-6 (R),
29-6 (R), 30-6 (R), 13-7 (R), 14-7 (R), 24-7 (R),
2-8 (R), 31-8 (R), 6-9 (R) (en dos festines), 23-9 (R),
24-9 (R), 12-10 (R), 13-10 (R), 3-11 (R), 14-11 (R),
2-12 (R), 5-12 (R), 7-12 (R), 13-12 (R), 20-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 7-1 (R), 8-1 (R), 17-1 (R), 18-1 (R), 29-1 (R), 5-2 (R)
(en dos festines), 15-2 (R), 5-3 (R), 22-4 (R), 11-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 11-1 (R), 17-1 (R), 6-3 (R), 28-3 (R), 25-4 (R),
23-5 (R), 30-5 (R), 19-9 (R).

(Puede verse una foto del buitre con anilla 73N, obtenida por Sergio Arís Arderiu el 12 de noviembre de 2009, en la **Hoja Informativa Nº 34**, pág. 324.)

73X (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 6-8 (R), 18-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 8-1 (R), 9-1 (R), 5-2 (R), 16-2 (R), 26-2 (R),
13-3 (R), 24-3 (R), 31-3 (R), 2-4 (R), 7-4 (R), 9-4 (R),
12-4 (R), 18-4 (R), 8-5 (en P.D.I., en un nido), 20-6 (R),
23-6 (R), 1-7 (R), 11-7 (R), 25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 19-1 (R), 26-1 (R), 28-1 (R), 1-2 (R), 6-2 (R), 15-2 (R),
18-2 (R), 17-4 (R), 1-5 (R), 4-5 (R), 11-5 (R), 1-6 (R),

11-6 (R) (con anilla de metal en pata izqda.), 9-7 (R), 21-7 (R), 3-8 (R), 17-8 (R), 19-8 (R), 7-10 (R), 24-10 (R), 26-10 (R), 2-11 (R), 15-11 (R), 14-12 (R), 29-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 8-1 (C), 5-2 (R) (en dos festines), 20-2 (R), 5-3 (R), 24-3 (R), 30-3 (R), 14-5 (R), 14-6 (R), 22-6 (R), 24-6 (R), 26-6 (R), 28-6 (R), 6-7 (R) (se lee de abajo arriba), 24-7 (R), 30-7 (R), 2-8 (ceba al pollo en el nido Nº 1 de Peña Inclinada –P.D.I.-; la anilla amarilla se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izqda), 23-9 (R), 8-10 (R), 15-10 (R), 14-11 (R), 13-12 (R), 25-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 24-3 (R).

Observaciones comunicadas en 2012.- 25-4 (R), 23-5 (R), 6-6 (junto al nido Nº 4, con pollo, de Peña Inclinada –P.D.I.-; la anilla amarilla, en la pata derecha).

Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R; se lee de abajo arriba, en la pata ¿izqda.?), 19-6 (R; fot.; se lee de abajo arriba, en la pata ¿izqda?).

Observaciones comunicadas en 2015.- 7-11 (Peña Portillo).

Observaciones comunicadas en 2017.- 20-5 (no es seguro; en el nido Nº 1, con pollo, de P.D.I.; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 12-6 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha).

Observaciones comunicadas en 2018.- 9-3 (R; con anilla de metal en la pata izquierda).

Observaciones comunicadas en 2019.- 27-2 (la primera letra no fue vista; en el nido Nº 1 de P.D.I.; se lee de abajo arriba).

73T (N).- Observaciones comunicadas en 2008.- 5-2 (R), 13-2 (R), 26-2 (R), 12-3 (R), 25-8 (R), 27-8 (R), 16-9 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 1-2 (R), 18-2 (R) (dos veces), 27-2 (R), 1-3 (R), 5-3 (R), 9-3 (R), 11-3 (R), 14-4 (R), 20-4 (R), 23-4 (R) 24-4 (R), 11-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R), 22-6 (R), 25-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 7-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 15-7 (R), 21-7 (R), 24-7 (R), 10-8 (R), 12-8 (R), 17-8 (R), 24-8 (R), 31-8 (R), 2-9 (R), 8-9 (R), 9-9 (R), 14-9 (R), 17-9 (R), 7-10 (R), 15-10 (R), 19-10 (R), 26-10 (R), 31-10 (R), 6-11 (R), 9-11 (R), 11-11 (C) (?), 12-11 (R), 25-11 (R), 29-11 (R), 4-12 (R), 14-12 (R), 21-12 (R), 29-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R), 14-1 (R), 20-1 (R), 18-2 (R), 17-4 (R), 26-4 (R), 28-4 (R), 27-5 (R), 3-6 (R), 16-7 (R), 2-8 (R), 18-9 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 9-2 (R), 24-3 (R), 22-4 (R).

Observaciones comunicadas en 2012.- 27-2 (R) (¿?; 73¿T? o 73¿1?; con anilla de metal en la pata derecha), 28-3 (R), 25-4 (R), 23-5 (R).

73H (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 8-9 (R).

Observaciones comunicadas en 2008.- 12-2 (R), 10-11 (C).

Observaciones comunicadas en 2009.- 15-7 (C; fotografiado), 24-10 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 26-4 (R).

737 (N).- Observaciones comunicadas en 2007.- 3-6 (C) (fot.), 30-12 (C; fot.).

Observaciones comunicadas en 2008.- 8-3 (R), 12-3 (R), 12-4 (C; fot.).

Observaciones comunicadas en 2009.- 1-5 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 10-4 (C).

73L (N).- Observaciones comunicadas en 2009.- 11-5 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 14-7 (C).

Observaciones comunicadas en 2016.- 13-11 (alto de S.I., Plat. I).

6XU.- Anillado de pollo, el 29 de mayo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 26-8 (C; fotografiado).
Observaciones comunicadas en 2009.- 1-3 (R) (la anilla se lee de arriba abajo), 5-2 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 9-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 7-6 (R; fot.), 10-6 (R), 27-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 25-4 (R), 30-5 (R), 26-7 (cerca del nido Nº 13 del barranco de Valdecasuar [margen izquierda, Grupo I]; con la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha), 30-8 (R; con la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2013.- 19-7 (en el G. I. del barranco de Valdecasuar, junto al nido Nº 40, fuera del nido; se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata izquierda), 24-7 (R), 11-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2014.- 7-6 (en el G.I. del barranco de Valdecasuar, en la repisa de los nidos Nº 10 y Nº 11; se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata izquierda), 25-8 (R).

6XV.- Anillado de pollo, el 29 de mayo, en el nido Nº 52 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 30-8 (R), 3-9 (R), 6-9 (R).

6XP.- Anillado de pollo, el 29 de mayo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2009.- 24-7 (C).
Observaciones comunicadas en 2011.- 10-4 (C).
Observaciones comunicadas en 2012.- 15-4 (C).
Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal).

6XX.- Anillado de pollo, el 29 de mayo, en el nido Nº 74´´ del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 11-8 (R), 30-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 24-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 5-2 (R), 15-4 (R), 17-6 (R), 14-7 (R), 30-7 (R), 9-8 (R), 30-8 (R), 6-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 9-2 (R), 22-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2018.- 9-3 (R; no es seguro), 29-11 (R; fotografiado; en la pata derecha; adulto).

6XW.- Anillado de pollo, el 29 de mayo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 23-8 (R), 3-9 (R), 8-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2008.- 16-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 12-8 (R), 19-6 (R), 17-8 (R), 28-8 (R), 14-9 (R), 15-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 17-5 (Grupo I del barranco de Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda; ap. subadulto; rebaña restos de un huevo en el Nº 10), 17-6 (R), 23-6 (R), 1-7 (R), 6-7 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 7-7 (R), 10-7 (R), 16-7 (R), 9-8 (R), 1-9 (R), 8-10 (R).

711.- Anillado de pollo, el 29 de mayo, en el nido Nº 16 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda). (No es seguro el nido).
Observaciones comunicadas en 2007.- 7-9 (R), 8-9 (R).

714.- Anillado de pollo, el 29 de mayo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2007.- 23-8 (R), 28-8 (R), 3-9 (R), 7-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 19-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 16-7 (R).

Anillados en 2008.-

95J.- Anillado de pollo, el 20 de mayo, en el nido Nº 10 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2008.- 13-8 (R), 21-8 (R), 5-9 (R), 6-9 (R), 9-9 (C).
Observaciones comunicadas en 2010.- 31-3 (R), 13-5 (en **Portugal**, en la zona del **Tajo** Internacional; en Ribeira do Aravil, Monforte da Beira, Castelo Branco; coordenadas 39º 40´ 36´´ N, 07º 15´ 52´´ W), 17-5 (R), 3-6 (Las Torcas, nido –sin pollo- Nº 7; el buitre es inmaduro del tercer año ap.; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2012.- 21-1 (R), 25-4 (R).

95M.- Anillado de pollo, el 20 de mayo, en el nido Nº 46 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2008.- 27-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 26-2 (R), 17-4 (R), 15-5 (R), 17-5 (R), 27-5 (R), 7-7 (R), 19-7 (R), 18-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 27-1 (R), 22-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 4-2 (R), 17-3 (R), 15-4 (C), 25-4 (R), 30-5 (R), 30-8 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2013.- 20-11 (F; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2017.- 30-3 (R; no es seguro).

95N.- Anillado de pollo, el 20 de mayo, en el nido Nº 16 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2008.- 18-8 (R) (el día anterior, lo vi junto a su nido).
Observaciones comunicadas en 2012.- 6-3 (R), 25-4 (R).

95F.- Anillado de pollo, el 20 de mayo, en el nido Nº 12´(o Nº 78) del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2008.- 21-8 (R), 25-8 (R), 5-9 (R), 7-10 (R).

95L.- Anillado de pollo, el 20 de mayo, en el barranco de Valdecasuar (margen izquierda). (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 13-8 (R), 21-8 (R), 25-8 (R), 27-8 (R), 28-8 (R), 11-9 (R), 29-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 6-4 (R), 12-4 (R), 2-7 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 17-3 (R), 30-8 (R), 6-11 (C; fot.; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2013.- 1-7 (en lo alto de Peñalba; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2014.- 25-4 (Peña Rubia).
Observaciones comunicadas en 2015.- 11-3 (Peñalba; con la anilla amarilla en la pata izquierda), 6-5 (Peñalba, nido Nº 14 –con pollo-; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; copula con otro buitre adulto, junto al pollo, siendo este buitre anillado el de abajo).

Puede verse una foto del buitre leonado con la anilla 95L, obtenida por Fernando Alarcón García el 6 de noviembre de 2012, en la **Hoja Informativa Nº 38**, pág. 336.

74H.- ¿Anillado de pollo, el 27/28 de mayo, en V.A.D. o en S.I.? (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 21-8 (R), 6-9 (R), 16-9 (R), 21-9 (C).
Observaciones comunicadas en 2010.- 8-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 11-6 (R; fot.; se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 17-3 (R), 28-3 (R), 25-4 (R), 1-5 (R; se lee de arriba abajo con anilla de metal en la pata ¿izquierda?),23-5 (R), 7-8 (R; se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata derecha), 19-9 (R).

Observaciones comunicadas en 2014.- 20-5 (en el nido Nº 46, sin pollo, de Los Poyales, con otro buitre adulto; se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata derecha).

Puede verse una foto del buitre con anilla 74H, obtenida por Juan José Molina Pérez el 11 de junio de 2011, en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 309.

745.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 21-8 (R), 25-8 (R), 27-8 (R).

74L.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 28-8 (R), 6-9 (R), 11-9 (R), 10-11 (R) (lleva emisor).
Observaciones comunicadas en 2009.- 5-1 (R), 8-1 (R), 11-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 3-11 (R).

74X.- ¿Anillado con red, en la zona de El Reloj, el 19 de agosto de 2008? (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 19-8 (R), 22-8 (R), 4-9 (R), 5-9 (R), 6-9 (R), 11-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 12-2 (R), 1-4 (R), 4-4 (R), 7-4 (R), 11-4 (R), 6-5 (R), 9-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 31-8 (R), 8-9 (R), 28-9 (R), 2-11 (R), 14-11 (Peñalba; el buitre es subadulto).
Observaciones comunicadas en 2010.- 8-1 (C), 16-1 (C), 3-2 (Peñalba, en repisa bajo nidos Nº 9 y Nº 3; el buitre es subadulto).
Observaciones comunicadas en 2012.- 25-1 (nido Nº 11-S.D.; el buitre es subadulto; tiene la anilla amarilla, que se le de arriba abajo, en la pata derecha).

74T.- ¿Anillado con red, en la zona de El Reloj, el 19 de agosto de 2008? (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 21-8 (R), 22-8 (R), 25-8 (R), 27-8 (R), 28-8 (R), 16-9 (R), 2-10 (R), 26-11 (R), 29-11 (R), 16-12 (R), 25-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 8-1 (R), 26-1 (R), 28-1 (R), 1-2 (R), 12-2 (R) 18-2 (R) (dos veces), 20-2 (R), 26-2 (R), 27-2 (R), 1-3 (R), 5-3 (R), 7-3 (R), 9-3 (R), 11-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 24-3 (R) (dos veces), 25-3 (R), 27-3 (R), 1-4 (R), 4-4 (R), 7-5 (R), 8-5 (R), 19-5 (R), 22-5 (R), 23-5 (R), 26-5 (R), 27-5 (R), 31-5 (R), 1-6 (R), 4-6 (R), 6-6 (R), 11-6 (R), 12-6 (R), 15-6 (R) (con anilla de metal en pata dcha.), 19-6 (R) (en dos festines), 22-6 (R), 24-6 (R), 25-6 (R), 27-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 3-7 (R), 7-7 (R), 9-7 (R) (en dos festines; con anilla de metal en pata derecha), 11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 15-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R), 21-7 (R), 24-7 (R), 25-7 (R), 27-7 (R), 3-8 (R), 4-8 (R), 5-8 (R), 6-8 (R), 10-8 (R), 12-8 (R), 14-8 (R), 17-8 (R), 19-8 (R), 20-8 (R), 22-8 (R), 24-8 (R), 26-8 (R), 27-8 (R), 28-8 (R), 31-8 (R), 2-9 (R) (dos veces), 5-9 (R), 8-9 (R), 9-9 (R), 14-9 (R), 15-9 (R), 17-9 (R), 20-9 (R), 23-9 (R), 25-9 (R), 15-10 (R), 24-10 (R), 26-10 (R), 9-11 (R), 12-11 (R), 15-11 (R), 23-11 (R), 25-11 (R), 26-11 (R), 27-11 (R), 29-11 (R), 4-12 (R), 16-12 (R), 21-12 (R) (en dos festines), 25-12 (R), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 14-1 (R), 18-1 (R), 24-1 (R), 26-1 (R), 28-1 (R), 1-2 (R), 2-2 (R), 16-2 (R), 18-2 (R), 20-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R), 1-3 (R), 2-3 (R), 3-3 (R), 4-3 (R), 8-3 (R), 12-3 (R), 21-3 (R), 24-3 (R), 26-3 (R), 28-3 (R), 29-3 (R), 30-3 (R), 31-3 (R), 3-4 (R), 9-4 (R), 12-4 (R), 13-4 (R), 15-4 (R), 17-4 (R), 21-4 (R), 22-4 (R) (en dos festines), 27-4 (R), 28-4 (R), 2-5 (R), 5-5 (R), 14-5 (R), 15-5 (R), 17-5 (R), 19-5 (R), 27-5 (R), 3-6 (R), 9-6 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 10-6 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 14-6 (R), 15-6 (R), 22-6 (R), 23-6 (R), 26-6 (R), 27-6 (R), 28-6 (R), 1-7 (R), 2-7 (R), 6-7 (R) (en la pata izquierda; se lee de abajo arriba), 13-7 (R), 14-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R), 24-7 (R), 30-7 (R),

4-8 (R), 9-8 (R), 14-8 (R), 23-8 (R), 30-8 (R), 1-9 (R), 6-9 (R) (en dos festines), 11-9 (R), 15-9 (R), 18-9 (R), 22-9 (R), 12-10 (R), 18-10 (R), 26-10 (R), 31-10 (R), 3-11 (R), 14-11 (R), 23-11 (R), 25-11 (R), 29-11 (R), 5-12 (R), 13-12 (R), 14-12 (R), 16-12 (R), 27-12 (R), 30-12 (R), 31-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 2-1 (R), 5-1 (R), 7-1 (R), 14-1 (R), 17-1 (R), 18-1 (R), 22-1 (R), 5-2 (R), 9-2 (R), 20-2 (R), 27-5 (en el nido Nº 8, con pollo, de Las Torcas; con anilla de metal en la pata derecha), 7-6 (R; fot.), 11-6 (R; fot.; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 14-11 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).

Observaciones comunicadas en 2012.- 27-2 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 17-3 (R; fot.; en la pata izquierda; se lee de abajo arriba), 28-3 (R), 25-4 (R), 1-6 (en el nido Nº 8, con pollo, de Las Torcas; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha; la letra T no es segura), 30-8 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 19-9 (R).

Observaciones comunicadas en 2013.- 6-11 (R), 11-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2016.- 22-7 (R).

Observaciones comunicadas en 2017.- 12-11 (Peña Portillo).

Observaciones comunicadas en 2018.- 29-11 (R: fotografiado; tiene la anilla amarilla en la pata izquierda; el buitre es adulto).

Pueden verse dos fotos del buitre con anilla 74T, obtenidas por Juan José Molina Pérez el 11 de junio de 2011 y por Javier Marchamalo de Blas el 17 de marzo de 2012, respectivamente, en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 311.

74V.- ¿Anillado con red, el 19 o el 27 de agosto de 2008? (No es seguro).

Observaciones comunicadas en 2008.- 6-9 (R) (lleva emisor), 16-9 (R) (al parecer, con emisor), 29-9 (R) (lleva emisor), 22-11 (R) (con emisor), 8-12 (R), 10-12 (R), 16-12 (R), 25-12 (R), 27-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 8-1 (R) (lleva emisor), 28-1 (R), 3-2 (R), 6-2 (R), 12-2 (R), 15-2 (R), 23-2 (R), 9-3 (R), 11-3 (R), 11-4 (R), 16-4 (R), 1-6 (R), 24-6 (R), 12-7 (R), 24-7 (R), 27-7 (R), 17-8 (R), 19-8 (R), 20-8 (R), 28-8 (R), 31-8 (R), 9-9 (R), 14-9 (R), 15-9 (R), 17-9 (R), 20-9 (R), 23-9 (R), 28-9 (R), 7-10 (R), 24-10 (R) (lleva emisor) (en dos festines), 26-10 (R) (con emisor de satélite), 2-11 (R), 6-11 (R) (lleva emisor).

Observaciones comunicadas en 2010.- 11-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R), 1-3 (R), 4-3 (R), 7-3 (R), 8-3 (R), 9-3 (R), 21-3 (R), 24-3 (R), 29-3 (R), 30-3 (R), 22-4 (R), 17-5 (R), 26-6 (R), 27-6 (R), 1-7 (R) (con emisor de satélite), 2-7 (R), 13-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R), 21-7 (R), 30-7 (R), 4-8 (R), 9-8 (R), 26-8 (R), 30-8 (R), 6-9 (R), 11-9 (R), 23-9 (R), 20-12 (R), 31-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 5-1 (R), 7-1 (R), 17-1 (R), 18-1 (R), 22-1 (R), 27-1 (R), 29-1 (R), 9-2 (R), 10-2 (R), 27-2 (R), 8-3 (R).

Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 25-4 (R), 31-7 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 19-9 (R) (con emisor de satélite).

74U.- ¿Anillado con red, el 19 o el 27 de agosto de 2008? (No es seguro).

Observaciones comunicadas en 2008.- 20-10 (R) (lleva emisor), 24-10 (R), 26-10 (R), 28-10 (R) (con emisor), 5-11 (R), 10-11 (R) (lleva emisor, con placa solar) (fotografiado), 11-11 (R) (con emisor),15-11 (R), 19-11 (R), 22-11 (R) (con emisor), 26-11 (R) (con emisor), 10-12 (R), 14-12 (R) (con emisor), 16-12 (R), 25-12 (R), 27-12 (R), 28-12 (R), 29-12 (R), 31-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 2-1 (R), 5-1 (R), 6-1 (R), 8-1 (R), 19-1 (R), 28-1 (R),

1-2 (R), 6-2 (R), 23-2 (R), 1-4 (R), 4-4 (R), 8-4 (R), 11-4 (R), 13-4 (R), 14-4 (R), 16-4 (R), 17-4 (R), 18-4 (R), 22-4 (R), 23-4 (R), 24-4 (R), 1-5 (R), 3-7 (R), 5-7 (C), 17-8 (R), 20-8 (R), 14-9 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 13-1 (R), 14-1 (R), 19-1 (R), 24-1 (R), 25-1 (R), 26-1 (R), 28-1 (R), 30-1 (R), 1-2 (R), 2-2 (R), 16-2 (R), 19-2 (R), 20-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R) (en dos festines), 2-3 (R), 4-3 (R), 8-3 (R), 9-3 (R), 21-3 (R), 24-3 (R), 26-3 (R), 28-3 (R), 30-3 (R), 3-6 (R), 22-6 (R), 23-6 (R), 26-6 (R), 28-6 (R), 29-6 (R), 1-7 (R), 2-7 (R), 6-7 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 7-7 (R), 13-7 (R), 24-7 (R), 2-8 (R), 4-8 (R) (con anilla de metal en la pata derecha), 18-8 (R), 23-8 (R), 26-8 (R), 6-9 (R), 10-2 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 18-1 (R), 22-1 (R), 29-1 (R), 9-2 (R), 15-2 (R), 27-2 (R), 19-5 (cerca del comedero del Refugio), 27-5 (R).

Observaciones comunicadas en 2012.- 11-1 (R), 25-4 (R), 1-5 (R), 19-9 (R).

Observaciones comunicadas en 2013.- 18-11 (R; con la anilla amarilla en la pata izquierda).

Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R).

Observaciones comunicadas en 2016.- 26-5 (El Corralón, zona del P.2; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal).

Observaciones comunicadas en 2017.- 24-4 (R; con anilla de metal en la pata derecha).

Observaciones comunicadas en 2018.- 12-11 (R; con anilla de metal en la pata derecha).

74P.- ¿Anillado con red, el 19 o el 27 de agosto de 2008? (No es seguro).

Observaciones comunicadas en 2008.- 20-10 (R) (lleva emisor), 1-11 (R) (con emisor), 10-11 (R) (lleva emisor), 22-11 (R) (con emisor), 8-12 (R), 10-12 (R), 14-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 12-2 (R), 12-2 (C) (fotografiado), 11-3 (R), 31-3 (R), 4-4 (R), 6-4 (R), 11-4 (R), 14-4 (R), 18-4 (R), 1-5 (R), 6-5 (R), 12-6 (R), 15-6 (R), 11-7 (R), 3-8 (R), 8-9 (R), 9-9 (R), 15-9 (R), 7-10 (R), 2-11 (R), 6-11 (R), 12-11 (R), 21-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 7-1 (R), 9-1 (R), 13-1 (R), 20-1 (R), 5-2 (R), 16-2 (R) (fot.; se lee de abajo arriba, en la pata izquierda), 20-2 (R), 26-2 (R), 1-3 (R), 2-3 (R), 5-3 (R), 8-3 (R), 12-3 (R), 21-3 (R), 26-3 (R), 29-3 (R), 30-3 (R), 3-4 (R), 9-4 (R), 17-4 (R), 21-4 (R), 22-4 (R), 27-4 (R), 28-4 (R), 2-5 (R), 5-5 (R), 19-5 (R), 21-5 (R), 27-5 (R), 1-7 (R), 2-7 (R) (con emisor de satélite), 24-7 (R), 4-8 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 30-8 (R), 11-9 (R), 29-10 (R), 3-11 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha; fot.), 31-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 14-1 (R), 9-2 (R), 10-2 (R), 15-2 (R), 25-2 (R), 9-3 (R).

Observaciones comunicadas en 2012.- 6-3 (R), 25-4 (R), 1-5 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 23-5 (R).

Observaciones comunicadas en 2013.- 24-7 (R) (se lee de abajo arriba, en la pata izquierda).

Observaciones comunicadas en 2017.- 30-3 (R; fot.; se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal), 17-7 (Peñalba, en el nido Nº 21, con pollo; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).

Puede verse una foto del buitre leonado con la anilla 74P, obtenida por Jesús Cobo Anula el 16 de febrero de 2010, en la **Hoja Informativa Nº 38**, pág. 339.

Puede verse otra foto del buitre con anilla 74P, obtenida por Elías Gomis Martín el 16 de noviembre de 2012, en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 313.

Puede verse otra foto del buitre leonado con la anilla 74P, obtenida por Jesús Cobo Anula el 30 de marzo de 2017, en la **Hoja Informativa Nº 49**.

740.- (No es seguro).

Observaciones comunicadas en 2008.- 21-9 (C).

Observaciones comunicadas en 2010.- 10-9 (C).

Observaciones comunicadas en 2016.- 6-8 (R; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 22-8 (R; con anilla de metal en la pata derecha).

74J.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 24-9 (R), 10-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 13-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 14-11 (R).

74M.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 21-9 (C; fot.), 28-9 (R), 7-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 13-1 (C).
Observaciones comunicadas en 2015.- 22-8 (R; no es seguro).

74R.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 10-11 (R) (lleva emisor) (fotografiado), 15-11 (R) (lleva emisor), 26-11 (R) (con emisor), 25-12 (R), 28-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 6-1 (R), 8-1 (R), 1-2 (R), 16-4 (R), 1-5 (R), 23-5 (R), 27-5 (R), 1-6 (R), 12-6 (R), 16-11 (R) (con la anilla amarilla en la pata izquierda), 17-11 (R) (con emisor), 23-11 (R), 25-11 (R), 27-11 (R), 29-11 (R), 3-12 (R), 4-12 (R), 16-12 (R), 21-12 (R) (en dos festines), 24-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R), 14-1 (R), 20-1 (R), 21-1 (R), 24-1 (R), 19-2 (R), 6-4 (R) (lleva emisor de satélite), 9-4 (R), 15-4 (R), 22-4 (R), 26-4 (R) (lleva emisor de satélite), 27-4 (R), 28-4 (R), 2-5 (R), 19-5 (R), 31-5 (R), 10-6 (R), 30-6 (R), 13-7 (R), 4-8 (R), 30-8 (R), 1-9 (R), 15-9 (R), 22-9 (R), 15-10 (R), 3-11 (R), 13-11 (P.D.I., Nº 11; 16 h. 40 m.; inm., anilla amarilla en pata izqda.; en cópula, está abajo), 16-11 (R), 25-11 (R), 25-12 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 7-1 (R), 8-1 (R), 19-1 (P.D.I.), 3-3 (R), 5-3 (R), 8-3 (R), 15-5 (R), 21-7 (P.D.I., cerca del Nº 8; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal), 16-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 25-4 (R), 31-7 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2013.- 17-11 (P.D.I.; repisa de la higuera).
Observaciones comunicadas en 2015.- 7-6 (nido Nº 23 de Peñalba, con pollo; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal).

74W.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2009.- 13-1 (C), 7-4 (R), 4-6 (R), 11-6 (R), 24-6 (R), 27-6 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 21-7 (R) (lleva emisor), 24-7 (R), 2-8 (R), 22-8 (R), 20-9 (R), 23-9 (R), 25-9 (R), 28-9 (R), 21-12 (R), 28-12 (C).
Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R), 13-1 (R), 30-1 (R), 5-2 (R), 20-2 (R), 28-3 (R), 13-4 (R), 27-4 (R), 27-5 (R), 31-5 (R), 28-6 (R), 19-7 (R), 2-8 (R), 26-8 (R), 6-9 (R) (en dos festines), 11-9 (R), 22-9 (R), 23-9 (R), 27-9 (R), 6-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 23-5 (R), 19-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 24-7 (R) (adulto; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2014.- 12-3 (en el nido Nº 19 de La Catedral, S.D.; es relevado por otro buitre, que ceba a un pollo no visto; el nido fracasaría posteriormente).
Observaciones comunicadas en 2017.- 17-5 (no es seguro; en el nido Nº 39, con pollo, de S.D., La Catedral).
Observaciones comunicadas en 2018.- 9-3 (R; con anilla de metal en la pata derecha).

75A.- (No es seguro).

Observaciones comunicadas en 2008.- 20-10 (R), 24-10 (R), 10-11 (R) (lleva emisor; fotografiado), 19-11 (R), 10-12 (R), 25-12 (R), 28-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 18-2 (R), 23-2 (R), 1-3 (R) (lleva emisor de satélite), 9-3 (R), 11-3 (R), 31-3 (R), 8-4 (R), 24-4 (R), 1-5 (R), 4-5 (R), 6-5 (R), 8-5 (R), 15-5 (R), 19-5 (R), 1-6 (R), 4-6 (R), 19-6 (R) (lleva emisor), 22-6 (R), 7-7 (R), 10-7 (en P. D. I., en la plataforma de los nidos Nº 7, 20 y 26; la anilla amarilla se lee de abajo arriba; tiene anilla de metal en la pata dcha.), 11-7 (R), 14-7 (R), 16-7 (R), 21-7 (R), 25-7 (R), 10-8 (R), 12-8 (R), 31-8 (R), 2-9 (R) (dos veces), 7-10 (R), 24-10 (R), 2-11 (R), 12-11 (R; fotografiado), 15-11 (R), 21-12 (R), 28-12 (C), 29-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R), 20-1 (R), 5-2 (R), 23-2 (R), 2-3 (R), 5-3 (R), 8-3 (R), 21-3 (R), 24-3 (R), 26-3 (R), 29-3 (R), 30-3 (R), 6-4 (R), 8-4 (R), 12-4 (R), 17-4 (R), 22-4 (R), 26-4 (R), 27-4 (R), 5-5 (R) (dos veces), 19-5 (R), 27-5 (R), 31-5 (R), 15-6 (R), 29-6 (R), 30-6 (R), 1-7 (R), 2-7 (R), 13-7 (R), 19-7 (R), 21-7 (R), 24-7 (R), 2-8 (R), 23-8 (R), 1-9 (R), 6-9 (R), 9-9 (R), 15-9 (R), 18-9 (R), 23-9 (R), 27-9 (R), 6-10 (R), 12-10 (R), 5-12 (R), 13-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 14-1 (R), 27-1 (R), 5-2 (R), 9-2 (R).

Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 6-3 (R), 17-3 (R; en la pata izquierda; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata dcha.), 28-3 (R), 25-4 (R), 23-5 (R), 7-7 (Peñalba; baja al nido Nº 3, con pollo; la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha), 19-9 (R).

Observaciones comunicadas en 2013.- 20-3 (Peña Inclinada, P.D.I., en el nido abandonado Nº 5), 18-11 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).

Observaciones comunicadas en 2014.- 15-1 (Peña Inclinada, P.D.I.; en el nido Nº 1; con la anilla amarilla en la pata izquierda); 23-8 (Peña Inclinada, P.D.I., no lejos del nido Nº 5; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal), 8-11 (Peña Portillo), 9-11 (Peña Portillo).

Observaciones comunicadas en 2015.- 5-10 (R; se lee de abajo arriba).

Observaciones comunicadas en 2017.- 24-4 (R).

Puede verse una foto del buitre con anilla 75A, obtenida por Sergio Arís Arderiu el 12 de noviembre de 2009, en la **Hoja Informativa Nº 34**, pág. 329.

Puede verse otra foto del buitre con anilla 75A, obtenida por Javier Marchamalo de Blas el 17 de marzo de 2012, en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 313.

750.- (No es seguro).

Observaciones comunicadas en 2008.- 20-10 (R), 24-10 (R), 28-10 (R), 9-11 (El Corralón).

Observaciones comunicadas en 2009.- 1-2 (R), 3-2 (R), 6-2 (R), 12-2 (R), 18-2 (R), 11-3 (R), 27-3 (R), 13-4 (R), 14-4 (R), 22-4 (R), 1-5 (R), 25-6 (R), 28-6 (R), 3-7 (R), 7-7 (R), 24-7 (R), 10-8 (R), 12-8 (R), 14-8 (R), 17-8 (R), 26-8 (R), 27-8 (R), 28-8 (R), 31-8 (R), 2-9 (R), 10-9 (R), 14-9 (R), 17-9 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 7-1 (R), 9-1 (R), 28-1 (R), 5-2 (R), 11-2 (R), 20-2 (R), 1-3 (R), 3-3 (R), 7-3 (R), 26-3 (R), 30-3 (R), 31-3 (R), 15-4 (R), 17-4 (R), 9-6 (R), 17-6 (R), 22-6 (R), 23-6 (R), 24-6 (R), 26-6 (R), 7-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R), 24-7 (R), 30-7 (R), 4-8 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 9-8 (R), 26-8 (R), 1-9 (R), 6-9 (R), 11-9 (R), 15-9 (R), 24-9 (R), 27-9 (R), 8-10 (R), 13-10 (R), 14-11 (R), 16-11 (R; fot.), 25-11 (R), 5-12 (R), 13-12 (R), 27-12 (R), 31-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 2-1 (R), 7-1 (R), 14-1 (R), 17-1 (R), 9-2 (R), 15-2 (R), 20-2 (R), 11-5 (R), 7-6 (R) (en dos festines; fot.), 27-5 (R), 2-8 (R) (fot.) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 16-11 (R).

Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 17-3 (R), 21-1 (R), 15-4 (C), 25-4 (R), 26-5 (C; fot.; se lee de abajo arriba), 30-8 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).

Observaciones comunicadas en 2013.- 20-2 (Peñalba; 75¿0?; se lee de abajo arriba; la anilla amarilla, en la pata izquierda), 22-10 (R).

Observaciones comunicadas en 2014.- 2-6 (se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; en el nido Nº 22 de El Corralón, junto al pollo), 28-6 (R), 25-8 (se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal).

Observaciones comunicadas en 2015.- 22-8 (R; en la pata izquierda; con anilla de metal), 7-11 (Peña Portillo).

Observaciones comunicadas en 2016.- 10-9 (R; se lee de abajo arriba, en la pata izquierda).

Observaciones comunicadas en 2017.- 12-4 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata ¿izquierda?).

Observaciones comunicadas en 2018.- 12-6 (se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal; en el nido Nº 4, con pollo, de la buitrera de Langa de Duero, en Soria), 21-8 (R; se lee de abajo arriba, en la pata izquierda), 16-9 (R; en la pata izquierda).

Pueden verse dos fotos del buitre con anilla 750, obtenidas por Elías Gomis Martín el 16 de noviembre de 2010, y por Miguel Sanz Trillo el 2 de agosto de 2011, respectivamente, en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 316.

Pueden verse otras dos fotos del buitre leonado con la anilla 750, obtenidas por Elías Gomis Martín el 16 de noviembre de 2010 y por Fernando Alarcón García el 26 de mayo de 2012 respectivamente, en la **Hoja Informativa Nº 38**, págs. 342 y 341.

751.- (No es seguro).

Observaciones comunicadas en 2008.- 20-10 (R), 24-10 (R), 26-10 (R), 28-10 (R), 1-11 (R), 5-11 (R), 19-11 (R), 26-11 (R), 29-11 (R), 10-12 (R), 29-12 (R), 31-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 8-1 (R), 26-1 (R), 6-2 (R), 12-2 (R), 15-2 (R), 18-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R), 27-2 (R), 1-3 (R), 7-3 (R), 9-3 (R), 11-3 (R), 13-3 (R), 25-3 (R), 31-3 (R), 7-4 (R), 11-4 (R), 14-4 (R), 16-4 (R), 20-4 (R), 23-4 (R), 1-5 (R), 4-5 (R), 6-5 (R), 8-5 (R), 11-5 (R), 19-5 (R), 20-5 (R), 22-5 (R), 26-5 (R), 27-5 (R), 31-5 (R), 1-6 (R), 4-6 (R), 6-6 (R), 11-6 (R) (con anilla de metal en otra pata) (en dos festines), 12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R) (en dos festines), 22-6 (R), 25-6 (R), 28-6 (R), 7-7 (R), 9-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R), 27-7 (R), 10-8 (R), 12-8 (R), 14 -8 (R), 15-8 (R), 17-8 (R), 20-8 (R), 26-8 (R), 28-8 (R), 31-8 (R), 2-9 (R), 5-9 (R), 8-9 (R), 9-9 (R), 14-9 (R), 15-9 (R), 19-10 (R), 24-10 (R), 27-10 (R), 28-10 (R), 29-10 (R), 2-11 (R), 6-11 (R), 9-11 (R), 12-11 (R), 16-11 (R), 17-11 (R), 23-11 (R), 25-11 (R), 26-11 (R), 27-11 (R), 3-12 (R), 4-12 (R), 14-12 (R), 21-12 (R), 24-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 7-1 (R), 9-1 (R), 13-1 (R), 18-1 (R), 19-1 (R), 25-1 (R), 26-1 (R), 2-2 (R), 5-2 (R), 11-2 (R), 16-2 (R), 18-2 (R), 19-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R), 3-3 (R), 8-3 (R), 24-3 (R), 29-3 (R), 31-3 (R), 6-4 (R), 12-4 (R), 13-4 (R), 15-4 (R), 17-4 (R), 21-4 (R), 22-4 (R) (en dos festines), 26-4 (R), 27-4 (R), 28-4 (R), 14-5 (R), 15-5 (R), 17-5 (R), 19-5 (R), 24-5 (R), 27-5 (R), 15-6 (R), 18-6 (R), 23-6 (R), 24-6 (R), 26-6 (R), 29-6 (R), 13-7 (R), 21-7 (R), 24-7 (R), 30-7 (R), 9-8 (R), 26-8 (R), 1-9 (R), 6-9 (R) (en dos festines), 11-9 (R), 18-9 (R), 22-9 (R), 24-9 (R), 17-10 (R), 18-10 (R), 31-10 (R),

3-11 (R), 14-11 (R), 16-11 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 29-11 (R), 2-12 (R), 5-12 (R), 8-12 (R), 16-12 (R), 25-12 (R), 27-12 (R), 30-12 (R), 31-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 3-1 (R), 7-1 (R), 8-1 (R), 14-1 (R), 17-1 (R), 18-1 (R), 27-1 (R), 5-2 (R), 9-2 (R), 15-2 (R), 3-3 (R), 5-3 (R), 8-3 (R), 9-3 (R), 10-3 (R), 14-3 (R), 24-3 (R), 27-3 (R), 1-5 (R), 11-5 (entre los nidos Nº 94 y Nº 93 del bco. de Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 11-5 (R), 7-6 (R; fot.), 14-11 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).

Observaciones comunicadas en 2012.- 6-3 (R), 21-1 (R), 13-5 (en el Grupo I del bco. de Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda; la lectura no es segura), 5-6 (en el nido Nº 46, con pollo, del barranco de Valdecasuar [margen izquierda, Grupo I]; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 26-7 (en el nido Nº 46 del barranco de Valdecasuar; el pollo le pide ceba; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 7-8 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 18-11 (barranco de Valdecasuar, Grupo I, al amanecer; con la anilla amarilla en la pata derecha).

Observaciones comunicadas en 2013.- 5-6 (en el nido Nº 46, con pollo, del barranco de Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 19-7 (en la zona de los nidos Nº 10-Nº 11 del barranco de Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 12-8 (en la zona de los nidos Nº 10-Nº 11 del barranco de Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 6-11 (R), 17-11 (Valdecasuar m.i.3 –con la anilla amarilla en la pata derecha-, y ¿P.D.I.-repisa grande-?).

Observaciones comunicadas en 2014.- 19-2 (Peñalba), 17-5 (en el nido Nº 46-Vald., con pollo).

Observaciones comunicadas en 2016.- 6-8 (R), 10-9 (R).

Observaciones comunicadas en 2018.- 11-8 (R), 13-8 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).

Puede verse una foto del buitre con la anilla 751, obtenida por Marianne Delacrétaz el 15 de junio de 2009, en la **Hoja Informativa Nº 34**, pág. 318.

759.- (No es seguro).

Observaciones comunicadas en 2008.- 20-10 (R), 24-10 (R), 26-10 (R), 28-10 (R), 1-11 (R), 5-11 (R), 10-11 (R), 11-11 (R), 15-11 (R), 22-11 (R), 26-11 (R), 29-11 (R), 8-12 (R), 14-12 (R), 16-12 (R), 23-12 (R), 25-12 (R), 27-12 (R), 28-12 (R), 29-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 5-1 (R), 8-1 (R), 19-1 (R), 26-1 (R), 28-1 (R), 1-2 (R), 6-2 (R), 7-2 (R), 12-2 (R), 15-2 (R), 18-2 (R), 23-2 (R) (fot.; se lee de abajo arriba; con anilla metálica en pata dcha.), 5-3 (R), 9-3 (R), 11-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 27-3 (R), 31-3 (R), 4-4 (R), 6-4 (R), 8-4 (R), 11-4 (R), 30-6 (R), 3-8 (R), 5-8 (R), 10-8 (R), 12-8 (R), 20-8 (R), 22-8 (R), 31-8 (R), 2-9 (R), 5-9 (R), 8-9 (R), 9-9 (R), 10-9 (R), 20-9 (R), 23-9 (R), 25-9 (R), 28-9 (R), 7-10 (R), 17-10 (R), 19-10 (R), 24-10 (R) (en dos festines), 26-10 (R), 29-10 (R), 31-10 (R), 2-11 (R), 6-11 (R), 9-11 (R), 12-11 (R), 15-11 (R), 17-11 (R), 23-11 (R), 25-11 (R), 26-11 (R), 27-11 (R), 3-12 (R), 14-12 (R), 16-12 (R), 21-12 (R) (en dos festines), 24-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 9-1 (R), 13-1 (R), 14-1 (R), 18-1 (R), 26-2 (R), 9-3 (R) (en dos festines), 21-3 (R), 31-3 (R), 3-4 (R), 15-4 (R), 21-4 (R), 27-5 (R), 10-6 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal

en la pata derecha). 15-6 (R), 18-6 (R), 28-6 (R), 1-7 (R), 10-7 (R), 13-7 (R), 14-7 (R), 21-7 (R), 24-7 (R), 30-7 (R), 2-8 (R), 4-8 (R), 9-8 (R), 14-8 (R) (en dos festines), 30-8 (R), 6-9 (R) (en dos festines), 9-9 (R), 11-9 (R), 15-9 (R), 22-9 (R), 23-9 (R), 8-10 (R), 12-10 (R), 14-11 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 8-3 (R), 27-5 (R).

Observaciones comunicadas en 2012.- 30-5 (R), 30-8 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 19-9 (R).

Observaciones comunicadas en 2013.- 16-7 (en el nido Nº 24 de El Corralón, con pollo; se lee de abajo arriba (?); con anilla de metal en la pata derecha), 18-11 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 11-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R; fot: tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal en la pata derecha), 8-11 (V.A.D.).

Observaciones comunicadas en 2016.- 10-3 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal en la pata derecha)

Observaciones comunicadas en 2018.- 16-9 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda).

Puede verse una foto del buitre leonado con la anilla 759, obtenida por Jesús Cobo Anula el 23 de febrero de 2009, en la **Hoja Informativa Nº 38**, pág. 344.

75C.- (No es seguro).

Observaciones comunicadas en 2008.- 22-10 (C).

Observaciones comunicadas en 2009.- 8-1 (C), 15-1 (C), 6-2 (R), 1-4 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 30-3 (R), 12-4 (R), 14-8 (R), 31-10 (R), 16-11 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 24-3 (R).

Observaciones comunicadas en 2012.- 23-5 (R).

Observaciones comunicadas en 2016.- 16-6 (buitrera de Langa de Duero, Soria; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal).

Observaciones comunicadas en 2017.- 30-3 (R; la letra C no es segura).

Observaciones comunicadas en 2018.- 14-8 (R; tiene la anilla amarilla en la pata izquierda).

75L.- (No es seguro).

Observaciones comunicadas en 2008.- 10-11 (R), 19-11 (R), 22-11 (R), 10-12 (R), 14-12 (R), 16-12 (R), 23-12 (R), 25-12 (R), 28-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 2-1 (R), 8-1 (R), 1-2 (R), 3-2 (R), 6-2 (R), 18-2 (R), 23-2 (R) (fot.; la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal en pata derecha), 26-2 (R), 7-3 (R), 9-3 (R), 11-3 (R), 4-4 (R), 11-4 (R), 24-4 (R), 1-5 (R), 4-5 (R), 6-5 (R), 7-5 (R), 11-5 (R), 15-5 (R), 19-5 (R), 31-5 (R), 1-6 (R), 4-6 (R), 11-6 (R) (en dos festines), 15-6 (R), 19-6 (R), 24-6 (R), 25-6 (R), 7-7 (R), 9-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 15-7 (R), 19-7 (R), 21-7 (R), 3-8 (R), 10-8 (R), 14-8 (R), 31-8 (R), 14-9 (R), 15-9 (R), 20-9 (R), 23-9 (R), 25-9 (R), 7-10 (R), 21-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 28-3 (R), 8-10 (R).

Observaciones comunicadas en 2015.- 6-6 (G.I. del barranco de Valdecasuar; no es seguro).

75J.- (No es seguro).

Observaciones comunicadas en 2008.- 10-11 (R) (con emisor) (fotografiado), 15-11 (R), 19-11 (R), 26-11 (R), 27-12 (R), 28-12 (R), 29-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 8-1 (R), 13-1 (C), 28-1 (R), 1-2 (R) (con emisor de satélite), 18-2 (R), 27-2 (R), 11-3 (R) (dos veces), 13-3 (R), 25-3 (R), 27-3 (R), 13-4 (R), 16-4 (R), 17-4 (R), 22-4 (R), 23-4 (R), 11-5 (R), 15-5 (R), 20-5 (R), 22-5 (R), 31-5 (R), 4-6 (R), 11-6 (R y C), 12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R) (en dos festines),

25-6 (R), 27-6 (R), 28-6 (R), 3-7 (R), 7-7 (R), 11-7 (R), 14-7 (R), 15-7 (R), 16-7 (R), 19-7 (R), 21-7 (R), 4-8 (R), 10-8 (R), 12-8 (R), 14-8 (R), 17-8 (R), 19-8 (R), 20-8 (R), 22-8 (R), 24-8 (R), 31-8 (R), 2-9 (R), 8-9 (R), 10-9 (R), 14-9 (R), 15-9 (R), 17-9 (R), 20-9 (R), 23-9 (R), 25-9 (R), 28-9 (R), 7-10 (R), 19-10 (R), 24-10 (R), 29-10 (R), 31-10 (R), 2-11 (R), 6-11 (R), 12-11 (R) (fot.; con anilla de metal en la pata derecha), 15-11 (R), 16-11 (R), 17-11 (R), 23-11 (R), 25-11 (R), 26-11 (R), 27-11 (R), 29-11 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 8-1 (C), 13-1 (R), 19-1 (R), 5-2 (R) (en dos festines), 16-2 (R), 18-2 (R), 26-2 (R), 1-3 (R), 2-3 (R), 11-3 (R), 24-3 (R), 26-3 (R), 31-3 (R), 3-4 (R), 9-4 (R), 12-4 (R), 26-4 (R), 27-4 (R), 2-5 (R), 14-5 (R), 17-5 (R), 19-5 (R), 30-7 (R), 9-8 (R), 30-8 (R), 31-8 (R), 18-9 (R), 22-9 (R), 12-10 (R), 23-11 (R), 25-11 (R), 29-11 (R), 30-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 27-1 (R), 29-1 (R), 5-2 (R), 9-2 (R), 10-2 (R), 8-3 (R), 9-3 (R), 7-6 (R; fot.).

Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 25-4 (R), 1-5 (R).

Puede verse una foto del buitre con anilla 75J, obtenida por Sergio Arís Arderiu el 12 de noviembre de 2009, en la **Hoja Informativa Nº 34**, pág. 331.

75M.- (No es seguro).

Observaciones comunicadas en 2008.- 10-11 (R) (con emisor) (fotografiado), 8-12 (R), 10-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 28-1 (R), 31-3 (R), 1-4 (R), 4-4 (R), 8-4 (R), 23-5 (R), 31-5 (R) ¿15-6 (R)?, 24-6 (R), 27-6 (R), 9-7 (R), 12-7 (R), 19-7 (R), 25-7 (R), 3-8 (R), 22-8 (R), 8-9 (R), 15-9 (R), 17-9 (R), 23-9 (R), 15-10 (R), 19-10 (R), 26-10 (R), 2-11 (R), 12-11 (R), 14-11 (Peña Inclinada, P.D.I.; el buitre es subadulto), 25-11 (R), 26-11 (R), 29-11 (R), 3-12 (R), 4-12 (R), 14-12 (R), 29-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 8-1 (C), 9-1 (R), 14-1 (R), 25-1 (R), 26-1 (R), 5-2 (R), 11-2 (R), 20-2 (R), 7-3 (R), 21-3 (R), 30-3 (R), 3-4 (R), 5-4 (R), 8-4 (R), 12-4 (R), 26-4 (R), 5-5 (R), 15-5 (R), 19-5 (R), 21-5 (R), 24-5 (Los Poyales, Plataforma I; el buitre es ad., y tiene la anilla amarilla –que se lee de abajo arriba- en la pata izquierda), 24-5 (R), 31-5 (R), 10-6 (R), 20-6 (R), 22-6 (R), 24-6 (R), 30-6 (R), 13-7 (R), 24-7 (R), 9-8 (R), 23-8 (R), 1-9 (R), 6-9 (R) (en dos festines), 22-9 (R), 17-10 (R), 31-10 (R), 13-11 (P.D.I., Nº 4; inm., 16 h. 43 m.; anilla amarilla en pata derecha), 14-11 (R), 16-11 (R), 2-12 (R), 30-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 14-1 (R), 18-1 (R), 29-1 (R), 5-2 (R), 15-2 (R), 25-2 (R), 13-11 (P.D.I.; la anilla amarilla, en la pata izquierda; el buitre es subadulto; está arriba en una cópula con otro buitre subadulto, junto al nido Nº 4; 9 h. 23 m.), 14-11 (R) (con anilla de metal en la pata derecha).

Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 11-4 (ceba al pollo en el nido Nº 7 de P.D.I.), 9-5 (ceba al pollo en el nido Nº 7 de P.D.I.), 22-5 (en el nido Nº 7 de P.D.I., releva a un adulto no anillado, ceba al pollo, y después se va; la anilla amarilla se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 23-5 (R), 6-6 (en el nido Nº 7 de P.D.I., releva a otro buitre, y ceba al pollo), 9-6 (en P.D.I., cerca del nido Nº 7 –con pollo-; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda), ¿31-7 (R)?, 19-9 (R).

Observaciones comunicadas en 2013.- 20-2 (ceba a un pollo muy pequeño, en el nido Nº 7 de Peña Inclinada o Presa Después Izquierda; la anilla amarilla, que lee de abajo arriba, en la pata izquierda.), 20-3 (en el nido Nº 7 de Peña Inclinada, P.I. o P.D.I., junto a un pollo blanco

crecido; copula con otro buitre, también de aspecto subadulto), 15-5 (llega al nido Nº 7 de Peña Inclinada, junto al pollo), 18-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2016.- 6-8 (R; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 11-8 (R; con anilla de metal en la pata derecha).

75T.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 10-11 (R) (con emisor).

75N.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 15-11 (R), 8-12 (R), 25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 28-1 (R), 12-2 (R), 15-2 (R), 18-2 (R), 13-4 (R), 1-5 (R), 7-5 (R), 15-5 (R), 19-5 (R), 4-6 (R), 6-6 (R), 12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R), 22-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 3-7 (R), 7-7 (R), 9-7 (R), 11-7 (R), 12-7 (R), 19-7 (R), 27-7 (R), 3-8 (R), 4-8 (R), 10-8 (R), 14-8 (R), 19-8 (R), 22-8 (R), 2-9 (R), 15-9 (R), 20-9 (R), 28-9 (R), 19-10 (R), 24-10 (R), 26-10 (R), 31-10 (R), 6-11 (R), 14-11 (Peña Portillo), 26-11 (R), 16-12 (R), 21-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 30-1 (R), 5-2 (R), 21-3 (R), 28-3 (R), 14-5 (R), 15-5 (R), 27-5 (R), 15-6 (R), 18-6 (R), 22-6 (R), 30-6 (R), 2-7 (R), 24-7 (R), 30-7 (R), 2-8 (R), 9-8 (R), 6-9 (R) (en dos festines), 18-9 (R), 23-9 (R), 13-11 (C), 13-11 (P. Portillo), 25-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 29-1 (R), 24-5 (R), 29-5 (nido Nº 1-P. Portillo, con pollo; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata ¿izqda.?).
Observaciones comunicadas en 2012- 15-4 (C), 23-5 (R), 30-5 (R), 30-8 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2013- 24-7 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).

75X.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2008.- 8-12 (R), 27-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 6-2 (R), 9-3 (R), 6-4 (R), 11-4 (R), 5-5 (R), 31-5 (R), 1-6 (R), 6-6 (R), 25-6 (R), 30-6 (R), 3-7 (R), 9-7 (R), 11-7 (R), 21-7 (R), 25-7 (R), 19-8 (R), 31-8 (R), 24-10 (R), 6-11 (R), 25-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 29-5 (P. Portillo izqda, en cueva sobre el Nº 80; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2012.- 11-1 (R) (fot.; se lee de abajo arriba, en la pata derecha), 21-1 (R), 23-5 (R), 30-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R), 25-8 (R).

Puede verse una foto del buitre leonado con la anilla 75X, obtenida por Jesús Cobo Anula el 11 de enero de 2012, en la **Hoja Informativa Nº 38**, pág. 346.

75V.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2009.- 23-2 (R), 24-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 24-9 (R).

75P.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2009.- 7-10 (R).

75W.- (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2009.- 2-11 (R), 6-11 (R) (lleva emisor), 15-11 (R) (con emisor), 17-11 (R) (con emisor), 26-11 (R), 29-11 (R), 3-12 (R).

Anillados en 2009.-

FA1.- Anillado de pollo, el 28 de mayo, en el nido Nº 14 del barranco de Valdecasuar.
Observaciones comunicadas en 2009.- 20-9 (R), 23-9 (R), 7-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 2-7 (R).

FA2.- Anillado de pollo, el 28 de mayo, en el nido Nº 11 del barranco de Valdecasuar.
Observaciones comunicadas en 2009.- 10-8 (R), 22-8 (R), 26-8 (R), 20-9 (R), 23-9 (R), 2-10 (R).

FA3.- ¿Anillado de pollo, el 28 de mayo, en el nido Nº 9 del barranco de Valdecasuar? (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2009.- 8-9 (R), 23-9 (R), 28-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal), 9-11 (Grupo I, barranco de Valdecasuar, margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2016.- 6-6 (Grupo I-Valdecasuar m.i.; se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2017.- 18-7 (Grupo I-Valdecasuar m.i., plataforma izqda..; se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal), 24-8 (R; en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 8-11 (R), 29-11 (R; fotografiado; tiene la anilla amarilla en la pata derecha).

FA6.- ¿Anillado de pollo, el 28 de mayo, en el nido Nº 15 del barranco de Valdecasuar? (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2009.- 7-10 (R).

FA7.- ¿Anillado de pollo, el 28 de mayo, en el nido Nº 108 del barranco de Valdecasuar? (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2009.- 28-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 31-7 (C).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-3 (R), 21-1 (R), 28-3 (R), 25-4 (R), 30-5 (R), 30-8 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).

FAM.- ¿Anillado entre el 21 y el 27 de septiembre, en el comedero de Campo de San Pedro? (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2010.- 8-1 (C), 3-2 (Peñalba, nido Nº 13; el buitre es subadulto, y participa en una cópula), 17-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 4-3 (C), 15-4 (C).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-11 (Peñalba; con la anilla amarilla en la pata dcha.).
Observaciones comunicadas en 2013.- 15-5 (Peñalba, nido Nº 13 –con pollo-; con la anilla amarilla en la pata izqda.).

FAN.- Anillado entre el 21 y el 27 de septiembre, en el comedero de Campo de San Pedro. (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2009.- 28-9 (R), 26-11 (R), 27-11 (R), 29-11 (R), 3-12 (R), 21-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 3-1 (R), 9-1 (R), 14-1 (R), 18-1 (R), 20-1 (R), 21-1 (R), 26-1 (R), 28-1 (R), 30-1 (R), 2-2 (R), 5-2 (R), 16-2 (R), 19-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R) (en dos festines), 1-3 (R), 2-3 (R), 4-3 (R), 8-3 (R), 9-3 (R) (en dos festines), 26-3 (R), 28-3 (R), 29-3 (R), 30-3 (R), 31-3 (R), 3-4 (R), 5-4 (R), 6-4 (R), 9-4 (R), 12-4 (R), 22-4 (R), 27-4 (R), 27-5 (R), 9-6 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 10-6 (R) (con anilla de metal en la pata izquierda), 14-6 (R), 15-6 (R), 14-8 (R), 26-8 (R), 1-9 (R), 6-9 (R), 11-9 (R), 24-9 (R), 27-9 (R), 5-10 (R), 8-10 (R), 12-10 (R), 15-10 (R), 17-10 (R), 18-10 (R), 14-11 (R), 16-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 27-1 (R), 29-1 (R), 9-2 (R), 15-2 (R), 20-2 (R), 3-3 (R), 8-3 (R), 9-3 (R), 14-3 (R), 7-6 (R; fot.), 10-6 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 30-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 27-2 (R), 21-1 (R), 28-3 (R), 25-4 (R), 1-5 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 23-5 (R), 7-8 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata

¿derecha?).
Observaciones comunicadas en 2013.- 15-5 (G.O. Bco. Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 11-12 (R).

FAV.- ¿Anillado entre el 21 y el 27 de septiembre, en el comedero de Campo de San Pedro? (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2009.- 7-10 (R), 26-10 (R), 28-12 (C).
Observaciones comunicadas en 2010.- 8-1 (C), 20-1 (R), 5-2 (R), 26-2 (R), 2-3 (R), 3-3 (R), 5-3 (R), 26-3 (R), 6-4 (R), 22-4 (R), 27-4 (R), 24-5 (Los Poyales, nido Nº 34, con pollo; la anilla se le de abajo arriba), 22-6 (R), 24-6 (R), 30-6 (R), 1-7 (R), 13-7 (R), 24-7 (R), 30-8 (R), 9-9 (R), 16-11 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda; fotografiado).
Observaciones comunicadas en 2011.- 8-1 (R), 14-1 (R), 17-1 (R), 29-1 (R), 10-4 (C), 24-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-1 (R), 28-3 (R), 1-5 (R), 23-5 (R), 29-7 (cerca del nido Nº 8, con pollo, de Peña Inclinada, P.D.I.; la anilla amarilla se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2013.- 22-10 (R).
Observaciones comunicadas en 2014.- 17-2 (Peñalba, a la derecha del viejo nido Nº Z del búho; la anilla amarilla se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2015.- 11-2 (con otro buitre, ambos erguidos, en el nido Nº 32 de Peña Inclinada, P.D.I., sin huevo).
Observaciones comunicadas en 2017.- 30-5 (en la zona del nido Nº 23 –con pollo- o en un nido cercano, de S.I.; la anilla amarilla se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).

Puede verse una foto del buitre con la anilla FAV, obtenida por Raúl González Rodríguez el 16 de noviembre de 2010, en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 321.

FAX.- Anillado entre el 21 y el 27 de septiembre, en el comedero de Campo de San Pedro. (No es seguro).
Observaciones comunicadas en 2009.- 21-12 (R), 29-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 8-1 (C), 13-1 (R), 16-2 (R), 12-4 (R), 22-4 (R), 26-6 (R), 13-7 (R), 24-7 (R), 11-9 (R), 15-10 (R), 17-10 (R), 31-10 (R), 3-11 (R), 13-11 (P.D.I., Nº 11; inm., con anilla amarilla en la pata dcha.; 16 h. 31 m., y 16 h. 40 m. con cópula, en la que está arriba), 14-11 (R), 16-11 (R) (en la pata derecha, con anilla de metal en la pata izquierda; fot.), 23-11 (R), 25-11 (R), 25-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 17-1 (R), 19-1 (P.D.I., a la dcha. del Nº 15), 31-1 (R), 3-3 (R), 5-3 (R), 24-3 (C), 21-7 (Peña Inclinada, P.D.I.; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-3 (R), 28-3 (R), 15-4 (C; fot.; en la pata derecha; se lee de abajo arriba), 25-4 (R), 22-5 (Peña Inclinada, P.D.I.; en el nido Nº 8, junto al pollo, y luego en otro lugar; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 9-6 (en P.D.I.; en la plataforma del nido Nº 33; acude junto al pollo de ese nido).
Observaciones comunicadas en 2013.- 20-5 (en el nido Nº 11-Peña Inclinada, P.D.I., con pollo; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).

Puede verse una foto del buitre leonado con la anilla FAX, obtenida por Fernando Alarcón García el 15 de abril de 2012, en la **Hoja Informativa Nº 38**, pág. 349.

Puede verse otra foto del buitre con anilla FAX, obtenida por Elías Gomis Martín el 16 de noviembre de 2012, en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 322.

Anillados en 2010.-

776.- Anillado de pollo, el 2 de junio, en el nido Nº 13 del barranco de Valdecasuar.
Observaciones comunicadas en 2010.- 4-8 (R), 18-8 (R), 11-9 (R), 24-9 (R).

77F.- Anillado de pollo, el 2 de junio, en el nido Nº 110 del barranco de Valdecasuar.
Observaciones comunicadas en 2010.- 18-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 24-7 (R) (con anilla de metal en la pata derecha)
Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2016.- 11-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2017.- 30-3 (R) (en la pata derecha; se lee de abajo arriba), 24-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2018.- 12-8 (en el Grupo I del barranco de Valdecasuar, a la izquierda del Nº 15; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 12-11 (R; con anilla de metal en la pata izquierda), 8-11 (R; fotografiado; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).
Pueden verse dos fotografías de este buitre, obtenidas por Raúl González Rodríguez el 8-11-2018 en el comedero del Refugio, en la **Hoja Informativa Nº 51**.

77H.- Anillado de pollo, el 2 de junio, en el nido Nº 46 del barranco de Valdecasuar.
Observaciones comunicadas en 2010.- 18-9 (R), 22-9 (R), 6-10 (R), 8-10 (R), 15-10 (R).

786.- Anillado de pollo, el 2 de junio, en el nido Nº 12 de Peñalba.
Observaciones comunicadas en 2012.- 6-6 (en Peñalba, cerca pero fuera del nido Nº 11; el buitre es inmaduro).
Observaciones comunicadas en 2013.- 1-7 (en Peñalba, cerca pero fuera del nido Nº 20; el buitre es inmaduro, del tercer año; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2014.- 19-2 (en Peñalba, cerca del nido Nº 30; con la anilla amarilla en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2016.- 18-12 (en Peñalba, cerca del nido Nº 2; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2017.- 13-1 (en Peñalba, en la "cueva sin fondo"; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal).

Anillados en 2011.-

781.- Anillado de pollo, el 13 de junio, en el nido Nº 13 de Peñalba.
Observaciones comunicadas en 2011.- 7-7 (en su nido, con la anilla amarilla en la pata derecha, no leída), 19-7 (en su nido; la anilla se lee de abajo arriba), 14-8 (en su nido), 10-9 (C).
Observaciones comunicadas en 2013.- 6-11 (R).
Observaciones comunicadas en 2016.- 10-3 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 18-5 (Peñalba, a la derecha del Nº 19; se lee de abajo arriba).
Observaciones comunicadas en 2017.- 12-6 (R; se lee de abajo arriba, en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 16-7 (Peñalba; en lo alto y luego, dos veces, en el nido Nº 21, donde ceba –o parece cebar- al pollo), 8-11 (R).

784.- Anillado de pollo, el 13 de junio, en el nido Nº 28 de Peñalba.
Observaciones comunicadas en 2011.- 7-7 (en su nido), 19-7 (en su nido; con la anilla amarilla en la pata izquierda), 31-7 (en distintos nidos de Peñalba; se le ve echar a volar; vuelve), 14-8 (C).

Puede verse otra foto del buitre con anilla 784, obtenida por David Fajardo Orellana el 14 de agosto de 2011, en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 323.

785.- Anillado de pollo, el 13 de junio, en el nido Nº 12 de Peñalba.
Observaciones comunicadas en 2017.- 24-4 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 11-11 (Peñalba; con la anilla amarilla en la pata

derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 8-11 (R; fotografiado; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda), 11-11 (en lo alto de Peña Portillo).

Puede verse una fotografía de este buitre, obtenida por Raúl González Rodríguez el 8-11-2018 en el comedero del Refugio, en la **Hoja Informativa Nº 51**.

788.- Anillado de pollo, el 13 de junio, en el nido Nº 1 de Peñalba.
Observaciones comunicadas en 2011.- 7-7 (en su nido), 19-7 (en su nido; con la anilla amarilla en la pata derecha), 31-7 (C), 31-7 (en lo alto de Peñalba).

78C.- Anillado de pollo, el 13 de junio, en el nido Nº 13 del barranco de Valdecasuar.
Observaciones comunicadas en 2011.- 26-7 (en su nido o cerca, y también volando), 28-8 (C).
Observaciones comunicadas en 2015.- 15-6 (R; se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; prob. con anilla de metal).

78L.- Anillado de pollo, el 13 de junio, en el nido Nº 12´ del barranco de Valdecasuar.
El buitre fue visto, el 18 de enero de 2012, por Philippe Pilard, en Tataguine (Senegal; 14º 25´ 21´61´´ N, 16º 35´45´12´´ W). (Información amablemente comunicada por Álvaro Camiña Cardenal).

78M.- Anillado de pollo, el 13 de junio, en el nido Nº 110 del barranco de Valdecasuar.
El buitre fue visto, el 12 de marzo de 2012, por Rafael Palomo Santana, en el comedero de Almodóvar del Campo (Ciurdad Real). (Información amablemente comunicada por Álvaro Camiña Cardenal).

Anillados en 2013.-

MH5.- Anillado de pollo, el 19 de mayo, en el nido Nº 46 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2013.- 20-11 (F; se lee de arriba abajo).
Observaciones comunicadas en 2016.- 10-3 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 22-7 (R; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2017.- 18-7 (en la cueva mayor del G.I. del bco. de Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 10-3 (R; con anilla de metal en la pata derecha), 12-5 (fot. por GREFA en el Punto de Alimentación Suplementaria de Huerta de Arriba, Burgos, dentro del Proyecto Monachus; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda), 16-9 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 12-11 (R; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2019.- 26-3 (R; fot.; adulto; con anilla de metal en la pata derecha).

MHA.- Anillado de pollo, el 19 de mayo, en el nido Nº 105 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2017.- 9-5 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda).

MHF.- Anillado de pollo, el 19 de mayo, en el nido Nº 110 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2013.- 8-9 (M; tiene la anilla amarilla en la pata izquierda; con anilla de metal; F. J.).
Observaciones comunicadas en 2018.- Encontrado muerto, con su anilla de metal 1111763, en la dehesa de Costana (Salas de los Infantes, Burgos, cuadrícula VM75), tras una fuerte nevada, por los agentes medioambientales, según recoge Rufino Fernández González en www.avesdeburgos.com (en el **Informe 67**, del primer trimestre de 2018, del Anuario Ornitológico de la Provincia de Burgos; y en su

"**Hoja Informativa sobre la avifauna en el sureste de Burgos**", Nº 1, de agosto de 2018, pág. 17, con una fotografía)

MHL.- Anillado de pollo, el 19 de mayo, en el nido Nº 93 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).

Observaciones comunicadas en 2013.- 8-9 (M; tiene la anilla amarilla en la pata derecha; con anilla de metal).

MHM.- Anillado de pollo, el 19 de mayo, en el nido Nº 66 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).

Observaciones comunicadas en 2013.- 8-9 (M; tiene la anilla amarilla en la pata derecha).

MHP.- Anillado de pollo, el 19 de mayo, en el nido Nº 94 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).

Observaciones comunicadas en 2016.- 15-11 (R; con anilla de metal en la pata izquierda).

PAJ.- Anillado el 4 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.

Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R), 21-7 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal), 25-8 (R).

Observaciones comunicadas en 2015.- 15-6 (R; se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal en la pata derecha).

Observaciones comunicadas en 2016.- 6-8 (R; en la pata izquierda; con anilla de metal en la pata derecha).

Observaciones comunicadas en 2018.- 12-11 (R; en la pata izquierda; con anilla de metal en la pata derecha), 29-11 (R; fotografiado; en la pata izquierda; el buitre es adulto).

PAL.- Anillado el 4 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.

Observaciones comunicadas en 2014.- 16-7 (en el Grupo I del barranco de Valdecasuar, cerca del nido Nº 46; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal), 25-8 (R; tiene la anilla amarilla en la pata izquierda), 9-11 (Grupo I del barrano de Valdecasuar, margen izquierda).

Observaciones comunicadas en 2015.- 4-4 (C*),10-5 (en al nido Nº 12 del barranco de Valdecasuar [margen izquierda, Grupo I], con pollo, que le pide ceba; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izqda.; con anilla de metal), 6-6 (en el nido Nº 12 del barranco de Valdecasuar [margen izquierda], con pollo; tiene la anilla amarilla en la pata izquierda; con anilla de metal), 22-7 (R).

Observaciones comunicadas en 2016.- 10-9 (en el nido Nº 110 –junto al Nº 12-, del barranco de Valdecasuar, que ha tenido pollo este año –también el Nº 12-, con otro buitre adulto; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal), 10-9 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal; fotografiado).

Observaciones comunicadas en 2017.- 12-11 (barranco de Valdecasuar [margen izquierda, Grupo I]).

Observaciones comunicadas en 2018.- 30-4 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata ¿derecha?), 14-6 (R).

Puede verse una foto de este buitre, obtenida por Xavier Parra Cuenca el 10-9-2016 en el comedero del Refugio, en la **Hoja Informativa Nº 47** (pág. 274).

(*- José Aguilera Díez.)

PAM.- Anillado el 4 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.

Observaciones comunicadas en 2015.- 22-8 (R; el buitre es inmaduro; tiene la anilla amarilla en la pata izquierda; con anilla de metal).

Observaciones comunicadas en 2018.- 4-3 (término de Moral; fotos; el buitre es adulto; tiene la anilla amarilla en la pata izquierda; con anilla de metal).

Pueden verse fotos del buitre con la anilla amarilla PAM, obtenidas por Yolanda de la Cruz Rubio en el término de Moral el 4 de marzo de 2018, en la **Hoja Informativa Nº 51**, anexo fotográfico.

PAR.- Anillado el 4 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2016.- 15-11 (R) (la última letra no es segura).

PAT.- Anillado el 4 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 8-11 (V.A.D.).
Observaciones comunicadas en 2015.- 22-8 (R; tiene la anilla amarilla en la pata izquierda; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2016.- 7-5 (V.D.I.; cerca del nido Nº 4, con otro adulto y pollo; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda), 3-6 (El Camp., no lejos del nido Nº 21, sin pollo; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2017.- 24-4 (R; no es seguro).
Observaciones comunicadas en 2018.- 29-11 (R; fotografiado; en la pata izquierda; adulto).

PAU.- Anillado el 4 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R), 25-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2017.- 9-5 (R; ¿o FAU?; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2018.- 22-8 (R; con anilla de metal en la pata derecha).

PAV.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2015.- 9-5 (junto al nido Nº 16 del barranco de Valdecasuar [margen izquierda, Grupo I], con pollo; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2016.- 11-3 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal), 21-7 (en el nido Nº 46 del barranco de Valdecasuar [margen izquierda, Grupo I], con pollo, al que ceba; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2017.- 30-3 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 10-3 (R; tiene la anilla amarilla en la pata derecha), 1-5 (barranco de Valdecasuar, a la derecha y fuera del nido Nº 14 [margen izquierda, Grupo I]; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal).

PAX.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R; tiene la anilla amarilla en la pata ¿izquierda?; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2015.- 5-7 (en lo alto de la margen derecha de El Risco, Burgos; tiene la anilla amarilla en la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2017.- 12-6 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha).

PC0.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2017.- 3-5 (nido Nº 31 del bco. de Valdecasuar, m. d., con pollo; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; también podría ser PCC).

PC1.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2017.- 12-6 (R; se lee de abajo arriba, en la pata derecha).

PC2.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R), 21-7 (R).
Observaciones comunicadas en 2015.- 15-6 (R; se lee de abajo arriba, en pata derecha; con anilla de metal).

PC3.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2016.- 21-2 (muladar de Las Renovillas, en Quintanilla del Agua [Burgos, cuadrícula VM45; Manuel Mata Hurtado; publicado en www.avesdeburgos.com; y en el Volumen 5 del **Anuario Ornitológico de Burgos**, pág. 72.]

PC5.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2016.- 22-7 (R; se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2017.- 24-4 (R).
Observaciones comunicadas en 2018.- 25-6 (R), 22-8 (R; se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2019.- 26-3 (R.; adulto; con anilla de metal en la pata izquierda).

PC7.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal).

PC9.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2015.- 13-9 (muladar de Las Renovillas, Quintanilla del Agua, Burgos; publicado en www.avesdeburgos.com).
Observaciones comunicadas en 2016.- 10-3 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).

PCA.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 12-5 (nido Nº 26 del barranco de Valdecasuar, margen derecha; ceba al pollo; tiene la anilla amarilla en la pata derecha; con anilla de metal), 5-10 (R; con la anilla amarilla en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2016.- 10-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2017.- 24-4 (R), 12-6 (R; se lee de abajo arriba, en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 22-8 ®.

PCC.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 12-5 (nido Nº 1 de La Cald., con pollo; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda), 5-10 (R; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2016.- 11-3 (R).
Observaciones comunicadas en 2017.- 3-5 (nido Nº 31 del bco. de Valdecasuar, m. d., con pollo; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; parce PC0, pero también podría ser PCC).
Observaciones comunicadas en 2018.- 12-11 (R; con anilla de metal en la pata derecha).

PCH.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R), 21-7 (R; tiene la anilla amarilla en la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2015.- 22-7 (R), 9-11 (R; tiene la anilla amarilla en la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2016.- 6-8 (R;se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2018.- 9-3 (R; con anilla de metal en la pata izquierda).

PCJ.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R), 21-7 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2016.- 6-8 (R; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2017.- 24-4 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 12-11 (Peña Portillo).
Observaciones comunicadas en 2018.- 9-3 (R; tiene la anilla amarilla en la pata izquierda), 5-6 (R), 31-7 (R; fot.; se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal en la pata derecha; el buitre es adulto).

PCL.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 13-6 (en el Entrante 1º de Peña Rubia, debajo y a la izquierda del nido Nº 4; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha), 25-8 (R).
Observaciones comunicadas en 2015.- 22-7 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2017.- 6-5 (no es seguro; en el nido Nº 31, con pollo, de Peña de la Zorra; tiene la anilla amarilla en la pata derecha; con anilla de metal).

PCN.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 22-8 (R; con anilla de metal en la pata izquierda), 9-11 (R; con anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2016.- 22-7 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata ¿izquierda?).

PCR.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 1-4 (en el nido Nº 63 del barranco de Valdecasuar [margen izquierda], con pollo; releva a un buitre adulto no anillado; con anilla de metal; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha); 13-5 (cerca del nido Nº 56 del barranco de Valdecasuar [margen derecha]; no es seguro); 18-7 (en el Grupo I del barranco de Valdecasuar [margen izquierda]; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2016.- 6-8 (R; con anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2017.- 3-5 (Peña Hundida; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).

PCT.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 9-6 (en el nido Nº 29 del barranco de Valdecasuar [margen derecha], con pollo; con anilla de metal; tiene la anilla amarilla –la última cifra no es segura- en la pata derecha), 21-7 (R; tiene la anilla amarillaen la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2017.- 12-6 (R; se lee de abajo arriba).

PCU.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 9-11 (R; tiene la anilla amarilla en la pata izquierda; con anilla de metal).

PCX.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 9-5 (en el nido Nº 75 del barranco de Valdecasuar [margen izquierda], con pollo; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha), 13-5 (en el nido Nº 75 del barranco de Valdecasuar [margen izquierda], con pollo; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal), 6-6 (en el Grupo I, y luego en el nido Nº 42 –sin pollo, con otro buitre adulto-, del barranco de Valdecasuar; se lee de abajo arriba; con anilla de metal; en

esta fecha, el nido Nº 75 está vacío), 8-11 (en el Grupo I del barranco de Valdecasuar; tiene la anilla amarilla en la pata derecha).

PCW.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 15-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2016.- 15-6 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).

PF1.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R; tiene la anilla amarilla en la pata ¿derecha?).
Observaciones comunicadas en 2015.- 2-1 (R: fotografiado), 5-2 (muladar para fotografía de la empresa “”*Hidesmadrid*”, Valdemaqueda, Madrid; fotografiado; con la anilla amarilla en la pata izqda).

PF2.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata ¿derecha?), 25-8 (en el G.I. del bco. de Valdecasuar, cerca de los nidos Nº 15 y Nº 110; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2015.- 9-5 (en el nido Nº 21 del barranco de Valdecasuar [margen izquierda], con pollo; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2016.- 11-3 (R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal), 6-6 (en el nido Nº 15 del barranco de Valdecasuar [margen izquierda], sin pollo; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal; junto a otro buitre adulto, no anillado).
Observaciones comunicadas en 2017.- 24-4 (R), 5-6 (en el nido Nº 21 del barranco de Valdecasuar [margen izquierda], con pollo; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal), 18-7 (en el nido Nº 15 del barranco de Valdecasuar [margen izquierda], sin pollo; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2018.- 12-11 (R; con anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2019.- 23-3 (R; fot.; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha).

PF3.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 15-6 (R; con la anilla amarilla en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2016.- 12-11 (El Camp.; no es seguro, con anilla de metal en la pata derecha).

PF4.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 19-7 (en el nido Nº 29 del barranco de Valdecasuar, con pollo, y con otro buitre adulto; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2016.- 7-6 (en el nido Nº 29 del barranco de Valdecasuar, con pollo, y con otro buitre adulto; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal), 10-9 (R; tiene la anilla amarilla en la pata derecha; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2018.- 29-11 (R; en la pata derecha; adulto).

PF5.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2016.- 6-8 (R; con anilla de metal en la pata izquierda).

Observaciones comunicadas en 2018.- 14-5 (R; fot.; la anilla amarilla, en la pata derecha, se lee de abajo arriba).

Puede verse una foto del buitre con anilla amarilla PF5, obtenida por Juan José Molina Pérez en el comedero del Refugio el 14 de mayo de 2018, en la **Hoja Informativa Nº 51**, anexo fotográfico.

PF7.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 30-5 (en el nido Nº 17, con pollo, de la Hocecilla; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal), 15-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2018.- 10-8 (en Las Torres, junto al nido Nº 4, aunque puede no ser del nido; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal)

PF8.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2016.- 12-11 (Peña Portillo).

PF9.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2014.- 7-6 (en el nido Nº 78 del barranco de Valdecasuar –margen izquierda-, con un pollito; se lee de abajo arriba; quizás podría ser también PF8; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2015.- 9-11 (R).

PFA.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 9-11 (R; tiene la anilla amarilla en la pata derecha; con anilla de metal; el buitre es adulto).
Observaciones comunicadas en 2017.- 30-3 (R; en la pata izquierda; se lee de abajo arriba; con anilla de metal).

PFC.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 15-6 (R; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal), 22-7 (R), 7-11 (La Raya; con anilla de metal en la pata ¿izqda?).
Observaciones comunicadas en 2016.- 22-7 (R; con anilla de metal en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2017.- 12-6 (R; con la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda), 11-9 (La Raya; con la anilla amarilla en la pata izquierda, y con anilla de metal), 12-11 (Peña Portillo).

PFF.- Anillado el 11 de diciembre, en el comedero de buitres del Refugio.
Observaciones comunicadas en 2015.- 22-8 (R; con la anilla amarilla en la pata izquierda; con anilla de metal), 29-8 (muladar de Las Renovillas, Quintanilla del Agua, Burgos; publicado en www.avesdeburgos.com).
Observaciones comunicadas en 2016.- 22-7 (R; con la anilla amarilla en la pata izquierda; se lee de abajo arriba).
Observaciones comunicadas en 2018.- 16-9 (R; con la anilla amarilla en la pata izquierda; con anilla de metal).

Anillados en 2015.-

PHH.- Anillado el 4 de junio, en el barranco de Valdecasuar.
Observaciones comunicadas en 2018.- 15-7 (en el nido Nº 120 del barranco de Valdecasuar, con pollo; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal), 29-11 (R; fotografiado; en la pata derecha).

PHL.- Anillado el 4 de junio, en el barranco de Valdecasuar.
Observaciones comunicadas en 2017.- 12-4 (R; se lee de abajo arriba, en la pata derecha).
Observaciones comunicadas en 2018.- 14-8 (R; con anilla de metal en la pata izquierda; el buitre es

subadulto).

PHM.- Anillado el 4 de junio, en el nido Nº 52 del barranco de Valdecasuar (margen izquierda).
Observaciones comunicadas en 2015.- 5-10 (R; la letra M no es segura).

Anillados en 2016.-

RRX.- Anillado el 31 de mayo, como pollo en su nido, en Peña de la Zorra.
Observaciones comunicadas en 2018.- 16-9 (R; el buitre es inmaduro; tiene la anilla amarilla en la pata izquierda).

RT0.- Anillado el 31 de mayo, como pollo en su nido, en Peña de la Zorra.
Observaciones comunicadas en 2017.- 30-3 (R; fot.; el buitre es joven; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda).
Puede verse una foto del buitre con anilla **RT0**, obtenida por Jesús Cobo Anula el 30 de marzo de 2017, en la **Hoja Informativa Nº 49**, Anexo fotográfico.

Anillados en otras zonas.-

01H.- Anillado de pollo, el 1 de mayo de 1991, por el Grupo Doval-Martínez y colaboradores, junto al río Martín (Alcaine, Teruel). Este buitre ya había sido visto anteriormente en el comedero de Montejo, los días 8 de septiembre de 1996 (por Guillermo Blanco Hervás y Antonio Acha Martín) y 22 de diciembre de 1997 (por Jesús Hernando Iglesias).
Observaciones comunicadas en 2007.- 6 de enero (R; Jesús Hernando Iglesias y Juan Carlos Rincón García).

025.- Según comunica amablemente Álvaro Camiña Cardenal, este buitre fue anillado como juvenil, en el Centro de Recuperación de La Alfranca (Zaragoza), el 28 de septiembre de 1991.
Observaciones comunicadas en 2007.- 8-11 (R).

083.- Anillado de pollo, el 4 de junio de 1992, por el Grupo Doval-Martínez y colaboradores, en la desembocadura del río Cabra (Odón, Teruel).
Observaciones comunicadas en 2008.- 9 de octubre (R; Jesús Hernando Iglesias).

08H.- Anillado el 2 de julio de 1992, en La Cotorna (Liendo, Cantabria; 43º 24´ 30´´ N, 3º 21´05´´ W), por el Grupo Doval-Martínez y colaboradores.
Observaciones comunicadas en 2007.- 6 de enero (R; Jesús Hernando Iglesias y María Victoria Rodríguez Ortigoso).

0CN.- Anillado de pollo, el 9 de mayo de 1993, en "La Muela" de Torre de las Arcas (Teruel), por el Grupo Doval y Martínez, y colaboradores.
Observaciones comunicadas en 2007.- 6 de septiembre (R; Jesús Hernando Iglesias).

0HN.- Según informa amablemente Guillermo Doval de las Heras, este buitre había sido anillado por él, como joven del año, en el Centro de Recuperación "Las Cansinas" del Parque Natural de Monfragüe, en Torrejón el Rubio (Cáceres), el 12 de octubre de 1993. Se le puso la anilla metálica 11-00600, de la Agencia de Medio Ambiente de la Junta de Extremadura.
Fue visto en el comedero del Refugio de Montejo el 13 de enero de 2007, por Jesús Hernando Iglesias (guarda de WWF/Adena), con María Victoria Rodríguez Ortigoso.

0FH.- Según informa amablemente Guillermo Doval de las Heras, este buitre había sido anillado por Joachim Griesinger, como joven del año, en 1993, en el Centro de Recuperación de Teruel. Se le puso la anilla metálica C-03774. Fue liberado el 22 de septiembre de 1993, en el comedero de buitres de La Alfambra (Teruel).
Fue visto en el comedero del Refugio de Montejo el 26 de febrero de 2007 (por Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena), y el 31 de marzo de 2008 (por Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España).

11L.- Según informa amablemente Guillermo Doval de las Heras, este buitre había sido anillado por él, Arturo F. Rodríguez y Ramón Arambarri, como pollo en el nido, el 8 de junio de 1996, en el Barranco de la Torca (Sobrón, Álava). Se le puso la anilla metálica 11-03331.

Fue visto en el comedero del Refugio de Montejo el 27 de diciembre de 2007, por Jesús Hernando Iglesias (guarda de WWF/Adena).

120.- Anillado de pollo, el 13 de junio de 1996, en la Sierra del Tuyo, en Iruña de Oca (Álava), por Arturo F. Rodríguez y Ramón Arambarri.

Fue visto en el Refugio el 28 de diciembre de 1996 (en La Hocecilla, por Jesús Hernando Iglesias), el 27 de septiembre de 1997 (en el comedero de buitres, durante un festín, por Félix Martínez Olivas, Rosa Rodríguez Manzano y Óscar Pontón Hidalgo), el 31 de octubre de 2001 (en el comedero de buitres, durante un festín, por José Antonio López Septiem), y el 11 de noviembre de 2007 (en el Grupo I del barranco de Valdecasuar, durante el censo de otoño, por Ángel Leiva Lozano y Joaquín Pesqué Senderos).

193.- Según informa amablemente Guillermo Doval de las Heras, este buitre había sido anillado por él, Arturo F. Rodríguez y Ramón Arambarri, como pollo en el nido, en la Peña Vallegobia (Parque Natural de Valderejo, Álava), el 10 de mayo de 1997. Se le puso la anilla metálica 11-01644.

Fue visto en el comedero del Refugio de Montejo el 17 de agosto de 2007, por Miriam Domingo García, guarda suplente de WWF/Adena; y el 2 de julio de 2010, por Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España.

Buitre procedente de Francia, con las siguientes anillas.- En la pata derecha: Amarilla (arriba) – Roja (abajo). / En la pata izquierda: Blanca. (El buitre tiene motas blancas, y el ala es blanca en parte por debajo).- Según comunica amablemente Didier Peryusqué, este buitre fue anillado como pollo el 9 de mayo de 1999, con la anilla **TY 2310**, en el nido D2 de la Reserva del Valle de Ossau, en el Parque Nacional de los Pirineos franceses. Fue registrado bastantes veces en distintos sitios de Francia, y también en la provincia de Jaén (en un festín, el 26 de enero de 2002), y en la de Segovia (las dos veces abajo indicadas, una en el comedero del Refugio y otra en el comedero de Campo).

Observaciones comunicadas en 2009.- 20-5 (R), 28-7 (C).

17C.- Según comunica amablemente Juan Mottos Oliver, este buitre corresponde al proyecto de reintroducción del buitre leonado en Vélez Blanco (Almería). Llegó a Montalviche el 30 de noviembre de 1998; y fue liberado el 6 de julio de 1999, en el comedero de Montalviche (en Vélez Blanco). La anilla amarilla está en la pata derecha, y en la pata izquierda tiene la anilla metálica de GREFA Nº 424. A este buitre, procedente del centro de recuperación de GREFA, "*le falta la uña del dedo central de la pata derecha*".

Fue visto en el comedero del Refugio de Montejo el 21 de agosto de 2007, por Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena.

34M.- Según comunica amablemente Álvaro Camiña Cardenal, este buitre fue anillado como juvenil, en el Centro de Recuperación de la Sierra de Fuentes, en Cáceres, en 2001.

Observaciones comunicadas en 2007.- 16-7 (R).
Observaciones comunicadas en 2009.- 18-2 (R) (adulto, con la anilla amarilla en la pata derecha, y con anilla metálica en la pata izquierda), 16-4 (R), 20-4 (R), 23-4 (R), 8-9 (R), 9-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 24-9 (R).
Observaciones comunicadas en 2011.- 9-2 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 17-3 (R), 25-4 (R), 23-5 (R).
Observaciones comunicadas en 2013.- 18-11 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R), 21-7 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).

34P.- Según comunica amablemente Álvaro Camiña Cardenal, este buitre fue anillado como joven del año, en el Centro de Recuperación de la Sierra de Fuentes, en Cáceres, en 2001, año en que también fue liberado.

Observaciones comunicadas en 2009.- 1-5 (R).

BCL (anilla blanca). Según comunica amablemente Didier Peryusqué, este buitre fue anillado en la reserva del valle de Ossau (en el Pirineo francés), el 14 de mayo de 2004; y no tuvieron más registros posteriores que el aquí reseñado.

Observaciones comunicadas en 2007.- 2-5 (C; fot.; con la anilla blanca en la pata derecha, y con anilla de metal).

Puede verse una foto del buitre con anilla BCL, obtenida por Manuel López Lázaro el 2-5-07, en la **Hoja Informativa Nº 32**, pág. 288.

BEW (fotografiado).- Anilla blanca, en la pata derecha. Según comunica Álvaro Camiña Cardenal, este buitre había sido anillado, como pollo en el nido, en la reserva del valle de Ossau (en el Pirineo francés), en mayo de 2004.

Observaciones comunicadas en 2007.- 4 de febrero (C; Manuel López Lázaro).

163.- Según comunica amablemente Juan Mottos Oliver, este buitre corresponde al proyecto de reintroducción del buitre leonado en Vélez Blanco (Almería). Fue anillado el 15 de octubre de 2004; corresponde, al parecer, a uno de los jóvenes caídos en la migración.

Observaciones comunicadas en 2009.- 13 de enero (C; fotografiado; Manuel López Lázaro). Tiene la anilla amarilla en la pata izquierda, y tiene anilla de metal en la pata derecha. (Puede verse una foto en la **Hoja Informativa Nº 23**, pág. 396).

667.- Según comunica amablemente Javier de la Puente Nilsson, este buitre había sido anillado como inmaduro del tercer año, en Abades (Segovia), el 12 de octubre de 2004, por un equipo conjunto de SEO/Monticola y Brinzal, en el marzo del proyecto antes aludido.

Observaciones comunicadas en 2007.- 20 de enero (C; Manuel López Lázaro y Fernando Alarcón García).

4AP.- Según comunica amablemente Félix Martínez Olivas, este buitre fue anillado como pollo en su nido, en el año 2005, en las Hoces del Duratón (Segovia), por Guillermo Blanco Hervás y colaboradores.

Observaciones comunicadas en 2007.- 15-2 (R), 12-6 (C).

Según informa Álvaro Camiña Cardenal, la anilla fue encontrada, a fines de mayo de 2007, en el Parque Nacional de Monfragüe (Cáceres), por personal del parque.

0UT.- Según comunica amablemente Álvaro Camiña Cardenal, este buitre había sido anillado de pollo, el 18 de junio de 2005, en el Parque Natural de Valderejo (Álava), por el Centro de Recuperación de Animales Salvajes de la Diputación Foral de Álava.

Observaciones comunicadas en 2007.- 9-7 (R).

2VW.- Según comunica amablemente Álvaro Camiña Cardenal, este buitre, nacido en 2005, fue atendido ese mismo año en el Centro de Recuperación de la Sierra de Fuentes, en Cáceres; y fue soltado, también en 2005, en la Sierra de Fuentes.

Ya fue visto en el comedero de Montejo el 6-XII-2006 (por Jesús Hernando Iglesias, Bruno Chacón Espinosa, y Verónica Vallejo Amate; véase la **Hoja Informativa Nº 31**, pág. 153).

Observaciones comunicadas en 2007.- 1-4 (R), 2-4 (R), 22-5 (R), 26-5 (R), 12-6 (R), 20-6 (R), 6-8 (R), 7-8 (R), 21-8 (R), 6-9 (R), 8-12 (R), 11-12 (R), 27-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 9-1 (R), 12-1 (R), 12-2 (R), 16-2 (R), 10-3 (R), 12-3 (R), 17-3 (R), 18-4 (R), 26-5 (R), 28-5 (R), 11-7 (R), 1-8 (R), 14-8 (R), 19-8 (R), 21-8 (R), 4-9 (R), 5-9 (R), 24-9 (R), 28-9 (R), 7-10 (R), 8-12 (R), 25-12 (R), 28-12 (R), 31-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 28-1 (R), 7-4 (R), 23-4 (R), 1-5 (R), 7-5 (R), 8-5 (R), 19-5 (R), 20-5 (R) (con anilla de metal en pata izqda.), 23-5 (R), 27-5 (R), 11-6 (R) (en dos festines), 12-6 (R), 15-6 (R), 16-6 (Nº 21-P.P.; con anilla de metal en pata izqda.), 19-6 (R), 22-6 (R), 25-6 (R), 27-6 (R), 28-6 (R), 3-7 (R), 7-7 (R), 9-7 (R) (en dos festines), 19-7 (R), 21-7 (R), 24-7 (R), 25-7 (R), 3-8 (R), 4-8 (R), 6-8 (R), 17-8 (R), 19-8 (R), 31-8 (R), 2-9 (R), 5-9 (R), 9-9 (R), 14-9 (R), 20-9 (R), 23-9 (R), 25-9 (R), 2-10 (R), 17-10 (R), 19-10 (R), 12-11 (R), 15-11 (R), 27-11 (R), 3-12 (R), 14-12 (R), 21-12 (R), 29-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 26-1 (R).

663.- Según comunica amablemente Javier de la Puente Nilsson, este buitre había sido anillado de adulto, con red, en Escarabajosa de Cabezas (Segovia), el 16 de octubre de 2005, por un equipo conjunto de SEO/Monticola y Brinzal. (Con anilla de metal en la pata izquierda).

En el año 2006, fue visto en el comedero de Campo el 22 de noviembre (por Manuel López Lázaro) y el 23 de diciembre (por Fernando Alarcón García y Manuel López Lázaro) (véase la **Hoja Informativa Nº 31**, págs. 151 y 154).

El 23 de enero de 2007, este buitre fue visto en el comedero de Campo de San Pedro (por Manuel López Lázaro).

El 27 de enero de 2008, este buitre fue visto cerca de Tiermes (Soria), por tres observadores (Alfredo López Hernangómez, Antonio Cavadas Sanz y Manuel López Lázaro).

El 11 de junio de 2009, el buitre 663 fue fotografiado en el comedero de Campo, por Jorge J. Rubio Casado.

64J.- Según comunica amablemente Javier de la Puente Nilsson, este buitre había sido anillado de adulto, con red, en Escarabajosa de Cabezas (Segovia), el 16 de octubre de 2005, por el Grupo Ornitológico SEO/Monticola, con Brinzal.

Fue visto en el comedero de Campo el 10-XI-2008 (Manuel López Lázaro y David Fajardo Orellana).

428 (con marcas alares amarillas, con el mismo número).- Recogido a finales de octubre de 2003, totalmente deshidratado, en Moraleja de Enmedio (Madrid). Era entonces un ejemplar joven del año, o de dos o tres años como máximo. Fue alimentado y atendido en el Centro de Recuperación de Fauna del GREFA durante más de un año, hasta su traslado a Alcoy (Alicante) para el Proyecto Canyet, de reintroducción del buitre leonado en dicha localidad. (Información amablemente comunicada por GREFA). (Agradecemos también la información amablemente proporcionada sobre el tema por Álvaro Camiña Cardenal, Pedro Luis Castilla Apolonio y Elías Gomis Martín).

El buitre ingresó en el aviario del Proyecto Canyet el 25 de febrero de 2005, fue liberado el 17 de enero de 2006, y abandonó la zona el viernes 21 de abril de 2006. Era un macho, y tenía la anilla de PVC 428, y l a anilla metálica 1104545. Se da la circunstancia de que el Proyecto Canyet está inspirado, al menos en parte, en el Refugio de Montejo. (Información amablemente proporcionada por Álvar Seguí Romá, Técnico Responsable del Proyecto Canyet).

Observaciones comunicadas en 2006.-

1 de junio (R) (fotografiado, por los ornitólogos suizos Philippe y Pierrette Benzi, durante un festín sobre una cerda muerta, con unos 150 buitres leonados, que tuvo lugar entre las 19 h. y las 20 h. 30 m. ap.). La foto obtenida por P. Benzi muestra que el ave no debía tener en 2006 más de tres años, por lo que debió nacer en el año en que fue recogido (2003).

(Publicado en la Circular informativa Nº 3 del Fondo para el Refugio, pág. 2).

5 de julio (C) (observado por los biólogos Guillermo Doval de las Heras y Javier Marchamalo de Blas, a las 13 h. 35 m.).

Observaciones comunicadas en 2007.-

10 de febrero (P. Portillo 2ª), 19 de febrero (R, 17 h. 42 m.), 21 de febrero (R; 16 h. 40 m.), 8 de junio (R; 13 h. 40 m.), 15 de junio (R, ap. atardecer), 7 de agosto (R; 19 h. 40 m.--).

Las seis observaciones de este año se deben a Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio.

Observaciones comunicadas en 2008.-

9 de enero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio), 12 de enero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio), 15 de enero (en Peña Rubia; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio), 17 de enero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio), 16 de febrero (R; no leídas las marcas, pero ha de ser el mismo; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio), 9 de abril (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio), ¿13 de agosto? (a las 13 h. 22 m., un buitre con marcas alares, no leídas, en Peña Rubia; Alfonso Alonso Rodríguez), 14 de agosto (el buitre conserva la marca alar) (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio), 25 de agosto (el buitre conserva la marca alar) (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio), 5 de septiembre (el buitre conserva la marca alar) (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio), 6 de septiembre (el

buitre conserva la marca alar) (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio), 29 de septiembre (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio), 19 de noviembre (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio; el buitre sigue teniendo la banda alar amarilla, ya desgastada), 14 de diciembre (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio; el buitre sigue teniendo la banda alar amarilla), 25 de diciembre (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio), y 27 de diciembre (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio).

Observaciones comunicadas en 2009.-

20 de febrero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Adena, en el Refugio), 6 de marzo (Peña Rubia; Bernardo Arroyo Morcillo), 7 de marzo (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Adena, en el Refugio; el ave tiene la banda alar), 24 de marzo (R; Joachim Griesinger), 24 de marzo (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Adena, en el Refugio), 1 de abril (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Adena, en el Refugio; el ave tiene la banda alar), 4 de abril (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Adena, en el Refugio), 7 de abril (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Adena, en el Refugio), 4 de mayo (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Adena, en el Refugio), 11 de mayo (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Adena, en el Refugio), 27 de mayo (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Adena, en el Refugio), 1 de junio (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Adena, en el Refugio), 6 de junio (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Adena, en el Refugio), 11 de junio (R; José Aguilera Díez -Presidente del Colectivo Azálvaro-, Adolfo Sánchez Díaz, Gabriella Báli, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo; el buitre tiene banda alar, y anilla de metal en la pata izqda.; la anilla amarilla, en la pata dcha., se lee de arriba abajo), 11 de julio (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 10 de agosto (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, con participantes en la Semana de Participación Local organizada por WWF España en Montejo de la Vega), 17 de agosto (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 24 de agosto (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 31 de agosto (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 2 de septiembre (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 8 de septiembre (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 14 de septiembre (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 15 de septiembre (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 20 de septiembre (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 31 de octubre (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), y 27 de noviembre (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio).

Observaciones comunicadas en 2010.-

24 de enero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, Adena, en el Refugio), 30 de enero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 19 de febrero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 23 de febrero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 26 de febrero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 2 de marzo (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 5 de marzo (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 12 de marzo (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, con Joachim Griesinger), 24 de marzo (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 12 de abril (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 26 de junio (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, con cuatro voluntarios de WWF [Rubén Ortega, Susana García, Arturo Ragel Pérez, y Raúl Medel Cuesta]), 13 de julio (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 14 de julio (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 2 de agosto (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 26 de agosto (el buitre conserva las marcas alares, aunque una ya está medio caída) (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 6 de septiembre (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 13 de noviembre (16 h. 58 m., Peña Rubia; Elías Gomis Martín, Raúl González Rodríguez, y Alfonso Lario Doylataguerra), 16 de noviembre (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, con Sergio Arís Arderiu, Elías Gomis Martín, Raúl González Rodríguez, Alfonso Lario Doylataguerra, Dr. Pedro Rodríguez Panizo, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo) (con la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha, con anilla de metal en la pata izquierda, y con banda alar; fotografiado), 25 de noviembre (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, con Pablo Sanz Trillo).

Observaciones comunicadas en 2011.-

7 de enero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, con Juan José Molina Pérez), 14 de enero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 31 de enero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 5 de febrero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 9 de febrero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 10 de febrero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 12 de febrero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 15 de febrero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 16 de febrero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 27 de febrero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 8 de marzo (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 16 de marzo (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 27 de marzo (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 8 de mayo (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 11 de mayo (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio; con Juan Gómez Hernando, Miguel Ángel García-Morales Sánchez, y Miranda Haderi), 7 de junio (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 27 de junio (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio; con Luis Suárez Arangüena y Gema Rodríguez Cáceres, también de WWF España), y 30 de diciembre (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena en el Refugio).

Observaciones comunicadas en 2012.-
17 de enero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, con Ezequiel Martínez Rodríguez y otros), 27 de febrero (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, con Álvaro Elúa Samaniego, José María Lebrero Vecino, y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo; se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata izquierda), 27 de febrero (R, en un segundo festín del mismo día; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio), 17 de marzo (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, con Javier Marchamalo de Blas, Jorge Marchamalo, y José Antonio López Septiem), 25 de abril (R; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España, con Guillermo Doval de las Heras, Ezequiel Martínez Rodríguez, y otros).

Pueden verse dos fotos del buitre con anilla 428, obtenidas por Elías Gomis Martín el 16 de noviembre de 2012, en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 329.

426 (con marcas alares amarillas, con el mismo número).- Tiene la anilla amarilla en la pata izquierda; y tiene, en la pata derecha, la anilla de metal 1104550. Es macho. Fue recuperado por GREFA. Ingresó el 25 de febrero de 2005 en el aviario de fijación del Proyecto Canyet, de reintroducción del buitre leonado en Alcoy (Alicante). Se le soltó, anillado, el 17 de enero de 2006, en Alcoy (Alicante), dentro del citado proyecto. (Información amablemente comunicada por Álvar Seguí Romá y Álvar Seguí LLopis, del Proyecto Canyet, y Ricardo Pérez Rodríguez).

Álvar Seguí Llopis añade amablemente otros datos sobre el buitre: "*Estuvo por la zona alimentándose en nuestro muladar, hasta el día 01-11-2006 en que se le perdió la pista. Durante el año 2007 solamente se le avistó un día (26-06-2007). Vuelve a aparecer en nuestra zona el día 04-03-2008 y permanece todo el resto del año 2008 por aquí. El día 18-01-2009 cerca de nuestro comedero se le ve copulando con la hembra 427. Muy recientemente (28-01-2009) lo hemos visto en la buitrera, construyendo un nido con otra hembra sin marcar ni anillar*."

Observaciones comunicadas en 2008.-
9 de noviembre (Peña Portillo; observado por Jorge Hernández Núñez, Ricardo Pérez Rodríguez, Guillermo Coronado Villar, y Carlos Palomar Asensio), y 23 de noviembre (Peña Portillo; observado por Ricardo Pérez de Ana).

42P (con marcas alares amarillas).- Según la información facilitada por el programa AUS y por Álvar Seguí Romá (Proyecto Canyet), este buitre, una hembra nacida en 2005, fue marcado el 17 de enero de 2006, con la anilla metálica 1104698 en la pata izquierda, la anilla amarilla (que se lee de arriba abajo) en la pata derecha, y marcas alares, en Parque Natural de la Sierra de Mariola (Alicante) (38º 41´N, 0º 30´W). El buitre había sido recuperado en el Centro de GREFA, y posteriormente cedido a FAPAS-Alcoy para su incorporación al Proyecto Canyet. Liberado después de un periodo de aclimatación, fue recogido el 6 de noviembre de 2005, "*con una fuerte desnutrición*", en la urbanización Pinatell (Bocairent, Valencia), por miembros de FAPAS-Alcoy, y trasladado al Centro de Recuperación de Santa Faz (Alicante). El responsable del marcaje es Álvar Seguí Llopis.

El buitre fue avistado el 3 de mayo de 2009 en Mouthomet (Francia).

Fue visto en el comedero del Refugio de Montejo el 8 de septiembre de 2009 (con bandas alares amarillas) (por Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España).

43A.- Según comunica amablemente Álvaro Camiña Cardenal, este buitre, nacido en 2006, fue atendido en el Centro de Recuperación de Animales Salvajes "Los Guindales" de Burgos; y fue anillado (también con anilla de metal, 1104967) y liberado el 12 de febrero de 2007, en Montejo de Tiermes (Soria).

Observaciones comunicadas en 2010.- 21-1 (R), 24-1 (R).

El 7-3-2010, el buitre fue fotografiado, por Delfín González Fernández, en el vertedero de Colmenar Viejo (Madrid) (40 º 39´55´´ N, 03º 44´ 30´´ W). El buitre tiene la anilla amarilla en la pata izquierda.

6WT.- Según comunica amablemente Martí Surroca, este buitre había sido anillado como adulto, el 3 de abril de 2007, en el comedero de La Creu del Gelat (La Cruz del Helado), en Cintorres (Castellón) (en el límite con Teruel, en la comarca del Maestrazgo).

Fue visto en el comedero del Refugio de Montejo el 22 de enero de 2008, por Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF/Adena., con José Antonio López Septiem y dos más, el 22 de enero de 2008.

8C1.- Según comunica amablemente Álvaro Camiña Cardenal, este buitre fue anillado como juvenil, y liberado en Lerma (Burgos), por el Centro de Recuperación de Animales Salvajes "Los Guindales" de Burgos, el 11 de octubre de 2007.

Observaciones comunicadas en 2007.- 28-10 (C; fotografiado), 8-11 (C; fotografiado; con anilla de metal en la pata izquierda), 9-11 (C).

Observaciones comunicadas en 2017.- 9-2 (R; también puede ser BC1).

8C5.- Según comunica amablemente Álvaro Camiña Cardenal, este buitre fue anillado como juvenil, y liberado en Los Rábanos (Soria), por el Centro de Recuperación de Animales Salvajes "Los Guindales" de Burgos, el 15 de octubre de 2007.

Observaciones comunicadas en 2007.- 28-10 (C).

Observaciones comunicadas en 2012.- 15-4 (C).

8A4.- Según comunican amablemente Álvaro Camiña Cardenal y Manuel López Lázaro, este buitre, nacido en 2006, fue atendido en el Centro de Recuperación de Animales Salvajes "Los Guindales" de Burgos; y fue anillado y liberado el 31 de diciembre de 2007, en el cañón del río Lobos (Soria).

Observaciones comunicadas en 2009.- 6-5 (R), 15-5 (R), 19-5 (R), 28-8 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 21-1 (R), 28-1 (R), 30-1 (R), 5-2 (R) (en dos festines), 20-2 (R), 23-2 (R), 26-2 (R), 12-3 (R), 24-3 (R), 26-3 (R), 31-3 (R), 3-4 (R), 6-4 (R), 8-4 (R), 9-4 (R), 12-4 (R), 17-4 (R), 23-5 (Peña Inclinada, junto a la piedra al lado del nido Nº 8; el buitre es inmaduro o subadulto, posiblemente de unos 3 años; tiene la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha), 24-5 (R), 26-5 (Los Poyales, nido Nº 29; el buitre es subadulto; tiene la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha; con anilla de metal), 10-6 (R), 7-7 (C), 13-7 (R), 14-7 (R), 21-7 (R), 9-8 (R), 18-8 (R), 15-10 (R) (en dos festines), 25-12 (R), 31-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 22-1 (R), 5-3 (R), 9-3 (R), 10-4 (C), 24-5 (R), 27-6 (R).

Observaciones comunicadas en 2012.- 21-1 (R), 15-4 (C), 25-4 (R), 23-5 (R), 30-5 (R), 19-9 (R).

8C0.- Según comunica amablemente Álvaro Camiña Cardenal, este buitre fue anillado como juvenil, y liberado en el Cañón del Río Lobos (Soria), por el Centro de Recuperación de Animales Salvajes "Los Guindales" de Burgos, el 31 de diciembre de 2007.

Observaciones comunicadas en 2008.- 14-3 (R).

AAF.- Según comunica amablemente Martín Surroca Royo, este buitre fue anillado como joven, en Cintorres (Castellón), el 24 de septiembre de 2008, por el Centro de Recuperación de Fauna Forn del Vidre. Se le puso la anilla metálica 1108110.

Observaciones comunicadas en 2010.- 23-9 (R).

Observaciones comunicadas en 2012.- 1-5 (R; las dos primeras cifras no son seguras; tiene la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha).

Observaciones comunicadas en 2014.- 6-5 (en el nido Nº 4-Vald., sin pollo, con otro adulto; tiene la

anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha; con anilla de metal).

ACW.- Según comunica amablemente Martín Surroca Royo, este buitre fue anillado como adulto, en Cintorres (Castellón), el 7 de octubre de 2008, por el Centro de Recuperación de Fauna Forn del Vidre. Se le puso la anilla metálica 1108144, y se determinó que era macho.

Observaciones comunicadas en 2008.- 22-2 (R). (¿?)

AFN.- Según comunica amablemente Martín Surroca Royo, este buitre fue anillado como adulto, en Cintorres (Castellón), el 4 de noviembre de 2008, por el Centro de Recuperación de Fauna Forn del Vidre. Se le puso la anilla metálica 1108559.

Observaciones comunicadas en 2010.- 30-5 (Peña Portillo; es adulto, con banda alar de color amarillo naranja en el ala derecha, donde se lee **AFN** -de arriba abajo-).

8L7.- Según comunica amablemente Álvar Seguí Romá, este buitre fue capturado y marcado en la zona de Alcoy (Alicante), durante el otoño de 2008, dentro de los trabajos del Proyecto Canyet,

Observaciones comunicadas en 2009.- 15-5 (R) (tiene marcas alares en las dos alas).

Observaciones comunicadas en 2011.- 10-9 (C).

CMO (anilla blanca).- Según informa amablemente Philippe Lecuyer, el buitre fue anillado como pollo (joven del año), después del vuelo, el 1 de septiembre de 2008, en las Grands Causses (Macizo Central francés; municipio de Saint-Pierre des Tripiers, departamento de Lozère, región de Languedoc-Roussillon; 44º 12´ 24.7´´ N, 3º 15´ 40.7´´ E). Tiene la anilla metálica TY4374. La última observación en las Grands Causses tuvo lugar el 10 de enero de 2012.

(27-4-10, R; el buitre es subadulto; tiene la anilla blanca en la pata derecha, que se lee de arriba abajo, y tiene anilla de metal en la pata izquierda; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España; citado en la **Hoja Informativa Nº 34**, págs. 388-389.)

(8-3-11, R; tiene la anilla blanca en la pata derecha; Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España; citado en la **Hoja Informativa Nº 35**, págs. 467-468.)

CSM (anilla blanca).- Según informa amablemente Philippe Lecuyer, el buitre fue anillado como pollo, en su nido, el 5 de mayo de 2009, en las Gargantas (Pechos) de Jonte (Macizo Central francés); tiene la anilla metálica TY4420; y la última observación en las Grands Causses tuvo lugar el 5 de agosto de 2011.

(31-7-11, C; tiene la anilla blanca, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha; fotografiado; Manuel López Lázaro; citado en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 259.)

Puede verse una foto del buitre con la anilla CSM, obtenida por Manuel López Lázaro el 31 de julio de 2011, en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 340.

AX4 (banda alar amarilla). Según comunica amablemente Francisco Javier Sampietro Latorre (del Área de Biodiversidad, Departamento de Conservación y Gestión de Especies y Hábitats, de Sodemasa), este buitre fue capturado y marcado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en el comedero de Tauste (Zaragoza), el 1 de julio de 2009. Se le identificó como hembra, de al menos el segundo año. Pesó 7.520 gr. Se le puso la anilla amarilla AX4 en la pata derecha, y la anilla metálica 11109261 en la pata izquierda. El buitre ha sido localizado bastantes veces en distintos lugares de la provincia de Huesca; y también en la de Segovia (la cita del comedero de Campo).

Observaciones comunicadas en 2011.- 5-9 (C).

AVF (con banda alar amarilla en el ala izquierda). Según comunica amablemente Francisco Javier Sampietro Latorre (del Área de Biodiversidad, Departamento de Conservación y Gestión de Especies y Hábitats, de Sodemasa), este buitre fue capturado y marcado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en el comedero de la RACAN de Talamantes (Zaragoza), en la Sierra del Moncayo, el 25 de agosto de 2009. Se le identificó como hembra, de al menos el tercer año. Pesó 10.200 gr. Se le puso la anilla amarilla AVF en la pata derecha, y la anilla metálica 11109318 en la pata izquierda. El buitre ha sido localizado bastantes veces en distintos lugares de las provincias de Huesca y Zaragoza; y también en las de Segovia (la cita del comedero de Campo), Cáceres (días 4 y 5-4-2010, y 21-4-11), y Navarra (el 15-9-11).

Observaciones comunicadas en 2009.- 27-9 (C).

AVU (con bandas alares amarillas).- Según comunica amablemente Francisco Javier Sampietro Latorre (del Área de Biodiversidad, Departamento de Conservación y Gestión de Especies y Hábitats, de Sodemasa), este buitre fue capturado y marcado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en el comedero de la RACAN de Talamantes (Zaragoza), en la Sierra del Moncayo, el 25 de agosto de 2009. Se le identificó como macho, del segundo año. Pesó 7.700 gr. Se le puso la anilla amarilla AVU en la pata derecha, y la anilla metálica 1109308 en la pata izquierda.

Observaciones comunicadas en 2010.- 26-8 (R) (tiene bandas alares amarillas).

472 (con marcas alares amarillas).- Según la información facilitada por el programa AUS y por Manuel López Lázaro, este buitre, nacido en 2009, fue encontrado desnutrido en Sobrón (Burgos), desde donde se le trasladó al Centro de Recuperación de Fauna de Mártioda (Álava). Fue marcado el 14 de octubre de 2009, con la anilla metálica 1108633 en la pata izquierda, la anilla amarilla (que se lee de abajo arriba) en la pata derecha, y marcas alares. Fue liberado en el mismo lugar de Sobrón donde se le había recogido.

El mismo año 2009, el buitre fue visto en el comedero de Campo de San Pedro el 1 de noviembre (por Jesús Hernando Iglesias, Juan José Molina Pérez y Noa Novo Rodríguez), el 13 de diciembre (por Manuel López Lázaro, quien lo fotografió), y el 28 de diciembre (por Fernando Alarcón García, quien lo fotografió)..

En 2010, el buitre fue visto en el comedero de Campo de San Pedro el 8 de enero (por Manuel López Lázaro y Fernando Alarcón García), el 12 de enero (por Manuel López Lázaro), y el 16 de enero (por Jorge Javier Rubio Casado).

Pueden verse fotos de este buitre, obtenidas en el comedero de Campo de San Pedro, en la **Hoja Informativa Nº 34**, págs. 336 (foto de Juan José Molina Pérez, el 1 de noviembre de 2009), 337 y 375 (fotos de Manuel López Lázaro, el 13 de diciembre de 2009).

Otra foto (de Jorge Javier Rubio Casado, el 16 de enero de 2010), y parte de los datos anteriores, aparecen en:

--- Rubio Casado, J. J. (2010). **El buitre leonado (*Gyps fulvus*).** Cuaderno. 24 págs. Editado por el autor. (Con fotografías en color. Las obtenidas en el Refugio o en su entorno corresponden a Jorge Javier Rubio Casado y a Cristina del Castillo-Olivares Sánchez.) (Pág. 14).

FUL. Según comunica amablemente Álvaro Camiña Cardenal, este buitre fue anillado por EBNava, con más de tres años de edad, en Rábano (Valladolid), el 7 de octubre de 2009.

Observaciones comunicadas en 2010.- 6-4 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 8-12 (C).

8MR.- Según comunica amablemente Jesús Hernando Iglesias, informado a su vez por Álvar Seguí Romá, este buitre fue marcado (y liberado) no muy lejos de Alcoy (Alicante), en el Parque Natural Sierra Mariola (en las coordenadas 30TX716.812 y 4.287.691), como joven no del año, el 5 de diciembre de 2009, con la anilla de metal 1108933 en la pata izquierda.

Observaciones comunicadas en 2011.- 2-8 (R) (con marcas alares blancas; con la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha; y con anilla de metal en la pata izquierda). (Fotografiado; puede verse una foto en la pág. 260, y otra en esta página.)

Puede verse una foto del buitre con anilla 8MR, obtenida por Miguel Sanz Trillo el 2 de agosto de 2011, en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 332.

C86 (con banda alar amarilla).- Según comunica amablemente Francisco Javier Sampietro Latorre (del Área de Biodiversidad, Departamento de Conservación y Gestión de Especies y Hábitats, de Sodemasa), este buitre fue capturado y marcado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en el comedero de Ejulve (Teruel), el 23 de junio de 2010. Se le identificó como macho, de al menos el cuarto año. Pesó 9.000 gr. Se le puso la anilla amarilla C86 en la pata derecha, y la anilla metálica 1109922 en la pata izquierda. El buitre ha sido localizado bastantes veces en distintos lugares de la provincia de Teruel; y también en las de Castellón (los días 2-7-2010 y 3-9-2010), y Segovia (la cita del comedero de Campo).

Observaciones comunicadas en 2011.- 31-7 (C; fotografiado; con banda alar amarilla; con la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha; y con anilla de metal en la pata izquierda; puede verse una foto en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 339).

Puede verse una foto del buitre con anilla C86, obtenida por Manuel López Lázaro el 31 de julio de 2011, en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 339.

H1U (con marcas alares amarillas).- Según comunican amablemente Jesús María Lekuona Sánchez y *Maquia Ambiental*, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Jesús María Lekuona Sánchez,

del Gobierno de Navarra, como joven del año, en el muladar de Lumbier (Navarra, España), gestionado por el Gobierno de Navarra, el 25 de agosto de 2010. Presentaba queratitis en el ojo izquierdo. Se le puso la anilla metálica 1110581 en la pata derecha.

Observaciones comunicadas en 2011.- 28-6 (R; con bandas alares amarillas).

Observaciones comunicadas en 2012.- 31-7 (R; se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata derecha; con las bandas alares amarillas), 6-8 (R), 7-8 (R; con bandas alares amarillas), ¿30-8 (R; con bandas alares amarillas; no leído el número)?.

Observaciones comunicadas en 2013.- 25-3 (R; con bandas alares), 17-7 (R; con bandas alares), 12-8 (R; con banda amarillo-naranja en el ala derecha), 11-12 (R; con bandas alares).

Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R; con banda alar), 21-7 (R; con banda alar).

Observaciones comunicadas en 2015.- 17-6 (R; con banda alar).

HJ9 (con marcas alares amarillas).- Según comunica amablemente Francisco Javier Sampietro Latorre (del Área de Biodiversidad, Departamento de Conservación y Gestión de Especies y Hábitats, de Sodemasa), este buitre fue capturado y marcado por el Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en el comedero de Laspuña (Huesca), el 8 de octubre de 2010. Se le identificó como macho, de al menos el tercer año. Pesó 8.800 gr. Se le puso la anilla amarilla HJ9 en la pata derecha, y la anilla metálica 1110832 en la pata izquierda. El buitre ha sido localizado bastantes veces en distintos lugares de la provincia de Huesca; y también en las de Zaragoza (el 8-6-11) y Segovia (la cita del Refugio).

Observaciones comunicadas en 2011.- 16-11 (R).

HTM (con banda alar ap. naranja en el ala izquierda).- Según comunica amablemente Francisco Javier Sampietro Latorre (del Departamento de Servicios Medioambientales, de la Sociedad Aragonesa de Gestión Medioambiental, SARGA), este buitre fue capturado y marcado por el Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente de la Diputación General de Aragón, en el comedero de Calatatud (Zaragoza), el 19 de enero de 2011. Se le identificó como macho, de al menos el cuarto año. Pesó 8.100 gr. Se le puso la anilla HTM en la pata derecha, y la anilla metálica 1111089 en la pata izquierda. Antes de su registro en el Refugio de Montejo, el buitre fue observado "*en puntos dentro del área de marcaje, en la provincia de Zaragoza, y dos datos aislados en el Pirineo oscense*".

Observaciones comunicadas en 2012.- 1-5 (R; adulto, con banda alar ap. naranja en el ala izquierda).

Y01 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 18 de septiembre de 2012. Pesó 8.600 gr., y midió 268 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1111827 en la pata derecha.

Observaciones comunicadas en 2012.- 6-11 (C, fot., con banda en ambas alas y anilla de metal en la pata derecha), 16-11 (C; con banda amarilla en ambas alas), 17-11 (C), y 17-11 (Peñalba -con la marca alar en el ala derecha-).

Observaciones comunicadas en 2014.- 12-3 (Peñalba, encima del nido Nº 5; con banda alar).

Puede verse una foto del buitre leonado con banda alar Y01, obtenida por Fernando Alarcón García el 6 de noviembre de 2012, en la **Hoja Informativa Nº 38**, pág. 360.

Y02 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 18 de septiembre de 2012. Pesó 9.100 gr. Se le puso la anilla metálica 1111828.

Observaciones comunicadas en 2012.- 14-10 (montes comunales de Adamuz, Córdoba).

Observaciones comunicadas en 2013.- 2-6 (Salto del Gitano, en el Parque Nacional de Monfragüe, Cáceres).

Observaciones comunicadas en 2014.- 30-4 (R).

Observaciones comunicadas en 2017.- 25-5 (en una encina de Las Torcas; la banda, amarillo-naranja, se lee de arriba abajo, en el ala izquierda).

Y04 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 18 de septiembre de 2012. Pesó 8.700 gr., y midió 246 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1111830 en la pata derecha. Indican de él que "*se trata de un ejemplar reproductor en la colonia de la zona de Pozos Verdes (río de la Hoz) en la colonia de Cantalojas (Guadalajara)*".

Observaciones comunicadas en 2014.- 12-3 (Peñalba, bajo el nido Nº 6; con banda alar), 12-3 (echado en un nido, en la colonia de cría de Pozos Verdes, en Cantalojas, Guadalajara; fotografiado), 21-7 (R; banda alar), 7-11 (en un festín en Cantalojas, Guadalajara).

Observaciones comunicadas en 2015.- 8-11 (Peñalba; con banda alar amarilla, y con una banda alar negra y blanca).

Y06 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 18 de septiembre de 2012. Pesó 9.400 gr., y midió 273 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1111832 en la pata derecha.

Observaciones comunicadas en 2012.- 20-11 (Peñalba).
Observaciones comunicadas en 2013.- 28-3 (en el muladar de La Vega, en Piñuécar-Gandullas, Madrid).
Observaciones comunicadas en 2015.- 7-11 (Peñalba).

Y12 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 18 de septiembre de 2012. Pesó 8.900 gr., y midió 259 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1111838 en la pata derecha.
Observaciones comunicadas en 2012.- 6-11 (C., fot.), 20-11 (C., fot.).

Puede verse una foto del buitre leonado con banda alar Y12, obtenida por Fernando Alarcón García el 6 de noviembre de 2012, en la **Hoja Informativa Nº 38**, pág. 361.

Y18 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó 8.800 gr. Se le puso la anilla metálica 1111844 en la pata derecha.

Observaciones comunicadas en 2012.- (17-11-12, Peñarrosa) (18-11-12, alto de S.I.).
Observaciones comunicadas en 2013.- 13-8 (urbanización La Beltraneja, en Trijueque, Guadalajara).

Y19 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 18 de septiembre de 2012. Pesó 8.800 gr., y midió 254 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1111845 en la pata derecha.

Observaciones comunicadas en 2012.- 6-11 (C., fot.).
Observaciones comunicadas en 2013.- Ap. 6-5 (R; con banda alar), ¿29-5 (C)?, 29-10 (muladar de Galve de Sorbe, Guadalajara), 22-10 (R; con banda alar).
Observaciones comunicadas en 2014.- 7-4 (R; con banda alar), 21-7 (R; con banda alar), 21-10 (muladar de Galve de Sorbe, Guadalajara).
Observaciones comunicadas en 2015.- 9-11 (R; con banda en ambas alas).

Puede verse una foto del buitre leonado con banda alar Y19, obtenida por Fernando Alarcón García el 6 de noviembre de 2012, en la **Hoja Informativa Nº 38**, pág. 362.

Y22 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó 7.600 gr., y midió 264 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1111848 en la pata derecha.

Observaciones comunicadas en 2013.- 28-3 (R; con banda alar amarilla).

Y26 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó 8.700 gr. Se le puso la anilla metálica 1112627.

Observaciones comunicadas en 2014.- 7-4 (R; con banda alar), 23-10 (en el muladar de Galve de Sorbe, Guadalajara).
Observaciones comunicadas en 2015.-18-6 (R; con banda alar).

Y27 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó 8.500 gr., y midió 262 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1112628 en la pata derecha. Fue "*marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)*".

Observaciones comunicadas en 2013.- 30-7 (cortados junto al yacimiento de Montejo de Tiermes, Soria, cuadrícula VL87; con banda amarilla en el ala derecha).
Observaciones comunicadas en 2014.- 10-9 (R; banda alar), ¿2-10 (R)?
Observaciones comunicadas en 2015.- 5-9 (en el vertedero de residuos sólidos urbanos de Colmenar Viejo, Madrid).

Y28 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó 9.000 gr., y midió 258 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1112629 en la pata derecha.
Observaciones comunicadas en 2012.- 6-11 (C) (fot.).
Observaciones comunicadas en 2013.- 21-6 (A) (fot.).

Puede verse una foto del buitre leonado con banda alar Y28, obtenida por Fernando Alarcón García el 6 de noviembre de 2012, en la **Hoja Informativa Nº 38**, pág. 362; y puede verse otra foto del mismo buitre, obtenida por Héctor Miguel Antequera el 2 de junio de 2013, en la **Hoja Informativa Nº 40**, pág. 447.

Y29 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó 8.900 gr., y midió 267 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1101332 en la pata izquierda.

Observaciones comunicadas en 2012.- 23-10 (en el vertedero de residuos sólidos urbanos de Golmayo, Los Rábanos, Soria).
Observaciones comunicadas en 2014.- ¿6-7 (C)?, 21-7 (R; con banda en el ala izquierda).

Y30 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente Manuel López Lázaro y Alejandro Aparicio Valenciano, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó 8.300 gr., y midió 264 cm. de

envergadura. Se le puso la anilla metálica 1112630 en la pata derecha. Fue registrado de nuevo, también en Galve de Sorbe, el 30 de enero de 2013, por Alejandro Aparicio Valenciano (Cátedra de Medio Ambiente, FGUA).

Observaciones comunicadas en 2013.- 30-1 (en la cta. GU 146, en Galve de Sorbe, Guadalajara), 13-3 (C), 19-5 (C), 8-9 (A), 9-10 (en el muladar de Galve de Sorbe, Guadalajara).
Observaciones comunicadas en 2014.- 2-10 (R), 22-10 (en el muladar de Galbe de Sorbe, Guadalajara).
Observaciones comunicadas en 2015.- ¿19-5 (R)?
en 2014.- 26-8 (Somolinos, Guadalajara), 10-9 (R; banda alar), 23-10 (muladar de Galbe de Sorbe, Guadalajara), 8-11 (V.D.I.; banda alar), 9-11 (P. Zorra; banda alar, en ala izqda.; foto).

Y31 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equip o de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Fue marcado "*dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de La Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)*". Pesó 8.300 gr., y midió 262 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1112631 en la pata derecha. Fue registrado de nuevo el 15 de mayo de 2013 (posado en un punto de alimentación, en Valdillón, Galbe de Sorbe, Guadalajara), el 26 de agosto de 2014 (posado en un punto de alimentación, en Somolinos, Guadalajara), y el 23 de octubre de 2014 (recapturado en el muladar de Galve de Sorbe, Guadalajara).

Observaciones comunicadas en 2013.- 12-3 (R; con banda alar amarilla), 15-5 (Somolinos, Guadalajara), 3-9 (R; con banda alar amarilla).
Observaciones comunicadas en 2014.- 26-8 (Somolinos, Guadalajara), 10-9 (R; banda alar), 23-10 (muladar de Galbe de Sorbe, Guadalajara), 8-11 (V.D.I.; banda alar), 9-11 (P. Zorra; banda alar, en ala izqda.; foto).

Y33 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Fue marcado "*dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de La Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)*". Pesó 8.800 gr. Se le puso la anilla metálica 1112633.
Observaciones comunicadas en 2013.- ¿23-6 (C)?

Y35 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó 8.300 gr., y midió 268 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1112635 en la pata derecha. Fue registrado de nuevo el 7 de noviembre de 2013 (posado cerca de una explotación ganadera, en La Miñosa, Soria), y el 17 de noviembre de 2014 (alimentándose en el vertedero de Golmayo, Soria).

Observaciones comunicadas en 2014.- (**35Y**, 8-11-14, Las Torcas, con banda alar).
Observaciones comunicadas en 2015.- 18-6 (R; banda alar).

Y37 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó 8.800 gr., y midió 262 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1112637 en la pata derecha.

Observaciones comunicadas en 2012.- 6-11 (C, fot.).
Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R; con banda en el ala derecha; tiene anilla de metal en la pata derecha; no tiene anilla en la pata izquierda).

Puede verse una foto del buitre leonado con banda alar Y37, obtenida por Fernando Alarcón García el 6 de noviembre de 2012, en la **Hoja Informativa Nº 38**, pág. 363.

Y39 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó 7.800 gr., y midió 268 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1112639 en la pata derecha.

Observaciones comunicadas en 2012.- 6-11 (C, fot.).
Observaciones comunicadas en 2013.- 4-11 (muladar de El Toriejo, en el valle de Alcudia; Brazatortas, Ciudad Real).
Observaciones comunicadas en 2015.- 26-9 (vertedero de Colmenar Viejo, Madrid).

Puede verse una foto del buitre leonado con banda alar Y39, obtenida por Fernando Alarcón García el 6 de noviembre de 2012, en la **Hoja Informativa Nº 38**, pág. 363.

Y40 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó 8.400 gr., y midió 268 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1112640 en la pata derecha.

Observaciones comunicadas en 2013.- 20-3 (ladera sobre El Caramelón, P.D.D., y nido vacío Nº 25 de Peña Inclinada, P.D.I.), 25-5 (Las Donpedro, en el Parque Natural del Cañón del río Lobos; Ucero, Soria), 14-8 (con banda amarilla en el ala izquierda; cerca del comedero de Ayllón), 15-11 (Gascueña de Bornova, Guadalajara).

Y45 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 19 de septiembre de 2012. Pesó 8.700 gr., y midió 268 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1112645 en la pata derecha. Señalan del ave que "*presenta una opacidad blanca en el iris del ojo derecho*".

Observaciones comunicadas en 2013.- 20-2-13 (R; con banda amarilla en el ala derecha), 12-3 (R; con banda alar amarilla), 16-5 (en el muladar de Vadillón, Galbe de Sorbe, Guadalajara), 17-7 (R; con banda alar amarilla), 22-10 (R; con banda alar), 4-12 (R), 22-12 (cerca de Riaguas; con banda amarilla en el ala derecha, que se lee de arriba abajo).
Observaciones comunicadas en 2014.- 31-5 (en vuelo, en la dehesa boyal de Montejo de la Sierra, Madrid).

MH1.- Según informa amablemente Álvaro Camiña Cardenal, este buitre fue anillado de pollo, el 16 de mayo de 2013, en Castroserna de Abajo (Segovia), por Guillermo Blanco Hervás y colaboradores (Grupo de Anillamiento Pyrrhocorax). Tiene la anilla metálica ESI1111755.

Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2017.- 9-2 (R; con anilla de metal en la pata izquierda).

Y51 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.400 gr., y midió 250 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113001en la para derecha. Fue "*marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)*".

Observaciones comunicadas en 2013.- 29-11 (entre Valvieja y Ribota, Segovia).
Observaciones comunicadas en 2014.- 23-10 (muladar de Galve de Sorbe, Guadalajara).
Observaciones comunicadas en 2015.- 20-3 (R; con banda alar).

Y52 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.500 gr., y midió 262 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113002 en la pata derecha. Fue "*marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)*".

Observaciones comunicadas en 2014.- 7-4 (R; con banda alar), 8-4 (Condemios de Abajo, Guadalajara), 5-7 (C).
Observaciones comunicadas en 2015.- 18-1 (Condemios de Abajo, Guadalajara).
Observaciones comunicadas en 2017.- 20-10 (A).
Observaciones comunicadas en 2018.- 14-3 (A), 7-8 (A), 29-8 (A).

Y53 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.400 gr., y midió 250 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113003 en la pata derecha. Fue "*marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)*".

Observaciones comunicadas en 2014.- 25-8 (R; con banda alar).
Observaciones comunicadas en 2015.- 8-11 (loma cerca del comedero de Maderuelo; con banda alar).
Observaciones comunicadas en 2016.- 9-5 (Peñalba, cueva del Nº 11; con banda amillo-naranja, que se lee de arriba abajo, en el ala derecha).

Y59 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 7.800 gr., y midió 244 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113009 en la pata derecha. Fue "*marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)*". Fue visto, posado, el 29-11-2013, entre Valvieja y Ribota (Segovia).

Observaciones comunicadas en 2013.- 16-11 (C; con banda alar).
Observaciones comunicadas en 2014.- 23-4 (Peña Rubia; con banda alar), ¿23-4 (Peñalba)?.
Observaciones comunicadas en 2017.- 29-4 (Peñalba, entre el Nº 34 y el Nº 14; con banda sólo en el ala izquierda; se lee de arriba abajo).
Observaciones comunicadas en 2018.- 11-8 (R; con banda en las dos alas; con anilla de metal en la pata derecha, sin anilla en la pata izquierda), 29-8 (A).

Y62 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.600 gr. Se le puso la anilla metálica 1113011. Fue "*marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)*".

Observaciones comunicadas en 2014.- 27-8 (F; banda alar), 7-10 (vertedero de Colmenar Viejo, Madrid).
Observaciones comunicadas en 2015.- 19-3 (vertedero de Colmenar Viejo, Madrid), 8-11 (vertedero de Colmenar Viejo, Madrid).

Y63 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.600 gr. Se le puso la anilla metálica 1113012. Fue "*marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)*".

Observaciones comunicadas en 2013.- 6-11 (R; con banda alar).

Observaciones comunicadas en 2014.- 20-1 (Castro, Soria), 25-8 (R; no es seguro), 26-10 (collado de Dos Hermanas, Rascafría, Madrid).

Observaciones comunicadas en 2015.- 5-10 (R; con banda naranja en el ala izquierda).

Observaciones comunicadas en 2016.- 2-8 (Castro, Soria; con banda amarilla en el ala izquierda; se lee de arriba abajo).

Y67 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 9.200 gr. Se le puso la anilla metálica 1113016. Fue "*marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)*".

Observaciones comunicadas en 2014.- 27-8 (F; banda en ambas alas).

Observaciones comunicadas en 2015.- 17-3 (Molino de la Huerce, en Valverde de los Arroyos, Guadalajara).

Y69 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 9.200 gr. Se le puso la anilla metálica 1113016. Fue "*marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)*".

Observaciones comunicadas en 2014.- ¿12-5 (R)?

Observaciones comunicadas en 2018.- 16-9 (R; con banda en el ala izquierda).

Y72 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.500 gr., y midió 264 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113020 en la pata derecha. Fue "*marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)*".

Observaciones comunicadas en 2013.- 6-11 (R; con banda alar), 16-11 (en el G.I. de S.I.; con banda alar, que se lee de arriba abajo), 17-11 (en Las Torcas), 20-11 (F; con banda amarilla en el ala derecha, que se lee de arriba abajo; el buitre es adulto no viejo, casi subadulto), 4-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2014.- 7-4 (R; con banda alar), 7-9 (en el muladar de Campisábalos, Guadalajara), 23-10 (en el muladar de Galbe de Sorbe, Guadalajara).

Observaciones comunicadas en 2015.- 20-3 (R; con banda alar), 15-6 (R; con banda alar), 5-10 (R; con banda alar; fotografiado).

Y73 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.500 gr., y midió 258 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113021 en la pata derecha. Fue "*marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)*".

Observaciones comunicadas en 2014.- ¿24-6 (C)?, ¿3-7 (C)?, 27-8 (F; banda en ambas alas).

Observaciones comunicadas en 2016.- 9-5 (Peñalba 1ª, debajo del Nº R-Cern.; con banda amarillo-naranja, que se lee de arriba abajo, en el ala izquierda), 13-9 (C; banda amarillo-naranja en ambas alas; se lee de arriba abajo), 16-10 (Peñalba; fotografiado; con banda amarillo-naranja en el

ala izquierda; se lee de arriba abajo).

Y74 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.700 gr., y midió 266 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113022 en la pata derecha. Fue "*marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)*". Fue visto, posado, el 29 de noviembre de 2013, entre Valvieja y Ribota (Segovia).

Observaciones comunicadas en 2013.- 20-11 (F; con bandas amarillas en ambas alas), 29-11 (entre Valvieja y Ribota), ¿2-10 (R)?, 21-10 (muladar de Galve de Sorbe, Guadalajara).

Observaciones comunicadas en 2016.- 22-7 (R; con banda en ala derecha), 6-8 (R; con bandas en ambas alas).

Observaciones comunicadas en 2017.- 30-3 (R; fot.; con bandas en ambas alas), 21-6 (R; con banda en el ala izquierda, que se lee de arriba abajo), 19-10 (R; fot.; con banda en el ala derecha, que se lee de arriba abajo).

Observaciones comunicadas en 2018.- 3-4 (R; fotografiado; con banda amarilla en el ala derecha, que se lee de arriba abajo), 25-6 (R), 12-7 ap. (A).

Pueden verse dos fotos del buitre leonado con banda alar **Y74**, obtenidas por Jesús Cobo Anula el 30 de marzo de 2017, en la **Hoja Informativa Nº 49.**

Puede verse otra foto de este mismo buitre, obtenida por Juan José Bacallado Aránega el 19 de octubre de 2017, en la misma **Hoja Informativa Nº 49.**

Y77 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.700 gr. Se le puso la anilla metálica 1113025. Fue "*marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)*".

Observaciones comunicadas en 2013.- 5-11 (Albendiego, Guadalajara), 26-11 (Albendiego, Guadalajara), 29-11 (entre Valvieja y Ribota).

Observaciones comunicadas en 2014.- 9-3 (vertedero de Colmenar Viejo, Madrid), 17-10 (muladar de Galve de Sorbe, Guadalajara), 22-10 (muladar de Galve de Sorbe, Guadalajara), 23-10 (muladar de Galve de Sorbe, Guadalajara).

Y78 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.200 gr., y midió 254 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113301 en la pata derecha. Fue "*marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)*".

Observaciones comunicadas en 2014.- 31-1 (confluencia del arroyo de la Requijada con el Bornova, en Albendiego, Guadalajara), ¿2-10 (R)?

Observaciones comunicadas en 2015.- 18-1 (Condemios de Abajo, Guadalajara), 20-3 (R; con banda alar).

Observaciones comunicadas en 2018.- 11-3 (R; con banda naranja en el ala derecha), 12-11 (R; con banda en ambas alas; con anilla de metal en la pata derecha; sin anilla amarilla), 29-11 (R; fotografiado; con banda naranja al menos en el ala izquierda).

Y83 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 9.400 gr., y midió 260 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113305 en la pata derecha. Fue

"*marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)*".

Observaciones comunicadas en 2013.- 22-10 (R; con banda alar).

Observaciones comunicadas en 2014.- 7-4 (R; con banda alar), 21-7 (R; con banda en ambas alas; con anilla amarilla en la pata izquierda, y con anilla de metal en la pata derecha), 20-8(R; con banda alar).

Observaciones comunicadas en 2015.- 5-10 (R; con banda alar naranja; con sólo anilla de metal, en la pata derecha; fotografiado; parece subadulto).

Observaciones comunicadas en 2017.- 30-3 (R; fot.; con banda alar naranja, en ambas alas; el buitre es adulto no viejo, o subadulto), 12-4 (R; con banda en ambas alas).

Observaciones comunicadas en 2018.- 30-4 (R; fot.; con banda alar naranja, en ambas alas).

Pueden verse fotos del buitre con bandas alares **Y83**, obtenidas por Jesús Cobo Anula el 30 de marzo de 2017, en la **Hoja Informativa Nº 49**, Anexo fotográfico.

Y87 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.500 gr., y midió 260 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113309 en la pata derecha. Fue "*marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)*".

Observaciones comunicadas en 2014.- 27-8 (F; banda en el ala izquierda, al menos).

Observaciones comunicadas en 2018.- 8-11 (R; fotografiado; con banda en el ala izquierda).

Puede verse una fotografía de este buitre, obtenida por Raúl González Rodríguez el 8-11-2018 en el comedero del Refugio, en la **Hoja Informativa Nº 51**.

Y88 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.900 gr., y midió 260 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113310 en la pata derecha. Fue "*marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)*".

Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R; con banda en ambas alas; sin anilla en la pata izquierda, y con anilla de metal en la pata derecha).

Observaciones comunicadas en 2015.- 19-1 (vertedero de Golmayo, Soria).

Y93 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.600 gr. Se le puso la anilla metálica 1113314. Fue "*marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)*".

Observaciones comunicadas en 2014.- ¿6-3 (C)?, 11-6 (Campisábalos, Guadalajara), 7-9 (Campisábalos, Guadalajara), 23-10 (muladar de Galbe de Sorbe, Guadalajara), 7-11 (Cantalojas, Guadalajara).

Y95 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 8.500 gr., y midió 252 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113317 en la pata derecha. Fue "*marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)*".

Observaciones comunicadas en 2013.- 26-10 (alto de V.D.I.; la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2014.- 21-7 (R; banda alar), 25-8 (R; banda alar), 10-9 (R; banda alar).
Observaciones comunicadas en 2015.- 20-3 (R; banda alar).
Observaciones comunicadas en 2018.- 25-6 (R; banda alar, con una cuerdecilla enganchada).

Y99 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 9 de octubre de 2013. Pesó 7.800 gr., y midió 252 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113321 en la pata derecha. Fue "*marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)*".

Observaciones comunicadas en 2013.- 29-11 (entre Valvieja y Ribota).
Observaciones comunicadas en 2014.- 20-1 (Molino de la Huerce, en Valverde de los Arroyos, Guadalajara), 27-8 (F; banda en el ala izquierda, al menos), 22-10 (muladar de Galve de Sorbe, Guadalajara), 7-11 (Cantalojas, Guadalajara).
Observaciones comunicadas en 2015.- 6-10 (muladar de Galve de Sorbe, Guadalajara).
Observaciones comunicadas en 2018.- 11-10 (S.I.2ª; con banda naranja en el ala derecha).

YA3 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 23 de octubre de 2014. Pesó 9.750 gr., y midió 250 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113436 en la pata derecha. Fue "*marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)*".

Observaciones comunicadas en 2015.- 20-3 (R; con banda alar), 17-6 (R; con banda alar).
Observaciones comunicadas en 2016.- 11-3 (R; con banda en ala derecha), 9-5 (en lo alto de Peñalba 2ª; con banda amarillo-naranja, que se lee de arriba abajo, en el ala izquierda).
Observaciones comunicadas en 2018.- 16-9 (R), 8-11 (R; fotografiado; con banda en el ala izquierda).
Observaciones comunicadas en 2019.- 26-3 (R, no seguro [¿?A3], fot.).

Puede verse una fotografía de este buitre, obtenida por Raúl González Rodríguez el 8-11-2018 en el comedero del Refugio, en la **Hoja Informativa Nº 51**.

YA7 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 23 de octubre de 2014. Midió 256 cm. de envergadura. Escapó antes de ser pesado. Se le puso la anilla metálica 1113440 en la pata derecha. Fue "*marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)*".

Observaciones comunicadas en 2014.- 8-11 (Las Torcas, con banda alar en ala izqda.), 8-11 (P. Zorra, fot., con banda alar en ala dcha.), 9-11 (P. Zorra; con banda alar).
Observaciones comunicadas en 2015.- 24-8 (A; con banda amarilla en el ala izquierda).

YC1 (con banda alar amarilla).- Según comunican amablemente *Maquia Ambiental* y la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá, este buitre fue capturado y marcado por el equipo de Juan Luis Aguirre (de la Cátedra de Medio Ambiente de la Fundación General Universidad de Alcalá), como adulto, en el muladar de Galve de Sorbe (Guadalajara), el 6 de octubre de 2015. Pesó 9.100 gr., y midió 264 cm. de envergadura. Se le puso la anilla metálica 1113444 en la pata izquierda. Fue "*marcado dentro del Plan de Vigilancia Ambiental del Parque Eólico de la Esperanza, ubicado en la Sierra de Pela (Guadalajara)*".

Observaciones comunicadas en 2018.- 4-3 (R; fotografiado; con banda amarilla, que se lee de arriba abajo, en el ala izquierda), 10-3 (R; con banda alar).

-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

Y los siguientes cuya procedencia ignoramos.-

028 (27-12-07, R).

0AF (18-2-09, R)**.**

04F (25-3-10, R).

¿**0FM**? (14-5-14, Nº 14-Vald. –sin pollo-).

0HV (19-9-12, R).

0L7 (11-4-09, R). (4-5-09, R).

0LH (12-6-07, C).

0MM (25-4-12, R).

0PM (30-12-07, C).

0W6 (29-11-07, R).

0WT (29-11-07, R). (15-4-08, R).

129 (bandas amarillas, en ambas alas) (21-7-14, R).

153 (9-11-14, Peñalba).
(7-11-15, Peña Portillo). (8-11-15, Peña Portillo).
(12-11-16, Peña Portillo). (13-11-16, Peña Portillo).

15L (25-4-12, R).

173 (15-11-09, R). (13-11-10, Peña Portillo). (26-8-14, nido Nº 10 –con pollo- de Peña La Graja).

17L (13-5-07, C).
(26-2-09, R). (31-3-09, R). (1-4-09, R). (4-4-09, R). (24-6-09, R).
(5-2-10, R). (20-2-10, R). (12-4-10, R). (15-4-10, R).

193 (14-8-09, R).

1AF (12-2-09, R).

1C3 (6-11-13, R).

1F3 (25-4-12, R).

¿1N8? (17-5-17, en el nido Nº 1 –con pollo- de El Reloj; la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal).

1T1 (29-4-08, R).

1T3 (1-7-08, R). (16-7, R). (17-7, R). (27-7, R). (28-7, R). (1-8, R). (16-9, R). (28-9, R). (9-10, R). (20-10, R), (24-10, R). (28-10, R). (4-11, R). (5-11, R). (10-11, R) (fotografiado; tiene la anilla amarilla en la pata izquierda, y tiene anilla de metal en la pata derecha). (19-11, R). (22-11, R). (29-11, R). (8-12, R). (14-12, R). (28-12-08, R).
(5-1-09, R). (6-1-09, R). (8-1-09, R). (6-2-09, R). (18-2-09, R). (20-2-09, R). (23-2-09, R). (1-3-09, R). (5-3-09, R). (9-3-09, R). (11-3-09, R). (24-3-09, R). (31-3-09, R). (1-4-09, R). (4-4-09, R). (13-4-09, R). (23-4-09, R). (1-5-09, R). (4-5-09, R). (6-5-09, R). (7-5-09, R). (11-5-09, R). (15-5-09, R). (20-5-09, R). (23-5-09, R). (26-5-09, R). (31-5-09, R). (4-6-09, R). (6-6-09, R). (11-6-09, R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata dcha.). (12-6-09, R). (15-6-09, R) (con anilla de metal en la pata derecha). (19-6-09, R). (22-6-09, R). (25-6-09, R). (9-7-09, R). (19-7-09, R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en pata derecha). (24-7-09, R). (4-8-09, R). (6-8-09, R). (14-8-09, R). (19-8-09, R). (22-8-09, R). (27-8-09, R). (31-8-09, R). (15-9-09, R). (25-9-09, R). (15-10-09, R). (24-10-09, R; en dos festines). (26-10, R). (27-10-09, R). (31-10-09, R). (2-11-09, R). (6-11-09, R). (15-11-09, R). (16-11-09, R) (con anilla de metal en la pata derecha). (23-11-09, R). (25-11-09, R). (14-12-09, R).
(13-1-10, R). (14-1-10, R). (20-1-10, R). (24-1-10, R). (2-2-10, R). (24-3-10, R). (9-4-10, R). (15-4-10, R). (21-4-10, R). (5-5-10, R). (19-5-10, R). (31-5-10, R). (9-6-10, R; con anilla de metal en la pata derecha). (10-6-10, R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal). (20-6-10, R). (2-7-10, R). (7-7-10, R). (13-7-10, R). (4-8-10, R). (9-8-10, R). (6-9-10, R). (18-9-10, R). (23-9-10, R). (24-9-10, R). (5-10-10, R). (8-10-10, R). (13-10-10, R). (17-10-10, R). (3-11-10, R). (14-11-10, R). (16-11-10, R) (con anilla de metal en pata derecha; fotografiado). (23-11-10, R). (25-12-10, R). (27-12-10, R).
(2-1-11, R). (5-1-11, R). (7-1-11, R). (8-1-11, R). (18-1-11, R). (22-1-11, R). (5-2-11, R). (10-2-11, R). (16-2-11, R). (3-3-11, R). (5-3-11, R). (11-4-11, R). (22-4-11, R). (25-4-11, R). (7-6-11, R; fot.).
(25-4-12, R). (23-5-12, R). (30-5-12, R). (19-9-12, R).
(15-6-15, R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en pata derecha). (6-8-16, R; no es seguro; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en pata derecha). (15-11-16; R; fot.).
(16-12-16; encontrado muerto, en Las Loberas).

1T8 (6-8-16, R.; no es seguro; en la pata izquierda).

228 (7-8-07, R).

24X.- Observaciones comunicadas en 2007.- 6-1 (R), 23-1 (C), 28-1(C), 15-2 (R), 26-2 (R), 8-3 (R), 2-4 (R), 4-4 (R), 22-5 (R), 26-5 (R), 14-6 (R), 20-6 (R), 6-8 (R), 11-8 (R), 17-8 (R), 21-8 (R), 23-8 (R), 3-9 (R), 6-9 (R), 28-11 (R), 2-12 (R), 4-12 (R), 7-12 (R), 22-12 (R), 30-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2008.- 5-1 (R), 8-1 (R), 9-1 (R), 12-1 (R), 25-1 (R), 5-2 (R), 8-2 (R), 12-2 (R), 13-2 (R), 16-2 (R), 18-2 (R), 28-2 (R), 8-3 (R), 12-3 (R), 17-3 (R), 24-3 (R), 31-3 (R), 7-4 (R), 9-4 (R), 10-4 (R), 29-4 (R), 30-4 (R), 3-5 (R), 8-5 (R), 11-5 (R), 18-5 (R), 24-5 (R), 30-5 (R), 16-6 (R), 1-7 (R), 6-7 (R), 11-7 (R), 14-8 (R), 18-8 (R), 19-8 (R), 21-8 (R), 25-8 (R), 28-8 (R), 4-9 (R), 5-9 (R), 6-9 (R), 24-10 (R), 26-10 (R), 10-11 (R), 19-11 (R), 25-12 (R), 27-12 (R), 29-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2009.- 12-2 (C) (fotografiado), 18-2 (R), 26-2 (R), 27-2 (R), 1-3 (R), 5-3 (R), 7-3 (R), 9-3 (R), 12-3 (R), 13-3 (R), 24-3 (R), 1-5 (R), 4-5 (R), 6-5 (R), 11-5 (R), 15-5 (R), 20-5 (R), 1-6 (R), 4-6 (R), 6-6 (R), 11-6 (R), 12-6 (R), 15-6 (R), 19-6 (R), 22-6 (R), 25-6 (R), 27-6 (R), 28-6 (R), 30-6 (R), 3-7 (R), 5-7 (C), 7-7 (R), 9-7 (R) (en dos festines), 11-7 (R), 12-7 (R), 14-7 (R), 16-7 (R), 24-7 (R), 25-7 (R), 27-7 (R), 3-8 (R), 10-8 (R), 12-8 (R), 19-8 (R), 24-8 (R), 28-8 (R), 31-8 (R), 2-9 (R), 5-9 (R), 8-9 (R), 9-9 (R), 14-9 (R), 15-9 (R), 17-9 (R), 20-9 (R), 25-9 (R), 28-9 (R), 7-10 (R), 15-10 (R), 24-10 (R), 27-10 (R), 29-10 (R),

2-11 (R), 6-11 (R), 9-11 (R), 15-11 (R), 17-11 (R), 25-11 (R), 27-11 (R), 4-12 (R), 14-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2010.- 7-1 (R), 8-1 (C), 9-1 (R), 24-1 (R), 19-2 (R), 20-2 (R), 26-2 (R), 7-3 (R), 21-3 (R), 24-3 (R), 28-3 (R), 30-3 (R), 3-4 (R), 6-4 (R), 8-4 (R), 15-4 (R), 17-4 (R), 26-4 (R), 27-4 (R), 2-5 (R), 5-5 (R) (dos veces), 15-5 (R), 17-5 (R), 19-5 (R), 21-5 (R), 27-5 (R), 9-6 (R) (se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la otra pata), 14-6 (R), 15-6 (R), 17-6 (R), 22-6 (R), 23-6 (R), 26-6 (R), 28-6 (R), 29-6 (R), 30-6 (R), 1-7 (R), 2-7 (R), 14-7 (R), 14-7 (C), 16-7 (R), 30-7 (R), 9-8 (R), 14-8 (R), 18-8 (R), 26-8 (R), 30-8 (R), 1-9 (R), 6-9 (R) (en dos festines), 5-10 (R), 7-10 (R), 8-10 (R), 13-10 (R), 29-10 (R), 3-11 (R), 14-11 (R), 16-11 (R) (con anilla de metal en la pata derecha; fot.), 23-11 (R), 25-11 (R), 29-11 (R), 5-12 (R), 30-12 (R).

Observaciones comunicadas en 2011.- 2-1 (R), 8-1 (R), 14-1 (R), 9-2 (R), 27-2 (R), 3-3 (R), 24-3 (R), 1-5 (R), 11-5 (Peña Inclinada, P.D.I.), 24-5 (R), 7-6 (R; fot.).

Observaciones comunicadas en 2011.- 11-1 (R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata dcha.; fot.).

Observaciones comunicadas en 2012.- 17-3 (R), 21-1 (R), 25-4 (R), 23-5 (R), 19-9 (R).

Observaciones comunicadas en 2013.- 20-3 (S.D., muy cerca del nido Nº 33).

Puede verse una foto del buitre con anilla 24X, obtenida por Elías Gomis Martín el 16 de noviembre de 2010, en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 335.

Puede verse otra foto del buitre leonado con anilla 24X, obtenida por Jesús Cobo Anula el 11 de enero de 2012, en la **Hoja Informativa Nº 38**, pág. 367.

260 (12-6-07, C).

28C (16-11-10, R).

2AF (7-10-09, R).

¿**2CW**? (14-5-14, nido Nº 26-Vald.)

2UA (22-8-15, R; con anilla de metal en la pata izquierda).

(Según la información publicada en www.avesdeburgos.com, este buitre con anilla 2UA fue visto, por Manuel Mata Hurtado, en el muladar de Las Renovillas [Burgos, cuadrícula VM45], el 20-1-18.)

2UM (25-4-12, R).

2WA (6-1-07, C).

En otro orden de cosas, puede citarse el buitre con anilla metálica **1103940**, que al parecer nació en Valdecasuar en 2005; y fue encontrado muerto, electrocutado, en Extremadura, el 14 de julio de 2007, por Javier Zalba, según informa Álvaro Camiña Cardenal.

30 (banda amarilla en ala derecha; se lee de arriba abajo) (14-6-15, A).

34N (5-3-11,R).

35M (22-4-11, R).

364 (joven del año). (9-9-07, C).

3CH (30-12-09, R).

3LX (16-2-08, R).

3LL (24-6-09, R). (20-9-09, R).

3P7 (29-7-09, C).

43A (16-7-09, R).

474 (banda alar) (25-6-18, R).

4A8 (5-3-09, R) (adulto muy blanco).

4AB (24-7-09, C).

4AL (10-6-10, R).

4AN (24-6-10, R).

4FA (24-9-08, R).

4JW (12-4-10, R).

4MC (15-6-09, R) (se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata derecha).

4M¿H? (30-3-17, R; fot.; se lee de abajo arriba, en la pata izquierda).

4MJ (6-4-09, R). (7-5-09, R). (8-5-09, R). (19-6-09, R; en dos festines; está tuerto del ojo izquierdo, que tiene vacío).

4MU (20-2-09, R).

4N9 (26-10-08, R).

4W(7 ó 9 ó T).- (9-11-09, R).

551 (20-9-09, R).

579 (17-1-12, R).

61T (23-5-12, R).

66 / **55** (bandas alares; 11-11-18, V.A.D.; con anilla de metal en la pata derecha).

665 (19-2-2014, Peñalba).

66F (20-2-10, R).

66P (17-1-12, R). (28-3-12, C). (23-5-12, R).

66U (10-4-11, C; fotografiado).

Puede verse una foto del buitre con anilla 66U, obtenida por Manuel López Lázaro el 10 de abril de 2011, en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 313.

6AC (8-1-10, C). (21-12-10, C).

6NU.- 1-3-09 (R).

708 (24-5-10, Los Poyales, bajo la Plataforma I; el buitre tiene la anilla amarilla en la pata derecha).

70A (25-8-14, R; tiene la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha; con anilla de metal).

70H (29-5-12, Grupo I de S.I.).

70M (23-5-12, R).
(El mismo buitre fue visto y fotografiado el 1-12-12, en los páramos próximos a Segovia, por Manuel Hernández López).

70U (23-5-10, Peña Inclinada, nido Nº 33 –sin pollo-; el buitre es subadulto; tiene la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha). (13-12-10, R).
(8-3-11, R). (21-7-11, Peña Inclinada, cerca del nido Nº 34 y luego en el nido Nº 7; tiene la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha; sin anilla de metal; el buitre es adulto, y copula en el nido Nº 7 –sin pollo- con otro buitre adulto, estando debajo el 70U).
(27-2-12, R; con la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha).
(25-5-12, Viaducto Antes Derecha, en el nido Nº 8 –con pollo blanco de poco más de unos 30 días-; tiene la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata ¿izqda.?; sin anilla de metal).
(30-5-12, R).
(18-7-14, Peña Inclinada, en la repisa de los nidos Nº 7 y otros; tiene la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata derecha; sin anilla de metal).
(8-3-15, Peña Inclinada, en el nido Nº 7, con pollo blanco crecido; tiene la anilla amarilla en la pata derecha).
(17-5-15, Peña Inclinada, en el nido Nº 7, junto al pollo; tiene la anilla amarilla en la pata derecha).
(5-10-15, Peña Inclinada, en el nido Nº 7, junto al pollo; tiene la anilla amarilla en la pata derecha; fot.).
(30-3-16, Peña Inclinada, en el nido Nº 7, junto al pollo, que al parecer es muy pequeño; tiene la anilla amarilla en la pata derecha; es relevado por otro buitre).

715 (21-7-09, R). (24-3-10, R). No sabemos si es de las hoces del Riaza (¿del año 2007?).

71F (21-7-14, R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda).
(15-6-15, R; tiene la anilla amarilla en la pata ¿derecha?).

728 (28-8-11, C).

730 (24-9-10, R). (12-10-10, R). (15-10-10, R; en dos festines).
(19-9-12, R).
(18-5-14, P.D.I.; se lee de abajo arriba; la última cifra no es segura).

735 (14-11-11, R) (se lee de abajo arriba; el 5 no es del todo seguro; con anilla de metal en la pata derecha).

737 (13-7-10, C).

746 (17-3-12, R). (21-3-12, R). (30-5-12, R).
(24-7-13, R; adulto no viejo; se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata derecha).
(25-8-14, R).
(30-3-17, R; fot.; adulto; se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata derecha). (24-8-17, R).
(40-3-18, R; con anilla de metal).

Puede verse una foto del buitre leonado con anilla **746**, obtenida por Jesús Cobo Anula el 30 de marzo de 2017, en la **Hoja Informativa Nº 49**.

748 (27-2-12, R; con la anilla amarilla, que se lee de arriba abajo, en la pata izquierda).

75R (9-11-14; Grupo I del barranco de Valdecasuar, margen izquierda).

760 (12-6-07, R). (16-7-07, R). (17-8-07, R). (2-9-07, R). (6-9-07, R). (28-11-07, R). (18-12-07, R).
(3-3-08, R). (1-8-08, R). (18-8-08, R). (21-8, R). (22-8-08, R). (27-8-08, R). (4-9-08, R).
(5-9-08, R). (6-9-08, R). (11-9-08, R). (28-10-08, R). (25-12-8, R).
(2-1-09, R). (5-1-09, R). (8-1-09, R). (18-2-09, R). (26-2-09, R). (12-3-09, R). (13-4-09, R).
(14-4-09, R). (1-5-09, R). (4-5-09, R). (15-5-09, R). (22-5-09, R). (12-6-09, R).
(19-6-09, R; en dos festines). (25-6-09, R). (9-7-09, R; con anilla de metal en pata dcha.).
(12-7-09, R). (14-7-09, R). (21-7-09, R). (27-7-09, R). (3-8-09, R). (5-8-09, R). (12-8-09, R).
(14-8-09, R). (17-8-09, R). (19-8-09, R). (20-8-09, R). (22-8-09, R). (27-8-09, R). (28-8-09, R).
(31-8-09, R). (2-9-09, R; dos veces). (5-9-09, R). (8-9-09, R). (9-9-09, R). (10-9-09, R).
(23-9-09, R). (25-9-09, R).
(25-1-10, R). (5-2-10, R). (12-4-10, R). (2-5-10, R). (23-6-10, R). (29-6-10, R). (16-7-10, R).
(21-7-10, R). (4-8-10, R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en pata derecha). (24-9-10, R).
(18-1-11, R). (1-5-11, R).
(17-1-12, R). (28-3-12, R). (19-9-12, R).
(24-7-13, R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en pata derecha).

761 (18-2-09, R) (subadulto).

762 (24-6-10, R).

765 (3-6-07, C; fot.). (12-6-07, C; fot.).

766 (22-5-07, R). (26-5-07, R).

780 (10-10-18, P.P.; fot.; se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal)

784 (25-4-12, R).

79X (6-11-09, R).

7AP (9-11-15, R).

7BC (no segura). (9-11-14, P. La Graja; fot.).

7NU (27-2-09, R).

7P5 (15-6-09, R) (inmaduro; con anilla de metal en la pata derecha).

8L (12-8-13, R.; con banda verde en el ala izquierda; el buitre es joven, quizá de 2012).

¿80H? (9-7-07, R).

86P (6-3-12, R).

86V (10-11-08, C).

87X (29-4-08, R).

88U (1-3-09, R). (Joven de 2007 ó 2008, posiblemente de 2008).

89U (joven) (9-10-08, R; fotografiado).

89V (5-4-09, C).

8AV (vista la anilla sola, en el suelo del comedero del Refugio, el 6-3-2012).

8C0 (12-6-09, R; subadulto muy blanco; la anilla se lee de arriba abajo).

8MN (con bandas alares amarillas, nuevas, en ambas alas; el buitre es joven del segundo o tercer año). (14-6-10, R).

8RP (5-3-10, R). (24-3-10, R). (30-3-10, R). (31-3-10, R). (3-4-10, R). (6-4-10, R). (12-4-10, R). (13-4-10, R). (15-5-10, R). (17-5-10, R). (17-6-10, R). (18-6-10, R). (29-6-10, R). (1-7-10, R). (2-7-10, R). (19-7-10, R). (24-7-10, R). (30-7-10, R). (18-8-10, R). (20-2-11, R). (5-3-11, R). (22-4-11, R). (4-2-12, R). (17-3-12, R). (15-4-12, C). (30-8-12, R; la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda). (19-9-12, R). (24-7-13, R; no es seguro). (18-11-13, R). (18-5-16, Nº 39-S.D.; no es seguro; RP).

8TL (10-4-11, C; fotografiado).

Puede verse una foto del buitre con anilla 8TL, obtenida por Manuel López Lázaro el 10 de abril de 2011, en la **Hoja Informativa Nº 36**, pág. 338.

8WU (24-7-14, R).

902 (14-8-18, R; se lee de abajo arriba; también podría ser **90L**).

95U (1-8-15, buitrera del yacimiento de Montejo de Tiermes; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; con anilla de metal).

95V (17-3-12, R). (21-3-12, R). (30-5-12, R). (21-7-14, R; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal). (14-6-18, R). (16-7-18, R).

985.- Visto en el comedero de Campo el 26-XI-2006 (M. López) (véase la **Hoja Informativa Nº 31**, pág. 152).

9MU (4-5-09, R).

AMX (con bandas alares amarillas). (14-7-10, C).

AP75 (anilla metálica, grande, en la pata izquierda).

A7J (banda amarillo-naranja, en ambas alas). (4-5-15, m.d. Boquerón; se lee de arriba abajo, en el ala izquierda; el buitre es joven, al parecer del 2º año). (6-5-15, alto de Peñalba; se lee de arriba abajo, en el ala izquierda; el buitre es inmaduro). (26-5-15, C; se lee de arriba abajo, en el ala derecha). (16-5-16, El Corralón; se lee de arriba abajo, en ambas alas; la banda es naranja; el buitre es subadulto, o adulto no viejo). (10-9-16, R; banda en ambas alas; con anilla amarilla, con el mismo código, que se lee de arriba abajo, en la pata izquierda; con anilla de metal; fotografiado.)

Puede verse una foto de este buitre, obtenida por Xavier Parra Cuenca el 10-9-2016 en el comedero del Refugio, en la **Hoja Informativa Nº 47** (pág. 274).

C8V (17-7-13, R).

CLF (12-11-18, R; con anilla de metal en la pata izquierda).

CM5 (25-7-09, R).

CT3 (15-8-12, C).

(31-7-14, cortados del yacimiento de Montejo de Tiermes, en el nido Nº 9, junto al pollo; no son seguras las dos primeras cifras de la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; tiene anilla de metal).

(1-8-15, cortados del yacimiento de Montejo de Tiermes; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha; tiene anilla de metal).

(11-3-16, R; tiene la anilla amarilla en la pata derecha).
(12-4-17, R; tiene la anilla amarilla en la pata derecha).

CVJ (11-4, R) (joven del primer o segundo año; le falta toda la cola salvo tres plumas). (14-4-09, R).

CVP (21-12-10, C). (4-3-11, C).

CWF (25-12-10, R; parece joven del año).

DDU (anilla blanca). (13-5-07, C). Puede proceder de la reserva del valle de Ossau (Pirineo francés).
(Puede verse una foto, obtenida por Manuel López Lázaro el 13-5-07, en la **Hoja Informativa Nº 32**, pág. 289).

DFJ (anilla blanca; puede ser de Francia). (19-3-08, R).

E97 (8-11-18, R; fotografiado; muy deteriorada, se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).
Puede verse una fotografía de este buitre, obtenida el 8-11-2018 por Raúl González Rodríguez en el comedero del Refugio, en la **Hoja Informativa Nº 51**.

E9T (30-3-16, P.D.I.; es el buitre de arriba, en una cópula; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata derecha).

F48 (25-6-09, R; el "8" está roto por abajo).

F6M. Observaciones comunicadas en 2012.- 24-2 (R).

F6R (banda naranja en el ala izquierda). (25-8-14, R).

F9X. Observaciones comunicadas en 2009.- 31-10 (R), 6-11 (R) (lleva emisor), 9-11 (R) (lleva emisor), 15-11 (R), 16-11 (R), 23-11 (R), 25-11 (R), 26-11 (R), 14-12 (R).
Observaciones comunicadas en 2010.- 30-1 (R), 5-2 (R), 16-2 (R), 1-3 (R), 4-3 (R), 8-3 (R), 21-3 (R), 24-3 (R), 29-3 (R), 31-3 (R), 6-4 (R) (lleva emisor de satélite), 9-4 (R), 17-4 (R), 21-4 (R), 22-4 (R), 26-4 (R) (lleva emisor de satélite), 27-4 (R), 15-5 (R), 19-5 (R), 14-6 (R), 23-6 (R).

F9T. Observaciones comunicadas en 2010.- 24-6 (R).
Observaciones comunicadas en 2012.- 15-2 (Peñalba; la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2013.- 8-5 (Peñalba; la anilla amarilla, en la pata izquierda; con anilla de metal; la lectura no es segura).
Observaciones comunicadas en 2017.- 30-3 (R; fot.; la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal), 17-7 (Peñalba 1ª; la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2018.- 8-11 (R).

Puede verse una foto de este buitre con anilla F9T, obtenida por Jesús Cobo Anula el 30 de marzo de 2017, en la **Hoja Informativa Nº 49**.

FF3.- Observaciones comunicadas en 2014.- 28-6 (R).

FOX. Observaciones comunicadas en 2010.- 21-1 (R) (lleva emisor).

FVL (con marca alar). Observaciones comunicadas en 2011.- 12-2 (R).

H08. Observaciones comunicadas en 2010.- 21-3 (R), 27-4 (R).

JL? (banda naranja en ala derecha).- 21-5 (Los Poyales, S.I.).

JTJ (anilla).- 25-6 (R).

JU (banda alar azul, con letras blancas; ala derecha) (1-6-15, Plat. I de S.I.; se lee de arriba abajo). (21-5-16, S.I., cerca del vacío Nº 46; no es seguro). (23-5-16, Plat I de S.I.; se lee de arriba abajo).

KN (con banda alar azul -o marrón-, con letras blancas) (20-5-14, R; con anilla de metal en la pata derecha). (11-4-17, R, fot.; con banda en el ala izquierda).

L10 (13-1-07, R).

L5X (banda naranja en ambas alas) (22-8-14, C; la segunda cifra no es del todo segura).

LL3 (banda amarilla en ambas alas) (11-3-16, R; se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata izquierda; con banda amarilla en las dos alas; el buitre es joven del segundo o tercer año). (10-9-16, R; se lee de arriba abajo; banda amarillo-naranja, en el ala derecha; con anilla amarilla, de distinto código, en la pata derecha).

LH7 (banda amarilla y anilla amarilla) (21-6-17, R; la banda se lee de arriba abajo, en el ala derecha).

MAM (1-2-12, R).

MOL (10-4-11, C).

MNC (31-7-12, R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).
(9-6-14; M¿N?-; en el nido Nº 28 del barranco de Valdecasuar, junto al pollo).
(18-6-15, R; se lee de abajo arriba).
(7-6-16; en el nido Nº 28 del barranco de Valdecasuar, junto al pollo; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).
(30-3-17; R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).

MNX (22-8-15, R; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata derecha).
(12-11-18, R).

N80 (23-1-07, C).

PAT (5-5-15, nidos Nº 15 y Nº 21 de El Camp.; se lee de abajo arriba; en la pata izqda.; con anilla de metal).

PE4 (14-5-14, nido Nº 26-Vald.; es echado).

¿**PE**-? (16-5-14, incubando en el nido Nº 78-Vald.).

P¿EF? (21-8-18, R; en la pata izquierda).

PGC (25-8-14, R). (6-6-16, Grupo I-Valdecasuar m.i.; se lee de abajo arriba; con anilla de metal en la pata izquierda).

P0N (9-11-15, R).

PX8 (9-5-18, R; banda naranja en ala izquierda, leída de arriba abajo).

T3N (25-6-18, R; banda alar amarilla).

VML (13-1-07, R).

WJJ (21-8-18, R; banda en ambas alas).

Y07 (22-8-15, R).

Y0N (6-8-16; R; con banda en ambas alas; el buitre es inmaduro).

Y23 (22-5-07, R).

Y57 (14-3-18, A). (27-5-18, en lo alto de Las Torcas; con banda naranja, que se lee de arriba abajo, en el ala derecha; el buitre es adulto). (12-11-18; R; con banda alar).

Y58 (12-4-17, C; el buitre es adulto; con banda amarilla en el ala izquierda).

Y61 (12-7-18 ap.; A; con banda alar).

Y82 (30-3-17, R; fot.; con banda en ambas alas; se lee de arriba abajo; el buitre es adulto).

Pueden verse fotos del buitre con bandas alares **Y82**, obtenidas por Jesús Cobo Anula el 30 de marzo de 2017, en la **Hoja Informativa Nº 49**, Anexo fotográfico.

Y84 (13-11-16, P. Fueros; fotografiado; se lee de arriba abajo; el buitre es inmaduro o subadulto).
(15-11-16, R; fotogradiado; con bandas en ambas alas; se lee de arriba abajo).
Pueden verse las fotos de ambos días, obtenidas por José Luis Armendáriz Sanz y por Raúl González Rodríguez respectivamente, en la **Hoja Informativa Nº 47**, Anexo fotográfico.
(30-4-18, R; con banda naranja en ambas alas).
(26-3-19, R; adulto; con anilla de metal en la pata derecha).

Y91 (7-8-18, A).

YA5 (21-8-2015, R –cerca-, con banda naranja [se lee de arriba abajo] en el ala derecha).
(24-8-2015, A; con banda amarilla en el ala derecha).

YA6 (29-5-15; en la zona intermedia-baja de Las Torcas´-cañón; con banda amarillo naranja en el ala izquierda). (3-6-15; en Las Torcas; con banda naranja, que se lee de arriba abajo, en el ala izquierda). (15-6-15, R; con banda en el ala derecha). (15-6-15, R; con banda alar; no seguro). (22-8-15, R; con banda naranja en el ala izquierda). (7-11-15, Las Torcas; con banda alar). (8-11-15, La Catedral; con banda alar).
(22-7-16, R; con banda alar, naranja, en el ala derecha).
(29-3-17, R; con banda alar; no es seguro). (19-10-17, R; fot.; con banda amarilla, que se lee de arriba abajo, en el ala derecha).
(16-2-18; Peñalba 1ª; con la banda amarilla, YA6 ó YA5, que se lee de arriba abajo, en el ala derecha; y con una banda negra [arriba] y blanca [debajo] en el ala izquierda). (27-5-18, en lo alto de Las Torcas; con banda amarilla, que se lee de arriba abajo, en ambas alas; el buitre es adulto).
(12-3-18; R; fotografiado; con banda en ambas alas, que se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata derecha; sin anilla amarilla).
(13-8-18; R; con banda en el ala izquierda, y esbozo de banda rota en el ala derecha).
(26-3-19; R; adulto; con banda deteriorada en el ala izquierda; con anilla de metal en la pata derecha).

Pueden verse dos fotos de este buitre con banda YA6, obtenidas por Juan José Bacallado Aránega el 19 de octubre de 2017, en la **Hoja Informativa Nº 49.**

YA9 (11-3-16; R; con banda en ala derecha; con anilla de metal en la pata izquierda; el buitre es joven del segundo o tercer año). (24-8-17; R; con banda en ala izquierda). (30-4-18; R; con banda naranja en el ala derecha, y con anilla amarilla). (5-6-18; R; con banda alar). (25-7-18; A; con banda alar; también puede ser **YA8**).

YAB (25-6-18; R; con banda alar).

YC2 (12-3-18; R; fotografiado; con banda en ala derecha, que se lee de arriba abajo; con anilla de metal en la pata izquierda; sin anilla amarilla).

YC7 (14-3-18, A). (7-8-18, A).

YC9 (9-3-18; Peñalba; con banda amarilla en ala derecha, leída de arriba abajo).
(9-5-18; R; con banda naranja en ambas alas, leída de arriba abajo).
(27-5-18; alto de Las Torcas; con banda amarilla en el ala derecha, leída de arriba abajo; el buitre es inmaduro o subadulto).
(25-6-18, R; con banda alar amarilla).
(14-8-18; R; con banda amarilla en el ala izquierda).

YCJ (22-8-15, R; con banda naranja en ambas alas).
(24-8-15, A; con banda amarillo naranja en ambas alas; se lee de arriba abajo)l

YF2 (30-3-17, R; fot.; con banda, al menos en el ala izquierda; se lee de arriba abajo). (19-10-17, R). (11-11-17, P. Zorra). (12-11-17, P. Zorra; fot.). (5-6-18, R; con banda alar). (12-7-18 ap.; A). (16-9-18, R). (12-11-18, R; con banda en el ala izquierda).

Puede verse una foto del buitre leonado con banda alar **YF2**, obtenida por Jesús Cobo Anula el 30 de marzo de 2017, en la **Hoja Informativa Nº 49.**

YL4 (16-7-18. R; con banda alar; fot.).

Y0F (27-1-2006, Peñalba; con banda alar).

Y0J (15-6-15, R; con banda en el ala izquierda).

1102380.- (30-6-09, R). (21-7-09, R). (11-12-13, R; se le coloca la anilla amarilla PC8).
No sabemos si es de las hoces del Riaza (¿del año 2000?).
Observaciones comunicadas en 2014.- 6-5 (en el nido Nº 20-Vald., con pollo; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal), 7-6 (en el nido Nº 20-Vald., con pollo; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal), 16-7 (en el nido Nº 20-Vald., con pollo; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal).
Observaciones comunicadas en 2015.- 22-8 (R; el buitre es adulto; tiene la anilla amarilla en la pata izquierda; con anilla de metal), 7-11 (Peña Portillo).
Observaciones comunicadas en 2016.- 4-5 (junto al nido Nº 93-Vald., con pollo; el buitre es adulto; tiene la anilla amarilla, que se lee de abajo arriba, en la pata izquierda; con anilla de metal), 10-9 (R; tiene la anilla amarilla en la pata izquierda).
Observaciones comunicadas en 2017.- 11-11 (Peña Portillo).

1102426.- (19-6-09, R; se lee al revés). (9-7-09, R). No sabemos si es de las hoces del Riaza.

1102786.- (28-3-10, R).

1103216.- (9-7-09, R).

1103285.- (4-12-09, R).

1104948.- (5-7-11; muerto, en el comedero del Refugio). No sabemos si es de las hoces del Riaza.

1106608.- (15-6-09, R). No sabemos si es de las hoces del Riaza.

1106908.- (15-6-09, R; inmaduro de 3-4 años). (Se lee al revés). No sabemos si es de las hoces del Riaza.

Buitre adulto, procedente seguramente de Francia, con las siguientes anillas.-
En la pata derecha: Blanco – Verde – Naranja.
En la pata izquierda: Metálica – Negra.
(27-2-09, R).

Buitre procedente seguramente de Francia, que puede ser el anterior, con las siguientes anillas.-
En la pata derecha (de arriba abajo): Blanco – Verde – Rojo.
En la pata izquierda (de arriba abajo): Negra – Metálica.
(22-8-09, R).

Buitre leonado con la cabeza roja de sangre, durante un festín en el comedero del Refugio de Montejo. (Fotografía: Elías Gomis Martín. 16 de noviembre de 2010.)
(Véase también la página 249.)

Marca alar verde, con dos letras.- 20-5-2014 (R).

Banda alar C1.- 5-3-2017 (Valugar m. d.).

Marca alar JW.- 5-7-2014 (R).

Banda negra con cuadrado blanco, en el ala derecha.- 1-8-2015 (buitrera del yacimiento de Montejo de Tiermes).

Coordenadas UTM (30T) del comedero de buitres del Refugio de Rapaces de Montejo (Segovia).-
X **450.826,35** Y **4.599.382,71**

Coordenadas UTM (30T) del comedero de buitres de Campo de San Pedro (Segovia).-
X **456.537,64** Y **4.585.234,37**

(Coordenadas amablemente proporcionadas por Álvar Seguí Romá).

Obsérvese que hay bastantes registros de buitres libres de veinte años de edad, y algunos de más edad. A partir de ese tiempo (y muchas veces antes) las anillas amarillas suelen ser ya ilegibles, si es que no se han perdido. En cautividad se han comprobado longevidades mucho mayores.

Recordaremos las anotaciones de buitres de 20 años o más.-

<u>22 años al menos (2 casos).-</u>
F96.- Nacido en 1990.
118 (PCP).- Nacido en 1996, perdió la anilla amarilla y se le puso una nueva, PCP, en 2013. Por eso ha habido registros posteriores.

<u>21 años al menos (4+2=6 casos).-</u>
H10.- Nacido en 1990.
H23.- Nacido en 1990.
01R.- Nacido en 1991.

01V.- Nacido en 1991.

<u>20 años al menos (10+4+2=16 casos).-</u>
F40.- Nacido en 1990.
F46.- Nacido en 1990.
H09.- Nacido en 1990.
H22.- Nacido en 1990.
010.- Nacido en 1991.
01J.- Nacido en 1991.
085.- Nacido en 1992.
0VH.- Nacido en 1995.
113.- Nacido en 1996.
1WH (PCM).- Nacido en 1998, perdió la anilla amarilla y se le puso una nueva, PCM, en 2013. Por eso ha habido registros posteriores.

(Los anilladores, para cada año, son los antes indicados).



Buitres leonados sobre el comedero del Refugio de Montejo. (Fotografías: Jesús Cobo Anula, biólogo conservador del Refugio, de WWF España, el 31 de julio de 2018.)

ANEXO IV

Algunos datos sobre nuevas observaciones de aves acuáticas.

A) **En el embalse de Linares.** Año 2018 (a partir del 15 de marzo).-

Fecha	21-3	26-3	27-3	30-3	2-4	16-4	17-4
Somormujo lavanco				2			
Cormorán grande	6		10 ap.	2		2	
Garza real	3 (mín. 2 nidos ocupados y 2-3 en construcción)		6 (2 en un nido) (al menos 5 nidos ocupados)	Ap. como el 27-3		5 (mín.) (en al menos 5 nidos ocupados, de al menos 10 nidos).	3 (en 3 nidos ocupados, una en cada nido)
Cigüeña blanca	1		1 (vol.)				
Cisne vulgar	1				1		
Cerceta común	25	4 (2 m. y 2 h.)					
Ánade azulón o real	46 ap.	++	++	30 ap.		1 m.	1 (oído)
Pato cuchara o cuchara europeo	15		2 (1 m. y 1 h.)				
Gallineta común o polla de agua			2				
Andarríos grande	1		1				
Observador	J. L. López-Pozuelo	X. Parra	X. Parra	X. Parra	X. Parra	F. J. Fernández	F. J. Fernández

Fecha	21-4	22-4	25-4	30-4	5-5	17-5	19-5
Somormujo lavanco	1						
Cormorán grande	1						
Garza real	1	1	1	Al menos 2, y al menos 4 nidos	1 oída		1
Cigüeña blanca	1 ad. en el nido de Maderuelo	1 ad. en el nido de Maderuelo, y 4 (2 ad. y 2 pollos) en el nido de Alconadilla					2 ad. en el nido de Maderuelo, y 4 (1 ad. y 3 pollos) en el nido de Alconadilla

Cisne vulgar						1	
Ánade azulón o real	Mín. 3-6 (2-5 m. y 1 h.)	4 (3 m. y 1 h.)	6 m.	2 m.			
[Aguilucho lagunero]			1 macho del 2º año				
Gallineta común o polla de agua		1 oída					
Andarríos grande			3				
Andarríos chico	Mín. 1-2, casi seguro 2	1	4-5				
Observador	F. J. Fernández	F. J. Fernández	J. L. López-Pozuelo	F. J. Fernández	F. J. Fernández	F. Cebas, F. Camarero y F. J. Rojo	F. J. Fernández

Fecha	21-5	22-5	23-5	29-5	4-6	5-6	10-6
Somormujo lavanco	1	1	2	1		1	
Cormorán grande							5
Garza real			1	1	1 (mín.)		
Cigüeña blanca					3 (2 en el nido de Maderuelo)	1 ad. en el nido de Maderuelo	
Cisne vulgar			1				
Ánade azulón o real	2 (1, ad.)	1	7 m.	2, 1 m. y 1 h.		1 h.	
Andarríos chico			2				
Observador	F. J. Fernández	F. J. Fernández	J. L. López-Pozuelo	F. J. Fernández	F. J. Fernández	F. J. Fernández	F. J. Fernández

Fecha	11-6	13-6	1-7	3-7	16-7	23-7	2-8
Somormujo lavanco	2 (posible nido)	3 (1+2)			1		
Cormorán grande	5			2	1	4 (mín.)	
Garza real	28-30 (2-4 ad. y 26 pollos)		1	9 (2 ad. y 7 pollos)	1 (mín.)	4 (1ad. y 3 pollos) (mín.)	1 oída
Cigüeña blanca			3 pollos en el nido de Alconadilla		1 ad. en el nido de Maderuelo		1 (en la cola del embalse)
Cisne vulgar		1		1			
Ánade azulón o real	1 oído	20-21 (1 m., 3 h., y 16-17	6 m.		6-8 (mín.)		

		pollos)					
Andarríos chico						¿1?	
Observador	F. J. Fernández	J. L. López-Pozuelo	F. J. Fernández	F. J. Fernández	F. J. Fernández	F. J. Fernández	F. J. Fernández

Fecha	3-8	4-8	4-8	9-8	10-8	13-8	14-8
Somormujo lavanco				**10**			
Cormorán grande	2			11-12			
Garza real	1 ad.	5	1-2	**21** ap.		1	
Garza imperial				1-2 jóvenes			1 joven
Cigüeña negra		2 ad.					
Cigüeña blanca		8		**15**			
Cisne vulgar				1			
Ánade azulón o real	3 h.	6			2 h. (mín.)	3	
Avefría				8			
Andarríos grande		5		1			
Andarríos chico		4		2	2		
Observador	F. J. Fernández	J. L. Galindo	F. J. Fernández	X. Parra	X. Parra	F. J. Fernández	X. Parra

Fecha	14-8	18-8	18-8	19-8	8-9	9-9
Zampullín chico					1	
Somormujo lavanco					**10**	
Cormorán grande					**17**	
Garceta común					5	
Garza real	3	1				
Garza imperial					1	1
Cisne vulgar					3 (1, h.)	
Cerceta común					9 o más (2 m.)	
Ánade azulón o real				5 (mín.)		
Pato cuchara				1		
[Aguilucho lagunero]						1
Rascón					2	2-3 (1, joven)
Gallineta común o					2-3 (1, joven)	1

polla de agua						
Avefría					3	
Agachadiza común				1		
Archibebe claro						1
Andarríos grande		2	2		1	
Andarríos chico		3				1
Gaviota reidora					6	
Gaviota sombría					1	
Observador	F. J. Fernández	F. J. Fernández	X. Parra	X. Parra	X. Parra	X. Parra y M. Gutiérrez

Fecha	12-9	16-9	17-9	10-10	11-10	10-11
Zampullín chico						1
Somormujo lavanco	**16** ad.			**33**		**10-13**
Cormorán grande	1		9 (mín.)	**17**	**25** ap.	Más de 10
Garceta común	**10**					
Garceta grande				1		4 (mín.)
Garza real	6	3	3	7	10 ap.	5-7
Cigüeña blanca						1
Cisne vulgar	1	1	1	1	1 ad.	1
Ánade silbón				1 m.		
Ánade friso						3
Cerceta común	9					3 (mín.)
Ánade azulón o real	74	Más de 30	22 (mín.)	141-193, prob. 193	200 ap.	100
Ánade rabudo					1	
Pato cuchara	3 m.				2	5 (mín.)
[Aguilucho lagunero]	1, prob. joven					
[Águila pescadora]		1 cerca	1 cerca			
Focha común				**4**		
Andarríos grande	1					
Andarríos chico				1		1
Gaviota reidora	1 ad. en plumaje			1, mudando		

	invernal			de juvenil a adulta		
Martín pescador			1	1		1
Observador	J. L. López-Pozuelo	F. J. Fernández	F. J. Fernández	J. L. López-Pozuelo	J. Liarte y M. Liarte	X. Parra y M. Gutiérrez

Fecha	10-11	10-11	10-11	10-11	11-11	11-11	11-11
Zampullín chico						4	
Somormujo lavanco	7-8	7	1	2		2	
Cormorán grande	27-29 (mín.)	27	2	9-15 (mín.)	2-4 (mín.)	12	1 (mín.)
Garceta grande	6	2		2			
Garza real	9 (mín.)	**12**	9	4-5	1	**15**	
Cigüeña blanca		1	1			1-2 (1 en el nido de Maderuelo)	1 (en el nido de Maderuelo)
Cisne vulgar	1	1	1			1	1
Ánade friso				1			
Cerceta común	6					6	
Ánade azulón o real	66	217	50	69-79 (mín.) (inc. 64 m. y 5 h.)	3	15	
Pato cuchara			1			5	
Avefría			1				
Observador	J. L. López-Pozuelo	J. Cano y C.Cano	J. L. Galindo, F. Ávila, y M. Benedited	F. J. Fernández	J. L. López-Pozuelo	J. L. Galindo, F. Ávila, M. Benedited, y C. Iglesias	E. Gomis y S. Gomis

Fecha	13-11	15-11	23-12	26-12	28-12
Zampullín chico				1	
Somormujo lavanco	1	4		**38**	
Cormorán grande	3-6 (1, inm.)	8 (1, joven)	1 (inm.)	27-40	6 (mín.)
Garceta grande	2	3-4	5	4	1 (mín.)
Garza real	4	7-14 ap.	2	5	4 (mín.)
Cisne vulgar		1		1 (**y vuela**)	1
Ánade friso		4			
Cerceta común				29	
Ánade	16-20	Ap. 50-61	83 (mín.)	Más de	**80**

azulón o real	(inc. 1 m. y 1 h.)		(inc. 1 m. y 1 h.)	110	(mín.)
Pato cuchara		4			3
[Aguilucho lagunero]				2 (1 m. ad. .y 1 joven del año)	
Avefría				30 ap.	
Gaviota reidora				7	
Observador	F. J. Fernández	J. Liarte y R. Ramos	F. J. Fernández	J. L. López-Pozuelo	J. Liarte y M. Liarte

Comienzo de 2019.-

Fecha	17-1	28-1	23-2	27-2	12-3	14-3	20-3
Somormujo lavanco	**37**	2		**20**			2
Cormorán grande	**138**	**95-98** (mín.)		**23**	1	1	11-17
Garceta grande	1	1					
Garza real	5	1		3			
Cigüeña blanca		2				2 en nido Maderuelo	
Cisne vulgar	1	1	1	1			1
Ánade silbón							1 m.
Cerceta común	**42**	**66**		**36**			**44**
Ánade azulón o real	**374**	**91** (mín.)		**119** (mín.).		16 (inc. 2 m. y 1 h.)	**76**
Ánade rabudo		**6** (2 m. y 4h.)					**60**
Cerceta carretona							**36**
Pato cuchara	12	6-7 (3-4 m. y 3 h.)					2
Rascón							1
Gallineta común o polla de agua	**5**						
Grulla				1			
Agachadiza común	2			1			
Andarríos grande				1			1
Gaviota reidora				7			
Gaviota sombría				4			
Observador	Agentes medioamb.	J. L. López-	Fco. J. Fernández	J. L. López-	F. J. Fernández	F. J. Fernández	J. L. López-

	(Parque Natural, Junta de Castilla y León)	Pozuelo	y S. Fernández	Pozuelo			Pozuelo

B) <u>En las charcas de Navajo Grande o cerca.</u> <u>Año 2018.-</u>

Fecha	30-3-18	13-8-18	14-8-18	10-9-18	17-9-18
Zampullín chico			1-2	1	
[Aguilucho lagunero]		3 (alguno, hembra)	1 hembra		1 joven
Garza real		1			
Combatiente	6				
Observador	X. Parra	F. J. Fernández	X. Parra	X. Parra	F. J. Fernández

C) <u>En la charca de Cascajares.</u> <u>Año 2018.-</u>

Fecha	31-3-18	19-6-18	18-8-18	13-11-18
Zampullín chico	1	1		
Cigüeña blanca		2		
Gallineta común o polla de agua			1 joven del año	
Focha común		1		
Observador	J. L. Galindo	F. J. Fernández	X. Parra	F. J. Fernández

El <u>13 de noviembre de 2018</u>, nueve gansos domésticos, junto a Cascajares. (Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

D) <u>En la charca cerca del camino de Valvieja.</u> <u>Año 2018.-</u>

Fecha	18-6-2018
Gallineta común o polla de agua	2 adultos
Observador	F. J. Fernández

E) <u>En la charca de Corral de Ayllón.</u> <u>Año 2018.-</u>

Fecha	15-6-2018	18-6-2018	17-9-2018
Zampullín chico			1
Ánade azulón o real			2
[Aguilucho lagunero]			1 hembra adulta
Observador	F. J. Fernández	F. J. Fernández	F. J. Fernández

F) En la charca de Castillejo de Mesleón. Año 2018.-

Fecha	18-8-2018
Zampullín chico	1 pollo
Ánade azulón o real	Al menos 2 hembras
Focha común	Al menos un adulto y dos jóvenes
Observador	F. J. Fernández

G) En la charca junto al comedero de Caleruega (Burgos). Año 2018.-

Fecha	3-8-2018
Cigüeña blanca	2 (1 vol., 1 cerca)
Andarríos grande	1
Observador	F. J. Fernández

H) En la balsa de Arauzo de Salce (Burgos). Año 2018.-

--- El 3 de agosto, un somormujo lavanco, y tres ánades azulones (dos hembras, y un macho en eclipse). **(**Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

(Otros datos relativos a distintos humedales del sur de Burgos pueden verse en los Informes del Anuario Ornitológico de Burgos, publicados en www.avesdeburgos.com; y también, en el Informe final del censo de otoño de 2018, págs. 46-47.)

I) En el río Duero, en la zona del puente de Navapalos. Año 2018.-

--- A primeros de septiembre, un águila pescadora. (Ángel Bocos García).

Observadores.-

Á. Bocos.- Ángel Bocos García.
C. Cano.- Carlos Cano Barbacil.
C. Iglesias.- Candelas Iglesias Aparicio.
E. Gomis.- Elías Gomis Martín.
F. Ávila.- Fernando Ávila Vico.
F. Camarero.- Francisco Camarero Rodríguez.
F. Cebas.- Francisco Cebas Miguel.
Fco. J. Fernández.- Francisco Jesús Fernández Herrera.
F. J. Fernández.- Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.
F. J. Rojo.- Francisco Javier Rojo Fernández.
J. Cano.- Javier Cano Sánchez.
JJ. Liarte.- José Liarte de Blas.
J. L. Galindo.- Juan Luis Galindo Estévez.
J. L. López-Pozuelo.- José Luis López-Pozuelo García.
M. Benedited.- Mario Benedited Guerrero.
M. Gutiérrez.- Montserrat Gutiérrez Fernández.
M. Gutiérrez.- Montserrat Gutiérrez Fernández.
M. Liarte.- Mario Liarte Lozano.
R. Ramos.- Ricardo Ramos Sánchez.
S. Fernández.- Sara Fernández Herrera.
S. Gomis.- Silvia Gomis Tellés.
X. Parra.- Xavier Parra Cuenca.

ANEXO V

Nuevas publicaciones, conferencias, congresos, informes y películas.

(Corresponde al apartado A del capítulo sobre el buitre leonado).
(Véase también las **Hojas Informativas Nº 32** [Anexo V, págs. 320-343], **Nº 33** [Anexo IV, págs. 427-451], **Nº 34** [Anexo IV, págs. 406-448], **Nº 35** [Anexo III, págs. 470-490], **Nº 37** [Anexo I, págs. 327-353], **Nº 38** [Anexo V, págs. 398-427], **Nº 40** [Anexo IV, págs. 457-484], **Nº 42** [Anexo IV, págs. 186-207], **Nº 44** [Anexo IV, págs. 169-194], **Nº 46** [Anexo IV, págs. 165-185], y **Nº 48** [Anexo IV, págs. 173-195]).

Durante los últimos meses, hemos recibido bastantes nuevas publicaciones relacionadas con el buitre leonado (o con otras especies de fauna o flora) en las hoces del Riaza (o en sus inmediaciones). Entre ellas, las dos nuevas Hojas Informativas:

--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2019). **Hoja Informativa sobre el Refugio de Rapaces de Montejo**, **Nº 50**. Editada por el autor. Madrid. 492 págs.
(Con fotografías obtenidas por 29 personas: Marina Arévalo de la Plaza, Martín Francisco Arévalo Sánchez, Fernando Ávila Vico, Jesús Cobo Anula, Sara Fernández Aguirre, Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Francisco Jesús Fernández Herrera, Luisa Fragua Domínguez, Adolfo Frías Fernández, Cándido de la Fuente de la Osada, Juan José Fuentenebro Martín, Juan Luis Galindo Estévez, Pilar García San José, Elías Gomis Martín, Raúl González Rodríguez, Jesús Hernando Iglesias, Candelas Iglesias Aparicio, Mario Liarte Lozano, Juan Francisco Martín Calleja, Xavier Martín Vilar, Pascual Mate Alonso, Juan José Molina Pérez, Xavier Parra Cuenca, Jorge Andrés Remacha Lorenzo, Juan Carlos Rincón García, José Luis Romero Carayol, Santiago Sanz Rincón, Luis Sitges Aparicio, y Juan Miguel Velasco de Miguel..)

--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2019). **Hoja Informativa sobre el Refugio de Rapaces de Montejo, Nº 51**. Editada por el autor. Madrid. 496 págs.
(Con fotografías obtenidas por 32 personas: Martín Francisco Arévalo Sánchez, Gema Cáceres Miguel, Jesús Cobo Anula, Yolanda de la Cruz Rubio, Carlos Cuéllar Basterrechea, Sara Fernández Aguirre, Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Francisco Jesús Fernández Herrera, Luisa Fragua Domínguez, José Luis de la Fuente Mayoral, Ana Belén Fuentenebro Rubio, Juan Luis Galindo Estévez, Pilar García San José, Elías Gomis Martín, Raúl González Rodríguez, GREFA, José Antonio Hernando García, Jesús Hernando Iglesias, Candelas Iglesias Aparicio, Alfonso Lario Doylataguerra, Mario Liarte Lozano, Manuel López Lázaro, Juan Francisco Martín Calleja, Xavier Martín Vilar, Juan José Molina Pérez, Xavier Parra Cuenca, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez, Inmaculada San José Negro, Luis Sitges Aparicio, Lourdes Tiemblo Blázquez, Juan Miguel Velasco de Miguel, y Antonio Velasco Pineda.)

[Entre las Hojas Informativas Nº 50 y Nº 51 aparecen fotos de 42 autores distintos.]

Por otra parte, hasta el momento se han presentado comunicaciones o datos relacionados con el Refugio de Montejo en 54 **congresos** (18 de ellos internacionales).

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Sobre las nuevas actividades de **WWF España** en el Refugio, pueden verse datos en las revistas "*Panda*" y "*Pandilla*", y en los Informes sobre el Refugio elaborados por esta asociación.

Durante el último año ha habido nuevas **conferencias o charlas** relacionadas con el Refugio, además de las ponencias en congresos o en cursos antes citadas; con lo que el total asciende a **333**, que sepamos. Señalaremos, para 2018 y comienzo de 2019,, las siguientes:

327) Jueves 8 de febrero de 2018, 19 h. 0 m. Palacio de los Marqueses de la Algaba, en Sevilla. Conferencia de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, titulada "**43 años censando y defendiendo el Refugio de los buitres**". Organizada por los grupos de WWF en Sevilla y en Doñana.

328) Lunes 21 de mayo de 2018. Colegios de Ayllón y de Campo de San Pedro, ambos en Segovia. Conferencias de Candelas Iglesias Aparicio, sobre aguiluchos. Pueden verse fotos en la Circular Nº 21 del Fondo (pág. 31).

329) Jueves 1 de junio de 2018. 20 h. 0 m. Centro Cultural San José, en Segovia. Conferencia de Juan José Molina Pérez, titulada "**Historia humana del Refugio de Rapaces de Montejo**". Con motivo de la exposición sobre el 40 (44) aniversario del Refugio de Rapaces de Montejo.

330) Miércoles 13 de junio de 2018. 20 h. 0 m. Centro Cultural San José, en Segovia. Conferencia de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, titulada "**44 años censando y defendiendo el Refugio de los buitres**". Con motivo de la exposición sobre el 40 (44) aniversario del de Rapaces de Montejo.

331) Sábado 1 y domingo 2 de septiembre de 2018. Fiduero (Aranda de Duero, Burgos). Conferencias de Candelas Iglesias Aparicio, sobre ecoturismo y medio ambiente (la primera, "**Información sobre los packs de ecoturismo**"; y la segunda, "**Importancia del medio ambiente en la salud de los ecosistemas y en nuestra salud física, psíquica y emocional**". En estas charlas también destacó la importante función de los buitres, y el valor que tiene el Refugio de Rapaces de Montejo para tres especies (leonado, blanco o alimoche, y negro). Pueden verse fotos en la Circular Nº 21 del Fondo (pág. 31).

332) Sábado 15 de septiembre de 2018. Ayuntamiento de Sepúlveda (Segovia). Conferencia de Candelas Iglesias Aparicio, sobre aguiluchos. Reseñada en la Circular Nº 21 del Fondo (pág. 30).

333) Jueves 7 de febrero de 2019. Sede de ADENEX en Mérida (Badajoz). Conferencia de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, titulada "**44 años censando y defendiendo el Refugio de Rapaces de Montejo**". Casi toda fue grabada en vídeo, por ADENEX, y puede verse en la web de ADENEX.

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Ha habido también bastantes nuevas **reuniones** relacionadas con el Refugio; en Montejo de la Vega (como la nueva *reunión anual informativa* con los vecinos de Montejo, organizada por WWF España el 18 de diciembre de 2018 [la anterior tuvo lugar el 19-12-2017]; o la Asamblea General del Fondo para el Refugio, el 11-11-2018); en Villaverde de Montejo (incluyendo la relativa al último censo de otoño, con 125 ornitólogos y un total de al menos unos 150 asistentes al homenaje a Jesús Hernando, el 10-11-2018), etc.; además de las charlas o los cursos antes mencionados.

[Por otra parte, la Junta Rectora (ahora Patronato) del Parque Natural ha celebrado hasta ahora diecisiete reuniones: en Maderuelo el 18-10-05, en Valdevacas el 1-2-06, en Montejo el 20-6-06, en Maderuelo el 21-2-07, en Valdevacas el 16-8-07, en Montejo el 20-2-08, en Maderuelo el 26-2-2009, en Valdevacas el 9-9-2009, en Montejo el 16-2-2010, en Maderuelo el 14-10-2010, en Valdevacas el 22-2-11, en Montejo el 18-2-14, en Maderuelo el 31-3-2015, en Valdevacas el 10-3-2016, en Montejo el 30-3-2017, en Maderuelo el el 9-3-2018, y en Valdevacas el 13-3-2018. Otras reuniones relacionadas con el Parque, así como distintas actuaciones relativas al mismo o realizadas en la Casa del Parque, figuran en las Memorias anuales correspondientes, de la Junta de Castilla y León, y también de WWF.]

Pueden mencionarse, también, nuevas **excursiones** realizadas al Refugio. Entre ellas, las excursiones del 16 de mayo de 2018 (de la Universidad Autónoma de Madrid), las rutas organizadas por Abubilla en 2018 (el 19 de agosto de 2018, entre otras), la excursión del 17 de noviembre de 2018 (del grupo de Madrid de WWF España), y bastantes más.

Por otra parte, durante los últimos años se han seguido obteniendo **filmaciones y/o fotografías** en el Refugio y su entorno.

Puede añadirse que durante el último año, después de la aparición de las Hojas Informativas 48 y 49, han aparecido o están previstas, en diferentes publicaciones o informes, fotografías de buitres obtenidas

en el Refugio de Montejo (o sus inmediaciones), al menos por las siguientes personas o entidades (por orden alfabético): José Luis Armendáriz Sanz, Dr. Juan José Bacallado Aránega, Juan José Carmona Moreno, Jesús Cobo Anula, Óscar Costa, Yolanda de la Cruz Rubio, Elías Gomis Martín, Raúl González Rodríguez, Jesús Hernando Iglesias, Juan José Molina Pérez, Juan Carlos Rincón García, Andrés Romero Bravo, y Luis Sitges Aparicio.

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Nota.- Ya son al menos 25 los **premios** concedidos a fotos, filmaciones, estudios o trabajos realizados en el Refugio de Rapaces de Montejo, o al propio Refugio.

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

El Refugio ha aparecido, también, al menos en 29 nuevos **programas** de televisión o de radio (7 y 22, resp.); con lo que los totales respectivos ascienden ya a 266 y 782, respectivamente.

Entre los nuevos programas de **televisión** de los que hemos tenido noticias, destacaremos, por orden cronológico:

2018 (a partir de abril), y comienzo de 2019.-
--- Un reportaje sobre el XIV censo de nutrias de WWF España en el Refugio, emitido en "La Otra" el martes 24 de abril de 2018, a las 18 h. 30 m. ap. Había sido emitido anteriormente, en la misma cadena, el lunes 10 de agosto de 2015 (véase la **Hoja Informativa Nº 44**, pág. 174); y antes, en "Telemadrid", en el programa "*Instinto animal*", el sábado 10 de octubre de 2009 (véase la **Hoja Informativa Nº 34**, pág. 416), y el jueves 13 de febrero de 2014 ap. (véase la **Hoja Informativa Nº 40**, pág. 462). Fue filmado el 26/27 de junio de 2009.
--- Un reportaje sobre la inauguración de la exposición del Refugio en Segovia, realizado por Natalia Fernández y Paqui Cuerdo y otros, con una entrevista a Juan José Molina Pérez (comisario de la exposición y Vicepresidente del Fondo para el Refugio), en el que también se habla del censo de otoño, emitido en el Informativo para Segovia de "*La 8*", el martes 15 de mayo de 2018. Dura 2 minutos ap.
--- El jueves 9 de agosto de 2018, en el "*Canal 24 horas*" de Televisión Española (TVE), se emitió de nuevo el programa de Crónicas sobre "**El Refugio**", emitido anteriormente en "La 2" el jueves 24 de septiembre de 2015 (a las 23 h. 55 m.), y poco después también en el Canal Internacional de Televisión Española (véase la **Hoja Informativa Nº 44**, pág. 174); y más adelante, el lunes 31 de julio de 2017, en la segunda cadena de Televisión Española ("La 2", a las 23 h. 25 m.), y en el "*Canal 24 horas*" (a las 22 h. 10 m.) (véase la **Hoja Informativa Nº 48**, pág. 175).
--- Un reportaje sobre las hoces del Riaza ("**El lugar de recreo para los naturalistas**"), presentado por Luis Miguel Domínguez Mencía, emitido en la primera cadena de Televisión Española (TVE-1), en el programa "*Aquí la Tierra*", el martes 21 de agosto de 2018, a las 20 h. 30 m. ap.
--- Un reportaje sobre las hoces del Duratón, en el que se incluyen imágenes y datos de las hoces del Riaza, y aparecen hablando Jesús Hernando Iglesias y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, realizado por Charles Diwo y Maxime Rousseau, filmado (por lo que respecta a las hoces del Riaza) el domingo 16 de septiembre de 2018, y emitido en el "Telediario" de TF1 (Francia) el martes 18 de septiembre de 2018, a las 20 h., presentado por Gilles Bouleau.
--- Un reportaje sobre el Parque Natural y la Casa del Parque, grabado el 9 de noviembre de 2018, por la Televisión de Castilla y León, para el programa "*Segovia de pueblo en pueblo*".
--- Escenas con un festín de buitres leonados en el comedero de buitres del Refugio de Montejo, en el documental "**El despertar de la primavera / La primavera en Europa**", emitido en la segunda cadena de Televisión Española (La 2), el domingo 17 de febrero de 2019, a las 18 h. ap.
--- Un reportaje con personas y escenas y paisajes de Montejo de la Vega y cerca, y con buitres, en el programa "**Me vuelvo al pueblo**", emitido en el Canal 7 de la Televisión de Castilla y León, el martes 12 de marzo de 2019.

Las emisoras de televisión citadas en la relación anterior son nacionales ("*TVE-1*", "*La 2*", el "*Canal 24 horas*", y "*La Otra*"), autonómicas (Televisión Española en Castilla y León, y Canal 7 de Castilla y León), provinciales ("*La 8*" en Segovia), y de otros países ("*TF1*" de Francia).

Entre los nuevos programas de **radio** de los que hemos tenido referencias, destacaremos también algunos, por orden cronológico:

Año 2018, y comienzo de 2019.-
--- Intervenciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, para el programa "*Respuestas de la ciencia*", de Radio 5, con la UNED.
En mayo de 2018.- *¿Cuántos pollos puede haber en un nido de cuervo?*
En julio de 2018.- *¿Cómo fue descubierto el pavo del Congo?*
En septiembre de 2018.- *¿Cuál es el ave que más nombres recibe en España?*
--- Tres intervenciones más de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, con preguntas formuladas por Miguel Minaya, grabadas el 30 de octubre de 2018, para el programa "*Respuestas de la ciencia*", de Radio 5, con la UNED. *("¿Cuáles son las aves rapaces más grandes?", "¿Qué es el Día de los Buitres?", "¿Es cierto que un búho real puede matar a un tejón?*").
(Véase la Circular Informativa Nº 22 del Fondo para el Refugio, pág. 78).
La primera apareció en diciembre de 2018. La segunda, en enero de 2019. La tercera, en abril de 2019.
--- Una entrevista a Laura Moreno Ruiz, emitida en "*Radio Segovia*" ("*Cadena SER*"), el sábado 13 de enero de 2018, aniversario de la inauguración del Refugio.
--- Entrevista al personal de la Casa del Parque Natural, el 25 de enero de 2018, por Radio Aranda (Cadena SER), para el programa "*Hoy por hoy Aranda*".
--- Una entrevista de Álvaro Guerrero Moreno a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en directo en "*Onda El Espinar*" ("*Onda Cero*") de Segovia, en el programa "*El mirador de los buitres*", el miércoles 13 de junio de 2018, a las 12 h. 30 m. ap.
--- Una entrevista de Cristina Sancho Gómez a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en "*Radio Sepúlveda*" y en "*Radio Cuéllar*" ("*Cadena SER*") (90.6 y 94.1), en el programa "*Hoy por hoy nuestra tierra*", el miércoles 13 de junio de 2018, hacia las 12 h. 30 m. ap.
--- Una entrevista de Vicente Herrero Carretes a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, sobre el censo de la cigüeña blanca, emitida en "*Radio Aranda*" (Cadena SER), de Aranda de Duero (Burgos), en los *Informativos*, el martes 10 de julio de 2018, a las 12 h. 20 m. y a las 14 h. 40 m.
--- Una entrevista de Carmen Martín Robledo a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, sobre el censo de la cigüeña blanca y otros temas relacionados con el Refugio, emitida en directo en "*Onda Cero*" de Segovia, en el programa "*Segovia en la onda*", el jueves 12 de julio de 2017, a las 13 h. 30 m. ap.
--- Una entrevista de Diego García Samaniego a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, sobre el censo de la cigüeña blanca, emitida en la "*Cadena COPE*" de Aranda de Duero (Burgos), en los *Informativos*, el jueves 12 de julio de 2017, a las 14 h. 20 m. ap.
--- Una noticia sobre la inauguración de la exposición sobre el Refugio en el Ayuntamiento de Montejo, emitida en "*Onda Cero*" de Segovia, el martes 21 de agosto de 2018.
--- Una entrevista de Álvaro Gómez Casado a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, sobre la exposición en Montejo y otros temas relacionados con el Refugio, emitida en directo en "*Onda Cero*" de Segovia, en el programa "*Segovia en la onda*", el miércoles 22 de agosto de 2018, a las 13 h. 15 m. ap.
--- Una noticia sobre la inauguración de la exposición sobre el Refugio en el Ayuntamiento de Montejo, emitida en "*Radio Aranda*" (Cadena SER) de Aranda de Duero (Burgos), el miércoles 22 de agosto de 2018.
--- Una entrevista a Juan José Molina Pérez, sobre la exposición en el Ayuntamiento de Montejo, emitida en la "*Cadena COPE*" de Aranda de Duero (Burgos), en el programa "*La mañana de la COPE en Aranda*", el jueves 23 de agosto de 2018, a las 13 h. 30 m. ap.
--- Una entrevista de Javier Pérez Andrés a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en "*Es Radio*" de Castilla y León, en el programa "*El picaporte*", el sábado 3 de noviembre de 2018, a las 12 h. 10 m. ap.
--- Una noticia sobre el censo de otoño, emitida en la "*Cadena COPE*" de Aranda de Duero (Burgos), en los Informativos, ap. el 6 de noviembre de 2018.
--- Una noticia sobre el censo de otoño, emitida en "*Radio Nacional de España*" en Segovia, en los Informativos, el viernes 9 de noviembre de 2018.
--- Una entrevista de María Yagüe Solís a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en "*Radio Segovia*" ("*Cadena SER*"), en el programa "*A vivir Segovia*", el sábado 10 de noviembre de 2018, a las 12 h. 50 m. ap.
--- Una entrevista de Cristina Sancho Gómez a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en "*Radio Sepúlveda*" y en "*Radio Cuéllar*" ("*Cadena SER*") (90.6 y 94.1), en el programa "*Hoy por hoy nuestra tierra*", el miérecoles 21de noviembre de 2018, a las 12 h. 30 m. ap.

--- Una intervención de Miguel del Pino Luego, en el programa "*Jungla de asfalto*" de Es Radio de Madrid, emitido el domingo 25 de noviembre de 2018.
--- Una entrevista de María Martín Sánchez a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en "*Radio Nacional de España*" en Segovia, en los Informativos, el miércoles 28 de noviembre de 2018, a las 9 h. 15 m. ap.; y en "*Radio Nacional de España*" en Castilla y León, en los Informativos, el domingo 2 de diciembre de 2018.
--- Una entrevista de Vicente Herrero Carretes a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, emitida en "*Radio Aranda*" (Cadena SER), de Aranda de Duero (Burgos), en *Hoy por hoy Aranda*, el jueves 29 de noviembre de 2018.
--- Una intervención de Damián Arguch Sánchez, emitida en "*Radio Almenara*" de Madrid, en el programa "*Buenos días, Tetuán*", el miércoles 16 de enero de 2019.
--- Una entrevista de Álvaro Gómez Casado a Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, sobre el Informe final del censo de otoño y la Circular Nº 22 del Fondo, emitida en directo en "*Onda Cero*" de Segovia, en el programa "*Segovia en la onda*", el viernes 8 de marzo de 2019.

Las emisoras de radio citadas en la relación anterior son nacionales ("*Radio Nacional de España*-"*Radio 5*"), autonómicas ("*Es Radio*" [Castilla y León], "*Radio Nacional de España*" en Castilla y León), o provinciales o locales; estas últimas corresponden a Segovia ("*Onda Cero*", "*Onda El Espinar*" ["*Onda Cero*"], "*Radio Cuéllar*" [SER], "*Radio Nacional de España*" en Segovia, "*Radio Segovia*" [SER], y "*Radio Sepúlveda*" [SER]), Burgos ("*Cadena COPE*" de Aranda de Duero, y "*Radio Aranda*" [SER] de Aranda de Duero), y Madrid ("*Radio Almenara*").

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

Además, durante los últimos meses he recibido 68 (12+56) nuevos **trabajos o informes** inéditos sobre el Refugio, con lo que el total asciende a 1.456 (250+1.206) (sin contar los relativos a los censos, que son muchos más). También se han obtenido allí miles de **fotografías**, etc. En este sentido, desde la aparición de la **Hoja Informativa Nº 49** destacan especialmente los magníficos trabajos (o informes, o fotos, o filmaciones, o datos) realizados u obtenidos y amablemente proporcionados por Jesús Abad Soria, León Adrados Rincón, José Aguilera Díez, José Félix Aladrén Rubio, Nuria Álvarez-Acebedo Salan, Eduardo Álvarez Cebrián, Manuel de Andrés Moreno, Marina Arévalo de la Plaza, Martín Francisco Arévalo Sánchez, José Luis Armendáriz Sanz, Yolanda Arrabal Agüera, Rubén Arrabal Espeja, Fernando Ávila Vico, Javier Balset Izquierdo, Pedro José Bartolomé Sanz, Manuel Pablo Box Sánchez, José Manuel Boy Carmona, Miguel Briones Díez, Pablo Briones González, Gema Cáceres Miguel, Cristian Calvo Vergara, Yolanda Calleja Corento, Javier Cano Sánchez, Juan Antonio de Cara García, Juan Luis Carranza Briones, Pedro Luis Castilla Apolonio, Bruno Chacón Espinosa, María José Chicharro Lafuente, Jesús Cobo Anula, Yolanda de la Cruz Rubio, Carlos Cuéllar Basterrechea, Dr. José Antonio Dávila García, Rosa Díez de Artazcoz Abellán, Martí Alexandre Dot Ventalló, Sara Fernández Aguirre, Francisco Jesús Fernández Herrera, Antonio Fernández Ortiz, Luisa Fragua Domínguez, Paloma Fraguío Piñas, José Luis de la Fuente Mayoral, Juan José Fuentenebro Martín, Ana Belén Fuentenebro Rubio, Juan Luis Galindo Estévez, Susana García Andrés, Pilar García San José, Elías Gomis Martín, Raúl González Rodríguez, Fernanda González Zubieta, Marta Gatti, GREFA (Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat), Montserrat Gutiérrez Fernández, Grupo Pyrrhocorax, Jorge Manuel Hernández Núñez, José Luis Hernández Pérez, José Antonio Hernando García, Jesús Hernando Iglesias (guarda de WWF España en el Refugio), Candelas Iglesias Aparicio, Mauricio Iglesias Sanz, Fernando Jiménez Raigón, Fernando Lafuente Aylagas, Alfonso Lario Doylataguerra, Ángel Leiva Lozano, José Liarte de Blas, Mario Liarte Lozano, Alfredo López Hernangómez, Manuel López Lázaro, José Luis López-Pozuelo García, Juan Francisco Martín Calleja (guarda de la CHD), Miguel Ángel Martín Jiménez, Xavier Martín Vilar, José María Martínez Mediano, Félix Martínez Olivas, Pascual Mate Alonso, Juan José Molina Pérez, Laura Moreno Ruiz, Raúl Navas Sanz, Fernando Nieva Palacios, Carlos Palma Barcenilla, Xavier Parra Cuenca, José Miguel Pascual Arranz, Julio Peña Herrero, Juan Prieto Martín, Ricardo Ramos Sánchez, Fermín Redondo Ramírez, Jorge Andrés Remacha Lorenzo, Andrés Requejo de las Heras, Juan Carlos Rincón García, José Félix Rodríguez Calcerrada, Dr. Pedro Rodríguez Panizo, José Román Rodríguez, José Luis Romero Carayol, Benito Ruiz Calatayud, Antonio Ruiz Heredia, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez, Antonio Sanz Carro, Santiago Sanz Rincón, Luis Sitges Aparicio, Lourdes Tiemblo Blázquez, Pedro Torres Expósito, Juan Miguel Velasco de Miguel, Almudena Vicente López, Javier Vitores Casado, WWF España, etc.; además de los autores de artículos o trabajos citados en otros lugares. Merecen mencionarse también los trabajos relativos a los censos; incluyendo todos los informes correspondientes

al último censo de otoño (organizado por el Fondo para el Refugio de Montejo, en el que participaron 125 ornitólogos, coordinados por Juan José Molina Pérez). Agradecemos, a todos los autores, el habernos proporcionado amablemente copia de sus trabajos, informes, fotografías, o filmaciones, en el Refugio. Destacaremos también la valiosa colaboración de la Asociación Cultural "Monte Irago" (de Astorga, León), Victorina Bernal Bernal, Cándido Calleja Tristán, Yolanda Calleja Corento, Juan Carlos Cano Calleja, María Cano Calleja, Abelardo Mínguez Bernal, etc.

Otras entidades y personas también han trabajado sobre el Refugio en los dos últimos meses, y han producido buen número de escritos al respecto (además de nuevas películas, fotos, etc.), pero su relación sería muy larga.

Ha habido asimismo referencias, observaciones o datos relativos al Refugio de Rapaces de Montejo en informes dedicados en su mayor parte a otras cuestiones.

----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

En otro orden de cosas, después de la aparición de la **Hoja Informativa Nº 49** ha habido al menos 96 nuevas **publicaciones** impresas relacionadas con el Refugio o con las hoces (el total asciende ya a 4.542). Entre las publicaciones de divulgación, destacaremos, por ser un compendio de una amplia información, o por contener gran cantidad de datos sobre novedades recientes, o por tratar algún aspecto o alguna noticia de particular interés, las siguientes:

--- ABC (2018). **Un alimoche, el "centinela" contra el uso del veneno en España. / El ejemplar fue marcado y liberado en el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega en Riaza (Segovia) y permitirá ampliar la información sobre estas prácticas también en esa zona de Castilla y León.** *ABC* (digital), 8-8-2018. (Con una fotografía, de Efe).

--- Aguilera Sanz, J. M. (2018). **Novedades sobre el proyecto "Occipitalis Station".** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 21, octubre de 2018, págs. 32-34. (Con fotografías obtenidas por José Manuel Aguilera Sanz, José Manuel Hiniesto del Río, y Mónica del Río Casa Sola).

--- Aguilera Sanz, J. M. (2019). **Sexta expedición del proyecto "Occipitalis Station".** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, págs. 26-27. (Con fotografías obtenidas por el FAB, por la Junta de Extremadura, y por Mikel Kebuteh Sanno).

--- Alcalde Cuña, J. (2019). **El primer impacto.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, págs. 57-58.

--- Alfonso, M. Á. (2018). **Ojo de lince. Félix Rodríguez de la Fuente hizo cambiar la visión que los españoles tenían de la fauna. / Hoy, cuando se cumple el 90 aniversario de su nacimiento y el 38 de su muerte, los naturalistas analizan el legado de un pionero.** *El Norte de Castilla*, miércoles 14 de marzo de 2018, págs. 61-63. (Con fotografías). (En pág. 63).

--- Andrés Moreno, Manuel de. (2018). **A Jesús Hernando Iglesias.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, pág. 48.

--- Antolín, M. (2018). **Hoces del río Riaza en Segovia. / Un paseo por un paraíso natural.** *Hoces del Río Riaza en Segovia.* ABC (ed. de Castilla y León), pag. 64. (Con tres fotografías).

--- Antón, B. (2018). **La Fundación Alondra Ricotí trabaja por conservar la colonia de la zona de Haza, única en Burgos. / Actualmente residen en este rincón de la Ribera 12 parejas, que son muy difíciles de ver y cuyo canto es espectacular.** *Diario de Burgos*, 2 de diciembre de 2018, pág. 36. (Con fotografías de Alfonso Antón y de Jesús Lázaro).

--- Antón, B. (2018). **Caleruega consigue el premio Fuentes Claras en sostenibilidad. / La Junta reconoce el proyecto de recuperación y puesta en valor del palomar, el muladar y el humedal ubicados en el paraje del antiguo poblado de San Martín de Bañuelos.** *Diario de Burgos*, 23 de noviembre de 2018, pág. 33. (Con una fotografía, obtenida por Belén Antón.)

--- Arguch Sánchez, D. (2018). **De la Amazonia peruana a las hoces del Riaza.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 21, octubre de 2018, pág. 11. (Con una fotografía, del autor).

--- Armendáriz Sanz, J. L. (2019). **¡30 años!** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 23, octubre de 2019, en preparación. (Con dos fotografías, obtenidas por José Luis Armendáriz Sanz y por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, respectivamente).

--- Arribas, F. (2018). **Comienza la campaña de protección del aguilucho cenizo en Segovia.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 207, mayo de 2018, pág. 28. (Con una fotografía).

--- Asociación Sociocultural de Riaguas de San Bartolomé (2018). **Y los árboles volvieron a Riaguas.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 207, mayo de 2018, pág. 18. (Con una fotografía).

--- Asociación Cultural de Riaguas de San Bartolomé (2018). **Riaguas de San Bartolomé, cada vez más verde.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 214, diciembre de 2018, pág. 4. (Con dos fotografías).
--- Atencia Páez, C. (2018). **Uno de septiembre de 2018, día de los buitres. In memoriam de "Montejo".** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 21, octubre de 2018, pág. 18. (Con dos fotografías, obtenidas por la autora).
--- Ávila Vico, F. (2018). **La divulgación ambiental: un legado paleolítico.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 21, octubre de 2018, págs. 16-17. (Con tres fotografías, del autor).
--- A.; y A. (2018). **Actividades en Moral de Hornuez**. *El Nordeste de Segovia*, Nº 212, octubre de 2018, pág. 6.
--- Cáceres Miguel, G. (2018). **El señor alcalde de Maderuelo sigue con sus despropósitos.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 207, mayo de 2018, pág. 5. (Con una fotografía).
--- Cano Barbacil, J.; y Cano Sánchez, J. (2018). **Fenología de los pasos migratorios del papamoscas cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*). Seguimiento a largo plazo en el centro y sur de la Comunidad de Madrid.** *Calendario Meteorológico 2019. Información meteorológica y climatológica de España.* Agencia Estatal de Meteorología. Madrid. Págs. 304-314.
--- Cano Barbacil, J.; y Cano Sánchez, J. (2018). **La duración de los pasos migratorios del papamoscas cerrojillo (*Ficedula hypoleuca*) se reduce en los últimos cuarenta años en el centro y sur de la Comunidad de Madrid.** Págs. 24-39 en: Juan, M.; De la Torre, V.; y Pérez-Granados, C. *Anuario Ornitológico de Madrid 2015-2017.* SEO-Monticola. Madrid.
--- Cano Barbacil, C.; y Cano Sánchez, J. (2019). **Las cámaras de una de las Cuatro Torres de Madrid captan un buitre leonado posado en su azotea.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, págs. 24-25. (Con dos fotografías, de Carolina Álvarez Cano.)
--- Cisneros, B. (2018). **43 años de historia del Refugio de Rapaces recogidos en imágenes. / En Montejo de la Vega acaba de inaugurarse esta exposición.** *Diario de la Ribera*, miércoles 22-8-2018. (Con tres fotografías).
--- Cobo Anula, J. (2018). **29-XI-2018.** Informe inédito. 1 pág.
--- Cobo Anula, J. (2019). **A Jesús Hernando Iglesias.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, pág. 68.
--- Conte Bragado, D. (2018). **El viajero: Juan Martos Quesada. "En Bercimuel he encontrado el gusto a la soledad".** *Viajar por Segovia*, Nº 27, invierno de 2018, págs. 3-4. (Con fotografías obtenidas por Diego Conte Bragado).
--- Contrainformación (2018). **WWF libera un nuevo centinela del veneno en Segovia para luchar contra el envenenamiento de rapaces. / Las muertes por envenenamiento de estos majestuosos animales siguen sin detenerse.** *Contrainformación* (digital), 8 de agosto de 2018. (Con una fotografía).
--- Cuéllar Basterrechea, C. (2018). **Marcaje de alimoche en Montejo.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 21, octubre de 2018, págs. 19-20. (Con fotografías y mapa, de GREFA y WWF).
--- Cuéllar Basterrechea, C. (2018). **Control biológico de plagas de topillos en el nordeste segoviano.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 21, octubre de 2018, págs. 28-29. (Con fotografías obtenidas por GREFA Fototrampeo / Carlos Cuéllar).
--- Del Olmo Castillejos, J. C. (2018). **Felicitación.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 21, octubre de 2018, pág. 9.
--- Del Olmo Castillejos, J. C. (2018). **50 años defendiendo la naturaleza.** *Panda* Nº 141, otoño de 2018, pág. 3. (Con una fotografía).
--- Del Olmo Castillejos, J. C. (2019). **Felicitación.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, pág. 14.
--- De la Puente, J.; Bermejo, A.; Del Moral, J. C.; y Ruiz, A. (2011). **Juvenile dispersión, dependence period, phylopatry and breeding maturity age of the cinereous vulture.** Págs. 270-280 (en pp. 276-278) en Zuberogoitia, Í.; y Martínez, J. E. (eds.). ***Ecology and conservation of european forest-dwelling raptors.*** Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Vizcaya. 408 págs.
--- Diario de Burgos (2018). **La población de cigüeña pervive en la comarca con 135 pollos. / Esta es la segunda mejor cifra de las registradas en los censos de esta especie realizados los últimos 15 años, a pesar de que las condiciones meteorológicas no han sido muy propicias.** *Diario de Burgos*, jueves 12-7-2018, pág. 27. (Con una fotografía, de F.L.).
--- Efe (2018). **100 ornitólogos de España e Italia harán el censo de las hoces de(l) Riaza.** *La Vanguardia* (digital) y *ABC* (digital), jueves 1-11-2018.
--- Efe (2019). **La población de buitres leonados crece en Hoces del Riaza en 150 ejemplares.** *La Vanguardia* (digital), miércoles 21-11-2018.

--- El Adelantado de Segovia (2018). **La Junta incluye el río Riaza en su totalidad como "aguas trucheras".** *El Adelantado de Segovia*, miércoles 4-4-2018, pág. 14.
--- El Adelantado de Segovia (2018). **Las "hojas informativas" del Refugio celebran su 40 aniversario.** *El Adelantado de Segovia*, jueves 5-4-2018, pág. 13. (Con una fotografía, obtenida por Kamarero).
--- El Adelantado de Segovia (2018). **El PSOE presenta varias iniciativas por la inundación de la ermita de la Veracruz.** *El Adelantado de Segovia*, jueves 3-5-2018, págs. (1), 15. (Con una fotografía).
--- El Adelantado de Segovia (2018). **Avifauna del nordeste en Segovia. / El Centro Cultural de San José acoge hasta el próximo 15 de junio una exposición conmemorativa de los más de 40 años del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega.** *El Adelantado de Segovia*, miércoles 16-5-2018, pág. 48. (Con una fotografía).
--- El Adelantado de Segovia (2018). **Exposiciones. Centro Cultural San José.** *El Adelantado de Segovia*, viernes 1-6-2018, pág. 50.
--- El Adelantado de Segovia (2018). **Exposiciones. Centro Cultural San José.** *El Adelantado de Segovia*, sábado 2-6-2018, pág. 42.
--- El Adelantado de Segovia (2018). **Exposiciones. Centro Cultural San José.** *El Adelantado de Segovia*, martes 12-6-2018, pág. 42.
--- El Adelantado de Segovia (2018). **Exposiciones. Centro Cultural San José.** *El Adelantado de Segovia*, miércoles 13-6-2018, pág. 42.
--- El Adelantado de Segovia (2018). **Zancudas en alza. / El último censo de cigüeña blanca de la zona del Refugio de Montejo revela un aumento de los pollos que logran volar.** *El Adelantado de Segovia*, viernes 13-7-2018, pág. 48. (Con una fotografía).
--- El Adelantado de Segovia (2018). **Vigía contra los venenos. / Liberan un alimoche en el Refugio de Rapaces que será el centinela contra el uso de productos letales en la zona.** *El Adelantado de Segovia*, sábado 11-8-2018, pág. 17. (Con una fotografía del alimoche adulto marcado, obtenida por GREFA/WWF en el comedero de buitres del Refugio, el 2-8-2018.)
--- El Adelantado de Segovia (2018). **Montejo de la Vega. / Hoy se inaugura la muestra sobre el Refugio de Rapaces.** *El Adelantado de Segovia*, martes 21-8-2018, pág. 14.
--- El Adelantado de Segovia (2018). **Unos 100 ornitólogos participan en el censo de otoño del Refugio. El año pasado se registraron, al menos, 1.214 buitres leonados en las hoces del Riaza.** *El Adelantado de Segovia*, jueves 1-11-2018, pág. 15. (Con una fotografía).
--- El Adelantado de Segovia (2018). **Montejo de la Vega de la Serrezuela. / Reconocimientos. / El Refugio de Rapaces homenajea a Jesús Hernando por sus 30 años de trabajo. / Familia, amigos y compañeros quisieron reconocer la gran labor de "Susi" y transmitirle ánimos para continuar con la defensa ambiental.** *El Adelantado de Segovia*, sábado 17-11-2018, pág. 14. (Con una fotografía, obtenida por Elías Gomis Martín).
--- El Adelantado de Segovia (2018). **El censo de otoño del Refugio de Rapaces registra 1.364 buitres leonados. / Se trata de la cifra más alta de los últimos años, concentrándose la mayor agrupación de estas aves en la zona de Peña Portillo.** *El Adelantado de Segovia*, lunes 26-11-2018, pág. 18. (Con una fotografía, obtenida por Elías Gomis Martín).
--- El Adelantado de Segovia (2019). **El Refugio de Rapaces de Montejo cumple 44 años.** *El Adelantado de Segovia*, domingo 13-1-2019, pág. 1.
--- El Adelantado de Segovia (2019). **WWF reclama el plan de gestión del Parque de las Hoces del Riaza. El Refugio de Rapaces, que este año celebra su 44 aniversario, fue creado a iniciativa de Félix Rodríguez de la Fuente y WWF lo gestiona y protege desde su creación.** *El Adelantado de Segovia*, martes 15-1-2019. (Con una fotografía, de un censo de otoño).
--- El Adelantado de Segovia (2019). **Alberto Tejedor halla un nido de buitre leonado con dos huevos en Sebúlcor. / Se trata de un hecho considerado excepcional por los expertos.** *El Adelantado de Segovia*, domingo 3-2-2019. (Con una fotografía).
--- El Adelantado de Segovia (2019). **La Junta mejora la reproducción de la trucha común en el río Riaza. / Se ha llevado a cabo la incubación de ejemplares durante la freza de la especie, con un sistema que asegura un 90% de nacimientos frente al 20% en condiciones naturales.** *El Adelantado de Segovia*, martes 5-2-2019. (Con una fotografía).
--- El Adelantado de Segovia (2019). **WWF denuncia que la Junta no aplica las medidas para proteger las Hoces del Riaza.** *El Adelantado de Segovia*, miércoles 13-3-2019, pág. 7.
--- El Adelantado de Segovia (2019). **Valdevacas de Montejo. / La colonia de aves de las Hoces del Riaza se mantiene en buen estado.** *El Adelantado de Segovia*, jueves 14-3-2019, pág. 12. (Con una fotografía).
--- El Cárabo (varios autores) (2018). **El buitre leonado (parte III).** En el apartado "***España, paraíso de los buitres***". *El Cárabo*, nº 84, pág. 41.

--- El Nordeste de Segovia (2018). **Lugares abandonados del nordeste, lugares con memoria.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 207, mayo de 2018, págs. 10-11. (Con fotografías).
--- El Nordeste de Segovia (2018). **Encuentro por la Serrezuela. El pasado 27 de mayo se reunieron en la pradera del sabinar de Hornuez más de cien personas de toda la Serrezuela para dar vida a este primer encuentro interpueblos patrocinado por la asociación cultural La Tejera de Honrubia de la Cuesta y apoyado también por la asociación Nuevo Horizonte de Villaverde de Montejo. / Eventos por la cultura y la naturaleza.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 208, junio de 2018, pág. 31. (Con dos fotografías).
--- El Nordeste de Segovia (2018). **Juan Martos Quesada, nuevo cronista del Nordeste de Segovia. Además de este nombramiento, el catedrático ha sido premiado por su libro *Bercimuel. Un pueblo del nordeste de Segovia en la ruta del silencio*.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 209, julio de 2018, pág. 29. (Con una fotografía).
--- El Nordeste de Segovia (2018). **Restaurante La Serrezuela - Montejo de la Vega de la Serrezuela.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 210, agosto de 2018, pág. 23. (Con fotografías).
--- El Nordeste de Segovia (2018). ***Riaguas Verde*, un proyecto de reforestación que sigue adelante.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 211, septiembre de 2018, pág. 25. (Con una fotografía).
--- El Nordeste de Segovia (2018). **Honrubia de la Cuesta recuerda el trágico incendio que obligó a evacuar el pueblo hace diez años. / Villaverde de Montejo se mueve.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 211, septiembre de 2018, pág. 28. (Con dos fotografías).
--- El Nordeste de Segovia (2018). **Cuarenta años del refugio de reapaces de Montejo. / Una exposición en el Ayuntamiento de la localidad hace un recorrido desde la creación de este espacio natural.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 211, septiembre de 2018, pág. 29. (Con dos fotografías).
--- El Nordeste de Segovia (2018). **Casuar Artesan-Ales, Montejo de la Vega de la Serrezuela. / Una cerveza para cada momento.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 211, septiembre de 2018, pág. 32. (Con una fotografía).
--- El Nordeste de Segovia (2018). **El lobo, una especie en eterno conflicto. / El lobo ibérico regresa a la comarca nordeste. / La loba coja.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 213, noviembre de 2018, págs. 1, 10-11. (Con cuatro fotografías, una de Juan José González Vega).
--- El Nordeste de Segovia (2018). **Museos y bibliotecas.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 214, diciembre de 2018, pág. 2.
--- El Nordeste de Segovia (2018). **CODINSE, en la reunión para la renovación de la Carta Europea de Turismo Sostenible. / El grupo de acción local estuvo presente en la reunión celebrada en la Casa del Parque Natural de las Hoces del Riaza.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 214, diciembre de 2018, pág. 8. (Con una fotografía).
--- El Nordeste de Segovia (2018). **Valdevacas de Montejo. / Proyección del documental *Una huella marcada a fuego*.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 214, diciembre de 2018, pág. 14. (Con una fotografía).
--- El Nordeste de Segovia (2018). **Nuevo mapa para la comarca Nordeste.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 214, diciembre de 2018, pág. 17. (Con fotografías).
--- El Nordeste de Segovia (2018). **Bodegas Severino Sanz, Montejo de la Vega de la Serrezuela.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 214, diciembre de 2018, pág. 32. (Con fotografías).
--- El Nordeste de Segovia (2019). **Q de calidad turística en las hoces del Duratón y del río Riaza.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 217, marzo de 2019, pág. 15.
--- El Norte de Castilla (2013). **El recuento de nutrias en el Riaza confirma la calidad del ecosistema fluvial.** *El Norte de Castilla* (edición de Segovia), martes 25 de junio de 2013, pág. 10.
--- El Norte de Castilla (2017). **Plantación en defensa de los bosques.** *El Norte de Castilla* (edición de Segovia), martes 28 de noviembre de 2017, pág. 14. (Con una fotografía, de WWF).
--- El Norte de Castilla (2018). **El Fondo del Refugio de Montejo apoya la permanencia de la patrulla del Seprona en Ayllón.** *El Norte de Castilla* (edición de Segovia), jueves 5 de abril de 2018, pág. 8.
--- El Norte de Castilla (2018). **Los 43 años del Refugio de Rapaces de Montejo. Exposición.** *El Norte de Castilla* (edición de Segovia), domingo 13 de mayo de 2018, pág. 13.
--- El Norte de Castilla (2018). **El Refugio de Rapaces de Montejo acerca sus 40 años de historia.** *El Norte de Castilla* (edición de Segovia), miércoles 16 de mayo de 2018, pág. 6. (Con una fotografía, obtenida por Antonio de Torre).
--- El Norte de Castilla (2018). **La retirada de masa arbórea aumenta la capacidad de los cauces en varios ríos. / La intervención, de 235.099 euros, ha afectado a Eresma, Cega, Riaza, Duratón, Caslilla y Gudillos.** *El Norte de Castilla* (edición de Segovia), sábado 2 de junio de 2018. (Con una fotografía).
--- El Norte de Castilla (2018). **El Pontón Alto está al 100% de su capacidad.** *El Norte de Castilla* (edición de Segovia), martes 12 de junio de 2018, pág. 5.

--- El Norte de Castilla (2018). **Los centinelas contra el veneno. / Un alimoche del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega se une a las aves marcadas para detectar focos peligrosos.** *El Norte de Castilla* (digital), 7 de agosto de 2018. (Con dos fotografías).
--- El Norte de Castilla (2018). **El Colectivo Azálvaro organiza una carroñada para conmemorar el Día de los Buitres.** *El Norte de Castilla* (edición de Segovia), sábado 1 de septiembre de 2018, pág. 14. (Con una fotografía, obtenida por Elías Gomis Martín).
--- El Norte de Castilla (2018). **Agentes medioambientales recuperan los restos de dos buitres leonados de entre las ramas de un chopo en Riaguas de San Bartolomé. / Un ciudadano alertó de la presencia de un cadáver de un ejemplar de esta rapaz en la copa del árbol.** *El Norte de Castilla* (edición de Segovia), viernes 12 de octubre de 2018. (Con una fotografía, de la Junta de Castilla y León).
--- El Norte de Castilla (2018). **Media vida dedicada a la naturaleza. Unas 150 personas homenajean a Jesús Hernando, guarda de WWF España en el Refugio de Rapaces de Montejo.** *El Norte de Castilla* (edición de Segovia), viernes 16-11-2018, pág. 16. (Con una fotografía, obtenida por Elías Gomis Martín).
--- El Norte de Castilla (2018). **El Refugio de Montejo de la Vega contabiliza este año 1.364 buitres leonados.** *El Norte de Castilla* (edición se Segovia), miércoles 21-11-2018, pág. 9.
--- El Norte de Castilla (2018). **Montejo contabiliza 1.364 buitres, la cifra más alta de los censos de otoño. / 120 ornitólogos, de siete comunidades autónomas, participan en el inventario anual.** *El Norte de Castilla* (edición se Segovia), miércoles 21-11-2018, pág. 9. (Con una fotografía, obtenida por Elías Gomis Martín).
--- El Norte de Castilla (2019). **WWF pide a la Junta el plan de gestión para el Parque de las Hoces del Riaza.** / **45.772 horas de observación.** *El Norte de Castilla* (edición se Segovia), domingo 13-1-2019, pág. 10.
--- El Norte de Castilla (2019). **WWF cifra en un 80% las medidas sin ejecutar para proteger las Hoces del Riaza.** *El Norte de Castilla* (edición se Segovia), miércoles 13-3-2019, pág. 12. (Con una fotografía, de El Norte).
--- El Norte de Castilla (2019). **WWF cifra en un 80% las medidas sin ejecutar para proteger las Hoces del Riaza.** *El Norte de Castilla* (edición se Segovia), miércoles 13-3-2019, pág. 12. (Con una fotografía, de El Norte).
--- El Norte de Castilla (2019). **La Junta espera que el plan rector de las Hoces del Riaza esté listo este año. / Representantes de WWF analizarán con el director del parque natural la ejecución de las medidas básicas, que López Escobar cifra en un 80 %.** *El Norte de Castilla* (edición se Segovia), jueves 14-3-2019, pág. 10. (Con una fotografía, de Ó. C.).
--- El País (2018). **Aves "centinelas" contra el veneno para animales. / Un alimoche liberado en Segovia con un radiotransmisor ayudará a localizar los cebos mortales.** *El País* (digital), 8 de agosto de 2018. (Con una fotografía).
--- Europa Press (2018). **Liberan un alimoche en Riaza (Segovia) que será el centinela contra el uso del veneno en la zona.** *Europa Press* (digital), 7 de agosto de 2018. (Con una fotografía).
--- Fargallo, J. A.; Martínez Olivas, F.; Wakamatsu, K.; Serrano, D.; y Blanco Hervás, G. (2018). **Sex-dependent expression and fitness consequences of sunlight-derived color phenotypes.** *American Naturalist*, 191 (6): 726-743. (Con fotografías de Alberto Carreño y Juan A. Fargallo resp.) (Con un apéndice de 5 págs.)
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2018). **Hoja Informativa sobre el Refugio de Rapaces de Montejo**, **Nº 48**. Editada por el autor. Madrid. 352 págs.
(Con fotografías obtenidas por 27 personas: José Luis Armendáriz Sanz, Juan José Bacallado Aránega, Pedro José Bartolomé Sanz, José Antonio Benito Martín, Ángel Bocos García, José Manuel Boy Carmona, Cristian Calvo Vergara, Javier Cano Sánchez, Jesús Cobo Anula, Diana Domingo Tapia, Juan José Escribano Ródenas, Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Francisco Jesús Fernández Herrera, Juan Luis Galindo Estévez, Candelas Iglesias Aparicio, Alfonso Lario Doylataguerra, Juan Francisco Martín Calleja, Juan José Molina Pérez, Héctor Osvaldo Rivera, Carlos Palma Barcenilla, Xavier Parra Cuenca, Gabriel Redondo Jáuregui, Fermín Redondo Ramírez, José Román Rodríguez, Antonio Sanz Carro, Luis Sitges Aparicio, y Javier Vitores Casado.)
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2018). **Hoja Informativa sobre el Refugio de Rapaces de Montejo, Nº 49**. Editada por el autor. Madrid. 430 págs.
(Con fotografías obtenidas por 34 personas: Manuel de Andrés Moreno, José Luis Armendáriz Sanz, Juan José Bacallado Aránega, Pedro José Bartolomé Sanz, Ángel Bocos García, José Manuel Boy Carmona, Gema Cáceres Miguel, Cristian Calvo Vergara, Javier Cano Sánchez, Jesús Cobo Anula, Diana Domingo Tapia, Juan José Escribano Ródenas, Margarita Escribano Ródenas, Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Francisco Jesús Fernández Herrera, Günther Finkeldey, Luisa Fragua Domínguez, Juan Luis Galindo Estévez, GREFA, Gema Hernando Iglesias, Candelas Iglesias Aparicio, Guillermo

Iglesias Sanz, Manuel López Lázaro, Juan Francisco Martín Calleja, Xavier Martín Vilar, Juan José Molina Pérez, Emilio Monedero Gutiérrez, Xavier Parra Cuenca, Gabriel Redondo Jáuregui, Fermín Redondo Ramírez, Benito Ruiz Calatayud, Antonio Sanz Carro, Luis Sitges Aparicio, y Javier Vitores Casado.)

[Entre las Hojas Informativas Nº 48 y Nº 49 aparecen fotos de 39 autores distintos.]

--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2018). **Hoces del Riaza: el Refugio de Rapaces cumple 43 años.** *Argutorio*, Nº 40, II semestre 2018, págs. 96-99. (Con fotografías obtenidas por José Luis Armendáriz Sanz, Juan José Bacallado Aránega, Xavier Parra Cuenca y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2018). **Día de los buitres.** *El Adelantado de Segovia*, 1-9-2018, pág. 15. (Con una fotografía, obtenidas por Jesús Cobo Anula).

--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2018). **Día de los buitres.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 212, octubre de 2018, pág. 4. (Con una fotografía, obtenidas por Jesús Cobo Anula).

--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2018). **Día de los buitres.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 21, octubre de 2018, págs. 35-36. (Con fotografías obtenidas por Jesús Cobo Anula y por Juan José Molina Pérez).

--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2018). **Resultados de la reproducción de la cigüeña blanca (2018).** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 21, octubre de 2018, págs. 39-49. (Con tres fotografías, obtenidas por Xavier Parra Cuenca [dos] y por Juan José Molina Pérez).

--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2018). **Halcón peregrino en las hoces del Riaza (Refugio de Montejo e inmediaciones), y en zonas cercanas. Observaciones realizadas o recibidas en los ocho primeros meses de 2018.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 21, octubre de 2018, págs. 50-54. (Con una fotografía, obtenidas por Xavier Parra Cuenca).

--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2018). **Resúmenes de algunos censos (2018).** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 21, octubre de 2018, págs. 55-56. (Con dos fotografías, obtenidas por Xavier Parra Cuenca y por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, respectivamente).

--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2018). **Jesús Hernando recibió un homenaje en Villaverde de Montejo. / El acto estuvo organizado por el Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza.** *Segovia al Día* (digital), viernes 16-11-2018. (Con una fotografía, obtenida por Elías Gomis Martín).

--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2018). **El Refugio de Rapaces de Montejo.** *100cias@uned* digital, Nº 11, 2018, págs. (1), (48), 49-52. (Con fotografías obtenidas por José Luis Armendáriz Sanz, Juan José Bacallado Aránega, Xavier Parra Cuenca y Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).

--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2019). **Homenaje a un guardián de la naturaleza.** *Quercus*, Nº 395, enero de 2019, págs. (3), 85. (Con una fotografía, obtenida por Elías Gomis Martín).

--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2019). **Cigüeña blanca *Ciconia ciconia*, Alimoche común *Neophron percnopterus*, Buitre leonado *Gyps fulvus*, y Búho real *Bubo bubo*.** Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, Vol. 66(1), I-2019, págs. 221, 224, y 243.

--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2019). **Hoces del Riaza: el Refugio de Rapaces cumple 44 años.** *El Adelantado de Segovia*, domingo 13-I-2019, págs. (1), 18-19. (Con fotografías obtenidas por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Juan Luis Galindo Estévez, Raúl González Rodríguez, Elías Gomis Martín, Juan José Molina Pérez, Xavier Parra Cuenca, y Juan Carlos Rincón García).

--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2019). **Informe final del XXXVI Censo de vertebrados realizado los días 10 y 11 de noviembre de 2018, en las Hoces del río Riaza (Refugios de Rapaces de Montejo y de Linares del Arroyo, resto de la ZEPA, e inmediaciones) y en peñas y barrancos próximos.** 110 páginas. (Con fotografías obtenidas por Elías Gomis Martín, Raúl González Rodríguez, y Juan Carlos Rincón García).

--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2019). **Hoces del Riaza: el Refugio de Rapaces cumple 44 años.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, págs. 3-10. (Con fotografías obtenidas por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Francisco Jesús Fernández Herrera, Juan Luis Galindo Estévez, Elías Gomis Martín, Raúl González Rodríguez, Juan José Molina Pérez, Xavier Parra Cuenca, Juan Carlos Rincón García, y José Luis Romero Carayol).

(Publicado también en otros medios, allí indicados).

--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2019). **Homenaje a Jesús Hernando.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, págs. 11-14. (Con fotografías obtenidas por Elías Gomis Martín y Raúl González Rodríguez,).

--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2019). **Resumen del Informe final del censo de otoño de 2018.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, págs. 34-39.

--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2019). **A Jesús Hernando Iglesias.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, págs. 53-54.
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2019). **Respuestas de la Ciencia (Radio 5). Nuevos mini-programas grabados el 30-10-18.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, pág. 78.
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2019). **Informe presentado (previsto) el 13-3-19, en la reunión del Patronato del Parque Natural.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, págs. 79-92. (Con una fotografía, obtenida por Candelas Iglesias Aparicio).
--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2019). **Día de los buitres.** *Ambiente y Medio* (Revista de la Asociación de Alumnos y Exalumnos de Ciencias Ambientales de la UNED), Nº 7, 2019, págs. (2), 17-18. (Con fotografías obtenidas por Jesús Cobo Anula y por Juan José Molina Pérez).
--- Fernández García, M. (2019). **Resumen del seguimiento de los dormideros de la población invernante de milano real (*Milvus milvus*) en la provincia de Burgos. Años 2016-2018.** Págs. 223-228 en: Román Sancho, F.; Lobo Cueva, J. L.; y Fernández González, R. (2018). ***Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos. Volumen V.*** Caja de Burgos. Aula de Medio Ambiente. Burgos. 300 págs.
--- Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza (2018). **Convocatoria del próximo censo de otoño. / Web de viajes ornitológicos.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 21, octubre de 2018, pág. 37.
--- Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza (2018). **Observados los últimos alimoches de 2018.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 21, octubre de 2018, pág. 57. (Con una fotografía, obtenida por Luis Sitges Aparicio).
--- Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza (2018). **Nuevas Hojas Informativas. / Consultar las Hojas Informativas. / Foro de Montejanos, página de Montejanos en Facebook y otros.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 21, octubre de 2018, págs. 60. (Con una fotografía, obtenida por Juan Luis Galindo Estévez).
--- Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza (2019). **Convocatoria del próximo censo de otoño.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, pág. 75.
--- Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza (2019). **Milano real anillado.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, pág. 76. (Con una fotografía, obtenida por Candelas Iglesias Aparicio).
--- Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza (2019). **Observado el primer alimoche de 2019.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, pág. 77. (Con una fotografía, obtenida por Manuel López Lázaro).
--- Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza (2019). **Web de viajes ornitológicos.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, pág. 78.
--- Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza (2019). **Nota.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, pág. 93.
--- Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza (2019). **Consultar las Hojas Informativas. / Foro de Montejanos, página de Montejanos en Facebook y otros.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, pág. 96.
--- Gallego, J. L. (2018). **Los extraordinarios gorriones caseros.** *Quercus*, Nº 394, diciembre de 2018, págs. 58-59.
--- Gomis Martín, E. (2019). **Con la mirada en el cielo y con los pies en la tierra.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, pág. 44.
--- Guerrero Mayo, Á. (2019). **AMUS.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, pág. 33. (Con una fotografía, obtenida por Sebastián Molano).
--- GREFA (2018). **Informe de resultados abril y mayo de 2018. Proyecto Monachus.** *Grefa* (dital).
--- Gutiérrez, S. (2018). **Enclavada en las Hoces del Riaza. / Bodegas Seveerino Sanz es la única elaboradora segoviana inscrita en Ribera del Duero.** *El Norte de Castilla* (edición de Segovia), miércoles 14-11-2018. (Con fotografías, obtenidas por Susana Gutiérrez).
--- Heraldo-Diario de Soria (2018). **Ornitólogos sorianos colaboran en la redacción del censo de otoño / El fin de semana del 10 y 11 se llevará a cabo en el Refugio de las Hoces del Riaza.** *Heraldo-Diario de Soria*, viernes 2-11-2018, pág. 15.
--- Herrero Gómez, G. (2018). **La Junta censa los buitres del Duratón y el Riaza. / Agentes medioambientales también han llevado a cabo en las últimas semanas un censo de aves acuáticas en los humendales y, en colaboración con SEO/BirdLife, otro de milanos.** *El Adelantado de Segovia*, jueves 8-2-2018.
--- Hoy (2019). **Charla en ADENEX sobre un refugio de rapaces / Montejo de la Vega.** *Hoy* (Diario de Extremadura), jueves 7-2-2019, pág. 7.

--- Ical (2018). **Un centenar de ornitólogos procedentes de varias provincias de Castilla y León participan el fin de semana en Segovia en la elaboración del censo de otoño de rapaces.** *Ical News* (digital), miércoles 31-10-2018.
--- Iglesias Aparicio, C. (2018). **Campaña de aguiluchos 2018.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 21, octubre de 2018, pág. 30-31. (Con fotografías obtenidas por Juan José Molina Pérez y otros).
--- Juste, L. (2018). **Proyecto Monachus. "Recuperación del Buitre Negro (*Aegypius monachus*) en el Sistema Ibérico".** Págs. 237-250 en: Román Sancho, F.; Lobo Cueva, J. L.; y Fernández González, R. (2018). ***Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos. Volumen V.*** Caja de Burgos. Aula de Medio Ambiente. Burgos. 300 págs.
--- Labrador, V. (2019). **Las Hoces del Riaza y el Duratón renuevan la Q de Calidad Turística.** *El Adelantado de Segovia*, jueves 24-1-2019.
--- López Hernangómez, A. (2018). **Fotografiando a los quebrantahuesos.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 21, octubre de 2018, págs. 21-23. (Con tres fotografías, obtenidas por el autor).
--- López Hernangómez, A. (2019). **Los grandes búhos de las llanuras cultivadas.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, págs. 28-31. (Con tres fotografías y un dibujo, todos ellos del autor).
--- López-Pozuelo García, J. L. (2018). **Visita del Grupo de socios de Madrid de WWF al Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega. 17-XI-2018, sábado.** Informe inédito. 2 págs.
--- López, M. Á. (2018). **Los senderos del aire. / Parque Natural de las Hoces del Riaza. / Montejo de la Vega de la Serrezuela abre sus caminos y veredas al espacio protegido.** *El Norte de Castilla* (edición de Segovia), domingo 9-12-2018, pág. 15.
--- Maestre, J. (2017). **Ecoturismo, ¡lo más saludable!** *Aves y Naturaleza*, Nº 24, 2017, págs. 24-29. (En p. 25).
--- Margalida, A.; Campion, D.; y Donázar, J. A. (2014). **Vultures vs livestock: conservation relationships in an emerging conflict between humans and wildlife.** *Oryx* 48 (2), pp. 172-176. (Pág. 173).
--- Martín López, I. (2018). **La población de cigüeña pervive en la comarca con 135 pollos. / Esta es la segunda mejor cifra de las registradas en los censos de esta especie realizados los últimos 15 años, a pesar de que las condiciones meteorológicas no han sido muy propicias.** *Diario de Burgos*, 12-7-2018, pág. 27. (Con una fotografía, de F. L.).
--- Martínez Olivas, F. (2019). **Mi gran amigo segoviano.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, pág. 52.
--- Molina Pérez, J. J. (2018). **El Refugio de Rapaces de Montejo acerca sus 40 (43) años de historia a Segovia.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 21, octubre de 2018, págs. 3-5. (Con fotografías obtenidas por Juan José Molina Pérez y por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo).
--- Molina Pérez, J. J. (2018). **La exposición sobre el Refugio, de nuevo en Montejo.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 21, octubre de 2018, págs. 6-8. (Con fotografías obtenidas por el autor).
--- Molina Pérez, J. J. (2019). **La naturaleza nos habla.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, págs. 15-19. (Con siete fotografías, obtenidas por el autor).
--- Molina Pérez, J. J. (2019). **Agradecimiento y mensaje.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, pág. 40.
--- Molina Pérez, J. J. (2019). **A Jesús Hernando Iglesias.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, págs. 59-60.
--- Morales-Reyes, Z.; Pérez-García, J. M.; Moleón, M.; Botella, F.; Carrete, M.; Lazcano, C.; Moreno-Opo, R.; Margalida, A.; Donázar, J. A.; y Sánchez-Zapata, J. A. (2014). **Supplanting ecosystem services provided by scavenger raises greenhouse gas emissions.** *Scientific Reports*, Nº 5, pp- 1-6. (Pág. 3).
--- Moreno, N. (2018). **Un día que de momento dura diez años.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 212, octubre de 2018, pág. 5. (Con una fotografía).
--- Novo Rodríguez, N. (2019). **A Jesús Hernando Iglesias.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, pág. 66.
--- Onda Cero de Segovia (2018). **Se celebran 40 años de la creación del Refugio. / Fidel José Fernández habla de la exposición que se ha organizado.** *Onda Cero, Segovia en la Onda*, martes 22-VIII-2018. (Con una fotografía).

--- Ortega Cabarga, G. (2018). **Campamento junto al Refugio.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 21, octubre de 2018, pág. 10. (Con una fotografía, obtenida por Jesús Cobo Anula).
--- Parra Cuenca, X.; y Gutiérrez Fernández, M. (2019). **Ruiseñor pechiazul *Luscinia svecica.*** Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, Vol. 66(1), I-2019, pág. 247.
--- Pérez Cuevas, M. (2019). **A Jesús Hernando Iglesias.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, pág. 46.
--- Quercus (2018). **Hojas informativas del Refugio de Montejo.** *Quercus*, Nº 392, octubre de 2018, págs. 45-46.
--- Quercus (2018). **Nuevo Censo de Otoño en el Refugio de Montejo.** *Quercus*, Nº 393, noviembre de 2018, pág. 30.
--- Radio Aranda (2018). **La exposición del refugio de Montejo vuelve a casa. / El Ayuntamiento de esta localidad exhibe la muestra que habla de las más de cuatro décadas de este enclave natural.** *Radio Aranda* (digital), miércoles 22-VIII-2018. (Con dos fotografías).
--- Radio Segovia (2018). **El Refugio de Aves Rapaces de Montejo de la Vega llega a Segovia. / El centro cultural de San José acoge una exposición acerca de los 40 años de historia de este espacio natural del nordeste segoviano.** *Radio Segovia* (digital), miércoles 16-V-2018. (Con una fotografía, obtenida por Radio Segovia).
--- Radio Segovia (2018). **El censo de otoño en el refugio de Montejo registra 1.364 buitres leonados / Éste sería el número más alto contabilizado en los censos correspondientes a esta estración del año.** *Radio Segovia* (digital), viernes 20-XI-2018. (Con una fotografía, obtenida por Elías Gomis Martín.)
--- Redondo Ramírez, F.; Navas Sanz, R.; y Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2019). **Cuervo grande *Corvus corax.*** Noticiario Ornitológico. *Ardeola*, Vol. 66(1), I-2019, pág. 253.
--- Remacha Lorenzo, J. A. (2018). **Excursión de montejanos.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 21, octubre de 2018, págs. 12-15. (Con fotografías obtenidas por Fernando Ávila Vico, Juan Luis Galindo Estévez y Jorge Andrés Remacha Lorenzo).
--- Radio Segovia (2018). **Fidel José Fernández habla de los datos provisionales del censo del Refugio de Montejo de la Vega de la Serrezuela.** . *Radio Segovia* (digital), miércoles 21-XI-2018.
--- Requejo de las Heras (2019). **Comportamiento migratorio de nuestros buitres leonados.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, págs. 21-22. (Con una fotografía, de Andrés Requejo de las Heras).
--- Rodríguez Panizo, P. (2019). **El heredero del Guardián del Refugio.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, pág. 62.
--- Romero Bravo, A. (2019). **A Jesús Hernando Iglesias.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, pág. 50.
--- Ruiz Heredia, A. (2018). **"Una historia que reivindicar sobre educación ambiental". III.** *Sierra Norte*, Nº 244, mayo de 2018, pág. 30.
--- Sahagún Rodríguez, M. J. (2018). **El azor en el nordeste de la provincia de Segovia.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 21, octubre de 2018, págs. 24-25. (Con seis fotografías, obtenidas por el autor).
--- Sánchez Expósito, I. (2019). **Montejo y los extremos del Duero. Un reconocimiento del conservacionismo extremeño a un proyecto ilusionante.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, pág. 32.
--- Sanz, G. (2018). **Tras el vuelo del buitre.** *Diario de Valladolid* (digital), 1-9-2018.
--- Sanz, G. (2018). **Tras el vuelo del buitre.** *El Correo de Burgos*, sábado 1-9-2018, págs. 14-15. (Con fotografías de Valentín Guisande / Ical).
--- Sanz, G. (2018). **Tras el vuelo del buitre.** *El Mundo / Diario de Castilla y León*, sábado 1-9-2018, págs. 1, 12-13. (Con fotografías de Valentín Guisande / Ical).
--- Sanz Rincón, S. (2018). **Relato.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 21, octubre de 2018, págs. 26-27. (Con fotografías obtenidas por Santiago Sanz Rincón y Adolfo Frías Fernández).
--- Segovia al Día (2018). **Jesús Hernando recibió un homenaje en Villaverde de Montejo / El acto estuvo organizado por el Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza**. *Segovia al Día* (digital), 16-11-2018.
--- Segovia Audaz (2018). **Historias de rapaces en el Centro San José.** *Segovia Audaz*, 15-5-2018.
--- Segovia Audaz (2018). **Un centenar de ornitólogos procedentes de varias provincias españolas elaborarán el fin de semana el censo de otoño de rapaces.** *Segovia Audaz*, 31-10-2018. (Con una fotografía).
--- Segovia Directo (2018). **El refugio de aves rapaces de Montejo de la Vega acerca sus 40 años de historia a Segovia.** *Segovia Directo*, 15-5-2018. (Con una fotografía).

--- Viajar por Segovia (2019). **Nuevo mapa turístico del Nordeste.** *Viajar por Segovia*, Nº 31, invierno de 2019, pág. 9.
--- WWF España (2018). **Dossier corredores ecológicos. Al rescate de las autopistas salvajes.** *Panda* Nº 139, primavera de 2018, págs. 10-17. (En p. 13).
--- WWF España (2018). **Campamento Panda.** *Panda* Nº 139, primavera de 2018, pág. 20. (Con una fotografía, obtenida por Luis Suárez Arangüena).
--- WWF España (2018). **Campamento Panda.** *Panda Jr* Nº 32, primavera de 2018, pág. 2. (Con una fotografía).
--- WWF España (2018). **Marca en verde.** *Panda* Nº 140, verano de 2018, pág. 21.
--- WWF España (2018). **Un árbol para María Luisa.** *Panda* Nº 140, verano de 2018, pág. 23.
--- WWF España / Oficina para Doñana (2018). **50 aniversario de WWF España.** *Info Doñana*, Nº 226, julio de 2018, págs. 4-5 (p. 5).
--- WWF España (2018). **El otoño en el Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega.** *Pandilla*, Nº 104, otoño de 2018, pág. 3. (Con una fotografía, obtenida por David Santiago/WWF).
--- WWF España (2018). *Panda* Nº 141, otoño de 2018, pág. 2. (Con fotografías del archivo de WWF España y de material cedido por Antonio Ruiz Heredia y Beltrán de Ceballos).
--- WWF España (2018). **Escuela de naturalistas. Club de los Linces de ADENA.** *Panda* Nº 141, otoño de 2018, pág. 7. (Con una fotografía del archivo Larena).
--- WWF España (2018). **La creación del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega.** *Panda* Nº 141, otoño de 2018, pág. 8. (Con tres fotografías; del archivo de WWF España, de Jorge Sierra Antiñolo, y de María Luisa Martínez Flores, respectivamente).
--- WWF España (2018). **1975.** *Panda* Nº 141, otoño de 2018, pág. 18. (Con una fotografía, obtenida por Carlos Sanz García).
--- WWF España (2018). **Comunicar para conservar.** *Panda* Nº 141, otoño de 2018, pág. 18. (Con una fotografías).
--- WWF España (2018). **Marca en verde.** *Panda* Nº 141, otoño de 2018, pág. 22. (Con una fotografía).
--- WWF España (2018). **Yo planto en red.** *Panda* Nº 142, invierno de 2018, pág. 18. (Con una fotografía).
--- WWF España (2018). **Tres décadas velando por el Refugio.** *Panda* Nº 142, invierno de 2018, pág. 20. (Con una fotografía).

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Por otra parte, después de la aparición de la Hoja Informativa Nº 49, el **Fondo** para el Refugio de las Hoces del Riaza ha publicado los dos siguientes números de su **Circular informativa**:

--- Nº 21 (octubre de 2018) (60 págs.). Índice.-

El Refugio de Rapaces de Montejo acerca sus 40 (43) años de historia a Segovia. *Juan José Molina Pérez.* Pág. 3.
La exposición sobre el Refugio, de nuevo en Montejo. *Juan José Molina Pérez.* Pág. 6.
Felicitación. *Juan Carlos del Olmo Castillejos.* Pág. 9.
Campamento junto al Refugio. *Gonzalo Ortega Cabarga.* Pág. 10.
De la Amazonia peruana a las hoces del Riaza. *Damián Arguch Sánchez.* Pág. 11.
Excursión de montejanos. *Jorge Andrés Remacha Lorenzo.* Pág. 12.
La divulgación ambiental: un legado paleolítico. *Fernando Ávila Vico*. Pág. 16.
Uno de septiembre de 2018, día de los buitres. In memoriam de "Montejo". *Chelo Atencia Páez.* Pág. 18.
Marcaje de alimoche en Montejo. *Carlos Cuéllar Basterrechea.* Pág. 19.
Nuevas fotos de aves de Xavier Parra Cuenca (2018). Pág. 20.
Fotografiando a los quebrantahuesos. *Alfredo López Hernangómez.* Pág. 21.
El azor en el nordeste de la provincia de Segovia. *Manuel Jesús Sahagún Rodríguez.* Pág. 24.
Relato. *Santiago Sanz Rincón.* Pág. 26.
Control biológico de plagas de topillos en el nordeste segoviano. *Carlos Cuéllar Basterrechea.* Pág. 28.
Campaña de aguiluchos 2018. *Candelas Iglesias Aparicio.* Pág. 30.
Novedades sobre el proyecto "Occipitalis Station". Datos y revisión: *José Manuel Aguilera Sanz.* Pág. 32.
Día de los buitres. *Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.* Pág. 35.
Convocatoria del próximo censo de otoño. / Web de viajes ornitológicos. *Fondo para el Refugio.* Pág. 37.
Cigüeña capturando vencejo en Fresnillo de las Dueñas. *Candelas Iglesias Aparicio.* Pág. 38.
Resultados de la reproducción de la cigüeña blanca (2018). *Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.* Pág. 39.

Halcón peregrino en las hoces del Riaza (Refugio de Montejo e inmediaciones), y en zonas cercanas. Observaciones realizadas o recibidas en los ocho primeros meses de 2018. *Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.* Pág. 50.
Resúmenes de algunos censos (2018). *Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo*. Pág. 55.
Observados los últimos alimoches de 2018. Pág. 56.
Nuevas Hojas Informativas. Pág. 57.
Consultar las Hojas Informativas, foro de Montejanos, página de Montejanos en Facebook y otros. Pág. 60.

Diseño y revisión.- Elías Gomis Martín.

Autores de textos.- José Manuel Aguilera Sanz, Damián Arguch Sánchez, Consuelo Atencia Páez, Fernando Ávila Vico, Carlos Cuéllar Basterrechea, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Candelas Iglesias Aparicio, Alfredo López Hernangómez, Juan José Molina Pérez, Juan Carlos del Olmo Castillejos, Gonzalo Ortega Cabarga, Jorge Andrés Remacha Lorenzo, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez, y Santiago Sanz Rincón. (15)

Autores de fotos.- José Manuel Aguilera Sanz, Aranda me gusta, Damián Arguch Sánchez, José Luis Armendáriz Sanz, Consuelo Atencia Páez, Fernando Ávila Vico, Jesús Cobo Anula, Yolanda de la Cruz Rubio, Françoise Delepoulle, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Luisa Fragua Domínguez, Adolfo Frías Fernández, Cándido de la Fuente de la Osada, José Luis de la Fuente Mayoral, Juan Luis Galindo Estévez, GREFA, Jesús Hernando Iglesias, José Manuel Hiniesto del Río, Candelas Iglesias Aparicio, Alfredo López Hernangómez, Juan José Molina Pérez, Xavier Parra Cuenca, Jorge Andrés Remacha Lorenzo, Mónica del Río Casa Sola, Benito Ruiz Calatayud, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez, Santiago Sanz Rincón, Luis Sitges Aparicio, y WWF España. (29)

Autores de textos o fotos o revisiones.- 33.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

--- Nº 22 (marzo de 2019) (96 págs.). Índice.-

Hoces del Riaza: el Refugio de Rapaces cumple 44 años. *Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.* Pág. 3.
Homenaje a Jesús Hernando. *Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.* Pág. 11.
Felicitación. *Juan Carlos del Olmo Castillejos.* Pág. 14.
La naturaleza nos habla. *Juan José Molina Pérez.* Pág. 15.
Nuevas charlas relacionadas con el Refugio (2018). Pág. 20.
Nuevas fotos de aves de Xavier Parra Cuenca (2018). Pág. 20.
Comportamiento migratorio de nuestros buitres leonados. *Andrés Requejo de las Heras.* Pág. 21.
Las cámaras de una de las Cuatro Torres de Madrid captan un buitre leonado posado en su azotea. *Carlos Cano Barbacil y Javier Cano Sánchez.* Pág. 24.
Sexta expedición del proyecto "Occipitalis Station". Datos y revisión: *José Manuel Aguilera Sanz.* Pág. 26.
Los grandes búhos de las llanuras cultivadas. *Alfredo López Hernangómez.* Pág. 28.
Montejo y los extremos del Duero. Un reconocimiento del conservacionismo extremeño a un proyecto ilusionante. *Ismael Sánchez Expósito*. Pág. 32.
AMUS. *Álvaro Guerrero Mayo.* Pág. 33.
Resumen del Informe final del censo de otoño de 2018. *Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.* Pág. 34.
Agradecimiento y mensaje. *Juan José Molina Pérez.* Pág. 40.

Libro homenaje a Jesús Hernando (los autores de las fotos se indican al final del libro).-
30 años guardando un refugio con encanto. Dibujo de la portada, *Rubén Arrabal Espeja*. Pág. 41.
Con la mirada en el cielo y con los pies en la tierra. *Elías Gomis Martín.* Pág. 44.
A Jesús Hernando Iglesias. *Milagros Pérez Cuevas.* Pág. 46.
A Jesús Hernando Iglesias. *Manuel de Andrés Moreno.* Pág. 48.
A Jesús Hernando Iglesias. *Andrés Romero Bravo*. Pág. 50.
Mi gran amigo segoviano. *Félix Martínez Olivas.* Pág. 52.
A Jesús Hernando Iglesias. *Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo*. Pág. 53.
El primer impacto. *Javier Alcalde Cuña.* Pág. 57.

A Jesús Hernando Iglesias. *Juan José Molina Pérez.* Pág. 59.
El heredero del Guardián del Refugio. *Dr. Pedro Rodríguez Panizo.* Pág. 62.
A Jesús Hernando Iglesias. *Noa Novo Rodríguez.* Pág. 66.
A Jesús Hernando Iglesias. *Jesús Cobo Anula.* Pág. 68.

Convocatoria del próximo censo de otoño: 16-17 de noviembre de 2019. Pág. 75.
Milano real anillado. Pág. 76.
Observado el primer alimoche de 2019. Pág. 77.
Respuestas de la Ciencia (Radio 5). Nuevos mini-programas grabados el 30-10-18. *Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.* Pág. 78.
Web de viajes ornitológicos. Pág. 78.
Informe presentado (previsto) el 13-3-2018, en la reunión del Patronato del Parque Natural. *Dr. Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo.* Pág. 79.
Nota. Pág. 93.
Consultar las Hojas Informativas, foro de Montejanos, pág. de Montejanos en Facebook y otros. Pág. 96.

Diseño y revisión.- Elías Gomis Martín.

Autores de textos.- José Manuel Aguilera Sanz, Javier Alcalde Cuña, Manuel de Andrés Moreno, Carlos Cano Barbacil, Javier Cano Sánchez, Jesús Cobo Anula, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza, Elías Gomis Martín, Álvaro Guerrero Mayo, Alfredo López Hernangómez, Félix Martínez Olivas, Juan José Molina Pérez, Noa Novo Rodríguez, Milagros Pérez Cuevas, Andrés Requejo de las Heras, Pedro Rodríguez Panizo, Andrés Romero Bravo, e Ismael Sánchez Espósito. (19)

Autores de fotos.- Javier Alcalde Cuña, Carolina Álvarez Cano, Martín Francisco Arévalo Sánchez, José Luis Armendáriz Sanz, Rubén Arrabal Espeja, Jesús Cobo Anula, FAB (Fondo Amigos del Buitre), Antonio Jesús Fernández y Fernández-Arroyo, Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, Francisco Jesus Fernández Herrera, Juan Luis Galindo Estévez, Antonio Gómez Manzano, Elías Gomis Martín, Ana Belén González Piriz, Raúl González Rodríguez, Jesús Hernando Iglesias, Candelas Iglesias Aparicio, Junta de Extremadura, Mikel Kebuteh Sanno, Mario Liarte Lozano, Alfredo López Hernangómez, Manuel López Lázaro, Xavier Martín Vilar, María Luisa Martínez Flores, Sebastián Molano, Juan José Molina Pérez, Xavier Parra Cuenca, Carlos Parrado Mejuto, Andrés Requejo de las Heras, Juan Carlos Rincón García, José Luis Romero Carayol, Antonio Ruiz Heredia, y Luis Sitges Aparicio. (33)

Autores de dibujos o carteles.- ADENEX, y Rubén Arrabal Espeja. (2).
Autores de textos o fotos o dibujos.- 45.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

(Además de las ediciones impresas, aparecieron, todas o parte, o alguna de las anteriores, en *Naturalicante* [gracias a la magnífica labor de Raúl González Rodríguez], y en foros o redes de Internet [como *Facebook, Grupos Naturalistas de Castilla y León, Montejanos, Raptor Conservation, SEO-Guadarrama,* y *Vulture Conservation*]).

--- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Aparte de lo anterior, durante los dos últimos años ha habido bastantes noticias o artículos sobre temas del Refugio publicados en la **Prensa**, nacional y sobre todo regional. La mayor parte ha aparecido en los diarios "*El Adelantado de Segovia*", "*El Norte de Castilla*" (sobre todo, la edición de Segovia), "*Diario de Burgos*", "*El Correo de Burgos*", "*Heraldo-Diario de Soria*", "*ABC*" (edición de Castilla y León), "*El Mundo*" (edición de Castilla y León, "*Diario de Castilla y León*"), y otros. También han aparecido recientemente temas relacionados con el Refugio de Montejo en periódicos o revistas comarcales o locales (como "*El Nordeste de Segovia*" [mensual],); y en diarios de otras provincias o regiones (como "*Hoy*" [Diario de Extremadura]).

Por otra parte, el Refugio de Montejo (o datos obtenidos en la zona) ha sido mencionado recientemente en bastantes **revistas** o publicaciones especializadas; incluyendo, entre las españolas, "*Ambiente y Medio*", "*Ardeola*", "*Argutorio*", "*Aves y Naturaleza*", "*Calendario Meteorológico*", "*100cias@uned*", "*Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*", "*El Cárabo*", "*Info Doñana*", "*Panda*", "*Pandilla / Panda Junior*", "*Quercus*", "*Sierra Norte*", "*Viajar por Segovia*", etc.; y entre las extranjeras, revistas especializadas como "*Oryx*", "*The American Naturalist*", o "*Scientific Reports*".

Han aparecido asimismo noticias sobre el Refugio (o sobre la zona) en **Internet**: En las páginas *web* de *WWF España (Adena)*, de *ADENEX*, del *Grupo Local SEO-Barcelona*, de la *Junta de Castilla y León*, del *Ayuntamiento de Segovia*, etc.; y también, en páginas web (o blogs) como *Alpajeshosteleriayturismo, Birdingtrekkingandnaturecom-luis, Contrainformación, Ebird, Ecoticias, El click verde, El Día (Segovia), El Herrerillo, Elías Gomis, Europa Press, ICAL, Issuu, La Naturaleza al Detalle, Libertad Digital, Mi Isla Sostenible, Naturalicante, Noticias Aranda, Onda Cero de Segovia, Radio Aranda (Cadena SER), Radio Segovia (Cadena SER), Radio Sepúlveda (Cadena SER), Rare Birds in Spain, Reservoir Birds, Rutadelvinoriberadelduero, Segovia al Día, Segovia Audaz, Segovia.a1clik, Segovia Directo, Tarsiger, Turismo de Segovia, Universa Terra, Xavier Martín*, etc.; en el boletín de novedades de la Tienda Verde; en distintos sitios de "*Facebook*" [incluyendo "*Montejanos*", "*Es-es.facebook*", "*RevistaQuercus*", "*Twitter*"…; y en periódicos o revistas digitales como "*ABC*" (digital), "*Ambiente y Medio*" (revista de la Asociación de Alumnos y Exalumnos de Ciencias Ambientales de la UNED), "*Allevents*", "*Diario de la Ribera*" (digital), "*Diario de Valladolid*" (digital), "*Dicyt*", "*El Confidencial*", "*El Mercurio digital*", "*El Norte de Castilla*" (digital), "*El País*" (digital), "*La Vanguardia*" (digital), "*Prnoticias*", etc.; en foros como "*Avesforum*", "*Goce*", "*Grupos Naturalistas de Castilla y León*", "*Montejanos*", "*Raptor Conservation*", "*SEO-SierradeGuadarrama*", "*SEO-Soria*", "*Vulture Conservation*", etc.

--- --- --- ---

El Refugio de Montejo (o fotos o datos de la zona) ha aparecido también en bastantes **libros**, **monografías, trabajos o cuadernos** nuevos. Destacaremos, además de los informes parciales del censo de otoño y de otros informes periódicos, los siguientes:

--- ADENEX (2019). **Charla. 44 años censando y defendiendo el Refugio de Rapaces de Montejo.** Cartel. Febrero de 2019.

--- Andrés Moreno, M.; Fernández Ortiz, A.; y Velasco de Miguel, J. M. (2018). **Ampliación del informe del censo de otoño.** Informe inédito. 6 págs.

--- Armendáriz Sanz, J. L. (2016). **Productos culinarios.** 2ª edición. Ed. Paraninfo. 217 págs. (Pág. 15).

--- Ayuntamiento de Montejo de la Vega de la Serrezuela (2018). **Exposición 40 aniversario del Refugio de Rapaces de Montejo.** Salón del Ayuntamiento de Montejo de la Vega (Segovia). Cartel.

--- Ayuntamiento de Segovia (2018). **Exposición 40 aniversario del Refugio de Rapaces de Montejo.** Centro Cultural San José de Segovia. Cartel.

--- Briones González, Pablo (2018). **Relación de especies. El Corralón. Censo de otoño en Montejo.** Informe inédito. (10 y 11-11-2018).

--- Cano Barbacil, C.; y Cano Sánchez, J. (2018). **Ampliación del informe del censo de otoño en el Parque Natural de las Hoces del Riaza. 10-11-XI-2018.** Informe inédito. 2 páginas.

--- Cobo Anula, J. (2019). **Seguimiento de anfibios en las hoces del Riaza. Año 2018.** Informe inédito para WWF España. 8 págs. (Con fotografías del autor.) (Los muestreos, con Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio).

--- Del Moral González, J. C. (ed.) (2018). **El buitre negro en España. Población reproductora en 2017 y método de censo.** SEO/BirdLife, Monografía Nº 45. Madrid. 102 págs. (Págs. 38, 87).

--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2018). **Halcón peregrino en las hoces del Riaza (Refugio de Montejo e inmediaciones), y en zonas cercanas. Observaciones realizadas o recibidas en los primeros meses de 2018 (hasta el 9 de julio).** Informe inédito. 5 págs. (Enviado a Jesús Cobo Anula, biólogo conservador del Refugio, para el censo nacional del halcón peregrino).

--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2019). **Informe final del XXXVI Censo de vertebrados realizado los días 10 y 11 de noviembre de 2018, en las Hoces del río Riaza (Refugios de Rapaces de Montejo y de Linares del Arroyo, resto de la ZEPA, e inmediaciones) y en peñas y barrancos próximos.** 110 páginas. (Con fotografías obtenidas por Elías Gomis Martín, Raúl González Rodríguez, y Juan Carlos Rincón García).

[Publicado también en Naturalicante (www.naturalicante.com), gracias a la labor desinteresada de Raúl González Rodríguez.]

--- Fernández y Fernández-Arroyo, F. J. (2019). **Informe presentado (previsto) el 13-3-19, en la reunión del Patronato del Parque Natural.** *Circular Informativa del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*, Nº 22, marzo de 2019, págs. 79-92. (Con una fotografía, obtenida por Candelas Iglesias Aparicio).

--- Fernández González, R. (2018). **Hoja informativa sobre la avifauna en el sureste de Burgos.** Nº 1. Agosto de 2018. 56 págs. (Pp. 17.)

--- Fernández Ortiz, A. (2019). **Notas de campo. Barbolla. 2019.** Informe inédito. 6 págs.

--- Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza (2018). **XXXVI censo de vertebrados de otoño en el Refugio de Rapaces de Montejo.** Cartel.
--- Gallego García, J. L. (2018). **Disfrutar en la naturaleza.** Alianza Editorial. 254 págs. (Pp. 79-65 ["*Buitres, liebres y sabinas*"], y otras.).
--- García de la Morena, E. L.; Bota, G.; Mañosa, S.; y Morales, M. B. (2018). **El sisón común en España. II Censo Nacional (2016).** SEO/BirdLife. Monografías, 47. Madrid. 118 págs. (Pp. 17, 21, 32, [37], 47, 55, [64-66], 68, [71-72], [92-93], [99-100], 111, 116).
--- Gomis Martín, E. (2018). **Censando en el Refugio de Rapaces de Montejo.** Publicado en eliasgomis.blogspot.com. 16 págs. Con fotografías del autor.
--- González, J. L. (2006). **Temida por desconocida.** Págs. 318-324 en: ***Caminos de El Espinar.*** Ayuntamiento de El Espinar (Segovia). 2ª ed. (Pág. 318).
--- González Rodríguez, R. (2018). **Informe. 8 al 11-XI-2018.** Informe inédito. 5 págs. + 14 fotos.
--- GREFA (Carlos Cuéllar Basterrechea y otros) (2018). **Detalle de trabajo para la captura de alimoche.** 9 págs.
--- Junta de Castilla y León (2019). **Memoria Anual del Parque Natural Hoces del río Riaza. Año 2018.** Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia. Memoria inédita. Enviada a los miembros del Patronato del Parque Natural. 97 págs.
--- Lafuente Aylagas, F. (2011). **Estudio de los parámetros demográficos del alimoche (*Neophron percnopterus*) en el suroeste de Soria.** Trabajo inédito. 53 págs.
--- Lafuente Aylagas, F. (2012). **Estudio de los parámetros demográficos del alimoche (*Neophron percnopterus*) en el suroeste de Soria.** Trabajo inédito. 46 págs.
--- Lafuente Aylagas, F. (2013). **Estudio de los parámetros demográficos del alimoche (*Neophron percnopterus*) en el suroeste de Soria.** Trabajo inédito. 40 págs.
--- Liarte de Blas, J.; y Ramos Sánchez, R. (2018). **Especies observadas en Montejo y sus alrededores. Jueves, 15 de noviembre de 2018.** Informe inédito. 4 págs.
--- López Hernangómez, A. (2018). **Información sobre ciertas parejas reproductoras de Alimoche (*Neophron percnopterus*) en el sur de Segovia, 2018.** Informe inédito. 3 págs.
--- López Hernangómez, A. (2018). **Apunte sobre la invernada reiterada del roquero solitario (*Monticola solitarius*) en el término segoviano de Valseca, 2018.** Informe inédito. 3 págs.
--- López-Pozuelo García, J. L. (2018). **Informe ampliado del censo de otoño en las Hoces del Riaza y alrededores. 10-11-XI-2018.** Informe inédito. 7 páginas.
--- Marinkovic, S.; y Karadzic, B. (2008). **Griffon Vulture.** Institute for Biological Research "Sinisa Stankovic". Belgrado. 76 págs.
--- Martínez Olivas, F. (2018). **Censo de vertebrados. Hoces del Riaza (Segovia). 2018.** Informe inédito. 5 páginas (10 y 11-11-18).
--- Parra Cuenca, X. (2018). **Aves de Moral. 2018**. Informe inédito. 17 págs., más fotos.
--- Parra Cuenca, X; y Gutiérrez Fernández, M. (2018). **Informe de observaciones complementarias al censo de otoño.** Informe inédito. 2 págs.
--- Prieto Martín, J. (2018). **Anexo al informe del censo de otoño 2018.** Informe inédito. (10 y 11-11-18).
--- Ramos Sánchez, R. (2006). **Parc de Diagonal Mar. Memoria de Fauna. Hoja Nº 3 (año 2005).** 22 págs. (Pp. 3, 22.)
--- Román Sancho, F.; Lobo Cueva, J. L.; y Fernández González, R. (2018). **Anuario Ornitológico de la provincia de Burgos. Volumen V.** Caja de Burgos. Aula de Medio Ambiente. Burgos. 300 págs.
--- Sáenz de Buruaga Tomillo, M. (coord.); y otros (2018). **Lobos. Población de Castilla y León. Situación en España.** Ed. Rimpego. 208 págs. (Pp. [70], 80, 82, [85], 87, [91], 101, 105, 108, 116, 118, 122-123, 128-129, 130-131, 134-135, [143], 157, [161], [162], 171).
--- SEO/BirdLife (2018). **Programas de Seguimiento de Avifauna y grupos de trabajo. 2017.** *SEO/BirdLife*. Madrid. 68 pp. (Págs. 20, 45, y 46.)
--- Varillas Suárez, B. (2018). **La estirpe de los libres. Altamira, Atapuerca, Olduvai, Homo sylvestris. De Darwin a Félix Rodríguez de la Fuente.** Ed. del autor. 572 págs. (Pp. 75-76 y otras).
--- WWF España (2005). **Refugio de Rapaces. Montejo de la Vega (Segovia). El Buen Plantador.** Folleto. 36 págs. (Texto: Luis Molina y María Melero de Blas. / Dibujos: Antonio Ojea y Mundo Azul / Juan Carlos Velasco.)
--- WWF España (2017). **Informe anual del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia). 2017.** 62 págs. (con los Anexos).
--- WWF España (2018). **Autopistas salvajes. Propuesta de WWF España para una Red Estratégica de Corredores Ecológicos entre espacios Red Natura 2000.** Estudio realizado en colaboración con MAVA y la Universidad Politécnica de Madrid (ETSI Montes, Forestal y del Medio Natural). 40 págs. y un mapa ("*Red Estratégica de Corredores Ecológicos*").

--- WWF España (2018). **La aplicación de los planes básicos de gestión y conservación del espacio protegido Red Natura 2000 "Hoces del río Riaza" (ZEPA y ZEC).** Presentado el 13-3-2019, en la reunión del Patronato del Parque Natural. 22 págs. (con 6 págs. de Anexos).
--- WWF España (2019). **Informe anual del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia). Datos del año 2018.** Informe presentado el 13-3-2019, en la reunión del Patronato del Parque Natural. 26 págs. (sin los Anexos).
--- WWF España y GREFA (2018). **Control biológico, conectividad y mejora ambiental en territorios agrícolas intensificados en el entorno del Refugio de Rapaces de Montejo.** (Citado en el Informe anterior).
--- Zuberogoitia, Í. & Martínez, J. E. (eds.) (2011). **Ecology and Conservation of European Forest-Dwelling Raptors.** Diputación Foral de Bizkaia (Vizcaya), Departamento de Agricultura. 408 págs.

Es justo agradecer, en lo que se refiere al seguimiento y la obtención de publicaciones (o grabaciones, o monografías) locales o regionales relacionadas con el Refugio, la magnífica ayuda recibida de Javier Alcalde Martín, José Antonio Benito Martín, Ángel Bocos García, José Manuel Boy Carmona, Miguel Briones Díez, Yolanda Calleja Corento, Javier Cano Sánchez, Honorio Iglesias García, Alfredo López Hernangómez, Jesús Moneo Gayubo, Raúl Navas Sanz, Lourdes Tiemblo Blázquez, y otras personas de las provincias de Burgos, Segovia o Soria. Debe destacarse asimismo la amable colaboración de Javier Alcalde Cuña, Manuel de Andrés Moreno, Damián Arguch Sánchez, José Luis Armendáriz Sanz, Javier Balset Izquierdo, Josefina Cabarga Gómez, Álvaro Camiña Cardenal, Javier Cano Sánchez, Jesús Cobo Anula, Colectivo Azálvaro, Dra. Mª Carmen Escribano Ródenas, Elías Gomis Martín, Raúl González Rodríguez, Anselmo Granado Sarabia, Violeta Granado Sarabia, Jesús Hernando Iglesias (guarda de WWF España en el Refugio), Xavier Martín Vilar, Félix Martínez Olivas, Dr. Juan Martos Quesada, Juan José Molina Pérez, Laura Moreno Ruiz, Juan Carlos del Olmo Castillejos, Francisco Javier Ortega Pinilla, Pablo Pérez García, Dr. Pedro Rodríguez Panizo, Antonio Ruiz Heredia, Pedro Torres Expósito, y un muy largo etcétera; y de entidades como Asociación Cultural "Monte Irago" (Astorga, León), WWF España (Adena), etc.

Remarcaremos del mismo modo la generosa ayuda, completamente desinteresada, de los autores de las fotografías que ilustran la presente Hoja Informativa (y las anteriores).

Sería preciso agradecer, también, la colaboración absolutamente altruista y el interés por el Refugio de mucha más gente; y pido disculpas a todos los que no he nombrado, por razones de espacio o por no recordar sus nombres en este momento. En el año 2018 recibí (y contesté) 1.167 **cartas o correos** relacionados con el Refugio de Rapaces de Montejo.

Las **Hojas Informativas Nº 48** y **Nº 49** (con 782 páginas, entre las dos) fueron incluidas, junto con otras informaciones sobre el Refugio, en la página web de Natur@licante (Naturalicante.com, diseñada por Raúl González Rodríguez, gracias a su amable colaboración).

Fueron mencionadas en emisoras de radio de toda España ("*Radio 5*"), de Segovia ("*Onda Cero*", "*Onda El Espinar*", "*Radio Segovia*", "*Radio Nacional de España*" en Segovia, "*Radio Sepúlveda*", y "*Radio Cuéllar*"), de Aranda de Duero ("*Cadena COPE*", y "*Radio Aranda*" [SER]), de Madrid ("*Es Radio*"), y de Castilla y León ("*Radio Nacional de España*" en Castilla y León); en la revista "*Argutorio*" (Nº 40, 2º semestre de 2018, págs. 96-99), en la revista "*Quercus*" (Nº 392, octubre de 2018, págs. 45-46), en los periódicos "*El Adelantado de Segovia*" (jueves 5-IV-2018, pág. 13; miércoles 16-5-2018, pág. 48; sábado 1-9-2018, pág. 15; domingo 13-1-2019, págs. 18-19), "*El Norte de Castilla*" (edición de Segovia; miércoles 21-XI-2018, pág. 9; domingo 13-1-2019, pág. 10), y "*El Nordeste de Segovia*" (Nº 212, X-2018, pág. 4); en los periódicos digitales "*Segovia al Día*" (viernes 16-XI-2018), y "*Segovia Directo*" (martes 15-V-2018); en páginas web ("*Radio Aranda*", 29-5-2018; "*Radio Segovia*", 16-5-2018; "*SEO-Barcelona*", 14-1-1990; "*Turismo de Segovia*", 17-5-2018); en la revista digital "*Ambiente y Medio*" (Nº 7, 2019, págs. 17-18), en las *Circulares Informativas Nº 21 y Nº 22 del Fondo para el Refugio de las Hoces del Riaza*; en el *Informe final del censo de otoño de 2018*; en el blog de *Elías Gomis*; en distintos foros de Internet ("*Grupos Naturalistas de Castilla y León*", "*Montejanos*" [y también en *Facebook*], "*Raptor Conservation*", "*SEO Guadarrama*", y "*Vulture Conservation*"); en la página web de Radio Segovia; en el boletín de novedades de la Tienda Verde; en el Informe de WWF España, sobre el Refugio, correspondiente a 2018; y en otros medios.

Todas las Hojas Informativas que faltaban fueron puestas también en Naturalicante (www.naturalicante.com), gracias a la gran labor desinteresada de Juan Luis Galindo Estévez y Raúl González Rodríguez.

En la revista "*Quercus*" (Nº 392, octubre de 2018, págs. 45-46), se indica:
"**Hojas Informativas del Refugio de Montejo**
Gracias a la labor de Fidel José Fernández, ya están disponibles dos nuevas Hojas Informativas sobre el Refugio de Rapaces de Montejo (números 48 y 49). Esta publicación, que en 2018 ha cumplido cuarenta años, es la crónica naturalista más longeva y exhaustiva dedicada a un espacio natural de la que tengamos noticias. Suman entre ambas casi ochocientas páginas dedicadas a recopilar las novedades más interesantes sobre la biodiversidad del carismático cañón calizo del noreste de la provincia de Segovia, hoy en día protegido en parte por el Parque Natural de las Hoces del río Riaza. Más información y descargas, en www.naturalicante.com/mochila/Montejo/montejo.htm."

Ha habido en torno al Refugio otras muchas novedades, pero su enumeración sería muy larga. Parte de ellas han sido mencionadas en la *Prensa*, sobre todo en la de Segovia y Burgos (véase la anterior selección de artículos).

Vuelos militares o de hidroaviones, o vuelos bajos de otras aeronaves.- Sobre el problema de los vuelos militares (o de hidroaviones, en los cinco últimos años) en la zona, los informes y las actuaciones realizadas y los logros conseguidos, véase lo indicado en las **Hojas Informativas Nº 20** (págs. 5-6), **Nº 21** (pág. 4), **Nº 24** (pág. 28), **Nº 31** (pág. 183), **Nº 33** (pág. 173), **Nº 37** (págs. 348-349), **Nº 38** (pág. 423), **Nº 40** (págs. 481-482), **Nº 42** (pág. 205), N**º 44** (pág. 192), **Nº 46** (pág. 183), y **Nº 48** (pág. 193).

Pueden añadirse algunos datos posteriores.-

Año 2018.-

I) Anotaciones de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, salvo aquellas en que se indique otro autor).-
--- El miércoles 23 de mayo, a las 11 h. 44 m., un helicóptero A109, volando sobre el cañón. (José Luis López-Pozuelo García).
--- El sábado 26 de mayo, a las 10 h. 19 m., cinco helicópteros (azules, y con banda naranja inclinada) vuelan de norte a sur, sobre el cañón, de La Raya al páramo del sureste.
--- El viernes 8 de junio, a las 9 h. 39 m., con lluvia, se oye ruido de avión, sobre el Tercer Cañón / Segundo Cañón.
--- El sábado 14 de julio, a las 13 h. 5 m., una avioneta coloreada, de alas relativamente cortas, vuela sobre la zona de la presa.

Sobre los **parques eólicos** cercanos al Refugio, incluido el de "*Piedras del Alto*" (en la serrezuela de Pradales), y sobre algunos proyectos cercanos, véase lo indicado en las **Hojas Informativas Nº 29** (págs. 96-97), **Nº 31** (págs. 114, 170), y **Nº 33** (págs. 448, 451, 150, 448), y **Nº 37** (pág. 349). En esta última se incluye una relación de animales salvajes muertos bajo esos parques, según los datos que conocemos.

En lo relativo al grave **incendio** que se originó el 6 de agosto de 2008, véanse las informaciones y referencias aparecidas en las **Hojas Informativas Nº 32** (páginas 243-245), **Nº 33** (pág. 449), **Nº 34** (pág. 446), y **Nº 37** (pág. 250).

Merece mencionarse el importante vídeo producido por la Asociación Cultural "La Tejera" de Honrubia de la Cuesta, junto con ARBA (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono), titulado "Honrubia de la Cuesta, diez años después del incendio", que puede verse en:
https://youtu.be/DJ_DNIWobhY

(Información amablemente proporcionada por Fernando Ávila Vico y otros.)

Un nuevo artículo sobre el tema es el siguiente:
--- El Nordeste de Segovia (2018). **Honrubia de la Cuesta recuerda el trágico incendio que obligó a evacuar el pueblo hace diez años. / Villaverde de Montejo se mueve.** *El Nordeste de Segovia*, Nº 211, septiembre de 2018, pág. 28. (Con dos fotografías).

Sobre otros problemas actuales y amenazas futuras en la comarca, véase lo indicado en las **Hojas Informativas Nº 29** (págs. 97-98), **Nº 34** (págs. 446-447), **Nº 36** (págs. 346-353), y **Nº 37** (págs. 349-350, y 352-353).

Durante las vacaciones de Jesús Hernando Iglesias, los guardas suplentes de WWF/Adena fueron, en los diecisiete años anteriores, Juan José Molina Pérez (en 2001 y 2002), Pilar Martín Miguel (en 2003), Pablo Sanz Trillo (en 2004), David Muñoz González (en 2005), Iván García Izquierdo (en 2006), Miriam Domingo García (en 2007, 2008, 2009, y 2010), Wilmer Rivera Ramos (en 2011 y 2012), y Héctor Osvaldo Rivera (en 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, y 2018).

En años precedentes, otros guardas estivales, de WWF, fueron Francisco López Laguna (1989), Mª Begoña Olaso Bilbao (1990), Mar Salinas Aguilera (1990 y 1991), etc.

Recordaremos asimismo que, como se indicó en la **Hoja Informativa Nº 27** (pág. 85) y posteriores, las poesías "*El páramo*" y "*El buitre*", así como los artículos sobre "*Algunos descubrimientos zoológicos recientes*" (cuatro partes), y "*Comentarios sobre la desaparición de la fauna y su conservación*", fueron publicados en la revista "***Argutorio***", editada por la Asociación Cultural "*Monte Irago*" (apartado de correos nº 50; 24700-Astorga, León). Los referidos artículos pueden verse también en **Naturalicante** (www.naturalicante.com), gracias a la amabilidad de Raúl González Rodríguez y Elías Gomis Martín; y las citadas poesías, y el último artículo citado, aparecen asimismo en nuestro libro colectivo "**Guardianes del Refugio**" (ed. José Luis Nava Rueda, Universa Terra ediciones, Salamanca, 291 páginas).

A propósito del **I Encuentro Nacional sobre Manejo de Rapaces Necrófagas y Gestión de Muladares** (Caravaca de la Cruz, Murcia, 4 al 6 de abril de 2008; organizado por la Asociación CARALLUMA), véase lo indicado en la **Hoja Informativa Nº 32** (págs. 242, apartado 11, y 321). Las importantes conclusiones de este Congreso, aparecidas en el blog de Caralluma, se incluyen también (en español, inglés y francés) en el Anexo VII de la Hoja Informativa Nº 32 (págs. 350-356).

(Las conclusiones fueron amablemente traducidas al inglés por Claire Graham, y al francés por Michel Terrasse).

Con respecto a las "***Jornadas sobre Buitres***" (Ávila, julio de 2001), a las "***Jornadas sobre Buitres II***" (Barbastro, Huesca, julio de 2004), y a las "***Jornadas sobre Buitres III***" (Plasencia, Cáceres, julio de 2007), véase lo indicado en las **Hojas Informativas Nº 25** (págs. 53-55 y 68), **Nº 27** (págs. 97-103), **Nº 29** (pág. 99), y **Nº 31** (págs. 115-125). Las conclusiones de las III Jornadas se incluyen también (en español y en inglés) en el Anexo VI de la **Hoja Informativa Nº 32** (págs. 344-349).

(Las conclusiones fueron amablemente traducidas al inglés por Claire Graham).

Hasta la fecha, las "*Jornadas sobre Buitres (III)*" han sido citadas, de alguna forma, al menos en 165 (168-3) artículos o notas publicados en periódicos o revistas (desde revistas científicas o especializadas, nacionales o extranjeras, hasta la Prensa nacional o regional; y varias veces dedicándoles páginas enteras –o casi enteras-); en 110 programas de radio y cinco de televisión; en 143 páginas web o

diarios digitales o foros o blogs de Internet; en tres libros; y en una Tesis Doctoral. Se obtiene así un total de 427 “impactos”.

Por otro lado, el comunicado conjunto “**No se puede seguir así**”, suscrito por 38 asociaciones, y traducido al francés por Françoise y Émilie Délepoulle, puede verse en la **Hoja Informativa Nº 38** (págs. 372-374).

Notas.- 1) Recordamos que Juan José Molina Pérez, encargado de la zona IBA (Área Importante para las Aves en Europa) del Refugio de Montejo de la Vega / Hoces del río Riaza, propuso (en diciembre de 2009) dos importantes ampliaciones de dicha zona, en la nueva revisión del inventario organizada por SEO/BirdLife.

2) Como se señaló en la **Hoja Informativa Nº 31** (pág. 156), bastantes datos sobre los buitres leonados de la zona (y también de toda la Comunidad) aparecieron, citando las referencias correspondientes, incluyendo una foto de las hoces del Riaza, e indicando que “*la población del Refugio de Rapaces de Montejo (Segovia)*” es “*sin duda una de las mejor estudiadas del mundo*”, en el siguiente libro:
--- Sanz-Zuasti, J.; y Velasco Tejada, T. (2005). **Guía de las Aves de Castilla y León. Nueva edición revisada y ampliada.** (Fotografía: Carlos Sánchez). Náyade Editorial. Medina del Campo (Valladolid). 408 págs.

NOTA

Entre el 15 de mayo y el 15 de junio de 2018, el Centro Cultural San José del Ayuntamiento de Segovia acogió la exposición “Donde los buitres encontraron Refugio”, sobre la historia del Refugio de Rapaces; exposición organizada por Juan José Molina Pérez, Vicepresidente del Fondo para el Refugio, y producida por dicha entidad; con la colaboración del mencionado Centro Cultural y del Ayuntamiento de Segovia, de la Casa de las Ciencias de Logroño (donde la exposición estuvo en 2015, entre el 8 de septiembre y el 8 de diciembre), del Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid (donde la exposición estuvo en 2016, entre el 30 de septiembre y el 12 de diciembre), de la Casa de la Cultura de Aranda de Duero (donde la exposición estuvo en 2017, entre el 19 de julio y el 31 de agosto), del Ayuntamiento de Montejo de la Vega (en cuyo salón de actos la exposición estuvo entre el 4 y el 14 de noviembre de 2017), de WWF España, y del Parque Natural. Posteriormente, entre el 21 y el 29 de agosto de 2018, la exposición volvió al salón de actos del Ayuntamiento de Montejo de la Vega, gracias a la colaboración de dicho Ayuntamiento.

En Segovia, la exposición estuvo acompañada de las charlas impartidas por Juan José Molina Pérez (el 1 de junio, titulada “**Historia humana del Refugio de Rapaces de Montejo**”), y por Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo (el 13 de junio, titulada “**44 años censando y defendiendo el Refugio de los buitres**”).

La exposición sobre el Refugio, en el Centro Cultural San José del Ayuntamietno de Segovia, fue mencionada en “*El Adelantado de Segovia*” (miércoles 16-5-2018, pág. 48; viernes 1-6-2018, pág. 50; sábado 2-6-2018, pág. 42; martes 12-6-2018, pág. 42; miércoles 13-6-2018, pág. 42; martes 21-8-2018, pág. 14; sábado 1-9-2018, pág. 15: domingo 13-1-2019, págs. 18-19), “*El Norte de Castilla*” de Segovia (domingo 13-5-2018, pág. 13; miércoles 16-5-2018, pág. 6), “*El Nordeste de Segovia*” (Nº 211, septiembre de 2018, pág. 29; Nº 212, octubre de 2018, pág. 4), la televisión de Segovia (“*La 8*”, en el Informativo, el martes 15-5-2018), la radio (“*Onda El Espinar*”, en el programa “*El Mirador de los Buitres*”, el miércoles 13-6-18; “*Onda Cero*” de Segovia, en el programa “*Segovia en la onda*”, el jueves 12-7-2018), páginas web o similares (“*Naturalicante*”, 13-6-2018, 22-8-2018; “*Radio Segovia*”, 16-5-2018; “*Segovia.a1clik*”, 12-6-2018; “*Turismo de Segovia*”, 17-5-2018), diarios digitales o similares (“*Segovia Audaz*”, 15-5-2018; “*Segovia Directo*”, 15-5-2018, con una fotografía), distintos foros de Internet (“*Avesforum*”, 18-5-2018, 20-8-2018; “*SEO-Guadarrama*”, 18-5-2018; “*Montejanos*”, 18-5-2018, 11-6-2018, 17-7-2018; “*Grupos Naturalistas de Castilla y León*”, 18-5-2018, 17-8-2018, “*Raptor Conservation*”, 17-8-2018), distintos sitios de *Facebook* (“*Juanjo Molina*”, 12-5-2018, “*Montejanos*”, 11-6-2018, “*RevistaQuercus*”, 14-5-2018), *Twiter* (“Ayuntamiento Segovia”, 15-5-2018), etc.

También apareció en la Circular Informativa Nº 21 del Fondo para el Refugio (marzo de 2019), donde pueden verse los artículos de Juan José Molina Pérez titulados "**El Refugio de Rapaces de Montejo acerca sus 40 (43) años de historia a Segovia**" (pág. 3-5), y "**La exposición sobre el Refugio, de nuevo en Montejo**" (págs. 6-8). Y en la Circular Informativa Nº 22 del Fondo (pág. 20), donde puede verse la nota "**Nuevas charlas relacionadas con el Refugio**" (pág. 20), y el artículo "**Hoces del Riaza: el Refugio de Rapaces cumple 44 años**" (págs. 3-10), de Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo, que también fue publicado en todos los demás medios que allí se indican.

La exposición en Segovia y en Montejo apareció asismismo en:

--- Junta de Castilla y León (2019). **Memoria Anual del Parque Natural Hoces del río Riaza. Año 2018.** Consejería de Fomento y Medio Ambiente. Servicio Territorial de Medio Ambiente de Segovia. Memoria inédita. Enviada a los miembros del Patronato del Parque Natural. 97 págs. (Págs. 59-60).

--- WWF España (2019). **Informe anual del Refugio de Rapaces de Montejo de la Vega (Segovia). Datos del año 2018.** Informe presentado el 13-3-2019, en la reunión del Patronato del Parque Natural. 26 págs. (sin los Anexos). (Pág. 19).

Anexo fotográfico

(Agradecemos, a todos los autores de las fotos, su colaboración desinteresada).



Buitre leonado, sobre el comedero del Refugio de Montejo. (Fotografía: Jesús Cobo Anula. 31-7-2018.)



Alimoche adulto (izquierda y centro) y joven del tercer año (derecha), con buitres leonados, en el comedero del Refugio de Montejo. (Fotografías: Jesús Cobo Anula, de WWF España. 16-7-2018).



Calandria en Montejo, en la estepa cerealista del norte. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 1 de abril de 2018.)



Amanecer al oeste de Valdecasuar. (Foto: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 6 de mayo de 2018.)



Calandria, en Montejo de la Vega. (Fotografía: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España. 16 de abril de 2018.)



El hábitat de la alondra ricotí, en el norte de Segovia. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 21 de agosto de 2018.)



Terrera común, en Moral de Hornuez. (Fotografías: Xavier Parra Cuenca. 12 de agosto de 2018.)



Cogujada común, en la estación de Maderuelo. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 30 de marzo de 2018.)



Cogujada común, en las hoces del Riaza. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 6 de junio de 2018.)



Cogujada común, en Campo de San Pedro. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 9 de agosto de 2018.)



Cogujada común, en el Refugio de Montejo. (Fotografía: Elías Gomis Martín. 10/11-XI-2018.)



Cogujada montesina, cerca de Moral de Hornuez. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 27 de marzo de 2018.)



Cogujada montesina con ceba, en Moral de Hornuez. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 12 de agosto de 2018.)



Totovía, en Moral de Hornuez. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 15 de agosto de 2018.)



Vista parcial de Peña Rubia, al amanecer. (Fotografía: Elías Gomis Martín. 11 de noviembre de 2018.)



Alondra común en vuelo de canto, en Valdebejón izquierda. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 1-4-2018.)



Alondra, en Campo de San Pedro. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 9 de agosto de 2018.)



Avión roquero, cerca de Montejo. (Fotografías: Xavier Parra Cuenca. 31 de marzo de 2018.)



Avión roquero, en Montejo de la Vega. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 10 de septiembre de 2018.)



Vista parcial de La Hocecilla. (Fotografía: Juan Miguel Velasco de Miguel. 11 de noviembre de 2018.)



Golondrinas comunes, en Montejo de la Vega. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 31 de marzo de 2018.)



Golondrina común, en Moral de Hornuez. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 11 de agosto de 2018.)



Golondrina dáurica, junto al puente de Alconadilla. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 9-9-2018.)



Avión común, junto al embalse de Linares. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 9 de agosto de 2018.)



Aviones comunes, y nidos de la especie, en Valdevacas de Montejo. (Fotografías: Juan Francisco Martín Calleja. 5 de julio de 2018.)



Paisaje desde la Vega de El Casuar. (Fotografía: Raúl González Rodríguez. 8 de noviembre de 2018.)



Bisbita campestre, en Moral de Hornuez. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 15 de agosto de 2018.)



Páramos con sabinas en el suroeste de Soria. (Fotografía: Fernando Ávila Vico. 15-9-2018.)



Bisbita arbóreo en Montejo de la Vega, junto al puente. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 1-4-2018.)



Bisbita arbóreo en Montejo de la Vega, en La Pisadera. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 10-9-2018.)



Bisbita pratense, cerca de la estación de Maderuelo. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 30 de marzo de 2018.)



Páramos altos de Pardebueyes. (Foto: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 16 de mayo de 2018.)



Lavandera boyera ibérica macho, en el Refugio de Montejo. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 10 de mayo de 2018.)



Lavandera boyera, junto al puente de Alconadilla. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 10 de agosto de 2018.)



Lavandera boyera, en Riaguas de San Bartolomé. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 14 de agosto de 2018.)



Lavandera cascadeña, en la fuente de La Pisadera. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 19 de agosto de 2018.)



Lavandera blanca, al parecer macho, en el comedero de buitres del Refugio de Montejo. (Fotografía: Juan José Molina Pérez. 14 de mayo de 2018.)



Cascada en el río Aguisejo, cerca de Santibáñez de Ayllón. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 17 de septiembre de 2018.)



Lavandera blanca junto al río, en Montejo. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 1 de abril de 2018.)



Lavandera blanca en el comedero de buitres del Refugio. (Fotografía: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España. 3 de abril de 2018.)



Acentor común, en Moral de Hornuez. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 27 de marzo de 2018.)



Sabinar cerca del Tercer Cañón. (Foto: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 8 de mayo de 2018.)



Petirrojo, en los huertos de Moral de Hornuez. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 30 de marzo de 2018.



Petirrojo en el soto de Valdeherreros (Milagros, Burgos). (Fotografía: Mario Liarte Lozano. 28 de diciembre de 2018.)



Ruiseñor común, junto al puente de Alconadilla. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 9 de septiembre de 2018.)



Paisaje desde La Hocecilla. (Fotografía: Juan Miguel Velasco de Miguel. 11 de noviembre de 2018.)



Pechiazul, junto al puente de Alconadilla. (**F**otografía: Xavier Parra Cuenca. 9 de septiembre de 2018.)





Coliazul cejiblanco, en el pinar de Valdevacas de Montejo. (Fotografías: Xavier Parra Cuenca. 10 de noviembre de 2018.)





Colirrojos tizones macho (arriba) y hembra (abajo), en los huertos de Moral de Hornuez. (Fotografías: Xavier Parra Cuenca. 27 y 31 de marzo de 2018, respectivamente.)



Colirrojo real hembra, junto al embalse de Linares. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 9-8-2018.)



Colirrojo real macho, junto a la carretera de la coronación. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 10-9-2018.)





Tarabilla común macho, en las hoces del Riaza. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 10 de mayo de 2018.)





Tarabilla común macho, en el Refugio de Montejo. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 6 de junio de 2018.)



Tarabilla común hembra, cerca del camino de Pardilla. (Fotografía: Juan José Mol**i**na Pérez. 5 de abril de 2018.)



Tarabilla común hembra, en los páramos del sureste. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 23 de mayo de 2018.)





Tarabilla común macho, en la estación de Maderuelo. (Fotografías: Xavier Parra Cuenca. 30-3-2018.)



Tarabilla común macho, con el obispillo blanco, en la fuente de la Pisadera (Montejo). (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 1 de abril de 2018.)



Tarabilla común macho, en el Refugio de Montejo. (Foto: Elías Gomis Martín. 10/11-XI-2018.)



Tarabilla norteña, junto al puente de Alconadilla. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 8 de septiembre de 2018.)



Collalba gris macho, en la estepa cerealista del norte del Refugio. (Fotografia: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España. 30 de abril de 2018.)





Collalba gris macho, en las hoces del Riaza. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 10 de mayo de 2018.)



Collalba gris macho, junto al puente de Alconadilla. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 18 de agosto de 2018.)



Collalba gris hembra, en Maderuelo. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 9 de agosto de 2018.)





Collalba rubia macho de la forma gorginegra, en el Refugio de Montejo. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 10 de mayo de 2018.)





Collalba rubia macho de la forma gorginegra, "*preciosa*", en el Refugio de Montejo. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 10 de mayo de 2018.)





Collalba rubia macho de la forma gorginegra, en el Refugio de Montejo. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 10 de mayo de 2018.)





Collalba rubia macho de la forma gorginegra, en el Refugio de Montejo. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 10 de mayo de 2018.)





Collalba rubia macho (arriba) y hembra (abajo), en el Refugio de Montejo. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 10 de mayo de 2018.)



Collalba rubia macho, en el Refugio de Montejo. (Foto: Luis Sitges Aparicio. 10 de junio de 2018.)



Collalba rubia hembra, en Villaverde de Montejo. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 11 de agosto de 2018.)



Collalba rubia macho de la forma gorgiblanca, en Villaverde de Montejo. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 10 de septiembre de 2018.)



Roquero rojo, en el barranco de Pardebueyes. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 18 de agosto de 2018.)



Dos machos de roquero solitario cantando juntos en el barranco de la Retuerta. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 31 de marzo de 2018.)



Roquero solitario macho en la roca del Castillo (Montejo). (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 1-4-2018.)



Roquero solitario en La Hocecilla. (Fotografía: Marina Arévalo de la Plaza. 25 de marzo de 2016.)



En el Refugio de Rapaces. (Fotografía: Martín Francisco Arévalo Sánchez. 30 de marzo de 2018.)





Roqueros solitarios, en los farallones de D.E.L.C. / S.D. (Fotografías: Luisa Fragua Domínguez. 28 de abril de 2018.)





Roquero solitario macho, cerca del aparcamiento de D.E.L.C. (Fotografías: Luisa Fragua Domínguez. 28 de abril de 2018.)



Roquero solitario, en el Refugio de la CHD. (Fotografía: Luisa Fragua Domínguez. 28 de abril de 2018.)



Roquero solitario macho, en las hoces del Riaza. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 10 de mayo de 2018.)



Roquero solitario macho, en El Molino de Torraño (Soria). (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 22 de abril de 2018.)



Mirlo común macho, en los huertos de Moral de Hornuez. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 31 de marzo de 2018.)





Mirlos capiblancos macho y hembra, en La Hoz (Moral de Hornuez). (Fotografías: Xavier Parra Cuenca. 1 de abril de 2018.)





Zorzal común, en Montejo de la Vega, junto al río. (Fotografías: Xavier Parra Cuenca. 1 de abril de 2018.)



Ruiseñor bastardo, junto al río Riaza, en Montejo de la Vega. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 1-4-18.)



Carricero común, junto al puente de Alconadilla. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 8-9-2018.)





Zarcero común o políglota, en las hoces del Riaza. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 10 de mayo de 2018.)



Zarcero común o políglota, en las hoces del Riaza. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 10 de mayo de 2018.)



El Reguero de los Pozos. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 12 de mayo de 2018.)



Zarcero común, en Maderuelo. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 9 de agosto de 2018.)



Zarcero común, junto al puente de Alconadilla. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 8 de septiembre de 2018.)





Curruca rabilarga macho, en el Refugio de Montejo. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 10 de mayo de 2018.)



Curruca rabilarga macho, en la estación de Maderuelo. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 30-3-2018.)



El Reguero de los Pozos. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 12-5-2018.)



Curruca tomillera, en el Refugio de Montejo. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 6 de junio de 2018.)



Curruca carrasqueña joven, en El Guancho (Villaverde de Montejo). (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 10 de agosto de 2018.)





Curruca tomillera, en Moral de Hornuez. (Fotografías: Xavier Parra Cuenca. 12 de agosto de 2018.)



Curruca mirlona, en Moral de Hornuez. (Fotografías: Xavier Parra Cuenca. 12 de agosto de 2018.)





Curruca mirlona macho, en el Refugio de Montejo. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 10 de mayo de 2018.)





Curruca zarcera macho, en el Refugio de Montejo. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 10 de mayo de 2018.)





Curruca zarcera macho, en el Refugio de Montejo. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 10 de mayo de 2018.)



Curruca zarcera, en Moral de Hornuez. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 12 de agosto de 2018.)



Curruca zarcera, cerca de Fuentemizarra. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 15 de agosto de 2018.)



Curruca capirotada macho, en los huertos de Moral de Hornuez. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 30 de marzo de 2018.)



"*El otoño inunda de colores el paisaje.*" (Texto y foto: Elías Gomis Martín. Censo de otoño de 2018.)





Mosquitero papialbo, en el Refugio de Montejo. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 6 de junio de 2018.)



Mosquitero común en los huertos de Moral. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 27 de marzo de 2018.)



Mosquitero común, en Aldealengua. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 1 de abril de 2018.)



Mosquitero ibérico junto al puente de Alconadilla. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 8-9-2018.)



Campos de amapolas, en las hoces del Riaza. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 6 de junio de 2018.)



Mosquitero musical junto al puente de Alconadilla. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 30 de marzo de 2018.)



Mosquitero musical, en la orilla del embalse. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 9 de agosto de 2018.)



Mosquitero musical, en Montejo de la Vega. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 10 de septiembre de 2018.)



Reyezuelo listado, en la Hoz de Moral de Hornuez. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 1 de abril de 2018.)



Papamoscas gris, en Moral de Hornuez. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 15 de agosto de 2018.)



Papamoscas gris, junto al puente de Alconadilla. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 9 de septiembre de 2018.)



Papamoscas cerrojillo, en Moral de Hornuez. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 9 de agosto de 2018.)



Papamoscas cerrojillo, junto a Peñalba. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 8 de septiembre de 2018.)



Mito haciendo un nido en la orilla del embalse. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 27 de marzo de 2018.)



Mito, junto a la fuente de La Pisadera. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 19 de agosto de 2018.)



Herrerillo capuchino, en Valdevacas de Montejo. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 15 de agosto de 2018.)



Carbonero garrapinos, en Valdevacas de Montejo. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 14 de agosto de 2018.)



Herrerillo común en los huertos de Moral de Hornuez. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 1 de abril de 2018.)



Carbonero común en los huertos de Moral. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 27 de marzo de 2018.)





Trepador azul, en Alconada de Maderuelo. (Fotografías: Xavier Parra Cuenca. 9 de septiembre de 2018.)



Agateador común en los huertos de Moral. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 30 de marzo de 2018.)



Agateador común, en Valdevacas de Montejo. (Fotografías: Xavier Parra Cuenca. 14 de agosto de 2018.)



Oropéndola hembra, en la orilla del embalse. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 9 de agosto de 2018.)



En el nacimiento del río Aguisejo, cerca de Grado del Pico. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 17 de septiembre de 2018.)





Alcaudón dorsirrojo macho, cerca del aparcamiento de la parte oeste del Refugio. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 6 de junio de 2018.)



Alcaudón dorsirrojo, en Moral de Hornuez. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 15 de agosto de 2018.)



Alcaudón real, en Moral de Hornuez. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 10 de septiembre de 2018.)





Alcaudón común en las hoces del Riaza. (Fotografías: Luis Sitges Aparicio. 10 de mayo de 2018.)



Alcaudón común, en el Refugio de Montejo. (Fotografía: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España. 18 de mayo de 2018.)



Alcaudón común, en el barranco de Pardebueyes. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 18 de agosto de 2018.)



Alcaudón común, en Maderuelo. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 19 de agosto de 2018.)



Alcaudón común joven, en Maderuelo. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 11 de agosto de 2018.)



Alcaudón común joven, en Montejo de la Vega. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 10 de septiembre de 2018.)



Rabilargo joven, en Moral de Hornuez. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 12 de agosto de 2018.)



Rabilargo, entre Maderuelo y Campo de San Pedro. (Fotogrrafía: Xavier Martín Vilar. 11-XI-2018.)



Urraca. (Fotografía: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio de Montejo. 9 de febrero de 2018.)



Urraca joven, en Moral de Hornuez. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 12 de agosto de 2018.)



Chova piquirroja en Montejo de la Vega. **(**Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 31 de marzo de 2018.)



Chova piquirroja en Montejo de la Vega. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 1 de abril de 2018.)



Chova piquirroja, en el Refugio de Montejo. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 10 de mayo de 2018.)



Chovas piquirrojas y grajillas, en la estepa norte del Refugio. (Fotografía: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España. 27 de febrero de 2018.)



Chovas piquirrojas, en Maderuelo. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 9 de agosto de 2018.)



Dos chovas cerca del viaducto (en m.d.). (Foto: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 25-5-2018.)



Chova transportando material. Refugio de la CHD. (Foto: Juan José Molina Pérez. 10-III-2019.)





Chova transportando material. Refugio de la CHD. (Fotos: Juan José Molina Pérez. 10-III-2019.)





Grajilla, en el comedero de buitres del Refugio de Rapaces de Montejo. (Fotografías: Juan José Molina Pérez. 3 de abril de 2018 –foto de arriba-, y 14 de mayo de 2018 –foto de abajo-.)





Grajillas con buitres leonados, en el comedero del Refugio de Montejo. (Fotografías: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España. 8 de febrero de 2018.)



Grajilla, en el comedero de buitres del Refugio de Montejo. (Fotografía: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España. 3 de abril de 2018.)



Grajilla, en el comedero de buitres del Refugio de Montejo. (Fotografía: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España. 18 de abril de 2018.)





Grajilla, en el comedero de buitres del Refugio de Montejo. (Fotografías: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España. 18 de abril de 2018.)





Grajilla, en el comedero de buitres del Refugio de Montejo. (Fotografías: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España. 18 de abril de 2018.)





Grajillas, en el comedero de buitres del Refugio de Montejo. (Fotografías: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España. 5 de junio de 2018.**)**





Bandada de al menos 107 grajillas, entre Montejo de la Vega y Villalvilla de Montejo. (Fotografías: Juan José Fuentenebro Martín. 11 de noviembre de 2018.)



Corneja negra, junto a la estación de Maderuelo. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 30 de marzo de 2018.)



Corneja negra, en el Refugio de Montejo. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 10 de mayo de 2018.)



Cornejas jóvenes, en Valdeherreros. (Fotografía: Juan José Molina Pérez. 11 de julio de 2018.)



Oveja con cordero. (Fotografía: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio de Montejo. 18 de abril de 2018.)



Cuervo, en Montejo de la Vega. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 1 de abril de 2018.)



Cuervo, en Peñalba. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 19 de agosto de 2018.)



Seis cuervos y un buitre leonado, en Peña Rubia. (Fotografía: Elías Gomis Martín. 11-XI-2018.)



Estornino negro, en Riaguas de San Bartolomé. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 27 de marzo de 2018.)



Estorninos negros en el comedero de buitres del Refugio. (Foto: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España. 8 de febrero de 2018.)



Estornino negro, en la ribera del río Riaza, en Milagros. (Fotografía: Juan José Molina Pérez. 22 de abril de 2018.)



Gorriones comunes, en el suroeste del Refugio de Montejo. (Fotografía: Elías Gomis Martín. 11 de noviembre de 2018.)



(Fotografía: Raúl González Rodríguez. 10/11 de noviembre de 2018.)



Gorrión moruno macho, cerca de la estación de Maderuelo. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 30-3-2018.)



Gorrión moruno macho con ceba, en Maderuelo. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 9 de agosto de 2018.)



Gorrión molinero en Montejo, junto al puente. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 1 de abril de 2018.)



Gorrión chillón, en Villaverde de Montejo. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 1 de abril de 2018.)



Pinzón vulgar macho, en Montejo de la Vega. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 31 de marzo de 2018.)



Pinzón vulgar, en La Pisadera (Montejo). (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 1 de abril de 2018.)



Pinzón vulgar macho, en el comedero de buitres del Refugio de Montejo. (Fotografía: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España. 3 de abril de 2018.)



Verdecillo junto al embalse, cerca de la isla. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 30 de marzo de 2018.)



Verderón común en La Pisadera (Montejo). (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 1 de abril de 2018.)



Jilgueros, en los huertos de Moral de Hornuez. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 27 de marzo de 2018.)



Jilguero, en el Refugio de Montejo. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 6 de junio de 2018.)



Pardillo macho, en el Refugio de Montejo. **(**Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 10 de mayo de 2018.)



Pardillo macho, en Valdebejón. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 1 de abril de 2018.)



Pardillos, en Riaguas de San Bartolomé. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 27 de marzo de 2018.)



Picogordo, en los huertos de Moral de Hornuez. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 30 de marzo de 2018.)



Escribano soteño macho, en los huertos de Moral. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 27 de marzo de 2018.)



Escribano soteño macho, en la ribera del Riaza, en Milagros. (Foto: Juan José Molina Pérez. 22-4- 18.)



Escribano montesino, en el coto de Campo de San Pedro. (Foto: Xavier Parra Cuenca. 30-3-2018.)



Escribano montesino, en el Refugio de Montejo. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 6 de junio de 2018.)



Escribano montesino macho, en Villaverde de Montejo. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 11 de agosto de 2018.)





Escribano hortelano en El Guancho, en Villaverde de Montejo. (Fotografías: Xavier Parra Cuenca. 10 de agosto de 2018.)



Escribano hortelano macho, en el Refugio de Montejo. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 10 de mayo de 2018.)



Triguero cerca de Fuentemizarra. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 30 de marzo de 2018.)



Triguero, en Moral de Hornuez. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 17 de agosto de 2018.)



Triguero, en las hoces del Riaza. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 10 de mayo de 2018.)



Triguero, en el Refugio de Montejo. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 6 de junio de 2018.)



Participantes en el último censo de otoño. (Fotografía: Raúl González Rodríguez. 10/11-XI-2018.)





Murciélago ratero muerto, en el Refugio de Montejo. (Fotografias: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 22 de julio de 2018.)





Rata campestre o negra atropellada, entre Fuentemizarra y Moral de Hornuez. (Fotografías: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 20 de mayo de 2018.)



Zorro en el Refugio de la CHD, cerca de la cantera. (Fotografía: Candelas Iglesias Aparicio, durante una ruta de naturaleza de Abubilla Ecoturismo. 2 de diciembre de 2018.)



(Fotografía: Raúl González Rodríguez. 8/9 de noviembre de 2018.)



Zorro, en el camino de Pardilla. (Fotografía: Juan José Molina Pérez, con Leo Molina Novo. 21-4-2018.)



Zona de Las Torres, cerca de Montejo. (Foto: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio. 19 de octubre de 2017.)



Zorro, en Maderuelo. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 19 de agosto de 2018.)



En la ladera de La Murcielaguera. (Fotografía: Raúl González Rodríguez. 8 de noviembre de 2018.)





Nutria, en el río Riaza y en el Refugio, junto a un puente del poblado del embalse. (Fotografías: Candelas Iglesias Aparicio, durante una ruta de naturaleza de Abubilla Ecoturismo. 21 de octubre de 2018.)



Excrementos de nutria, junto a una fuente cerca del poblado del embalse. (Fotografía: Francisco Jesús Fernández Herrera. 23 de febrero de 2019.)



(Fotografia: Sara Fernández Herrera. 23 de febrero de 2019.)





Gineta atropellada, en el sur de Burgos. (Fotografías: Santiago Sanz Rincón. 15 de junio de 2018.)





Gineta atropellada, en el sur de Burgos. (Fotografías: Santiago Sanz Rincón. 15 de junio de 2018.)





Santiago Sanz Rincón con la gineta atropellada que encontraron, entre Moradillo de Roa y Fuentenebro. (Fotografías: Adolfo Frías Fernández).



Cuatro jabalíes junto a la cta. Sg-945, cerca del desvío a la presa. (Fotografía: Juan José Molina Pérez. 7 de abril de 2018.)



Gran cama de jabalí en el fondo del barranco de Valtejo. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 15 de abril de 2018.)






Jabalíes, en la zona de Vallejo del Charco. (Fotografías: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio. 30 de abril de 2018.)



Jabalí, en Montejo de la Vega. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 19 de agosto de 2018.)



(Fotografía: Elías Gomis Martín. Censo de otoño de 2018.)



Corzos, en Corral de Ayllón. (Fotografía: Juan Luis Galindo Estévez. 30 de marzo de 2018.)



Corzos, en Cascajares. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 27 de marzo de 2018.)



Corzos, en la zona del camino de Pardilla. (Fotografía: Juan José Molina Pérez. 5 de abril de 2018.)



Corzo hembra, en el Refugio de Montejo. (Fotografía: Luis Sitges Aparicio. 10 de mayo de 2018.)





Corzos en el Pontón. (Fotografías: Juan José Molina Pérez. 11 de julio de 2018.)



Corzo hembra. (Fotografía: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF. 19 de diciembre de 2017.)



Corzo macho. (Fotografía: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF. 19 de febrero de 2018.)



Corzos. (Fotografía: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España. 30 de abril de 2018.)



Corzo macho. (Fotografía: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España. 30 de abril de 2018.)



Corzo. (Fotografía: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España. 21 de mayo de 2018.)



Corzos macho y hembra. (Fotografía: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España. 30 de mayo de 2018.)





Corzo hembra, en el Refugio de Montejo. (Fotografías: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España. 5 de junio de 2018.)



Corzo hembra, en el Refugio de Montejo. (Fotografía: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España. 5 de junio de 2018.)



Colmenas. (Fotografía: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España. 12 de **j**unio de 2018.)





Corzos, entre Hornuez y Valdevacas. (Fotografías: Raúl González Rodríguez. 9 de noviembre de 2018.)



Corzos, entre Hornuez y Valdevacas. (Fotografía: Raúl González Rodríguez. 9 de noviembre de 2018.)



Tres corzos, cerca de Fuentelcésped. (Fotografía: Elías Gomis Martín. 11 de noviembre de 2018.)



Corzos, en los páramos del sureste. (Fotografía: Xavier Martín Vilar. 10 de noviembre de 2018.)



Campos entre Maderuelo y Campo de San Pedro. (Fotografía: Xavier Martín Vilar. 11-XI-2018.)





Corzos, entre Hornuez y Valdevacas. (Fotografías: Raúl González Rodríguez. 9 de noviembre de 2018.)



Lagartija colilarga. Páramos del nordeste. (Foto: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 24-5-2018.)



Árbol junto a la cantera. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 24 de mayo de 2018.)



Lagarto ocelado. (Fotografía: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España. 2 de julio de 2018.)



Chopos en La Hocecilla. (Fotografía: Raúl González Rodríguez. 8 de noviembre de 2018.)



Lagartija ibérica (parda), macho joven, en la ermita de El Casuar. (Fotografía: Francisco Jesús Fernández Herrera. 23 de febrero de 2019.)



(Fotografía: Sara Fernández Herrera. 23 de febrero de 2019.)



Culebra de escalera en un árbol, en el monte de Cedillo de la Torre. (Fotografía: Pascual Mate Alonso. 19 de julio de 2018.)



El Reguero de los Pozos. (Fotografías: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 21 de mayo de 2018.)



Gallipato adulto, en una charca del suroeste de Soria. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. Noche del 27 al 28 de julio de 2018, día 28.)



La charca de Corral de Ayllón. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 17 de septiembre de 1018.)



Tritón jaspeado hembra, en Villaverde de Montejo. (Foto: Cándido de la Fuente de la Osada. 27-3-2018.)



En el barranco de San Andrés, con agua. (Foto: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 28-3-2018.)





Dos hembras adultas y 25 larvas de tritón jaspeado, en Valdevacas de Montejo (en el antiguo lavadero). (Fotografías: Jesús Cobo Anula, biólogo conservador del Refugio, de WWF España. 25 de junio de 2018.)



Sapillo pintojo, en el oeste del Refugio. (Fotografia: José Luis Romero Carayol. Noche del 9 al 10 de noviembre de 2018.)



Sapillo pintojo, en el oeste del Refugio. (Fotografia: Raúl González Rodríguez. Noche del 9 al 10 de noviembre de 2018.)



Sapillo pintojo, en el oeste del Refugio. (Foto: Raúl González Rodríguez. Noche del 9/ 10- XI- 2018.)




(Fotografia: Raúl González Rodríguez. Refugio de Montejo. 10/11 de noviembre de 2018.)



Renacuajo de sapo partero en un abrevadero de Milagros. (Fotografías: Mario Liarte Lozano. 11 de octubre de 2018.)



Renacuajos de sapo partero en un abrevadero de Milagros. (Fotografías: Mario Liarte Lozano. 11 de octubre de 2018.)



Renacuajos de sapo partero en un abrevadero de Milagros. (Fotografías: Mario Liarte Lozano. 11 de octubre de 2018.)



Sapo corredor, en el oeste del Refugio. (Fotografia: José Luis Romero Carayol. Noche del 9 al 10 de noviembre de 2018.)



Puesta de sapo corredor, entre Milagros y Montejo. (Fotografía: Juan José Molina Pérez. 7 de abril de 2018.)



Pequeño sapo corredor, en la zona del sur/sureste. (Fotografía: Xavier Martín Vilar. Noche del 10 al 11 de noviembre de 2018.)



Rana común, en una charca del suroeste de Soria. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 29 de julio de 2018.)





Restos de cangrejo, posiblemente dejados por una garza real, en el poyete de la carretera, bajo La Catedral. (Fotografías: Francisco Jesús Fernández Herrera [superior] y Sara Fernández Aguirre [inferior]. 23 de febrero de 2019.)



Cangrejo señal muerto en el río Pedro, en la zona del Molino de Torraño (Soria), encontrado durante una excursión del Fondo para el Refugio. (Fotografía: Jorge Andrés Remacha Lorenzo. 15 de septiembre de 2018.)



Escorpión, en el sabinar del norte del Refugio de Montejo. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 21 de agosto de 2018.)



Araña *Agelena labyrinthica*, en el barranco de Pardebueyes, en Villaverde de Montejo. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca).




Libélula *Aeshna mixta*, macho, junto al puente de Alconadilla. (Fotografía: Xavier Parra Cuenca. 8 de septiembre de 2018.)




Viborera (*Echium vulgare*), cerca del viaducto. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. Viaducto, 26 de mayo de 2018.) (Identificación realizada por José Manuel Boy Carmona).



Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España en el Refugio, frente a Peña Rubia. (Fotografías: Juan José Molina Pérez. 3 de abril de 2018.)





Izquierda.- (Fotografía: Raúl González Rodríguez. Refugio de la CHD. 9 de noviembre de 2018.)
Derecha.- Las dos cigüeñas blancas en el nido de Montejo de la Vega. (Fotografía: Pilar García San José. 24 de febrero de 2019.)





(Fotografías: Francisco Jesús Fernández Herrera. 23 de febrero de 2019.)



(Fotografía: Raúl González Rodríguez. Refugio de la CHD. 8/9 de noviembre de 2018.)




(Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 20 de mayo de 2018.)



Ornitólogos durante el último censo de otoño. (Fotografía: Elías Gomis Martín. Noviembre de 2018.)






Izquierda: En el sabinar de Hornuez. (Fotografía: Elías Gomis Martín. 10 de noviembre de 2018.)
Derecha: (Fotografía: Francisco Jesús Fernández Herrera. 23 de febrero de 2019.)







Vistas parciales de Peña Cuervo. (Fotografías: Jesús Hernando Iglesias, guarda de WWF España. 21 de febrero de 2018.)



En el Refugio de Rapaces de Montejo. (Fotografía: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 21 de mayo de 2018, 21 h. 4 m.)



La zona del viaducto. (Fotografía: Raúl González Rodríguez. 9 de noviembre de 2018.)



En el barranco de San Andrés. (Foto: Fidel José Fernández y Fernández-Arroyo. 28 de marzo de 2018.)



La zona del viaducto. (Fotografía: Raúl González Rodríguez. 9 de noviembre de 2018.)



(Fotografia: Sara Fernández Herrera. 23 de febrero de 2019.)



El puente de Maderuelo. (Fotografía: Elías Gomis Martín. 11 de noviembre de 2018.)



En el Refugio de la CHD. (Fotografía: Martín Francisco Arévalo Sánchez. 30 de marzo de 2018.)



(Fotografía: Francisco Jesús Fernández Herrera. 23 de febrero de 2019.)



Campos entre Maderuelo y Campo de San Pedro ap. (Foto: Xavier Martín Vilar. 11-XI-2018.)



Chopos junto a la Vega de El Casuar. (Fotografía: Raúl González Rodríguez. 8 de noviembre de 2018.)



El río Riaza, en el Refugio de la CHD**.** (Fotografía: Raúl González Rodríguez. 9-XI-2018.)




(Fotografía: Francisco Jesús Fernández Herrera. 23 de febrero de 2019.)



Campos entre Maderuelo y Campo de San Pedro ap. (Foto: Xavier Martín Vilar. 11-XI-2018.)



Chopos junto a la Vega de El Casuar. (Fotografía: Raúl González Rodríguez. 8 de noviembre de 2018.)



El río Riaza, en el Refugio de la CHD. (Fotografía: Raúl González Rodríguez. 9-XI-2018.)



(Fotografía: Francisco Jesús Fernández Herrera. 23 de febrero de 2019.)



Alimoches de distintas edades, buitres leonados, y buitre negro joven, en el comedero de buitres del Refugio. Abajo, un alimoche adulto tiene la anilla amarilla 3CC en la pata derecha, y tiene anilla de metal. (Fotografías: Carlos Cuéllar Basterrechea / GREFA, con WWF España. 21 de junio de 2018.)



Alimoches de distintas edades, buitres leonados, y buitre negro, en el comedero de buitres del Refugio. (Fotografías: Carlos Cuéllar Basterrechea / GREFA, con WWF España. 21 y 22 de junio de 2018 [las dos fotos de abajo, el día 22].)



Alimoches (buitres blancos) de distintas edades, buitres negros, y buitres leonados**,** en el comedero de buitres del Refugio. (Fotografías: Carlos Cuéllar Basterrechea / GREFA, con WWF España. 22 de junio de 2018.)



Alimoches (buitres blancos) de distintas edades, buitres negros de distintas edades, y buitres leonados, en el comedero de buitres del Refugio. (Fotografías: Carlos Cuéllar Basterrechea / GREFA, con WWF España. 22 de junio de 2018.)



Alimoches (buitres blancos) de distintas edades, buitres negros de distintas edades, y buitres leonados, en el comedero de buitres del Refugio. (Fotografías: Carlos Cuéllar Basterrechea / GREFA, con WWF España. 22 de junio de 2018 [cinco primeras fotos] y 23 de junio de 2018 [las cinco restantes].)





















Alimoches (buitres blancos) de distintas edades, buitres negros de distintas edades, buitres leonados, y un rabilargo (éste, en la última foto), en el comedero de buitres del Refugio. (Fotografías: Carlos Cuéllar Basterrechea / GREFA, con WWF España. 23 y 26 de junio de 2018 [el 26, la última foto].)



Alimoches (buitres blancos), buitres negros, buitres leonados, y un rabilargo, en el comedero de buitres del Refugio. (Fotografías: Carlos Cuéllar Basterrechea / GREFA, con WWF España. 26 de junio de 2018 [ocho primeras fotos], y poco después [las dos fotos restantes, con las fechas puestas cambiadas].)



Alimoches (en las fotos tercera a décima, un adulto con anillas 23M –derecha- y de metal), buitres negros, y buitres leonados, en el comedero de buitres del Refugio. (Fotografías: Carlos Cuéllar Basterrechea / GREFA, con WWF España. Verano de 2018 [las fechas puestas están cambiadas]).



Alimoches de distintas edades (en las fotos primera a sexta, y décima, un adulto con anillas 23M –derecha- y de metal; y en la foto tercera, un ejemplar más con anilla amarilla), buitres negros, y buitres leonados, en el comedero de buitres del Refugio. (Fotografías: Carlos Cuéllar Basterrechea / GREFA, con WWF España. Verano de 2018 [las fechas puestas están cambiadas]).






















Alimoches de distintas edades (en las fotos primera a quinta, un adulto con anillas 23M –derecha- y de metal; y en la foto tercera, un ejemplar más con anilla amarilla), buitres negros, y buïtres leonados, en el comedero de buitres del Refugio. (Fotografías: Carlos Cuéllar Basterrechea / GREFA, con WWF España. Verano de 2018 [las fechas puestas están cambiadas]).



Alimoches de distintas edades (en las dos fotos inferiores, un adulto con la anilla amarilla 23M), buitre negro, buitres leonados, y cuervo, en el comedero de buitres del Refugio. (Fotografías: Carlos Cuéllar Basterrechea / GREFA, con WWF España. Verano de 2018 [las fechas puestas están cambiadas]).



Alimoches (en la fotos primera y tercera, un adulto con la anilla amarilla 23M; en las fotos tercera a quinta, un adulto con la anilla amarilla 3UH), buitre negro, y buitres leonados, en el comedero del Refugio. (Fotos: Carlos Cuéllar Basterrechea / GREFA, con WWF España. Verano de 2018 [las fechas puestas en las fotos están cambiadas]).



Alimoches (en la foto primera, un adulto con la anilla amarilla 3UH), buitres negros, y buitres leonados, en el comedero del Refugio. (Fotos: Carlos Cuéllar Basterrechea / GREFA, con WWF España. Verano de 2018 [las fechas puestas en las fotos están cambiadas]).






















Alimoches de distintas edades (en la foto octava, un adulto con la anilla amarilla 3UH), buitre negro, buitres leonados, y mirlo (éste, en las fotos sexta y décima), en el comedero del Refugio. (Fotos: Carlos Cuéllar Basterrechea / GREFA, con WWF España. Verano de 2018 [las fechas puestas en las fotos están cambiadas]).



Alimoches de distintas edades (en las dos fotos superiores, un adulto con anilla amarilla; en la foto cuarta, un adulto con la anilla amarilla 1V3; y en la foto cuarta, un inmaduro con anilla amarilla), buitres negros, y buitres leonados, en el comedero del Refugio. (Fotos: Carlos Cuéllar Basterrechea / GREFA, con WWF España. Verano de 2018 [las fechas puestas en las fotos están cambiadas]).



Alimoches (en la foto segunda, un adulto con la anilla amarilla 3UH; y en la foto décima, un adulto con la anilla amarilla 23M), buitres leonados, y cuervo (éste, en tres fotos), en el comedero del Refugio. (Fotos: Carlos Cuéllar Basterrechea / GREFA, con WWF España. Verano de 2018 [las fechas puestas en las fotos están cambiadas]).



Alimoches de distintas edades (nótese, en las fotos séptima a novena, la presencia de un inmaduro del tercer año con la anilla amarilla 98C; y en la foto décima, un joven del segundo año con anilla amarilla), y zorro (éste, en las fotos tercera a quinta), en el comedero del Refugio. (Fotos: Carlos Cuéllar Basterrechea / GREFA, con WWF España. Verano de 2018 [las fechas puestas en las fotos están cambiadas]).



Alimoches de distintas edades (en las fotos segunda a cuarta, un inmaduro del tercer año con la anilla amarilla derecha 98C; y en las fotos cuarta y quinta, un inmaduro del tercer año con la anilla amarilla izquierda 986), y cuervo, en el comedero del Refugio. (Fotografías: Carlos Cuéllar Basterrechea / GREFA, con WWF España. Verano de 2018 [las fechas puestas en las fotos están cambiadas]).



Buitres blancos (alimoches), negro, y leonado, de distintas edades, en el comedero del Refugio. (Fotografías: Carlos Cuéllar Basterrechea / GREFA, con WWF España. Verano de 2018 [las fechas puestas en las fotos están cambiadas]).



Buitres blancos (alimoches), negros, y leonado, de distintas edades, en el comedero del Refugio. (Fotografías: Carlos Cuéllar Basterrechea / GREFA, con WWF España. Verano de 2018 [las fechas puestas en las fotos están cambiadas]).



Alimoches de distintas edades, cuervo (en las segunda fila de fotos), buitre negro, buitres leonados, y zorro (en la primera fila de fotos), en el comedero del Refugio. (Fotografías: Carlos Cuéllar Basterrechea / GREFA, con WWF España. Verano de 2018 [las fechas puestas en las fotos están cambiadas]).

Última hora




Izquierda: Azor joven en Milagros (Burgos). (Fotografía: Juan José Molina Pérez. 23 de marzo de 2019.)
Derecha: Totovía en el barranco del Quite. (Fotografía: Juan José Molina Pérez. 23 de marzo de 2019.)




Cogujadas pos. comunes, en El Carrascal. (Fotografías: Juan José Molina Pérez. 23 de marzo de 2019.)




Triguero, en El Carrascal. (Fotografías: Juan José Molina Pérez. 23 de marzo de 2019.)





Corzo, en la zona de Maluque. (Fotografías: Juan José Molina Pérez. 23 de marzo de 2019.)

NOTA

Por razones prácticas, en las **Hojas Informativas sobre el Refugio** había seguido manteniendo el orden de la "**Lista de vertebrados del Refugio de Rapaces de Montejo (1975-1992)**", que publiqué en 1993; si bien en estos dos nuevos números (50 y 51) aparece la actualización indicada en la página 2. Manuel de Andrés Moreno proporciona amablemente la lista que se reproduce a continuación, de las especies mencionadas en las Hojas Informativas, con el orden actualizado de acuerdo con la siguiente referencia:

--- Gill, F.; y Donsker, D. (eds.) (2018). **IOC (International Ornithological Congress) World Bird List** (v. 9.1).

Aves paseriformes.-

PASSERIFORMES: Laniidae

Lanius collurio	ALCAUDÓN DORSIRROJO
Lanius excubitor	ALCAUDÓN NORTEÑO
Lanius meridionalis	ALCAUDÓN REAL
Lanius senator	ALCAUDÓN COMÚN

PASSERIFORMES: Oriolidae

Oriolus oriolus	OROPÉNDOLA EUROPEA

PASSERIFORMES: Corvidae

Garrulus glandarius	ARRENDAJO EUROASIÁTICO
Cyanopica cooki	RABILARGO IBÉRICO
Pica pica	URRACA COMÚN
Pyrrhocorax pyrrohocorax	CHOVA PIQUIRROJA
Pyrrhocorax graculus	CHOVA PIQUIGUALDA
Coloeus monedula	GRAJILLA OCCIDENTAL
Corvus frugilegus	GRAJA
Corvus corone	CORNEJA NEGRA
Corvus corax	CUERVO GRANDE

PASSERIFORMES: Paridae

Poecile palustris	CARBONERO PALUSTRE
Periparus ater	CARBONERO GARRAPINOS
Lophophanes cristatus	HERRERILLO CAPUCHINO
Cyanistes caeruleus	HERRERILLO COMÚN
Parus major	CARBONERO COMÚN

PASSERIFORMES: Remizidae

Remiz pendulinus	PÁJARO-MOSCÓN EUROPEO

PASSERIFORMES: Alaudidae

Lullula arborea	ALONDRA TOTOVÍA
Alauda arvensis	ALONDRA COMÚN
Galerida theklae	COGUJADA MONTESINA
Galerida cristata	COGUJADA COMÚN
Calandrella brachydactyla	TERRERA COMÚN
Melanocorypha calandra	CALANDRIA COMÚN
Chersophilus duponti	ALONDRA RICOTÍ
Alaudala rufescens	TERRERA MARISMEÑA

PASSERIFORMES: Hirundinidae

Riparia riparia	AVIÓN ZAPADOR
Hirundo rustica	GOLONDRINA COMÚN
Ptyonoprogne rupestris	AVIÓN ROQUERO
Delichon urbicum	AVIÓN COMÚN
Cecropis daurica	GOLONDRINA DÁURICA

PASSERIFORMES: Cettiidae

Cettia cetti	CETIA RUISEÑOR

PASSERIFORMES: Aegithalidae

Aegithalos caudatus	MITO COMÚN

PASSERIFORMES: Phylloscopidae

Phylloscopus trochilus	MOSQUITERO MUSICAL
Phylloscopus collybita	MOSQUITERO COMÚN
Phylloscopus ibericus	MOSQUITERO IBÉRICO
Phylloscopus bonelli	MOSQUITERO PAPIALBO
Phylloscopus sibilatrix	MOSQUITERO SILBADOR

PASSERIFORMES: Acrocephalidae

Acrocephalus arundinaceus	CARRICERO TORDAL
Acrocephalus melanopogon	CARRICERÍN REAL
Acrocephalus schnobaenus	CARRICERÍN COMÚN
Acrocephalus scirpaceus	CARRICERO COMÚN
Iduna opaca	ZARCERO BEREBER
Hippolais polyglotta	ZARCERO POLÍGLOTA

PASSERIFORMES: Locustellidae

Locustella naevia	BUSCARLA PINTOJA
Locustella luscinioides	BUSCARLA UNICOLOR

PASSERIFORMES: Cisticolidae

Cisticola juncidis	CISTÍCOLA BUITRÓN

PASSERIFORMES: Sylviidae

Sylvia atricapilla	CURRUCA CAPIROTADA
Sylvia borin	CURRUCA MOSQUITERA
Sylvia hortensis	CURRUCA MIRLONA
Sylvia communis	CURRUCA ZARCERA
Sylvia undata	CURRUCA RABILARGA
Sylvia balearica	CURRUCA BALEAR
Sylvia conspicillata	CURRUCA TOMILLERA
Sylvia canillans	CURRUCA CARRASQUEÑA
Sylvia melanocephala	CURRUCA CABECINEGRA

PASSERIFORMES: Regulidae

Regulus ignicapilla	REYEZUELO LISTADO
Regulus regulus	REYEZUELO SENCILLO

PASSERIFORMES: Troglodytidae

Troglodytes troglodytes	CHOCHÍN COMÚN

PASSERIFORMES: Sittidae

Sitta europaea	TREPADOR AZUL

PASSERIFORMES: Tichodromidae

Tichodroma muraria	TREPARRISCOS

PASSERIFORMES: Cerhiidae

Certhia brachydactyla	AGATEADOR EUROPEO

PASSERIFORMES: Sturnidae

Sturnus vulgaris	ESTORNINO PINTO
Sturnus unicolor	ESTORNINO NEGRO

PASSERIFORMES: Turdidae

Turdus torquatus	MIRLO CAPIBLANCO
Turdus merula	MIRLO COMÚN
Turdus pilaris	ZORZAL REAL
Turdus iliacus	ZORZAL ALIRROJO
Turdus philomelos	ZORZAL COMÚN
Turdus viscivorus	ZORZAL CHARLO

PASSERIFORMES: Muscicapidae

Cercotrichas galactotes	ALZACOLA ROJIZO
Muscicapa striata	PAPAMOSCAS GRIS
Erithacus rubecula	PETIRROJO EUROPEO
Luscinia svecica	PECHIAZUL
Luscinia megarhynchos	RUISEÑOR COMÚN
Rangifer tarandus	COLIAZUL CEJIBLANCO
Ficedula hypoleuca	PAPAMOSCAS CERROJILLO
Phoenicurus ochruros	COLIRROJO TIZÓN
Phoenicurus phoenicurus	COLIRROJO REAL
Monticola saxatilis	ROQUERO ROJO
Monticola solitarius	ROQUERO SOLITARIO
Saxicola rubetra	TARABILLA NORTEÑA
Saxicola rubicola	TARABILLA COMÚN
Oenanthe oenanthe	COLLALBA GRIS
Oenanthe hispanica	COLLALBA RUBIA
Oenanthe leucura	COLLALBA NEGRA

PASSERIFORMES: Cinclidae

Cinclus cinclus	MIRLO-ACUÁTICO EUROPEO

PASSERIFORMES: Passeridae

Passer domesticus	GORRIÓN COMÚN
Passer hispaniolensis	GORRIÓN MORUNO
Passer montanus	GORRIÓN MOLINERO
Petronia petronia	GORRIÓN CHILLÓN
Montifringilla nivalis	GORRIÓN ALPINO

PASSERIFORMES: Estrildidae

Taeniopygia guttata	DIAMANTE CEBRA

PASSERIFORMES: Prunellidae

Prunella collaris	ACENTOR ALPINO
Prunella modularis	ACENTOR COMÚN

PASSERIFORMES: Motacillidae

Motacilla flava	LAVANDERA BOYERA
Motacilla cinerea	LAVANDERA CASCADEÑA
Motacilla Alba	LAVANDERA BLANCA
Anthus campestris	BISBITA CAMPESTRE
Anthus pratensis	BISBITA PRATENSE
Anthus trivialis	BISBITA ARBÓREO
Anthus spinoletta	BISBITA ALPINO

PASSERIFORMES: Fringillidae

Fringilla coelebs	PINZÓN VULGAR
Fringilla montifringilla	PINZÓN REAL
Coccothraustes coccothraustes	PICOGORDO
Pyrrhula pyrrhula	CAMACHUELO COMÚN
Chloris chloris	VERDERÓN COMÚN
Linaria cannabina	PARDILLO COMÚN
Loxia curvirostra	PIQUITUERTO COMÚN
Carduelis carduelis	JILGUERO EUROPEO
Carduelis citrinella	VERDERÓN SERRANO
Serinus serinus	SERÍN VERDECILLO
Spinus spinus	LÚGANO

PASSERIFORMES: Emberizidae

Emberiza calandra	ESCRIBANO TRIGUERO
Emberiza citrinella	ESCRIBANO CERILLO
Emberiza cia	ESCRIBANO MONTESINO
Emberiza hortulana	ESCRIBANO HORTELANO
Emberiza cirlus	ESCRIBANO SOTEÑO
Emberiza schoeniclus	ESCRIBANO PALUSTRE





Alimoches de distintas edades, y buitres leonados, en el comedero del Refugio. (Fotografías: Carlos Cuéllar Basterrechea / GREFA, con WWF España. Verano de 2018 [las fechas puestas en las fotos están cambiadas]).


AGRADECIMIENTOS

A todas las personas que creyeron en este Refugio de vida salvaje, como medio de defender esa tierra, sus espléndidas poblaciones de aves rapaces, y el resto de su fauna y de la riqueza natural que alberga; y que trabajaron de forma noble y generosa, a menudo manteniendo un gran esfuerzo durante mucho tiempo, y en casi todos los casos sin obtener a cambio ninguna recompensa material, para convertir el Refugio en una realidad, y para que siguiera existiendo.

Además de las personas que aparecen citadas a lo largo de la presente Hoja Informativa, quisiera destacar también, en el último año, la amable colaboración de Lespicinio Abad Merino, Jesús Abad Soria, Abubilla Ecoturismo, ACENVA (Asociación para la Conservación y Estudio de la Naturaleza de Valladolid), ADENEX, León Adrados Rincón, José Aguilera Díez, José Manuel Aguilera Sanz, Javier Alcalde Cuña, Beatriz Alcalde Hornillos, Javier Alcalde Martín, Nuria Álvarez-Acebedo Salan, José Félix Aladrén Rubio, Carolina Álvarez Cano, Eduardo Álvarez Cebrián, Ernesto Álvarez Xusto, AMUS, Manuel de Andrés Moreno, Jesús Javier Andrés Rodríguez, Damián Arguch Sánchez, Diana Teresa Argüello Díaz, Sergio Arís Arderiu, Marina Arévalo de la Plaza, Martín Francisco Arévalo Sánchez, José Luis Armendáriz Sanz, Yolanda Arrabal Agüera, Rubén Arrabal Espeja, Asociación de Alumnos y Ex--alumnos de Ciencias Ambientales de la UNED, Asociación Caralluma (Murcia), Asociación Cultural "Nuevo Horizonte" (Villaverde de Montejo, Segovia), Asociación Cultural "Monte Irago" (Astorga, León), Consuelo Atencia Páez, Fernando Ávila Vico, Ayuntamiento de Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia), Dr. Juan José Bacallado Aránega, Javier Balset Izquierdo, Luis Bartolomé Martínez, Pedro José Bartolomé Sanz, Dr. Xavier Batllori Aguilá, Dr. Jordi Batllori Aguilá, José Antonio Benito Martín, Juan Carlos Benito Martín, Luis Benito Martín, Marisol Benito Martín, Pedro Benito Martín, Rafael Benito Martín, Victorina Bernal Bernal, Dr. Francisco Bernis Carro, Blas Berzal Cáceres, Biblioteca Pública Municipal de Aranda de Duero, Biblioteca Pública Municipal de Albendea (Cuenca), Abilio Eutiquio Blázquez Alonso, Ángel Bocos García, Bettina Boemans, bodega Kirios de Adrada de Haza, Ana José Bonilla Fernández, Dr. Alberto Borobia Vizmanos, Manuel Pablo Box Sánchez, José Manuel Boy Carnona, Miguel Briones Díez, Pablo Briones González, Dr. Emilio Bujalance García, Dr. José Antonio Bujalance García, Josefina Cabarga Gómez, Gema Cáceres Miguel, Alfredo Calleja Benito, Ascensión Calleja Benito, Carlos Calleja Corento, Yolanda Calleja Corento, Cándido Calleja Tristán, Cristian Calvo Vergara, Marcial Camacho Núñez, Francisco Camarero Rodríguez, Álvaro Camiña Cardenal, Carlos Cano Barbacil, Juan Carlos Cano Calleja, María Cano Calleja, Javier Cano Sánchez, Juan Antonio de Cara García, Ricardo Carbajal Vega, Guillermo Carmona Castresana, Juan José Carmona Moreno, Cárnicas Minchán, Juan Luis Carranza Briones, Casa del Parque Hoces del Riaza, Susana Casado Campos Pedro Luis Castilla Apolonio, Anastasio Castro Arroyo, Mariano Castro Carravilla, Antonio Cavadas Sanz, Francisco Cebas Miguel, Teótimo Cerezo de Grado, Américo Cerqueira Valle, Bruno Chacón Espinosa, CHD (Confederación Hidrográfica del Duero), María José Chicharro Lafuente, Francisco Chiclana Moreno, Dr. Francisco Javier Cirre Torres, Jesús Cobo Anula, Colectivo Azálvaro (Segovia), Colectivo Ornitológico Cigüeña Negra (COCN), Wendy Collinson, Dr. Antonio Félix Costa González, Javier Cotín Martínez, Toñi Cruz Izquierdo, Juan de la Cruz Rubio, Toñi de la Cruz Rubio, Yolanda de la Cruz Rubio, Mª Mar Cuadrado Gutiérrez, Carlos Cuéllar Basterrechea, Mariana Curado Malta, Christian Cussonneau, Dr. José Antonio Dávila García, Marianne Delacrétaz (viuda de Daniel Magnenat, quien me envió en 2018-19 una nueva ayuda económica póstuma de Daniel para contribuir a hacer frente a los gastos sobre el Refugio, Hojas Informativas incluidas), Françoise Delepoulle, Dr. Miguel Delgado Pineda, Rosa Díez de Artazcoz Abellán, Miguel Ángel Díez Hidalgo, Miriam Domingo García, Javier de Domingo Pérez, Diputación de Burgos, Martí Alexandre Dot Ventalló, Pedro Ejarque Lobo, Ángel Encinas Sanz, Jesús Escobar Téllez, Dra. Mª Carmen Escribano Ródenas, Beatriz Esgueva Abad, Azucena Esteban Vallejo, Dra. Beatriz Estrada López, EWT (Endangered Wildlife Trust), FAB (Fondo Amigos del Buitre), David Fajardo Orellana, FAPAS (Fondo para la Protección de los Animales Salvajes), Matilde Fernández-Arroyo y Cabeza de Vaca, Agustín Fernández y Fernández-Arroyo, Antonio Jesús Fernández y Fernández-Arroyo, José Manuel Fernández y Fernández-Arroyo, María Matilde Fernández y Fernández-Arroyo, José María Fernández García, Francisco Jesús Fernández Herrera, Antonio Fernández Ortiz, José Luis Fernández Pérez, Luis Antonio Flores Ocejo, Luisa Fragua Domínguez, Paloma Fraguío Piñas, Beatriz Fraile Sánchez, Adolfo Frías Aguilera, Cándido de la Fuente de la Osada, José Luis de la Fuente Mayoral, Juan José Fuentenebro Martín, Ana Belén Fuentenebro Rubio, Laureano Fuentespina, Fernando Fuentespina Valderrama, Lucas Gadea Cáceres, Francisco Javier Gadea Castro, Martín Gadea Castro, Tomás Gadea Castro, Rafael Galán Romero, Juan Luis Galindo Estévez, José Ignacio Gallo Fernández, Fernando Garcés Toledano, Dr. José María García Álvarez, Susana García Andrés, Raúl García Arranz, José Antonio García Baciero, Juan Jesús García Baciero, Lucía García Cornejo, Patricio García del Cura, Fernando García Fernández, Rafael

García Fernández, Ricardo García Fernández, Dr. Iván García Izquierdo, Carlos García Pérez, Pilar García San José, Ignacio García Sanz, Mª Socorro García Vara, Dr. Ángel Garrido Bullón, Jesús Garzón Heydt, Marta Gatti, Álvaro Gómez Casado, Julia Gómez Catasús, María José Gómez Domingo, J. Ramón Gómez Fernández, María José Gómez Domingo, Antonio Gómez Manzano, Francisco Gómez Montes, Emilio Gómez Samitier, Elías Gomis Martín, Cristóbal Gomiz Castillo, José González de Mingo, Ana Belén González Piriz, Raúl González Rodríguez, Fernanda González Zubieta, Eduardo Gorriz Moreno, Miguel Ángel Granado Iglesias, Anselmo Granado Sarabia, Violeta Granado Sarabia, GREFA (Grupo para la Recuperación de la Fauna Autóctona y su Hábitat), Joachim Griesinger, Grupo Cabrera, Grupo Local SEO-Badajoz, Grupo Local SEO-Barcelona, Grupo Local WWF Córdoba, Álvaro Guerrero Mayo, Alberto Guerrero Moreno, Montserrat Gutiérrez Fernández, Roberto Hartasánchez Martínez, Jorge Manuel Hernández Núñez, José Luis Hernández Pérez, Juan Luis Hernández, Dra. Beatriz Hernando Boto, Juan Manuel Hernando Encinas, Gema Hernando García, Isabel Hernando García, José Antonio Hernando García, Araceli Hernando Iglesias, Brígida Hernando Iglesias (fallecida en 2018), Gema Hernando Iglesias, Hoticiano Hernando Iglesias (fallecido el 29-5-2015), Jesús Hernando Iglesias, José Antonio Hernando Iglesias, Carmelo Hernándo Sualdea, David Hernando Tomé, Juan Carlos Hernando Vicente, Teresa Herranz de Contreras, Vicente Herrero Carretes, José Miguel Ibáñez de la Fuente, Candelas Iglesias Aparicio, Honorio Iglesias García, Guillermo Iglesias Sanz, Mauricio Iglesias Sanz, Juan Manuel Izquierdo Calleja, Irene Jara Escobosa, Helena Jáuregui Díaz de Cerio, Juan Jiménez Pérez, Fernando Jiménez Raigón, Junta de Extremadura, Lorena Juste, Mikel Kebuteh Sanno, Fernando Lafuente Aylagas, Antonia de Lama García, Alfonso Lario Doylataguerra, Jesús Lázaro de Diego, Ángel Leiva Lozano, José Liarte de Blas, Mario Liarte Lozano, José Luis Lobo Cueva, Dr. Jorge López Abad, Francisco Javier López-Escobar Anguiano, Miguel Ángel López Fernández, Alfredo López Hernangómez, Francisco López Laguna, Manuel López Lázaro, José Luis López-Pozuelo García, José María Lozoya Cañas, Raúl Madrid Moraleda, Daniel Magnenat (a título póstumo), Rafael Marina García, Paloma Maroto Moreno, Juan Francisco Martín Aceves, Dra. Rosa María Martín Aranda, Jorge Martín Arevalillo, Francisco Martín Arranz, Juan Francisco Martín Calleja, Milagros Martín García, Jesús Martín González, Soraya Martín Hernando, Miguel Ángel Martín Jiménez, Mercedes Martín Miguel, Luis Martín Moral, María Martín Sánchez, Xavier Martín Vilar, Asier Martínez Arrieta, Dr. Pedro José Martínez de Paz, María Luisa Martínez Flores, José María Martínez Mediano, Félix Martínez Olivas, Ezequiel Martínez Rodríguez, Dr. Juan Martos Quesada, Pascual Mate Alonso, Stefano Mazzoletti, Bernd Meyburg, Manuel Miguel Abajo, Héctor Miguel Antequera, Quintín Miguel Serrano, Abelardo Mínguez Bernal, Blas Mínguez Bernal, Juan José Mínguez Bernal, Sebastián Molano, David Molina Hernández, Juan José Molina Pérez, Juan Molina Ramírez, Blas Molina Vilariño, Jesús Moneo Gayubo, José Antonio Montero Calvo, Lesmes Pascual Moral de Blas, Zebensui Morales Reyes, Juan de Dios Morenilla Carrascal, Saturnino Moreno Borrell, Carmen Moreno Pérez, Laura Moreno Ruiz, Dra. Mª José Muñoz Bouzo, David Muñoz González, José Luis Nava Rueda, Raúl Navas Sanz, Roberto Negro Cobo, Raphaël Néouze, Fernando Nieva Palacios, Marta Novo Rodríguez, Noa Novo Rodríguez, Elda Maribel Núñez García, Marcos Núñez Laiseca, Jesús Núñez Pintor, Gema Ocaña Llandrés, Juan Carlos del Olmo Castillejos, Onda Cero de Segovia, Onda El Espinar, Florina Orbesteanu, Gonzalo Ortega Cabarga, Francisco Javier Ortega Pinilla, Alfredo Ortega Sirvent, Carlos Palma Barcenilla, Xavier Parra Cuenca, José Miguel Pascual Arranz, Carlos Pecharromán Perosanz, Mª Belén Peña Arenas, Julio Peña Herrero, Dr. Javier Pérez Álvarez, Milagros Pérez Cuevas, Pablo Pérez García, Maite Pérez Lara, Pilar Pérez Soler, Miguel del Pino Luengo, José Antonio Pinzolas Torremocha, Gerardo Pizarro García, Dra. Ana Mª Porto Ferreira da Silva, Miguel Pou Vázquez, Javier Prieta Díez, Juan Prieto Martín, Javier de la Puente Nilsson, Radio Nacional de España en Segovia, Radio Segovia, Radio Sepúlveda, Dr. Eduardo Ramos Méndez, Ricardo Ramos Sánchez, Fernando Redondo Berdugo, Fermín Redondo Ramírez, Jorge Andrés Remacha Lorenzo, Andrés Requejo de las Heras, Joel Reyes Núñez, Juan Carlos Rincón García, Santos Reprografía, José Félix Rodríguez Calcerrada, Odile Rodríguez de la Fuente Parmentier, Dr. Pedro Rodríguez Panizo, Jesús Rodríguez Sánchez, Dra. María Luisa Rojas Cervantes, Francisco Javier Rojo Fernández, Fernando Román Sancho, José Román Rodríguez, Antonio Romera Camarero, Andrés Romero Bravo, José Luis Romero Carayol, José Rozas González, Miguel Rozas Iturrate, Jorge Javier Rubio Casado, Benito Ruiz Calatayud, Ángel Ruiz Fernández, Antonio Ruiz Heredia, Manuel Jesús Sahagún Rodríguez, Salva la Selva, Dr. Francisco Sánchez-Bayo Sánchez, Emilia Sánchez Coca, Antonio María Sánchez Conde, Ismael Sánchez Espósito, Rafael Sánchez Pérez, Cristina Sancho Gómez, Gonzalo San Frutos de Diego, Inmaculada San José Negro, Antonio Sanz Carro, Miguel Ángel Sanz Gutiérrez, Víctor Sanz Hernando, Santiago Sanz Rincón, Miguel Sanz Trillo, Pablo Sanz Trillo, Segovia al Día, Santiago Segovia Pérez, Àlvar Seguí Romà, SEO Barcelona, Servicio de Vida Silvestre de la Generalitat Valenciana, Luis Sitges Aparicio, Cristina Sobrado Calvo, Sociedad de Amigos del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Jesús Solana Ramos, Yolanda Soriano, Javier Sualdea Sanz, Carlos Sunyer Lachiondo, Erich Tenbrink, Michel Terrasse, Dra. Evelyn Tewes, Lourdes Tiemblo Blázquez, Tienda

Verde, Pedro Torres Expósito, Diego Tripiana, UNED, Elena del Val del Olmo, Juanita Valderrama González, Ana Valenciano Serrano, Benigno Varillas Suárez, José Velasco Cabas, Juan Miguel Velasco de Miguel, Antonio Velasco Pineda, Carmen Verde López, Juan Carlos Vicente Arranz, Almudena Vicente López, Miguel Jesús Villafáfila Cejuela, Javier Vitores Casado, Kerri Wolter, WWF España (Adena), Grupo Local WWF Barcelona, Dr. Manuel Yuste Llandres, Pilar Yuste Pascual, Antonio Zaragozí Llenes, todos los participantes en los últimos censos de otoño (799 personas han participado hasta ahora), y todos los profesores y alumnos de las "*Jornadas sobre Buitres I, II y III*". Y de otros muchos a los que también debería nombrar y en estos momentos no recuerdo, a los que ruego me disculpen.



Buitres leonados en el comedero de buitres del Refugio de Montejo. A la izquierda, un adulto anillado. En el centro y a la derecha, en primer término, un adulto con el buche lleno. (Fotografías. Jesús Cobo Anula, biólogo conservador del Refugio, de WWF España, el 31 de julio de 2018.)



Alimoche adulto (arriba) y joven del tercer año (abajo), ambos con mancha en la cara, con buitres leonados, en el comedero de buitres del Refugio de Rapaces de Montejo. (Fotografías: Jesús Cobo Anula, biólogo conservador del Refugio, de WWF España, el 16 de julio de 2018.)

ÍNDICE

1.....Nota. / Introducción y comentarios.
2…....AVES (Paseriformes)
2……*Alaudidae* (aláudidos; alondras, calandria, terreras, cogujadas, totovía)
6……*Hirundinidae* (hirundínidos; aviones y golondrinas)
12……....*Motacillidae* (bisbitas y lavanderas)
16……*Cinclidae* (mirlo acuático)
16……*Troglodytidae* (chochín)
16……*Prunellidae* (acentores)
16……*Turdidae* (túrdidos; alzacola, petirrojo, ruiseñor común, pechiazul, coliazul, colirrojos, tarabillas, collalbas, roqueros, mirlos y zorzales)
28……*Sylviidae* (ruiseñor bastardo, buitrón, buscarlas y carricerines y carriceros, zarceros, currucas, mosquiteros y reyezuelos)
36……*Muscicapidae* (papamoscas)
37……*Aegithalidae* (mito)
37……*Paridae* (páridos; carboneros y herrerillos)
38……*Sittidae* (trepador azul)
39……*Tichodromadidae* (treparriscos)
39……*Certhiidae* (agateador)
39……*Remizidae* (pájaro moscón)
39……*Oriolidae* (oropéndola)
39……*Laniidae* (alcaudones)
42……..…..*Corvidae* (córvidos; arrendajo, rabilargo, urraca, chovas, grajilla, graja, corneja, cuervo)
60……..…..*Sturnidae* (estorninos)
61..……..*Passeridae* (gorriones)
64……*Estrildidae* (diamante cebra de Timor)
64……*Fringillidae* (fringílidos; pinzones, verdecillo, verderones, jilguero, lúgano, pardillo, piquituerto, camachuelo, picogordo)
67……*Emberizidae* (emberícidos; escribanos y triguero)

70……..MAMÍFEROS
70……Insectívoros (erizo, musarañas, musgaños, topo y desmán)
71……Quirópteros (murciélagos)
73……Lagomorfos (liebre y conejo)
77……Roedores (ardilla, lirón, topillos, ratas y ratones)
79……Carnívoros (lobo, zorro, tejón, armiño, comadreja, visón, turón, nutria, garduña, meloncillo, gineta, gato montés)
91..……...Artiodáctilos (jabalí, ciervo, corzo)

104…….REPTILES
104..……....Quelonios (galápago)
104…….Saurios (salamanquesa, lagartijas, lagartos, lución, eslizones)
106…….Anfisbénidos (culebrilla ciega)
106…….Ofidios (culebras y víbora)

109…..…ANFIBIOS
109…….Urodelos (salamandra, gallipato y tritones)
110…….Anuros (sapos, sapillos, ranita y rana)

118……..PECES
118…….Anguilliformes (anguila)
118…….Salmoniformes (trucha)
119…….Cypriniformes (barbo, pez rojo, carpa, bermejuela, boga, gobio, bordallo, piscardo, tenca, lamprehuela)
120…….Perciformes (pez sol, perca americana)

121……..Frases diversas

122……..Notas sobre invertebrados

128……..Nota sobre plantas
129……..Notas sobre hongos
129……..Miscelánea
130……..AVISOS
133…….Respuestas de la Ciencia (Radio 5). Nuevos mini-programas grabados el 30 de octubre de 2018
135…..….ANEXO 0. Hoces del Riaza: el Refugio de Rapaces cumple 44 años.
137…….Informe presentado el 13-3-19, en la reunión del Patronato del Parque Natural.
151……..ANEXO I. Nuevos datos sobre festines observados en los comederos de buitres.
161……..ANEXO II. Nuevos datos sobre anillas leídas de buitres leonados.
171……..ANEXO III. Datos sobre buitres leonados con anilla leída entre de 2007 y marzo de 2019.
263……..ANEXO IV. Algunos datos sobre nuevas observaciones de aves acuáticas.
271……..ANEXO V. Nuevas publicaciones, conferencias, congresos, informes y películas.
294……..Anexo fotográfico.
489……..NOTA
492……..AGRADECIMIENTOS.







Buitres leonados, a la derecha con alimoche del tercer año, en el comedero del Refugio de Montejo. (Fotografías: Jesús Cobo Anula, biólogo conservador del Refugio, de WWF España, los días 31 de julio [izquierda y centro] y 16 de julio [derecha] de 2018.)